

ویژگی های کام نگاری همخوان های زبانی کامی فارسی

Palatographic specification of lingual-palatal consonants in persian language

زهرا آقا رسولی^۱، آرش بھلولی^۲، محمد رضا کیهانی^۱، فرهاد ترابی نژاد^۲

Zahra Agharasouli¹, Arash Bohlooli², Mohammad Reza keyhani¹, Farhad Torabinezhad²

چکیده

هدف: هدف این مطالعه بررسی ویژگی های کام نگاری همخوان های زبانی - کامی فارسی است. تا کنون تحقیقی در زبان فارسی انجام نگرفته است، از این رو، تحقیق اخیر با هدف مشخص نمودن الگوهای طبیعی تماس زبان به کام و تعیین تغییر پذیری درون فردی تولید همخوان های زبانی - کامی فارسی، طراحی گشته است. مواد و روش ها: در این تحقیق، ۱۶ همخوان زبانی - کامی فارسی مورد بررسی قرار گرفتند. برای هر همخوان چهل نمونه هجایی (از چهار فرد مورد بررسی) بدست آمد. این همخوان ها در قالب هجاهای (CVCV) و با واکه باز /a/ ادا شدند. ابتدا برای هر همخوان الگوی حداکثر تماس انتخاب شد. سپس از روی این الگو، الگوی نماینده هر فرد بدست آمد. از روی این الگو ها نیز الگوی نماینده کل بدست آمد که همان الگوی تماس کلی می باشد.

یافته ها: در این بررسی الگوهای متفاوت تماس در همخوان های مختلف مشخص شد. همچنین نشان داده شد همخوان های مختلف از لحاظ شاخص تغییر پذیری، مقادیر مختلفی داشتند، بطوریکه همخوان های /n/, /l/, /ʃ/ بیشترین میزان تغییر پذیری را به خود اختصاص دادند و همخوان های انسدادی و سایشی نیز کمترین میزان تغییر پذیری را بدست آوردندا.

نتیجه گیری: همخوانهای مختلف فارسی، الگوهای تماس مختلفی دارند و این نتایج با مطالعات مشابه در زبان های خارجی همگونی بسیاری دارد.

وازگان کلیدی: کام نگاری، الگوهای تماس، تغییر پذیری

Abstract

Objective: This research is designed to study palatographic specification of lingual-palatal consonants in Persian language. Since there is not any research about the lingua-palatal contacts in Persian language, this research is designed to determine these "normal" contact patterns and variability of Persian consonant production.

Materials and Methods: In this study 16 consonants have been studied. Subjects were 4 normal adults. Each person repeated every consonant 10 times in (CVCV) syllable with vowel /a/. Frame of maximum contact for each consonant was determined. Individual and overall representative frames obtained from those frames.

Results: There are different patterns of variability between Persian consonants. Consonants /n/, /l/, and /ʃ/ display more variable articulation and stops and affricates display less variable articulation than others.

Conclusion: Persian consonants have different contact patterns. These findings are in accordance with previous studies in other languages.

Key words: palatography, contact patterns, variability

۱- IUMS Sientific Board Member

۲- MSc in speech and language pathology

۱- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲- کارشناس ارشد گفتاردرمانی

نشانی مکاتبه: تهران - میدان مادر - خیابان شهید شاه نظری - دانشکده علوم توانبخشی - گروه گفتاردرمانی

Email: zahraagharaouli@yahoo.com

مقدمه

امروزه با پیدا شدن ابزارهای الکترونیکی و رایانه ای امکان ارزیابی و درمان اختلالات گفتاری به شیوه ای دقیق تر فراهم آمده است. کام نگاری نیز یکی از همین روش ها است. این دستگاه تماس های زبان به کام را در حین تولید همخوان ها ثبت می کند و کارایی آن در این است که امکان نمایش پویا و همزمانی از تولید گفتار را فراهم می آورد (۱). کام نگاری به منظور ضبط جزئیات مربوط به زمان بندی و جایگاه تماس های زبان به کام طی گفتار پیوسته طراحی شده است (۲).

در بحث ارزیابی و درمان با کام نگار آنچه بیش از حد ضروری می نماید در دست داشتن اطلاعاتی در مورد الگوی طبیعی تماس در همخوان های زبانی - کامی می باشد. این مساله بخوبی مشخص شده است که تا زمانی که جنبه های تولید گفتار طبیعی و سطوح تغییر پذیری بصورت کمی مشخص نشده باشند، تحقیقات ابزاری تولید گفتار ارزش اند کی خواهند داشت (۴). هیجینز^۱ در ۱۹۹۴ ذکر کرده است که توانایی ابزارها برای تعیین و توصیف اختلالاتی که منشاء عصب شناختی دارند، در صورتی که میزان تغییر پذیری درون فردی ، بصورت دقیق مشخص نشده باشد بسیار محدود خواهد بود (۴). مکالیفه^۲ در زمینه توجه به الگوهای تماس زبانی - کامی هنجار چنین می گوید:

تحقیقات پیشین که از کام نگاری بعنوان نوعی ابزار ارزیابی بزرگسالان استفاده نموده اند، اساساً بر روی توصیف اختلال گفتاری متمرکز شده اند و توجه اند کی به مقایسه با داده های هنجار و بویژه داده های مربوط به تغییر پذیری درون فردی نموده اند. صرفاً در مطالعات انگشت شماری الگوهای طبیعی تماس زبانی - کامی در بزرگسالان توصیف شده اند. متناسبانه در مطالعات پیشین، به دفعات مقایسه هایی بین گروه های افراد بیمار و سالم انجام گرفته است، بدون اینکه در این مقایسه ها از هرگونه داده های هنجار استفاده ای شود. بکارگیری مناسب کام نگاری در تحقیقات، نیازمند داده های هنجار مناسبی همچون الگوهای تماس زبان به کام،

توصیف این الگوها و اندازه گیری تغییر پذیری در تولید گفتار طبیعی می باشد (۴).

نتایج مطالعات انجام گرفته با کام نگار نشان میدهد که همخوان /l/ دارای تغییر پذیری درون فردی بیشتری نسبت به همخوانهای /s/t/ می باشد (۴). داگنایس^۳، ۱۹۹۴، الگوی تماس را در همخوانهای مورد مطالعه خود چنین شرح داد. در انسدادهای لثوی تماس پیوسته ای در طول برجستگی لثوی و برجستگی های لثوی کناری دیده می شود. در انسدادهای نرم کامی تماس کامل در لبه خلفی شکل نمی گیرد. در سایشی ها تماس طرفی در طول برجستگی های لثوی و یک شیار قدامی - خلفی بدون تماس در حدود برآمدگی پشت دندان های پیشین ایجاد می شود . در همخوان روان /r/ تماس زبانی کامی، در طول بخش های خلفی برجستگی پشت دندان های پیشین ایجاد می شود (۵). فلچر^۴ ۱۹۸۹ نیز ذکر می کند که همخوان های انسدادی - سایشی از بخش های سایش و انسداد تشکیل شده اند که بخش سایش آنها در همان مکان و با ابعاد شیار مشابه با ۳/۱/ آ شکل می گیرند (۱).

با توجه به اینکه الگوهای تماس زبان به کام (نقاطی از کام که طی تولید یک همخوان در گیر هستند)، مختصه هایی هستند که از زبانی به زبان دیگر تغییر می کنند و در زبان فارسی نیز مشخصات این الگوها در دسترس نیست، این تحقیق در صدد تعیین شکل الگوهای تماس در گویندگان طبیعی فارسی زبان و تعیین میزان تغییر پذیری درون فردی این الگوها در بین گویندگان فارسی زبان می باشد.

مواد و روش ها

این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. جمعیت مورد مطالعه دانشجویان ۲۰ تا ۲۵ ساله دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و نمونه مورد مطالعه، چهار نفر از این جمعیت (دو مرد و دو زن) بودند. تمامی این افراد دارای اکلوژن دندانی طبیعی بوده و هیچ گونه اختلال گفتاری در گذشته و حال نداشتهند.


نصف فضای بین چهار ردیف خلفی می گردد . همانند ردیف های یک و هشت در این ردیف ها نیز الکتروودها با فواصل یکسان قرار می گیرند. انتخاب خطوط مرجع آناتومیکی و قرار دهی الکتروودها در فواصل مناسب در بین این خطوط این امکان را فراهم می آورد که اندازه ها و اشکال مختلف کام ، با استناد به جایگاه ردیف و الکتروود خاص مقایسه شوند، به عنوان مثال ردیف شماره ۳ (سومین ردیف از قدام که روی لبه بر جستگی لشوی قرار می گیرد)، در افراد مختلف ارتباط مشابهی با کام و دندان های افراد دارد.

ابتدا فرآیند نمونه گیری برای فرد آزمایش شونده توضیح داده شد. سپس به منظور ایجاد تطابق با کام فرد می بایست قبل از نمونه گیری کام مصنوعی را بمدت یک ساعت در دهان قرار می داد(۲۰). آزمون شونده در یک اتاق اکوستیک روی صندلی می نشست. فاصله وی تا میکروفون ۲۰ سانتی متر بود و طی آزمایش به صفحه نمایش دستگاه نگاه نمی کرد. کارت های مربوط به فهرست هجاهای که حاوی هجاهای مورد بررسی بودند بصورت تصادفی انتخاب می شدند و در مقابل فرد آزمایش شونده (در فاصله ۲۰ سانتی متری وی) قرار می گرفتند. این فهرست مشتمل بر ۱۶ همخوان زبانی کامی بود که این همخوان ها در قالب هجای همخوان - واکه - همخوان- واکه و با واکه باز /a/ قرار داشتند، علت انتخاب واکه /a/ به عنوان بافت مجاور همخوان های مورد بررسی این بود که تأثیرات هماهنگی تولید بافت های اطراف بر روی همخوان مورد مطالعه به حداقل کاهش یابد و تماسی که از این طریق بدست می آید، نمایانگر تماس واج تنها باشد. با هر بار پخش علامت صوتی توسط دستگاه آزمون شونده می بایست یکبار هجای مورد نظر را تکرار می کرد. الگوی تماس زبان به کام در فواصل ۱۰ میلی ثانیه بدست می آمد. بین نمونه گیری ها حداقل ۱۰ تا ۱۵ ثانیه زمان وجود داشت. در نهایت برای هر هجا از هر فرد ده نمونه ذخیره گردید (۴۰ هجا از کل افراد). کامپیوتر اطلاعات صوتی و تماسی نمونه ها را بصورت طیف نگاشت و زنجیره الگو های تماس نمایش می داد.

در این تحقیق از سیستم کام نگاری Reading با نسخه نرم افزاری ۱/۱ استفاده شد. برای افراد مورد مطالعه کام مصنوعی ساخته شد. مشخصات این کامها منطبق بر شیوه ۶۲ الکتروودی دانشگاه Reading بود، در این شیوه نحوه چینش الکتروودها بر روی کام به ترتیب زیر است:

ابتدا سه خط مرجع زیر بر روی سطح کام ترسیم می شود (شکل ۱).

۱. یک خط بصورت افقی در عرض بخش فوقانی مدل و در امتداد خط اتصال بین دندان های قدامی و لئه ترسیم می شود.
۲. یک خط بصورت افقی در امتداد محل اتصال نرمکام و سخت کام ترسیم می شود.
۳. یک خط به حالت عمودی از مرکز کام بصورت قدام به خلف رسم می شود.



شکل ۱) نحوه چینش الکتروودها بر اساس خطوط مرجع (۱)

۶۲ الکتروود در هشت ردیف افقی با هشت الکتروود در هر ردیف (بجز ردیف اول که شش الکتروود دارد) قرار می گیرند. قدامی ترین و خلفی ترین ردیف ها بر روی دو خط مرجع افقی (خطوط ۲۱ و ۲۰) قرار می گیرند. در طول این خطوط افقی، الکتروودها در فواصل یکسانی قرار می گیرند. کناری ترین الکتروودها نیز درست در سمت داخلی دندان های کناری قرار می گیرند. ردیف های باقیمانده به نحوی مرتب می شوند که فضای بین چهار ردیف قدامی، معادل

بدست می آمد با هم جمع شده و تقسیم بر تعداد افراد می شد تا مقدار میانگین جامعه بدست آید این میانگین میزان تغییر پذیری موجود در تکرارهای هر واژ را مشخص می ساخت (۴) (پیوست ۱).


آزمونهای آماری مورد استفاده در این تحقیق ، شامل آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) برای بررسی وجود اختلاف معنی دار در بین میانگین های مقادیر مورد نظر و Post hoc برای مشخص نمودن دو متغیر دارای اختلاف معنی دار بود.

یافته ها

شکل تماس همخوان های مورد مطالعه(پیوست ۲) به صورت زیر بدست آمد(شکل ۲). لازم به ذکر است که برای مطالعه همخوان های انسدادی - سایشی /t'/، /d'/، سه مقطع از زنجیره الگوهای آنها بدست آمد. این مقاطع عبارت بودند از الگوی حداکثر تماس جزء انسداد /t'/ و /d'/ الگوی لحظه شروع جز سایش /ʃ'/ و /ʒ'/ و الگوی نقطه وسط موج اکوستیکی بخش سایش /m'/ و /m'/ در نقطه وسط، سایش در طیف نگار پیشترین میزان را نشان می دهد.

از روی اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر فرآیند استخراج داده ها طی چند مرحله صورت گرفت. در ابتدا الگوهای حداکثر تماس تمامی نمونه ها از میان زنجیره الگوهای تولید هر واژ انتخاب شدند. از روی الکترودهایی که طی ۱۰ بار تکرار واژ هدف توسط هر فرد، در بیش از ۸۰٪ موارد (۸ مورد) تماس داشتند، الگوی نماینده هر فرد مشخص شد. سپس از روی الکترودهایی که در بیش از ۳۲ مورد از ۴۰ بار تکرار واژ هدف در آنها تماس دیده می شد، الگوی نماینده کل بدست آمد این الگو همان الگوی تماس کلی بود.

برای محاسبه شاخص تغییر پذیری از الگوی نماینده هر فرد که دارای درصد فعال شدن هر الکترود خاص طی ده بار تکرار است استفاده شد. نمرات فعال شدن هر الکترود که معادل صفر و صد درصد بود، به عنوان عدم تغییرپذیری در نظر گرفته می شد و نمرات ۵۰٪ بعنوان حداکثر تغییرپذیری محسوب می شد. تفاوت نمرات زیر ۵۰ درصد از صفر درصد و تفاوت نمرات بالای ۵۰ درصد از ۱۰۰ درصد با یکدیگر جمع بسته می شدند تا امتیازها بدست آیند. سپس این امتیازها با هم جمع می شدند و تقسیم بر تعداد نقاط تماس یافته می شدند تا شاخص تغییرپذیری بدست آید. مقادیر تغییرپذیری که از الگوهای نماینده تماس هر فرد



/t/

/d/

/n/

/s/

	26	3	1	26	40	40
4 0	39	18		12	40	40
4 0	35			10	39	40
4 0	12			30	40	
4 0				12	40	
4 0				7	40	
4 0				11	40	
4 0				1	40	

1 0	7			1	14	16	2 3
3 0	39	2		1	27	40	1
1 1	35			5	40	1	
1 1	18			40	1		
1 1	32			38	4		
1 1	36			38	1		
1 1	14			16	1		

7	1	2		3	1	1	2 3
39	3	8		6	3	3	4
40	4	4		3	4	4	
40	1	9		3	5	4	
40	2	5		3	4	4	
40	3	1		6	2	2	
40	1	1		1	4	3	

1 8	1	2	1	1	2	2	2 0
1 1	3	5	18	3	5	3	4 0
1 1	4	2	9	1	3	4	4 0
1 1	0	3	7	8	2	1	0
1 1	3	8	1	2	3	4	0
1 1	1	2	1	1	2	3	4 0
1 1	2	0	1	1	2	3	4 0

/z/

/ʃ/

/ʒ/

/t'/

9				8	8
1 2	1 3	1 0	1 2	3 6	40
1 4	1 5	4	1 0	3 7	40
1 3	4		9	3	40
1 2	1		3	8	40
1 2	4		7	3 4	40
1 2	0		1 0	2 3	39
1 1	0		1 0	1	40

1 0	3			7	14	16
3 8	28			1	12	39
4 0	31			10	40	5
4 0	18			37	4	0
4 0	31			7	36	4
4 0	30			10	26	4
3 8	13			12	4	0

1 8	8	1	0	1	5	2 1	2 3
32	3	9	1	2	4	3	1
39	4	0	1	1	7	0	3
40	4	0	2	7	3	0	1
40	2	2		3	1	0	3
39	2	9		5	1	3	2
40	1	8		2	2	1	4
36	8			1	1	1	1

1 0				2	7	1 0
24	3	2	1	4	3	3 0
40	2	0	1	5	1	0
40	4	0	1	6	8	3 0
40	2	2		3	4	0
40	2	4		1	6	0
46	1	7		4	2	4 0
35	8			3	4	0

/ʃ'/

/mʃ'/

/d'/

/ʒ'/

				1	3
1 0	5			9	21
3 8	37			1	23
2 0	38			6	40
4 0	16			33	40
4 0	27			1	34
4 0	17	1		3	26
3 6	8			3	40

	21	20	19	18	17	12
29	23	23	19	20	28	21
32	29	16	17	18	26	37
32	16	10	10	11	16	38
23	4			2	3	24
22						19
15						9
7						2

19	3			3	1	2
40	1	7		2	1	3
40	3	1		3	2	4
40	4	0	5	1	4	4
40	4	0	9	1	3	4
40	3	7	8	1	5	4


9	18	12	10	11	15	7	5
35	19	6	4	6	9	9	26
30	11			2	4	8	38
24							36
22							39
39						5	40
38	3					6	40

/mʒ'/

/L/

/y/

/I/



'g/ /x/

/Y/

تماس در بیش از ۳۲ نمونه (۸۰٪ نمونه‌ها)

تماس در بیش از ۲۴ نمونه (۶۰٪ نمونه ها)

شکل ۲- شکل تماس همخوان های مورد مطالعه

همخوان های انسدادی، سایشی و بخش های سایش و انسداد هم خوان های انسدادی - سایشی بیشتر می باشد، لیکن این اختلاف معنی دار نیست ($p < 0.05$). میانگین تغییر پذیری هم خوان های سایشی، انسدادی، انسدادی - سایشی و روان /y اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند ($p > 0.05$).

جدول ۱ میانگین و انحراف معیار شاخص تغییر پذیری را در همخوان های مورد مطالعه نشان می دهد.

آزمونهای آماری نشان داد (جدول ۲)	مقدار شاخص تغییرپذیری در گروه همخوان های ۱/۰,۰/۷,۰/۷	نسبت به گروه همخوان های /d/, /z/, /j/ بطور معنی داری بالاتر	می باشد ($p < 0,000$). تغییر پذیری همخوان /n/ نسبت به
آزمونهای آماری آماری نشان داد (جدول ۲)	۰,۰/۷,۰/۷	۰,۰/۷,۰/۷	۰,۰/۷,۰/۷

جدول ۱ - میانگین و انحراف معیار شاخص تغییر پذیری

انحراف معیار	میانگین	همخوان
۲,۵۴	۵,۸۳	t
۲,۰۸	۴,۲۷	d
۸,۱۳	۱۵,۸۶	n
۱,۳۴	۸,۶۵	t'
.۷۹	۷,۷۴	d'
۷,۸۰	۱۷,۷۷	l
۴,۸۲	۱۸,۱۲	f
۵,۱۲	۷,۴۱	k
۷,۶۸	۱۰,۱۵	g
۳,۷۷	۸,۴۱	y
۲,۷۰	۷,۴۵	s
۱,۵۰	۴,۴۶	z
۳,۷۶	۸,۲۱	j
۱,۹۰	۸,۹۴	ʒ
۱,۸۱	۵,۰۵	j'
۱,۰۳	۶,۰۶	mj'
۲,۳۴	۸,۶۳	z'
۱,۸۸	۸,۹۱	mz'
۱۲,۱۲	۲۲,۲۵	γ
۷,۰۹	۸,۶۰	x
۷,۴۰	۹,۵۸	Total

جدول ۲- نتایج آزمون post hoc در ارتباط با مقایسه میانگین تغییر پذیری بین همخوان های زبانی کامی فارسی

	t	d	n	t'	d'	L	f	k	g	y	s	z	ʃ	ʒ	mʃ'	ʒ'	mʒ'	γ	x
t																		+	
d							+	+										+	
n																			
t'																		+	
d'																		+	
L		+													+				
f		+												+	+				
k																		+	
g																			
Y																		+	
S																		+	
Z							+	+										+	
ʃ																		+	
ʒ																		+	
ʃ'							+	+										+	
Mʃ'																		+	
ʒ'																		+	
mʒ'																		+	
γ		+	+	+	+				+		+	+	+	+	+	+	+	+	
X																		+	

بحث

که همخوان های /ʃ/, /n/ و /l/ بیشترین مقدار تغییرپذیری درون فردی را حین تکرارهای هر هجا، به خود اختصاص داده اند. مکالیفه (۲۰۰۱) نیز در مطالعات خود به بالاتر بودن تغییرپذیری همخوان /l/ در حین تکرارها و در مقایسه با سایر همخوان ها اشاره کرده بود. همخوان های /ʃ/, /n/ و /l/ مقدادر بیشتری را از لحاظ شاخص تغییرپذیری نسبت به همخوان های سایشی و انسدادی داشتند (اختلاف بین آنها معنی دار بود). همخوان های سایشی اندکی نسبت به همخوان های انسدادی، تغییرپذیری بیشتری داشتند ولی این اختلاف معنی دار نبود. همخوان های انسدادی کمترین میزان شاخص تغییرپذیری را به خود اختصاص داده بودند. علت این اختلاف در مقدادر تغییرپذیری را احتمالاً بتوان به تماس های کناری زبان نسبت داد. تماس با فشاری که در لبه های زبان حین تولید همخوان های انسدادی ایجاد می شود، بعنوان تکیه گاهی برای زبان عمل می نماید و مانع از

بررسی میانگین مقادیر تغییرپذیری نشان می داد که اختلاف معنی دلری بین مقادیر تغییرپذیری در همخوان های مختلف وجود دارد. این نتیجه گیری با نتایج مطالعه مکالیفه (۲۰۰۱)، مبنی بر وجود اختلاف در شاخص تغییرپذیری بین همخوان ها مطابقت دارد. به نظر می رسد اختلاف همخوان ها از لحاظ نحوه تماس زبان به کام، ناحیه ای از زبان که تماس را ایجاد می کند و میزان فشاری که از طرف زبان به کام وارد می شود، منجر به ایجاد اختلاف از لحاظ تغییرپذیری در بین همخوان ها می گردد.

با توجه به اینکه کام نگار، تماس های خلفی با ثبات را در همخوان های خلفی /x/, /g/, /ʃ/ ثبت نمی نماید لذا به احتمال زیاد مقادیر واقعی شاخص تغییرپذیری این همخوان ها، کمتر از مقداری می باشد که در این مطالعه مشخص شده است. بررسی همخوان های دیگر نشان می دهد

دارد. تعداد نقاط تماس در /s/ و /z/ در زبان فارسی معادل $\frac{23}{4}$ و $\frac{24}{7}$ الکترود بوده است. این نقاط در مطالعه مکاليفه (۲۰۰۱) برابر با $\frac{22}{2}$ الکترود بوده است که از نظر آماری تفاوت چندانی با اين مطالعه ندارد.

الگوی تماس آزمونهای سايشي - کامي /s/ و /z/ با الگوی ذكر شده هاردکسل (۱۹۸۷) مطابقت دارد. تعداد نقاط تماس در دو مطالعه زبان فارسي و انگليسى به ترتيب برابر با $\frac{24}{2}$ ، $\frac{23}{4}$ ، $\frac{25}{2}$ ، $\frac{24}{7}$ مي باشد که از لحاظ آماری معنadar نیست، داگنایس نیز نتایج مشابه را گزارش نموده است.

در الگوی تماس همخوانهای انسدادی - سايشي /t/ و /d/ بيشترین نقاط تماس نسبت به همخوانهای ديگر وجود دارد. در مطالعه فلچر (۱۹۸۹) نیز اين نتایج گزارش شده است. فلچر علت اين افزایش تماس را در همخوانهای انسدادی - سايشي پیچیدگی تولید اين همخوانها مى داند. از اين رو فراگيری اين همخوانها در مراحل آخر تحول رشد واجی است. در مجموع همخوانهای انسدادی - سايشي كمترین ميزان تغيير پذيری و همخوانهای /n/، /r/ و /l/ بيشترین تغيير پذيری را در حين توليد نشان مى دهند. اين نتایج توسط مکاليفه (۲۰۰۱) نيز تأييد شده است.

نتایج اين بررسی نشان مى دهد که همخوان های مختلف الگوهای تماس مختلفی دارند. همچنین مشخص شد که همخوان های مختلف از لحاظ تغيير پذيری درون فردی حين تكرارها با هميگر متفاوتند. همخوان های انسدادی و سايشي كمترین ميزان تغيير پذيری و همخوان های /n/، /l/ و /r/ بيشترین ميزان تغيير پذيری را حين توليد نشان مى دهند. به نظر مى رسد، اختلاف در تماس های طرفی زبان به کام در چيز، به اختلاف در تماس های طرفی زبان به کام در همخوان های مختلف مربوط مى باشد. نتایج اين بررسی همچنین نشان مى دهد که همخوان های انسدادی - سايشي از بخش های سايش و انسداد تشکيل شده اند که بخش سايش و انسداد آنها متمايز از انسدادی های لثوي و کامي مى باشد.

ایجاد تغييرات زياد جايگاه آن مى گردد. در مورد همخوان های سايشي نيز بحث وجود محدوديت های شديد توليدی مطرح مى باشد. اين محدوديت های توليدی در نتيجه پيچيدگی توليد اين همخوان ها ايجاد مى گردد، بدین صورت که درگير شدن بخش های مختلف زبان در توليد همخوان های سايشي، احتمالاً مانع از بروز تغيير پذيری زياد، در توليد اين همخوان ها مى گردد. در همخوان های /l/، /n/ و /r/ اين تماس های کناري يا وجود ندارند يا صرفاً به منظور ايجاد انسداد خفيف در طرفين کام ايجاد مى شوند و نمى توانند نقش تكيه گاه برای بخش قدامی زبان را ايفا نمایند و در نتيجه حين تكرارها تغيير پذيری بيشتری نسبت به انسدادی ها و سايشي های قدامی ايجاد مى شود.

نتیجه گیری

نتایج اين بررسی هر چند از تعداد نمونه های اندکي بحسب آمده است، لیکن با نتایج بحسب آمده از مطالعات مشابه در زبانهای خارجی همگونی بسیاري دارد. الگوی تماس در همخوانهای انسدادی /d/ و /t/ در زبان فارسي با الگوی مطرح شده توسط مکاليفه (۲۰۰۱)، هاردکسل (۱۹۹۷) و داگنایس (۱۹۹۴) در زبان انگلیسي مشابه است. البته در مطالعات خارجی، همخوان های فوق در مجاورت واكه /i/ و در فارسي در مجاورت واكه /a/ مورد بررسی قرار گرفته اند. ولی با وجود اين ، الگوی کام نگاری اين دو مطالعه مشابه بوده است.

الگوی تماس همخوانهای انسدادی /k/ و /g/ در اين مطالعه ، به صورت انسداد ناکامل در رديف هشت مجاور نرمکام مشخص شده است. تماس کناري زبان با کام در رديفهای ششم و هفتم به صورت بي ثبات مى باشد. اين الگو توسط داگنایس (۱۹۹۴) و مکاليفه (۲۰۰۱) نيز گزارش شده است. البته هاردکسل^۰ (۱۹۹۷) انسداد کامل را گزارش كرده است. احتمالاً علت آن بررسی اين همخوانها در بافت هجاجی با واكه /i/ بوده است.

الگوی تماس همخوانهای سايشي /s/ و /z/ فارسي با الگوی داگنایس (۱۹۹۴) ، و هاردکسل (۱۹۸۷) نيز مشابه است

سپاسگزاری

پی نویس:

- 1- Higgins
- 2- Mcauliffe
- 3- Dagenais
- 4- Fletcher
- 5- Hardcastle

از همکاری مسئولین محترم دپارتمان گفتار درمانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دپارتمان گفتار کالج کوئینز
مارگارت اسکاتلند و هلال احمر تبریز به جهت ایجاد
امکانات تحقیق و از دکتر ویلیامز هاردکسل و دکتر مگان
مکالیفه به جهت پشتیبانی علمی تشکر می گردد.

منابع:

1. Fletcher, S.G. Palatometric specification of stop, affricate and sibilant sounds. *Journal of Speech Hearing Research*. 1989. 32: 736-748.
2. Hardcastle,W.J. EPG Data reduction methods and their implications for studies of lingual coarticulation . *Journal of Phonetics*. 1991. 19: 251-266.
3. Hardcastle, W.J. Gibbon, F. Jones, W. Visual display of tongue – palate contact: EPG in assessment and remediation of speech Disorders. *Journal of Disorders of Communication*. 1991. 26: 41-74.
4. Mcaulife, MJ. Tongue-to-palate contact patterns and variability of four English consonants in an /i/ vowel environment. *log phon vocal*. 2001. 26: 165-178.
5. Dagenais, P.A. A study of voicing and context effect upon consonant Lingualpalatal contact patterns . *Journal of Phonetics*. 1994. 22: 225 -233.
6. Byred, D. Flemming, E. Using Regions and indices in EPG Data reduction. *Journal of Speech Hearing Research*. 1995. 38: 821-827.
7. Hardcastle,W.J. Electropalatography and its clinical application. In ball, MJ. *Instrumental clinical phonetics*. London: whurr. 1997.

پیوست ۱ - نحوه محاسبه شاخص تغییر پذیری (۴)

10	10	10	10	10	10	10
10	8	0	0	0	0	4
10	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	3

$$\begin{aligned} \text{Absolute Variability Index} &= \frac{(2 \times 10) + (2 \times 20) + (5 \times 30) + (4 \times 40) + (2 \times 50)}{62} \\ &= \frac{470}{62} \\ &= 7.58 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Relative Variability Index} &= \frac{(2 \times 10) + (2 \times 20) + (5 \times 30) + (4 \times 40) + 2 \times 50}{29} \\ &= \frac{470}{29} \\ &= 16.21 \end{aligned}$$

پیوست ۲) جدول راهنمای علامت آوانگاری بکار رفته در متن:

علامت نوشتاری		علامت آوانگاری
ت		t
د		d
ل		l
ن		n
(رزنشی)		f
س		s
ز		z
ش		j
ژ		ʒ
حداکثر تماس بخش انسداد	ج	t'
حداکثر تماس بخش سایش		ʃ'
تماس در نقطه حداکثر شدت اکوستیکی بخش سایش		mʃ'
حداکثر تماس بخش انسداد	ج	d'
حداکثر تماس بخش سایش		ʒ'
تماس در نقطه حداکثر شدت اکوستیکی بخش سایش		mʒ'
ی		y
ک		k
گ		g
خ		X
غ		ɣ