

بررسی میزان مواجهه با صدا و وضعیت

شناوری دندانپزشکان تهران

مهندس رستم ساسانی

دکتر پروین نصیری

روش کار:

مقدمه:

این بررسی در سال ۱۳۶۷ در شهر تهران انجام گرفت. ابتدا با مراجعت به جامعه دندانپزشکی ایران لیست کلیه دندانپزشکان متخصص و عمومی شهر تهران تهیه شد که دندانپزشکان شهر تهران ۱۲۰۸ نفر بودند. مطالعات مقدماتی نشان داد که در حدود ۲۰٪ دندانپزشکان افت شناوری نداشتند. لذا، تعداد نمونه لازم با اشتباہی کمتر از ۵٪ و نیز میزان دقیق کمتر از ۵٪ برابر ۲۰ نفر می‌باشد. روش انتخاب نمونه‌ها با استفاده از طبقه‌بندی بر حسب سابقه کار و مناسب با جمعیت دندانپزشکان در هر ساقه کار تعیین شد که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. نوع مطالعه در این تحقیق، توصیفی مقطوعی^۱ می‌باشد. دستگاهها و وسایل مورد اندازه‌گیری این پژوهش عبارتند از:

۱- دستگاه تراز سنج صوت^۲ مدل (NA07A)، دستگاهی است جهت تعیین تراز فشار کلی صوت که از استانداردهای مورد قبول بین‌المللی پیروی می‌کند. این دستگاه ساخت کارخانه مدرسن (Madsen) دانمارک می‌باشد.

۲- دستگاه تجزیه کننده صدا^۳، این دستگاه فرکانس ویژه‌ای را از امواج مرکب جدا نموده و تراز فشار صوت آن را نشان می‌دهد. دستگاه مورد استفاده تجزیه کننده یک سوم اکتاو باند مدل (SA560A) و ساخت کارخانه ریون (RION) ژاپن مجهز به ۳۱ باند اضافی می‌باشد.

۳- دستگاه شناوری سنج (ادیومتر)^۴، این دستگاه مدل (OB40) ساخت کارخانه مدرسن دانمارک می‌باشد.

ابتدا محل‌های اندازه‌گیری صدا مشخص گردید، سپس

همزمان با پیشرفت تمدن، انسان بتدریج راههای بیشتر و بهتری را جهت استفاده از ماشین آلاتی که می‌تواند کارهای او را با سهولت یافته باشد انجام دهد پیدا نمود. ولی این امر موجب گردیده که در محیط کار در معرض صدایی یافته باشند که در مجموع با ماشین آلات باتوجه به نوع آن هر کدام به تنهایی یا در مجموع با ایجاد صدا، افراد را در معرض کشمکش شناوری ناشی از حرفة (به طور موقت یا دائم) قرار می‌دهند. کارشناسان بهداشت صنعتی در ایران مطالعات جدی در این زمینه انجام داده‌اند. طبق اطلاعات موجود، در مورد اثرات صدا با فرکانس بالا بر شناوری دندانپزشکان در ایران تاکنون مطالعه‌ای صورت نگرفته و در دنیا در سطح محدودی انجام پذیرفته است.

از آتجایی که این قشر از متخصصین جامعه ما در معرض عوارض زیان آور محیط کار که یکی از آنها صدا با فرکانس بالا می‌باشد قرار دارد، جهت بدست آوردن اطلاعات علمی و کمک به پیشگیری از ابتلاء به عوارض آنها در این زمینه مبادرت به انجام این تحقیق و بررسی گردید. در این زمینه سوالات زیر مطرح شد:

۱- آیا صدا در مطب دندانپزشکان بیش از حد مجاز است؟

۲- آیا دندانپزشکان مثلاً به نفس شناوری هستند؟

۳- آیا نفس شناوری دندانپزشکان در رابطه با مواجهه با صداست؟

۴- آیا کاهش شناوری دندانپزشکان با سن مربوط است؟

۵- آیا کاهش شناوری دندانپزشکان با سابقه کار مربوط است؟

همان طوری که در جدول آمده است. میزان متوسط صدای کلی دستگاه‌ها $69/1$ dBA بی‌باشد.

میانگین افت دائم آستانه شنایی دندانپزشکان مرد و زن در ۵ گروه سنی جداگانه و برای گوش راست و چپ به تفکیک در ۷ فرکانس و در هر فرکانس تعداد افرادی که دارای افت شنایی در هر دو گوش بودند مشخص شد. سایر یافته‌های بررسی و تحقیق در نمودارهای ۱ و ۴ آورده شده است. تابع بررسی محیطی در محیط‌های مختلف دندانپزشکی نشان می‌دهد که متوسط تراز کلی صدا $69/1$ dBA بوده است. در جدول ۴ متوسط تراز کلی صدا و متوسط تراز فشار صوت در فرکانس‌های هشتگانه مشخص شده است. جدول نشان می‌دهد، متوسط تراز کلی صدای ناشی از دستگاه‌های اولتراسوند پایین‌تر از حد استاندارد می‌باشد.

جدول ۱- توزیع فراوانی نسبی دندانپزشکان تحت مطالعه بر حسب جنس و وضعیت تحصیلی در شهر تهران

جمع		متخصص		عمومی		وضع تحصیلی	جنس
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۷۴/۳	۱۵۶	۲۷/۵	۴۳	۷۲/۴	۱۱۳	مرد	
۲۵/۷	۵۴	۳۱/۴	۱۷	۶۸/۵	۳۷	زن	
۱۰۰	۲۱۰	۲۸/۶	۶۰	۷۱/۴	۱۵۰	جمع	

جدول ۲- توزیع فراوانی نسبی دندانپزشکان تحت مطالعه بر حسب سابقه کار، وضعیت تحصیلی و جنس در شهر تهران

جمع				زن				مرد				جنس						
جمع	متخصص	عمومی	متخصص	جمع	متخصص	عمومی	متخصص	جمع	متخصص	عمومی	متخصص	وضعیت تحصیلی						
۱۵/۳	۲۲	۱۲/۵	۴	۸۷/۵	۲۸	۱۰۰	۱۶	۱۲/۵	۱۲	۸۷/۵	۱۴	۱۰۰	۱۶	۱۲/۵	۲	۸۷/۵	۱۴	۵-۹
۶/۲	۵۵	۱۷	۹	۸۲	۴۶	۱۰۰	۱۷	۲۲/۵	۴	۷۶/۵	۱۳	۱۰۰	۲۸	۱۲/۲	۵	۸۶/۹	۲۲	۱۰-۱۴
۲۲	۴۸	۲۴	۱۶	۶۶	۳۲	۱۰۰	۱۲	۳۰/۸	۴	۶۹/۲	۹	۱۰۰	۳۵	۲۴/۲	۱۲	۶۵/۲	۲۲	۱۵-۱۹
۱۱/۹	۲۵	۴۸	۱۲	۵۲	۱۳	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲	-	-	۱۰۰	۲۳	۴۴/۵	۱۰	۵۶/۵	۱۲	۲۰-۲۴
۱۱	۲۲	۲۹	۹	۶۱	۱۴	۱۰۰	۴	۷۵	۳	۲۵	۱	۱۰۰	۱۹	۲۱/۶	۶	۶۸/۴	۱۳	۲۵-۲۹
۱۲/۸	۲۷	۳۷	۱۰	۶۳	۱۷	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲	-	-	۱۰۰	۲۵	۳۲	۸	۶۸	۱۷	۳۰+
۱۰۰	۲۱۰	۲۹	۶۰	۷۱	۱۵۰	۱۰۰	۵۴	۳۱/۵	۱۷	۶۸/۵	۲۷	۱۰۰	۱۵۶	۲۷/۶	۴۲	۷۲/۴	۱۱۳	جمع

صدای کلی در چند نقطه اندازه گیری شد. لازم به توضیح است که در انتخاب محل اندازه گیری منع تولید صدا (تورین) در مجاورت گوش دندانپزشک مورد توجه بود. سپس صدای اندازه گیری شده بوسیله دستگاه آنالیزور $1/3$ اکتاوایاند در فرکانس‌های 500 ، 1000 ، 2000 ، 3000 ، 4000 و 6000 هرتز آنالیز کرده و در جدول مخصوص ثبت گردید.

جهت اندازه گیری افت شنایی دندانپزشک پس از پر کردن فرم مخصوص سنجش شنایی با استفاده از دستگاه ادیومتر گوش راست و چپ مورد آزمایش قرار گرفت و تابع در ادیوگرام ثبت گردید.

نتایج و بحث

همان طوری که جدول ۱ نشان می‌دهد حدود $72/4\%$ از دندانپزشکان مرد، عمومی و $17/5\%$ آنان متخصص هستند. دندانپزشکان زن، عمومی و $31/4\%$ آنان متخصص هستند. جدول ۲ میانگین توزیع دندانپزشکان مرد و زن، بر حسب سابقه کار را نشان می‌دهد. در مجموع درصد کمتری از دندانپزشکان مرد و زن را متخصصین تشکیل می‌دهند. جدول ۳ بیانگر توزیع فراوانی نسبی دندانپزشکان بر حسب سن، وضعیت تحصیلی و جنس می‌باشد. جدول نشان می‌دهد که بیشترین درصد متخصصین را افراد مسن تشکیل می‌دهند. جدول ۴ توزیع تراز فشار صوت با فرکانس‌های مختلف را در مطبهای دندانپزشکی نشان می‌دهد. ترازهای فشار صوت در فرکانس‌های مختلف در جدول ۵ آورده شده است.

جدول ۳- توزیع فراوانی و فراوانی نسبی دندانپزشکان تحت مطالعه بر حسب سن، وضعیت تحصیلی و جنس در شهر تهران

جمع				زن				مرد				جنس	
جمع	متخصص	عمومی	مجموع	جمع	متخصص	عمومی	مجموع	جمع	متخصص	عمومی	مجموع	وضعیت تحصیلی	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	سن (سال)	
۱۲	۲۰	۱۰	۲	۹۰	۲۲	۱۰۰	۱۸	۶	۹۴	۱۷	۱۰۰	۱۲	
۴۰	۸۵	۲۰	۱۷	۸۰	۶۸	۱۰۰	۲۸	۲۲	۹	۶۸	۱۹	۱۰۰	
۲۴	۵۱	۴	۲۶	۹۶	۲۵	۱۰۰	۶	۸۳	۵	۱۷	۱	۱۰۰	
۴۰/۵	۴۲	۲۲	۱۴	۶۷	۲۹	۱۰۰	۲	-	-	۱۰۰	۴۱	۲۹	
۰/۵	۱	-	-	۱۰۰	۱	-	-	-	-	۱۰۰	۱	۱۰۰	
۱۰۰	۲۱۰	۲۹	۶۰	۷۱	۱۵۰	۱۰۰	۵۴	۲۲	۱۷	۶۸	۲۷	۱۰۰	
جم													

جدول نشان می‌دهد، تراز فشار صوت در فرکانس ۶۰۰۰ هرتز

ماکریم و بعد از آن در فرکانس ۸۰۰۰ هرتز زیادتر است و کمترین

تراز فشار صوت در فرکانس ۲۰۰۰ هرتز می‌باشد.

جدول ۴- توزیع تراز فشار صوت بر فرکانس‌های مختلف با سرعت عقره (Slow) در مطب‌های

بررسی نتایج آزمون آستودنت بر توزیع فراوانی

افت دامن آستانه شنوایی دندانپزشکان زن و مرد

بر حسب سن در گوش راست و چپ نشان می‌دهد که

در گوش راست دندانپزشکان مرد، دو به دو گروههای

سنی مختلف مقایسه شده‌اند، در فرکانس ۲۵۰ بین

گروههای سنی کمتر از ۳۰ سال و ۴۰-۴۹ سال و بین

بین گروههای سنی کمتر از ۳۰ سال و ۵۰-۵۹ سال با

اطمینان یش از $0.05 < p < 0.10$ از نظر آماری

اختلاف معنی دار بین آنها وجود دارد. در فرکانس

۱۰۰۰ هرتز بین گروههای سنی مختلف دو به دو با

اطمینان یش از $0.05 < p < 0.10$ از نظر آماری

اختلاف معنی داری وجود دارد.

در گوش چپ دندانپزشکان در صورتی که دو به دو

گروههای سنی را در فرکانس‌های مختلف مقایسه

نماییم در فرکانس ۲۵۰ هرتز بین گروههای سنی کمتر

از ۳۰ سال و ۴۰-۴۹ سال و کمتر از ۳۰ سال و ۵۰-۵۹

سال با اطمینان یش از $0.05 < p < 0.10$ از نظر آماری

اختلاف معنی دار وجود دارد. در فرکانس ۱۰۰۰ هرتز

بین گروههای سنی کمتر از ۳۰ سال و ۵۰-۵۹ سال با

اطمینانی یش از $0.05 < p < 0.10$ از نظر آماری

اختلاف معنی دار وجود دارد. در فرکانس ۶۰۰۰ هرتز

بین گروههای سنی کمتر از ۳۰ سال و ۵۰-۵۹ سال از

نظر آماری اختلاف معنی دار وجود دارد و در بقیه


در حالی که نمودار ۱ شدت صدای ناشی از این دستگاهها در فرکانس‌های مختلف را نشان می‌دهد.

جدول ۵- توزیع میانگین و انحراف معیار ترازهای فشار صوت در فرکانس‌های مختلف دندانپزشکی تهران


موقعیت محل	ترازهای فشار صوت (مینا ۰۰۰/میکروبار) مراکز باند (سیکل در ثانیه) و اکتاویاند									تراز کلی صدا (dB)
	۸۰۰۰	۶۰۰۰	۴۰۰۰	۳۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰		
۱	۴۳	۴۰	۴۰	۳۵	۴۸	۴۸	۵۰	۷۵	۶۸	۴۳
۲	۴۵	۴۱	۴۲	۳۵	۴۰	۳۸	۴۰	۸۰	۷۷	۴۵
۳	۴۸	۴۵	۴۵	۳۲	۳۰	۳۱	۳۰	۷۱	۶۸	۴۸
۴	۴۱	۴۶	۴۵	۳۸	۵۰	۴۹	۵۲	۷۶	۷۰	۴۱
۵	۴۸	۴۶	۴۶	۵۰	۴۹	۵۵	۵۴	۶۷	۶۴	۴۸
۶	۶۸/۳	۷۰	۶۵	۶۲	۵۳	۵۴/۵	۴۸	۵۲	۷۳	۷۲
۷	۶۴	۶۹/۵	۶۷/۴	۶۵	۵۵	۵۰/۵	۴۲	۴۵	۶۸	۶۴

جدول ۵- توزیع میانگین و انحراف معیار ترازهای فشار صوت در فرکانس‌های مختلف دندانپزشکی تهران

شاخص‌ها	ترازهای فشار صوت (مینا ۰۰۰/میکروبار) مراکز باند (سیکل در ثانیه) و اکتاویاند									تراز کلی صدا (dB)
	(C)	(A)	۸۰۰۰	۶۰۰۰	۴۰۰۰	۳۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	
میانگین	۵۲	۵۰	۴۷/۱	۴۲/۳	۴۶/۱	۴۴/۳	۴۶/۸	۷۲/۸	۶۹/۱	۵۲
انحراف معیار	۱۱/۲	۱۱/۳	۱۰/۴	۱۱	۹/۲	۷/۴	۷/۶	۶/۵	۴/۶	۱۰/۴



نمودار ۱- ییناب صدای ناشی از دستگاههای (High speed drill) در مطب های دندانپزشکان شهر تهران در ۸ فر کانس مورد مطالعه با استگاه آنالیزور افت榛وایی ۱۱/۳ اکتاو باند



نمودار ۲- توزیع میانگین افت دائم آستانه شنایی (بر حسب dB) مردان (a) و زنان (b) دندانپزشک بر حسب گروههای سنی و فر کانس های مختلف (KHZ) و مقایسه آن با منطقه شنایی طبیعی در شهر تهران

بیشتری می‌باشد.

- ۳- با افزایش سابقه کار بر میزان افت شنایی افزوده می‌گردد.
به عبارت دیگر افت شنایی با سابقه کار نسبت مستقیم دارد.
به طور کلی از مطالعه جداول و نمودارها چنین بر می‌آید که:
۱- تراز فشار صوت در مطبات های دندانپزشکی پایین تر از حد استاندارد می‌باشد.

- ۲- چون صدای ناشی از دستگاههای High Speed Drill در فرکانس‌های بالا می‌باشد، بنابراین تراز فشار صوت آنها در فرکانس‌های ۶۰۰۰ هرتز ماکزیمم می‌باشد و بعد از آن در فرکانس‌های ۸۰۰۰ هرتز از فشار صوت زیادتر است.
۳- از آنجا که دندانپزشکان در موقع تراشیدن و خالی نمودن دندانها طوری می‌ایستند که گوش راست آنها به طرف دستگاه سورین می‌باشد، گوش راست آنها مختصری بیش از گوش چپ افت شنایی نشان می‌دهد.
۵- عوامل فردی چون سن و سابقه کار (مدت تماس با صدا) تأثیر مستقیم بر میزان افت شنایی دارد.

فرکانس‌ها در مقایسه با گروههای سنی دیگر با اطمینانی بیش از ۵۹٪ ($p < 0.05$) از نظر آماری اختلاف معنی‌دار وجود ندارد.

در گوش راست دندانپزشکان زن در فرکانس‌های مختلف و مقایسه دو به دو در گروههای سنی در فرکانس ۲۰۰۰ هرتز بین گروههای سنی کمتر از ۳۰ سال و ۵۰-۵۹ سال و ۳۰-۴۹ سال و ۴۰-۴۹ سال با اطمینانی بیش از ۹۵٪ ($p < 0.05$) اختلاف معنی‌دار وجود دارد. در فرکانس ۳۰۰۰ هرتز بین گروههای سنی ۴۰-۴۹ سال و ۵۰-۵۹ سال از نظر آماری اختلاف معنی‌دار وجود دارد. در مقایسه بین گروههای سنی در فرکانس‌های مختلف با اطمینانی بیش از ۹۵٪ ($p < 0.05$) اختلاف معنی‌دار وجود ندارد.

در گوش چپ زنان دندانپزشک در فرکانس ۲۰۰۰ هرتز، بین گروههای سنی کمتر از ۳۰ سال و ۳۰-۴۹ سال با اطمینانی بیش از ۹۵٪ ($p < 0.05$) اختلاف معنی‌دار وجود دارد و بین بقیه گروهها اختلاف معنی‌دار وجود ندارد.

نمودار ۲ نشان می‌دهد که هم مردان دندانپزشک و هم زنان دندانپزشک، با افزایش سن بر میزان افت شنایی آنها افزوده می‌گردد. به عبارت دیگر افت شنایی رابطه مستقیم با افزایش سن دارد.

با استدلال مشابه و نیز نمودار ۳ نتیجه می‌گیریم:

- ۱- کلیه دندانپزشکان مرد و زن با هر سابقه کاری در هر گوش در فرکانس ۶۰۰۰ هرتز افت شنایی دارند.
- ۲- گوش راست آنها نسبت به گوش چپ دارای افت شنایی

پی‌نویس

- 1- Cross Sectional
- 2- Sound Level Meter
- 3- Noise Analyisor
- 4- Audiometer