

نوروپاتی شنوایی: یافته های آزمونهای رفتاری فیزیولوژیک و نوروفیزیولوژیک

دکتر محمد فرهادی* - سعید محمودیان**

* استاد گروه آموزشی گوش، گلو، بینی و جراحی سروگردان دانشگاه علوم پزشکی ایران

** عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گوش، گلو و بینی و جراحی سر و گردن بیمارستان حضرت رسول (ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

زمینه و هدف: نوروپاتی شنوایی با پاسخهای ناهنجار شنوایی و حفظ گسیلهای صوتی گوش و پتانسیل های میکروfonی حلزون قابل تشخیص است. مطالعه حاضر با هدف بررسی یافته های مربوط به پتانسیل های برانگیخته شنوایی و سایر آزمونهای تشخیصی روی شش بیمار مشکوک به نوروپاتی شنوایی که دچار مشکل در تمایز گفتار بودند، صورت گرفته است.

روش بررسی: در مطالعه مقطعی حاضر، شش بیمار مشکوک به نوروپاتی شنوایی در سنین مختلف مورد ارزیابی های کامل ادیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک قرار گرفتند. آزمونهای مرسوم ادیومتری شامل ادیومتری تن خالص، ارزیابی تمایز گفتار و ادیومتری ایمیتانس به همراه الکتروکوکلیوگرافی، گسیلهای صوتی گوش، ادیومتری پاسخهای برانگیخته زدرس، میان رس و دیررس شنوایی در تمامی افراد مورد مطالعه انجام شد.

یافته ها: نتایج حاصل از آزمونهای ادیومتری رفتاری، کم شنوایی متوسط تا عمیق را در آستانه های شنوایی با تن خالص نشان داد. امتیازات تمایز گفتار این بیماران بسیار ضعیف بود و با آستانه های تن خالص آنها همخوانی نداشت. تمامی افراد مورد مطالعه دارای تهابنگرام هنجار بودند ولی رفلکس آکوستیک آنها نا هنجار بود. پتانسیل های میکروfonی حلزون همراه با دامنه گسیلهای صوتی گوش در محدوده هنجار بودند ولی مهار دگرسویی گسیلهای صوتی گوش وجود نداشت. پاسخ های برانگیخته شنوایی ساقه مغز بطور دو طرفه در تمامی بیماران مورد مطالعه ناهنجار بود یا وجود نداشت. در کلیه افراد مورد مطالعه پاسخ های میان رس شنوایی تمایز داده نشد. ولی پاسخ های شنوایی دیررس در چهار بیمار ثبت شد.

نتیجه گیری: هر شش بیمار مورد بررسی در این مطالعه، نمونه هایی از نوروپاتی شنوایی می باشند. در این بررسی، پاسخ های دیررس شنوایی علیرغم ورودی ناهنجار از مراکز پائین تر سیستم شنوایی مرکزی حفظ شده اند که بیان کننده تفاوت های موجود در پتانسیل های برانگیخته شنوایی مرتبط با همزمانی عصبی مورد نیاز می باشند. این یافته ها بیان می کند که قشر شنوایی مغز می تواند در تنظیم ارائه سیگنال های معیوب در مراحل ابتدایی در طول مسیرهای شنوایی نقش داشته باشند.

وازگان کلیدی: نوروپاتی شنوایی، ادیومتری رفتاری، آزمونهای فیزیولوژیک، آزمونهای نوروفیزیولوژیک

پذیرش مقاله: آذر ۱۳۸۴

وصول مقاله: مهر ۱۳۸۴

نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سروگردان و علوم وابسته بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران farhadi@ent-hns.org

مقدمه

از نظر بالینی این اختلال با اختلال ناهنجاری یا از بین رفتن پاسخ های شنوایی ساقه مغز (ABR) Auditory Brainstem Response: ABR و رفلکس اکوستیک همراه بوده ولی عملکرد گسیلهای صوتی گوش (OAEs) Otoacoustic Emissions: OAEs) و پتانسیل های میکروفونی حلزون (Cochlear Microphonic: CMs) به صورت هنجار باقی ماند.

نوروپاتی شنوایی یا ناهمزنمانی عصبی شنوایی (Auditory Dys-synchrony: AD) اختلالی است که در آن عملکرد سولولهای موثری خارجی (OHCs) هنجار باقی مانده لیکن پاسخ های مربوط به الیاف عصب هشتم و ساقه مغز دچار صدمه شده و در نتیجه ناهمزنمانی عصبی شنوایی ایجاد می شود. (۱)

حضور پتانسیل های میکروفنی حذرون (CMs) بیانگر عملکرد هنجار OHCs بدون توجه به عملکرد هنجار عصب شنوایی است. یافته های Delentre همکاران و نیز Berlin و همکاران با مطالعات قبلی Starr و همکاران مطابقت دارد (۱۵، ۲۰، ۳۵)، آنها نشان دادند CMs در افراد مبتلا به ناهمزمانی عصبی شنوایی به صورت قوی و مشخص وجود دارد و برای چند میلی ثانیه پس از تحريكات کلیک حفظ می شود. Starr و همکاران در عین حال نشان دادند که پتانسیل های میکروفنی حذرون به ثبت رسیده از گوش دارای این اختلال نسبت به افراد بدون آن از نظر دامنه بزرگتر هستند (۵)، آنها فرض کردند که افزایش دامنه های CM در بیماران مبتلا به AD احتمالاً ناشی از تغییر در عملکرد OHCs و تغییرات فیزیولوژیک متعاقب آن در این گونه بیماران می باشد.

مولدهای عصبی پاسخ های برانگیخته میان رس شنوایی Middle Latency Response: MLR) و پاسخ های برانگیخته دیررس شنوایی (Late Latency Response: LLR) هر دو در مناطق تحت قشری و قشری مغز قرار دارند و کمتر وابسته به همزمانی عصبی نسبت به ABR می باشند. یافته های Kraus و همکاران نشان داد بدست آوردن پاسخ های برانگیخته از سطوح بالاتر سیستم شنوایی در حالیکه ABR وجود نداشته باشد نیز محتمل است. (۳۶)، Hood نتایج مربوط به بیمار مبتلا به نوروپاتی را گزارش کرد که در وی ABR و MLR مشاهده نشد ولی LLR هنجار بود. (۱۳)، علاوه بر این Salvi و همکاران بصورت تجربی، اختلال ناشی از نوروپاتی شنوایی AN را در مدل حیوانی مورد توجه قرار دادند (۳۷). آنها مشاهده کردند با تزریق کربوپلاتین به چین چیلاها و از بین بردن سلولهای موئی داخلی و ایجاد AN در این حیوانات پاسخهای MLR و LLR از بین می رفت در حالیکه پاسخ های کوتیکال واضحی در آنها به ثبت می رسید.

در افراد مبتلا به AN، گسلهای صوتی گوش OAEs به صورت شاخصی وجود دارد ولی مهار دگرسویی OAEs که بیانگر سلامت پاسخ های رفلکسی زستونی - حذرونی می باشد ناهنجار است. Abdala و همکاران مطرح کردند که عصب دهی هنجار سلولهای موئی خارجی برای کوک هنجار حذرون بصورتی که برای مهار گسلهای حاصل اعوجاج (Distortion Product Otoacoustic Emissions: DPOAEs)

(۱-۱۸)، محققان مختلفی در گزارش های خود طیفی از سبب شناسی ها و عوامل را علت نوروپاتی شنوایی معرفی کرده اند. از جمله مواردی که منجر به پاتولوژی عصب شنوایی می شود می توان به هیپرپلی رو بینی، آناکسی بیماری های شدید دوره نوزادی، بیماری های از بین برنده میلین، آناکسی فردیش و پاره ای دیگر اشاره نمود (۱۹-۲۷)، اما پاتوفیزیولوژی آن هنوز پژوهی شناخته شده نیست.

تعدادی از منابع، ناهمزمانی عصبی را علت احتمالی این اختلال فرض کرده اند. (۲۸)، همزمانی شلیک های عصبی شنوایی عامل مهم درک اطلاعات حسی شنوایی در دستگاه عصبی مرکزی محاسب می شود. فعالیت های همزمانی عصبی در ایاف شنوایی می تواند در رمز خوانی درک شنیداری پایه، مثل درک اطلاعات مربوط به بلندی و زیر و بمی اصوات و همچنین استخراج جنبه های پیچیده صوتی نقطه اوج طیفی و پوش امواج صوتی (Waveform envelope) برای بازسازی اطلاعات گفتاری (Speech recognition) بسیار با اهمیت باشند. (۲۹-۳۰)، مشکلات مربوط به زمانبندی انتقال همراه با اختلال ناهمزمانی عصبی ذاتاً بصورت حسی، اکسونی و دندرتی رخ می دهد (۳۱)، به این ترتیب می توان مطرح نمود اختلال نوروپاتی مربوط به وجود ناهنجاری سیستم محیطی شنوایی است که حذرون شنوایی و سلولهای موئی داخلی آن به همراه پخش دیستال عصب هشتمن یا سیناپس های بین آنها را درگیر کرده است. (۳)، Zeng و همکاران (۳۲) بیان کردند نوروپاتی شنوایی در واقع نوعی ناپیوستگی و از بین رفتن فعالیت های همزمانی عصب شنوایی بدون اختلال در عملکرد سلول های موئی خارجی است.

هیچ مشخصه خاصی در شکل ادیوگرام افراد مبتلا به نوروپاتی شنوایی (Auditory Neuropathy: AN) مشهود نمی باشد و درجه کم شنوایی آنها در برگیرنده محدوده ای از کم شنوایی ملایم تا عمیق می باشد (۳)، این بیماران به گونه بارزی اختلال در فهم گفتار به ویژه در محیط های دارای تحریکات رقابتی دارند.

آزمایش ABR با مجرک کلیک، دارای دقیقی بسیار بالا جهت ارزیابی پیوستگی عملکرد مسیر شنوایی در سیستم عصبی مرکزی و محیطی می باشد. نبود ABR یا وجود ناهنجاری در آن معمولاً مبنی از بین رفتن الیاف عصبی در مسیر شنوایی ساقه مغز می باشد. (۳۴)

ازیابی‌های نورولوژیک و روماتولوژیک برای بررسی سبب‌شناختی‌های احتمالی و تشخیص دقیق و طبقه‌بندی مناسب نوروپاتی صورت پذیرفت. نتایج مجموعه‌آزمونها و معاینات بالینی در برگیرنده اطلاعات جالب توجه و مفید در این بیماران بود.

تعریف شده است ضروری نمی‌باشد. (۳۸)، به عبارت دیگر اگرچه تحریکات واپرائی می‌تواند حلزون شناوبی دو طرف را تحت تأثیر قرار دهد ولی مشخص نشده است که به چه میزان فعالیت واپرائی اعصاب شناوبی برای پردازش‌های حلزونی هنجار و رمز بندی اطلاعات شناوبی مورد نیاز هستند.

نمونه‌های مورد مطالعه

بیمار ۱ خانمی ۱۸ ساله که بدلیل اختلال در فهم گفتار و تمایز کلمات جهت مشاوره‌های درمانی مراجعه کرده بود. درجه کم شناوبی این بیمار با فهم گفتار و تمایز کلمات وی تابعی نداشت. نتایج MRI و سی‌تی‌اسکن به منظور تشخیص ضایعات فضای‌گیر مجرای شناوبی داخلی، زاویه پلی مخچه‌ای و یا ساقه مغز منفی بود.

بیمار ۲ خانمی ۱۹ ساله (خواهر بیمار ۱) با شکایت از تمایز گفتاری ضعیف بهویژه در مکالمات تلفنی و احساس بی‌ثباتی در تعامل مراجعه کرد. نتایج MRI و سی‌تی‌اسکن وی نیز مانند خواهرش از نظر وجود ضایعات فضای‌گیر مجرای شناوبی داخلی، زاویه پلی مخچه‌ای و یا ساقه مغز منفی بود.

بیمار ۳ خانمی ۵۹ ساله که از اختلال شناوبی دو طرفه و وزوز بازیرو و بیمی بالا در گوش راست شکایت داشت.

بیمار ۴ خانمی ۲۴ ساله که بدلاً از ضعف شدید بینایی و عدم درک کلمات و گفتار بود. این بیمار دچار کم شناوبی حسی عصبی دو طرفه در فرکانس‌های بالا و وزوز بازیرو و بیمی بالا بود.

بیمار ۵ دختر پچه ۴ ساله که شکایت اصلی والدین او تأخیر در رشد گفتار و شک به ناتوانی یادگیری زبانی بود. این کودک برای بررسی‌های

تلیق ارزیابی‌های رفتاری و الکتروفیزیولوژیک شناوبی بینش ما را نسبت به عملکرد پیش عصبی و عصبی افزایش می‌دهد و طبیعتاً اطلاعات بالازشی را در شناختی دقیق‌تر پدیده نوروپاتی یا ناهزمانی عصبی شناوبی فراهم می‌آورد. هدف از این بررسی ارائه گزارش شش بیمار مبتلا به اختلال در فهم و تمایز گفتاری در سینه مختلف می‌باشد که با احتمال ابتلاء به نوروپاتی شناوبی به بخش کاشت حلزون شناوبی مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سروگردان و علوم وابسته دانشگاه علوم پزشکی ایران ارجاع شده بودند.

روش بررسی

در این مطالعه مقطعی، شش بیمار مبتلا به صدمه شناوبی با ترکیب ۵ زن و ۱ مرد، با سینه متفاوت که همگی دچار اختلال در تمایز و فهم گفتاری و درجاتی از کم شناوبی بودند و جهت ارزیابی‌های مقدماتی کاشت حلزون به مرکز کاشت حلزون شناوبی دانشگاه علوم پزشکی ایران ارجاع شده بودند، مورد ارزیابی‌های دقیق و کامل رفتاری، فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شناوبی قرار گرفتند (جدول ۱). هیچیک از بیماران مورد مطالعه از سمعک و تجهیزات تقویت کننده شناوبی بهره مفیدی نمی‌برند.

جدول ۱- مشخصه‌های زمینه‌ای بیماران مبتلا به نوروپاتی شناوبی

بیمار							خصوصیات
۶	۵	۴	۳	۲	۱		
۵/۵	۴	۲۴	۵۹	۱۹	۱۸	سن کنونی	
۳	۳	۳	۲۹	۸	۱۲	سن شروع مشکل	
ذکر	مونت	مونت	مونت	مونت	مونت	جنسيت	
ندارد	ندارد	سندرم رفسام	ندارد	شارکوماری توث	شارکوماری توث	تشخیص نوروولوژیک	
-	-	ندارد	دارد/ بالا	دارد/-	دارد/-	(وزوز گوش/ ازیر و بیمی)	

برای تمامی بیماران، گسیل‌های صوتی گذراي گوش (Transient Evoked OAEs: TEOAEs) و گسیل‌های صوتی (TEOAEs) حاصل اعوجاج DPOAEs از مجموعه آزمونهای OAEs انجام شد و سپس تکرار پذیری پاسخ‌ها در همان جلسه طی دو نوبت و یک هفته بعد (Intrasession و intersession) مورد ارزیابی قرار گرفت. دستگاه ثبت آنالیز مورد استفاده اندیانامیک IL-O-88DPI بود.

TEOAEs با استفاده از تحریکات غیرخطی کلیک ۸۰ میکروثانیه‌ای در سطح شدت ۲ dBpeSPL ± 80 به ثبت رسید. با ارائه ۲۸۰ تحریک، پاسخ به صورت جاروب با استفاده از فیلتر باندگذر ۵۰۰۰-۶۰۰۰ هرتز توسط سیستم، معدل گیری و ثبت شد. پاسخ‌ها درصورتیکه با معیارهای زیر به دست می‌آمد هنجار تلقی می‌گردید.

دامنه طیف پاسخی (Response spectrum) حداقل در دو باند فرکانس اکتاوی بالای نویز ۶ دسی بل باشد. بر اساس آنالیز کامپیوتروی دستگاه، میزان تکرار پذیری کلی امواج بالاتر از ۷۷۵ و همین معیار از نظر فرکانسی بالاتر از ۵۵٪ و ثبات پاسخ‌ها بالاتر از ۸۵٪ خواهد بود. DPOAE با ارائه ۲ تن خالص همزمان با مشخصه‌های $f_1/f_2 = 1/22$ و در سطح شدت ۶۰ dB SPL و $L_1 - L_2 = 10$ dB مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. منحنی DPOAE به عنوان تابعی از فرکانس‌های مختلف به صورت $f_2 - f_1 > 5$ dB ثبت شد. هرگاه پاسخ‌های به دست آمده بالای سطح نویز زمینه بودند، هنجار تلقی می‌شدند. عملکرد مهار دگرسویی گسیل‌های صوتی گوش با نویز سفید ممتد در سطح شدت 60 ± 3 دسی بل SPL ارزیابی شد. نویز سفید از طریق گوشی داخلی به صورت دگرسویی ارائه گردید.

آزمونهای الکتروفیزیولوژیک

الکتروکوکلئوگرافی (Electrocochlography: ECochG) با الکترودهای اکسترا تیمپانیک جایگذاری شده در نزدیکترین مکان به پرده تمیان (سطح خلفی تحتانی) به ثبت می‌رسیدند. تحریک‌ها با شدت ۹۵ دسی بل SPL و با سرعت ۷ کلیک در ثانیه و فیلتر باندگذر ۳۰ تا ۲۵۰۰ هرتز ارائه می‌شد. پاسخها برای ۱۰۲۴ سوئیپ در پنجره زمانی ۵ میلی ثانیه‌ای معدل گیری می‌شدند. مونتاژ الکترود دارای آزمون، ورتكس (Cz) به مجرای شنوایی همانسویی و الکترود زمین روی ماستوئید دگرسویی بود.

تحصصی تر و درمانهای مقتضی به این مرکز مراجعه کرده بود. بیمار ۶ پسر بچه ۵/۵ ساله که خانواده او از عدم توانایی کودکشان در پاسخ به تحریکات زبانی شفاخی و عدم رشد کافی در فرآیندهای رفتاری و زبانی وی نسبت به همسالان خوبیش بهویژه در محیط‌های پرسرو صدا شکایت داشتند. وضعیت رشد حرکتی این کودک هنجار ارزیابی شد.

ارزیابی‌های تشخیصی سیستم شنوایی

بررسیهای تشخیصی شامل کلیه ارزیابی‌های رفتاری و الکتروفیزیولوژیک شنوایی روی افراد مورد مطالعه انجام گرفت. همه ارزیابی‌های الکتروفیزیولوژیک در اتاق اکوستیک و نیز عایق از نظر مداخله امواج الکترومغناطیسی و با استفاده از سیستم amplaid MK12 انجام شد. تکرار پذیری هریک از امواج الکتروفیزیولوژیک درابتدا به دقت مورد بررسی قرار گرفت و سپس پاسخها جهت تجزیه و تحلیل تلفیق شد و امواج الکتروفیزیولوژیک شنوایی با آرایش الکترودی Cz-A1 و Cz-A2 و الکترود خنثی (زمین) در Fpz ثبت شدند.

آزمونهای رفتاری شنوایی

آستانه‌های راه هوایی و استخوانی با استفاده از ادیومتر بالینی دوکاناله Madsen OB822 مورد ارزیابی قرار گرفت. ادیومتری مشاهده رفتاری (Behavioral Observation Audiometry: BOA) برای کودکان تحت بررسی اجرا شد.

برای تمامی بیماران آزمونهای بازشناسی گفتار با استفاده از لغات متوازن آوای فارسی (۲۵ آیتمی) در محدوده ۳۰ تا ۴۰ دسی بل SL به اجرا در آمد.

آزمونهای فیزیولوژیک شنوایی

آزمایش‌های تمپانومتری و رفلکس اکوستیک از مجموعه آزمونهای فیزیولوژیک انجام گرفت. تمپانومتری با پربو تردن ۲۲۶ هرتز و رفلکس اکوستیک در فرکانس‌های ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز و درحال همانسویی و دگرسویی با استفاده از دستگاه Madsen Zodiac 901 به دست آمد. درصورت فقدان پاسخ رفلکس اکوستیک، تحریکات در گام‌های ۱۰ دسی بلی تا سطح شدت ۱۱۰ دسی بل افزایش داده شد.

۱-۲ هرتز ارائه شد. سایز حوزه‌ای ۱۰-۲۰ درجه تعیین شد. زمان آنالیز و معدل گیری امواج VEP ۳۰۰ میلی ثانیه و تعداد سوئیپ ۱۲۸ تعیین گردید.

بررسی‌های روماتولوژیک و نورولوژیک

بررسی‌های تخصصی روماتولوژیک و نورولوژیک به منظور جستجوی سبب‌شناختی‌های احتمالی نوروپاتی شناوی به بررسی‌های روماتولوژیک و الکتروودیاگنوستیک دیگر به منظور ارزیابی هدایت عصبی در سایر اعصاب حسی و حرکتی و احتمال نوروپاتی‌های محیطی در مورد بیماران بزرگسال صورت پذیرفت.

بررسی عملکرد دهليزی

آزمونهای بالینی ثبات (Clinical tests of stability) بیمار، تست رومبرگ با چشم باز و بسته و همچنین تست Unterberger برای ۳ بیمار بزرگسال مورد مطالعه ارزیابی شدند.

آزمونهای ثبت حرکات چشم، به عبارتی مجموعه آزمونهای الکترونیستاگموجرافی (Electronystagmography: ENG) شامل نیستاگموس خودبخودی، خبره، وضعیتی و وضعیت دهی، ساکاد، تعقیب آرام (Slow pursuit)، اپتوکینتیک (Optokinetic) و آزمون کالریک برای ۳ نفر از افراد مورد مطالعه انجام شد. این ارزیابی‌ها توسط سیستم ICS انجام گرفت.

یافته‌ها

نتایج ارزیابی‌های شناوی

اذیوگرام‌ها در ۵ بیمار مورد مطالعه، کم‌شنوایی با الگوی صعودی و در یک بیمار کم‌شنوایی در فرکانس‌های بالا و با شبیه نزولی را نشان داد.

شدت کم‌شنوایی، محدوده‌ای از ملايم تا شدید را نشان می‌داد. در بیمار ۱، کم‌شنوایی دو طرفه تقریباً متقارن در حد متوسط با بهبود ناگهانی آستانه‌ها در فرکانس حدود ۲۰۰۰ هرتز، در بیمار ۲، کم‌شنوایی متقارن با الگوی کاملاً مشابه بیمار اول و در حد متوسط تا شدید، در بیمار ۳ کم‌شنوایی صعودی دوطرفه متقارن در حد متوسط و در بیماران ۴، ۵ و ۶ نیز کم‌شنوایی در حد ملايم تا متوسط با الگوی نزولی در بیمار ۴، الگوی

ABR در کودکان مورد مطالعه تحت شرایط خواب طبیعی و یا با استفاده از داروی خواب آور کلروهیدرات ارزیابی شد. در این آزمون آمپلی فایر باند گذر ۳۰۰ - ۱۰۰ هرتز، قطبیت انساضی به صورت مونووال، با گوشی داخلی و سرعت ۱۱/۱ هرتز در سطح شدتی ۱۰۰ دسی بل nHL مورد استفاده قرار گرفت.

برای فراهم آوردن پاسخهای مطلوب تر ABR ، تعداد ۲۰۴۸ تحریک در ثانیه ارائه شد. پاسخهای معدل گیری شده در محدوده زمانی ۱۰ میلی ثانیه جمع‌آوری و ذخیره می‌شدند. تکراریزی شاخصه‌های امواج ABR کاملاً از یکدیگر قابل تشخیص بودند و زمان نهفتگی مطلق امواج و فواصل بین قله‌ای برای هر پاسخ مشخص گردید.

در پاسخهای برانگیخته میان رس شناوی زمان نهفتگی مطلق قله امواج Nb-Pa و Pb به همراه دامنه کمپلکس Cz-A1/A2 (اکتیو) و بیماران مورد مطالعه بررسی شد. آرایش الکتروودها به صورت Cz (اکتیو) و A1/A2 (مرجع) مشخص شد و از فیلتر باندگذر ۱۰۰-۲۵۰ هرتز، با آنالیز امواج ۱۰۰ میلی ثانیه تعیین گردید. برای هر پاسخ ۱۰۳۴ اکلیک ارائه گردید. در پاسخهای برانگیخته دیررس شناوی زمان نهفتگی مطلق امواج P2، N1 و N2 در بیماران اندازه‌گیری شد و دامنه امواج کمپلکس N1-P2 برای هر پاسخ تعیین شد.

فیلتر مورد استفاده در این آزمایش ۱-۳۰ هرتز بود و پنجره زمانی جهت آنالیز و معدل گیری امواج ۵۰۰ میلی ثانیه در نظر گرفته شد. تعداد تحریک ۱۲۸-۵۱۲ انتخاب شد. از محرك تن برست با مشخصه زمانی افت و خیز ۲۰ میلی ثانیه و زمان پلاتو ۳۰ میلی ثانیه‌ای استفاده گردید. آرایش الکتروودی بصورت Cz-A2 و Cz-A1 تعیین شد.

ازیابی‌های پاسخهای عصبی بینایی به منظور بررسی دقیق‌تر نوروپاتی و ارزیابی همزمانی تخلیه‌های عصبی الیاف بینایی در بیماران انجام شد. پتانسیل‌های برانگیخته بینایی (Visual Evoked Potentials:VEPs) در مورد ۳ بیمار اندازه‌گیری شد. نهفتگی مطلق امواج N75 و P100 در N145 به همراه دامنه این امواج از طریق VEP برای بیماران ثبت گردید و تکراریزی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این بررسی از آرایش الکتروودی Fpz-O2 استفاده شد.

فیلتر باندگذر ۱-۱۲۵ هرتز و تحریکات به صورت مونواکولار با سرعت

نتایج آزمایشات فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی صعودی در بیماران ۵ و ۶ مشخص گردید.
ازیابی‌های ادیومتریک رفتاری به صورت BOA در فضای باز صوتی و نیز تحت گوشی انجام شد. امتیازات آزمون بازشناسی گفتاری بطور بارزی در تمامی بیماران ناهنجار بود که در مرحله اول میان پاتولوژی وراء حلزونی بود. نتایج فوق در جدول ۲ ذکر شده‌اند.

ادیومتری ایمپیتانس، تمپانوگرام‌های هنجار در تمامی بیماران مورد مطالعه نشان داد ولی آستانه‌های رفلکس اکوستیک بصورت همانسویی و دگرسویی در هیچیک وجود نداشت. TEOAEs و DPOAEs نشان‌دهنده وضعیت کاملاً هنجار در نمونه‌های مورد مطالعه بود. این نتایج در بیماران ۴، ۵ و ۶ دارای دامنه‌های بسیار قوی و در محلوده هنجار با میانگین ۱۵/۲ دسی بل SPL بود. در بیمار ۸، TEOAEs گوش راست دارای دامنه‌های

جدول ۲- نتایج آزمونهای ادیولوژیک بیماران مبتلا به نوروباتی شنوایی

بیمار							نتایج آزمونها
ادیوگرام							درجه کم شنوایی
۶	۵	۴	۳	۲	۱		شیب ادیوگرام
ملایم تا متوسط	ملایم تا متوسط	ملایم تا متوسط	متوسط	شدید	متوسط		میانگین آستانه
صعودی	صعودی	نزولی	صعودی	صعودی	صعودی		۰-۳۰/۳۰
۴۷/۴-۴۳/۵	۳۵-۳۳/۲	۵۳/۷-۳۸/۳	۵۳/۲-۵۳/۳	۶۸/۳-۸۱/۳	۵۸/۳-۵۵		چپ-راست PTA
آزمونهای گفتاری							تمایز گفتاری (%)
چپ- راست	چپ - راست	بسیار ضعیف	بسیار ضعیف	۲۰-۱۲	۲۰-۱۲	۴۴-۴۰	۰-۳۰/۳۰
آزمونهای فیزیولوژیک							آزمونهای فیزیولوژیک
TEOAEs							چپ - راست
۲۲/۲-۱۹/۶	۱۱/۲-۵/۲	۵/۷-۱۰/۷	۱۲/۶-۰-۷/۹	۸/۱-۱۴/۸	۱۳/۶-۱۵		DPOAEs
چپ - راست	چپ - راست						
DPOAEs							
مهار دگرسویی	مهار دگرسویی	ناهنجار	ناهنجار	ناهنجار	ناهنجار	ناهنجار	OAEs
تمپانومتری	تمپانومتری	هنجار	هنجار	هنجار	هنجار	هنجار	
رفلکس اکوستیک	رفلکس اکوستیک	ناهنجار	ناهنجار	ناهنجار	ناهنجار	ناهنجار	
پتانسیلهای برانگیخته شنوایی							
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ABR	MLR	LLR	ECoG				
بدون پاسخ	بدون پاسخ	بدون پاسخ	بدون پاسخ	بدون پاسخ	بدون پاسخ	بدون پاسخ	
CM	CM	CM+SP	CM+SP	CM+SP	CM+SP	CM+SP	

کلیک و قطبیت متفاوت در شدتهای بالا در کلیه بیماران انجام شد، نتایج بیان کننده پاسخهای بسیار ضعیف و یا فقدان پتانسیل‌های برانگیخته ساقه مغز در هر دو طرف بودند. در مطالعه حاضر پاسخهای شنوایی میانرس MLR حتی در سطوح شدتی بالا مشاهده نشد و پتانسیل‌های دیررس LLR تنها در ۴ بیمار ثبت شد. امواج با قله‌های واضح در هر دو گوش این افراد ثبت شد و نهفتگی و دامنه همه امواج قابل بررسی بودند و در محدوده نسبتاً هنچاری قرار داشتند. علاوه دامنه‌های N1-P2 در تمامی بیماران در محدوده هنچار قرار داشت (جدول ۲).

بررسی پتانسیل‌های برانگیخته بینایی VEP در هر ۳ بیمار اول از الگوهای هنچار تبعیت می‌کرد. مورفولوژی و زمان نهفتگی امواج VEP مناسب بود و دامنه امواج N75 و P100 در حد هنچار گزارش شدند. نتایج ارزیابی‌های روماتولوژیک و نوروولوژیک در هر ۳ بیمار بزرگسال مورد مطالعه از نظر وجود اختلالات کلازن و اسکولر و سبب‌شناسی‌های احتمالی بیماری‌های روماتولوژیک بررسی شدند که کلیه نتایج، منفی گزارش گردید. همچنین بررسی از نظر احتمال وجود سنترم پندرد علیرغم فقدان عالمی هیپوتربوئیدی در بیماران منفی بود. هر ۳ بیمار مورد ارزیابی‌های الکترومیوگرافی (EMG) (Electromyography: EMG) و سرعت انتقال عصب (Nerve Conduction Velocity: NCV) از چهار اندام قرار گرفتند. هیچ‌گونه یافته‌ای مبنی بر نوروپاتی در اعصاب محیطی دستها و پاها مشاهده نگردید و عملکرد حسی و حرکتی اعضا مربوطه هنچار بود. NCV حسی و حرکتی تمامی آزمونهای عصبی هنچار بود و رفلکس H ریز طبیعی گزارش شد. درنهایت شواهدی دال بر نوروپاتی، میوپاتی و رادیکولوپاتی توسط متخصصین مربوطه گزارش نگردید.

نتایج بررسی عملکرد دهليزی

ارزیابی سیستم موتوری و نوروولوژیک در هر ۳ بیمار هنچار و آزمون رومبرگ با چشم بسته نتایج ناهنجاری را نشان داد. به دلیل احساس عدم تعادل بخصوص در حالت گیت (Gate) آزمون ENG برای ۳ بیمار بزرگسال انجام شد که نیستاگموس خودبخودی دیده نشد. کالیبراسیون طبیعی بود و هیچ نوع نیستاگموس در آزمونهای خیره و وضعیت مشاهده نشد، اما دقت آزمون برای نهفتگی‌های سرعت نیستاگموس‌ها در محدوده مرزی قرار داشت. تعقیب آرام افقی و اپتوکینتیک در هر دو چشم هنچار و شنوایی شناسی-دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران - دوره ۱۴، شماره ۱۳۸۴، ۲

نسبتاً ضعیف ولی هنچار در فرکانس‌های ۱/۵، ۲ و ۳ کیلوهرتز با میانگین پاسخها در سطح ۸/۱ دسی‌بل SPL بود و DPOAEs در همین گوش دارای دامنه کم ولی هنچار در محدوده ۱ الی ۳ کیلوهرتز و در بقیه فرکانس‌های مورد ارزیابی دامنه‌ها پایین و ناهنجار بود. در گوش چپ نیز پاسخها با میانگین ۱۴/۸ دسی‌بل SPL در فرکانس‌های ۱-۴ کیلوهرتز قوی‌تر ظاهر شدند. یافته‌های DPOAEs نیز در این گوش مؤید دامنه‌های بالاتر در میان فرکانس‌های ۶-۸ دسی‌بل کیلوهرتز با دامنه‌های بالای ۱۰ دسی‌بل SPL و کاهش مختصر در فرکانس‌های ۵ و ۶ کیلوهرتز و همچنین فرکانس‌های ۸۰۰ و ۱۰۰۰ هرتز بودند.

در بیمار ۲ آزمون TEOAEs گوش راست در حد کاملاً هنچار با میانگین پاسخ ۱۳/۶ دسی‌بل SPL و DPOAEs نیز در حد هنچار در فرکانس‌های ۵۷۴ الی ۵۰۵ هرتز با دامنه بیش از ۱۴ دسی‌بل SPL دیده شد. زمان نهفتگی پاسخهای DPOAE در این بیمار بصورت کاملاً هنچار بود و نمودار دامنه - شدت نیز از عملکردی هنچار تبعیت می‌کرد. ارزیابی TEOAEs گوش چپ در این بیمار با میانگین پاسخها ۱۵ دسی‌بل SPL دامنه‌های بالاتری را در فرکانس‌های مختلف نشان می‌داد و الگوی منحنی DPOAEs نیز دامنه‌های بهتری را به خصوص در فرکانس‌های بالا (۴-۶ کیلوهرتز) مشخص می‌ساخت. ارزیابی‌های مربوط به نهفتگی در رشد دامنه‌های DPOAEs هنچار بودند.

نتایج آزمایش Spontaneous OAEs میان فقدان پاسخهای خودبخودی در هر دو گوش در این بیمار بود.

بیمار ۳ که شکایت از کم‌شنوایی و عدم درک کلمات از ۲۰ سال بیش داشت در ارزیابی TEOAE گوش راست پاسخهای هنچار با میانگین ۱۲/۶ دسی‌بل و گوش چپ ۸/۱ دسی‌بل SPL پذست آمد. دامنه پاسخهای DPOAE گوش راست و در فرکانس‌های بالای ۱۰۰۰ هرتز بیش ۱۰ دسی‌بل SPL و در گوش چپ بیش از ۸ دسی‌بل پذست آمد. در هیچ‌یک از بیماران مورد مطالعه مهار دگرسویی وابرانی در پاسخهای OAE مشاهده نگردید.

نتایج ECoG در بیماران نشان‌دهنده پاسخهای بسیار ضعیف و یا فقدان پتانسیل عمل مركب (Compound Action Potential: CAP) بود. CM بطور واضح وجود داشت و با تغییر در قطبیت تحریکات، تغییر فاز مشابه نشان می‌دادند و از قطبیت تحریکات تبعیت می‌کرد. ABR با

استانه شنواي، تحریک شده و فعال می‌شوند. این موضوع بیان می‌کند که رمزگشایی سیگنالهای شدید می‌تواند با اختلال عصب شنوايی مختلف شده باشد (۲۱).

زمان نهفتگی و دامنه پتانسیل میکروفنی حلزون تمامی بیماران هنجار بود، اما اجزء امواج ABR از شروع موج I بطور دولطه در پاسخ به تحریکات یک گوش یا وجود نداشتند و یا به شدت ضعیف شده بودند.

یافههای ABR ناهنجار در همراهی با شواهد فیزیولوژیک هنجار شامل عملکرد سلولهای موئی خارجی حلزون و CMS، اهمیت تشخیصی ویژهای در شناسایی نوروپاتی شنوایی دارند. حضور پاسخهای OAE نشان دهنده عملکرد هنجار سلولهای موئی خارجی می‌باشد. بنابراین تعقیرات پاتولوژیک باید در سطحی پرتوگزیمال تر قرار داشته باشد. ناهنجاریهای مربوط به پیوستگی‌های اتصالات سیناپسی بین سلولهای موئی داخلی و دندربتهای الیاف عصبی روی آنها، گانگلیون ماریچی یا الیاف عصب حلزونی می‌تواند علت اصلی علائم و یافته‌های دیده شده در بیماران چهار AN باشد. Berlin و همکاران روی اهمیت استفاده از کلیک تک قطبی در ارزیابی‌های ABR تأکید کرده‌اند.^(۱۵) آنها مطرح نمودند که وقتی به وجود AN در بیماری مشکوک می‌باشیم، در ابتدا باید اجزاء پیتانسیل‌های میکروفنی‌های حلزون را در حالتی با کلیک تک قطبی آشکار ساخته و سپس با تغییر قطبیت تحریک به بررسی همتوخانی با قطبیت تحریک میکروفونیک حلزون پرداخت.

مهار پاسخهای پرانگیخته OAE و آزمایش رفلکس اکوستیک در تشخیص سلامت سیستم واپران شنوایی، شامل عصب شنوایی و مسیرهای شنوایی ساقه مغز در سطح پائین تر مورد استفاده قرار گرفته است. در جریان این بررسی‌ها، مهار دگرسویی پاسخهای OAE در تمامی بیماران مورد مطالعه وجود نداشت. فقدان مهار پاسخهای OAE در اختلال AN نشان

متقارن گزارش شد. در نهایت ناهنجاری ضعیف در ساکلاد وجود داشت و حتمال هیپوکنیوتی شدید دو طرفه در آزمون کالریک وجود داشت (جدول ۳).

دخت

بیماران مورد بررسی در این مطالعه، نمونه‌هایی از اختلالات نادر سیستم شنوایی محسوب می‌شوند که از آنها به عنوان نوروپاتی شنوایی یا اهمزمانی عصبی شنوایی باد می‌شود. تمامی این بیماران بطور چشمگیری خصوصیات مشابه در ارزیابی‌های ادیولوژیک از خود نشان دادند که احتمالاً می‌توان این خصوصیت مشترک را در پاتوفیزیولوژی عصب شنوایی حسنه نمود.

این اختلال عمدتاً با امواج غیرطبیعی ABR یا فقدان آنها و عملکرد هنجار سلولهای موئی حلزون شنوایی و شواهد فیزیولوژیک هنجار شنوایی شامل OAEs و ECoG امتحان می‌گردد. امتیاز تمایز گفتاری (Speech Discrimination Score: SDS) و توانایی بازشناسی گفتاری بسیار ضعیف بود که همخوانی مناسبی با آستانه‌های تن خالص داشت. Zeng و همکاران مطرح کردند که پردازش فوق آستانه ای (Suprathreshold temporal processing) به عنوان عامل نمپورال مهمی در مشکلات مربوط به بازشناسی گفتار در بیماران نوروپاتی شنوایی نقش دارد. (۳۲)، این نقصان در افراد دچار AN شواهد متنقی صنی بر اساس پراهمیت هزمانی عصبی در درک شنوایی و بازشناسی گفتاری بر ما روشن می‌سازند و همچنین می‌توانند مؤید عدم همخوانی با کم شنوایی تن خالص باشند.

آنستانه رفلکس های اکوستیک در بیماران مورد مطالعه وجود نداشت. بطور نسبیکال رفلکس اکوستیک با اصوات نسبتاً شدید در حد ۸۵ دسی بل بالا

جدول ۳- نتایج بررسی های نورولوژیک بیماران مبتلا به نوروپاتی شنوایی

گزارش شد. با توجه به نبود شواهد کافی در مورد نوروپاتی محیطی و میوپاتی براساس آزمایشات نورولوژیک و روماتولوژیک در بیماران فوق، تشخیص این بیماری کاملاً محرز نشده و تنها احتمال آن مطرح گردید. جهت بیمار ۴ که خانمی ۲۶ ساله، نایینا و سخت شنوای بود با انجام آزمایشات تخصصی تر و عالم موجود از نظر نورولوژیک، سندرم رفاسم تشخیص داده شد. این سندرم نیز در اولین یا دومین دهه زندگی شروع شده و باز بین رفتن میلین یعنی دمیلینه شدن تارهای عصبی حسی عالم خود را بروز می‌دهد. دمیلینه شدن احتمالی اعصاب شنوایی در مناطق ساقه مغز توجیه کننده نوروپاتی شنوایی وجود کم شنوایی حسی عصبی می‌باشد. التهاب رنگدانه ای شبکیه (Retinitis pigmentosa) از عوارض دیگر بیماری و باعث نایینی در بیمار می‌شود. اختلال در آلفا اکسیده کردن اسیدهای چرب بتا - متیلات از علل این بیماری می‌باشد.

نتیجه گیری

به نظر می‌رسد با استناد به نتایج آزمایشات بالینی، رفتاری، فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی واژه "ناهمزنی عصبی شنوایی" به جای نوروپاتی شنوایی صحیح‌تر باشد. همچنین از نتایج آزمایشات چنین برمی‌آید که در بیماران مبتلا به ناهمزنی عصبی شنوایی، شاخه وستیبور عصب هشتم و ساختارهای عصبی مربوط به آن نیز ممکن است به درجاتی دچار اختلال باشند. این مطلب با نتایج مطالعه Sheikholeslami و همکاران در توافق می‌باشد. بنابراین توصیه می‌شود در بیماران مشکوک به این اختلال، مجموعه آزمایشات فیزیولوژیک، الکتروفیزیولوژیک و رفتاری شنوایی و تعادل به همراه معاینه‌های طبی و مجموعه آزمونهای تشخیصی انتقال عصبی جهت بررسی نوروپاتی‌های محیطی توأمًا صورت پذیرد تا طبقه‌بندی از این اختلال و تعیین وابستگی آن با سندرم های شناخته شده و یا نادر که با نوروپاتی‌های حسی حرکتی همراه‌هند صورت پذیرد. (۳۹)

متنون، گزارشات سایر محققان و نتایج آزمایش‌های گزارش شده این مطالعه بر این موضوع دلالت دارند که کورتوکس شنوایی مغز قادر است که سیگنال‌های معیوب ارائه شده در سطوح اولیه مسیر شنوایی به سمت مرکز را بطور فعال تنظیم نماید. در حقیقت ثبت پتانسیلهای کورتیکال سالم در بیماران مبتلا به AN مطرح می‌سازند که این‌گونه بیماران ورودی‌های نامحدود و مختلفی را برای درک سیگنال‌های پیچیده استفاده می‌کنند.

می‌دهد که عملکرد دسته زینتونی حلزونی شنوایی (Olivocochlear bundle) در آنها تغییر پیدا کرده است. در مطالعه حاضر، عملکرد شنوایی مرکزی با حضور امواج LLR در اکثر بیماران مورد مطالعه علیرغم ورودی‌های ناهنجار از مراکز پائین‌تر سیستم شنوایی بطور وسیعی حفظ شده بودند. به‌حال، این موضوع مورد تأکید می‌باشد که حضور پاسخهای مناسب کورتیکال و پاسخهای صدمه دیده سطوح پائین‌تر، تفاوت‌های موجود میان پتانسیلهای برانگیخته شنوایی (Auditory Evoked Potentials: AEPs) و مناطق مولد آنها را مطرح می‌سازد. این تفاوت‌ها عمداً مربوط به همزمانی عصبی شنوایی مورد نیاز در پاسخهای قابل ثبت و حساسیت آنها به شروع تحریک و مشخصه‌های زمان تداوم آنها می‌باشند. دامنه امواج ABR به شدت وابسته به تخلیه‌های عصبی همزمان تولید شده در مسیر الیاف شنوایی هستند. در حالیکه دامنه امواج LLR مربوط به تجمع پتانسیلهای تحریک پس سیناپسی Post-synaptic potentials عبارت دیگر امواج ABR بازتاب جریانهای فعال عصبی در اکسونها بوده در حالیکه پتانسیلهای کورتیکال بازتاب وقایع آهسته دندرتی هستند. انجام آزمونهای بالینی سیستم تعادل در برخی از بیماران مطالعه حاضر، ناهنجاریهایی را در آزمایش رومبرگ نشان داد. نتایج آزمونهای تعقیب آرام، ساکلاد و اپتوکینتیک و ثبت حرکات چشم در بیماران مورد مطالعه نشان داد که مسیرهای سیستم اوکولوموتور مرکزی آنها سالم بوده و عملکرد نسبتاً هنجاری دارند.

در مطالعه Sheikholeslami و همکاران با استفاده از آزمونهای تعادلی (Vestibular Evoked Myogenic Potentials: VEMPs) روی سه بیمار مبتلا به AN نتایج مشابهی گزارش شده است. (۳۹)، براساس VEMPs بطور مشهودی در این بیماران وجود ندارد گزارش این محققان که علت آن را مربوط به پاتولوژی عصب وستیبور تحتانی یا ساختارهایی که از آن عصب می‌گیرند، معرفی کرده است.

از نظر نورولوژیک در دو خواهر، بیماران ۱و ۲ احتمال وجود سندرم شارکوماری توٹ مطرح گردید. عالم بیماری در آنها به ترتیب از ۸ سالگی و ۱۵ سالگی شروع شده بود.

این عالم عمدها شامل عدم درک گفتار و اختلال در تعادل بود. الگوی عالم بیماری یعنی ضعف در اندامهای دیستال مثل پاها تنها در بیمار ۲

REFERENCES

1. Hood U, Berlin CI, Morlet T, Brashears S, Rose K, Tedesco S. Considerations in the clinical evaluation of auditory neuropathy/auditory dys-synchrony. *Sem Hear* 2002;3:201-8.
2. Chaudhari L, Tandon OP, Vaney N, Agrawal N. Auditory evoked responses in gestational diabetics. *Indian J Physiol Pharmacol* 2003;47(1):75-80.
3. Madden C, Rutter M, Hilbert L, Greinwald JH Jr, Choo DI. Clinical and audiological features in auditory neuropathy. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2002;128(9):1026-30.
4. Rance G, Cone-Wesson B, Wunderlich J, Dowell R. Speech perception and cortical event related potentials in children with auditory neuropathy. *Ear Hear* 2002;23(3):239-53.
5. Starr A, Sininger Y, Neguyen T, Michalaweski HJ, Oba S, Abdala C. Cochlear receptor (microphonics and summation potentials, otoacoustic emissions) and auditory pathway (auditory brainstem potentials) activity in auditory neuropathy. *Ear Hear* 2001;22(2): 91-9.
6. Lee JSM, McPherson B, Yuen KCP, Wong LLN. Screening for auditory neuropathy in a school for hearing impaired children. *Int J Ped Otorhinolaryngol* 2001;61(1):39-46.
7. Shallop JK, Peterson A, Facer GW, Fabry LB, Driscoll C. Cochlear implants in five cases of auditory neuropathy: postoperative findings and progress. *Laryngoscope* 2001;111(4Pt1):555-62.
8. Ohwatari R, Fukuda S, Chid E, Matsumura M, Kuroda T, Kashiwamura M, et al. Preserved otoacoustic emission in a child with a profound unilateral sensorineural hearing loss. *Auris Nasus Larynx* 2001;Suppl:117-20.
9. Sheykholeslami K, Kaga K, Kaga M. An isolated and sporadic auditory neuropathy (auditory nerve disease): report of five patients. *J Laryngol Otol* 2001;115(7):530-4.
10. Cone- Wesson B, Rance G. Auditory neuropathy : a brief review. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg* 2000;8(5):421-5.
11. Kraus N, Bradlow AR, Cunningham J, King CD, Koch DB, Nicol TG, et al. Consequences of neural asynchrony: a case of auditory neuropathy. *J Assoc Res Otolaryngol* 2000;1(1):33-45.
12. Delentre P, Mansbach AL, Bozet C. Auditory neuropathy with preserved cochlear microphonics and secondary loss of otoacoustic emissions. *Audiology* 1999;38(4):187-95.
13. Hood U. A review of objective methods of evaluating auditory neural pathways. *Laryngoscope* 1999;109(11):1745-8.
14. Berlin CI, Goforth-Barter L, Jhon P, Hood U. Auditory neuropathy: three time' courses after early intervention. 1999;[1] available at: www.aro.org/archives/1999/668.html. Sept:22.2005.
15. Berlin CI, Bordelon J, Jhon PS, Wilensky D, Hurley A, Kluka E, et al. Reversing click polarity may uncover auditory neuropathy in infants. *Ear Hear* 1998;19(1):37-47.
16. Starr A, Picton TW, Sininger Y, Hood U, Berlin CI. Auditory neuropathy. *Brain* 1996;119(pt 3):741-53.
17. Stein L, Tremblay K, Pasternak J, Bannerjee S, Undemann K, Kraus N. Brainstem abnormalities in neonates with normal otoacoustic emissions. *Sem Hear* 1996;17:197-213.

18. Kaga K, Nakamura M, Shingami M, Tsuzuku T, Yamada K, Shindo M. Auditory nerve disease of both ears revealed by auditory brainstem responses, electrocochleography and otoacoustic emissions. *Scand Audiol* 1996;25(4):223-38.
19. Simmons J, Beauchaine KI. Auditory neuropathy: case study with hyperbilirubinemia. *JAM* 2000;11(6):337-47.
20. Delentre P, Mansbach AL, Bozet C, Clercx A, Hecox KE. Auditory neuropathy: A report on three cases with early onsets and major neonatal illness. *Electroencephal Clin. Neurophysiol* 1997;401(1):71-22.
21. Starr A, Sininger YS, Pratt H. The varieties of auditory neuropathy. *J Basic Clin Physiol Pharmacol* 2000;11(3):215-30.
22. Klaydjieva I, Nikolava A, Turnev I, Petrova J, Hristova A, Ishpekova B,et al. Hereditary motor and sensory neuropathy--Lom, a novel demyelinating neuropathy associated with deafness in gypsies. Clinical, electrophysiological and nerve biopsy findings. *Brain* 1998;121(Pt 3):399-408.
23. Butinar D, Starr A, Vatovec J. Brainstem auditory evoked potentials and cochlear microphonics in the HMSN family with auditory neuropathy. *Pflugers Arch* 2000;439(3 Suppl):R204-5.
24. Lopez-Diaz-de-Leon E, Silva-Rojas A, Ysunza A, Amavisca R, Rivera R. Auditory neuropathy in Friedreich ataxia. A report of two cases. *Int J Ped Otorhinolaryngol* 2003;67(6):641-8.
25. Vatovec J, Perat MV, Smid L, Gros A. Otoacoustic emissions and auditory assessment in infant at risk for early brain damage. *Int J Otorhinolaryngol* 2001;58(2):139-45.
26. Starr A, Sininger Y, Winter M, Derebery MJ, Oba S, Michalewski HJ. Transient deafness due to temperature-sensitive auditory neuropathy. *Ear Hear* 1998;193:169-79.
27. Kon K, Ingaki M, Hanoka S. Otoacoustic emissions in patients with neurological disorders who have auditory brainstem abnormality. *Brain Dev* 2000;22(5):227-35.
28. Hood LJ. Auditory neuropathy: what is it and what can do about it? *Hear J* 1998;51:10-13.
29. Zeng FG, Shannon RV. Loudness - coding mechanisms inferred from electric stimulation of human auditory system. *Science* 1994;264(5158):564-6.
30. Shannon RV, Zeng FG, Wygonski J, Kamath V, Ekelid M. Speech recognition with primarily temporal cues. *Science* 1995; (13);270(5234):303-4.
31. Hood LJ. Auditory neuropathy/auditory dys-synchrony: new insights. *Hear J* 2002;55(2):10-18.
32. Zeng FG, Oba S, Garde S, Sininger Y, Starr A. Temporal and speech processing deficits in auditory neuropathy. *Neuroreport* 1999;10(6):3429-35.
33. Doyle KJ, Sininger S, Starr A. Auditory neuropathy in childhood. *Laryngoscope* 1998;108(9):1374-7.
34. Tlumak AI. Electrophysiological responses in individuals with auditory neuropathy. *Sem Hear* 2002;23: 183-91.
35. Starr A, McPherson D, Patterson J. Abscence of both auditory evoked potentials and auditory percepts dependent on timing cues. *Brain* 1991;114(Pts):1157-80.
36. Kraus N, Ozdamar O, Stein L, Reed N. Absent auditory brainstem response: peripheral hearing loss or brainstem dysfunction. *Int Elec Resp Audio Study Gr* 1983; AA3:59.

37. Salvi RJ, Wang J, Ding D, Stecker N, Arnold S. Auditory deprivation of the central auditory system resulting from selective inner hair cell loss: animal model of auditory neuropathy. Scand Audiol 1999;51(Suppl):1-12.
38. Abdala C, Sininger YS, Starr A. Distortion-product otoacoustic emission suppression in subjects with auditory neuropathy. Ear Hear 2000;21(6):542-53.
39. Shykholeslami k, Kaga K, Murofushi T, Hughes DW. Vestibular function in Auditory neuropathy. Acta Otolaryngol 2000;120(7):849-854.