

موسیقی و شنایی

بررسی شنایی نوازندگان

مینا میلانی

کارشناس ارشد شنایی شناسی


سازمان صدا و سیما



هجموم سطوح زیان آور صوتی قرار نمی‌گیرند، اما موضوع نوازندگان درون ارکستر کاملاً متفاوت است. اصوات بلند موسیقی نه تنها متناسب با شیوه اجرا یا نوع موسیقی هر لحظه تغیر می‌کند بلکه حجم صدایی که به گوش می‌رسد به میزان زیادی بسته به موقعیت نوازنده متفاوت است.

نوازندگان بخش سازهای کوبهای (Percussion) در معرض سطوح بالایی از نویز ضربهای قرار داشته و عده‌ای که در مجاورت سازهای برنجی (Brass) قوی‌تر می‌نوازنند در معرض قله‌های گذراي صوتی ييش از ۱۰۰ دسی بل قرار می‌گيرند. در هر حال، مکانهایی که يشتر در معرض خطر هستند مربوط به نوازندگان سازهای بادی چوبی (Woodwind) که بلا فاصله در جلوی قسمت

صدا جز لایفک رزندگی روزمره انسان محسوب می‌شود. صدا امکان تجارت خوشایندی چون گوش دادن به موسیقی یا آواز پرنده‌گان را فراهم آورده و وسیله ارتباط کلامی است. با این حال، در جامعه مدرن امروزی صدا اغلب موجب ناراحتی انسان می‌گردد، به این صدای ناراحت کننده "نویز" می‌گویند. از آنجا که نویز ناخوشایند، مداخله گر و مضر است به عنوان صدایی ناخواسته درنظر گرفته می‌شود. بدین خاطر دلنشیں ترین آهنگ‌ها در صورتی که بلند نواخته شود می‌توانند نویز به حساب آید. در این مسئله شکی نیست که موسیقی منبعی از صدا و گاه صدای بسیار شدید است. در مورد موسیقی کلاسیک، گرچه شوندگان حاضر در سالن کنسرت که به ارکستر سمفونی کامل گوش می‌دهند مورد



است ضمن آن که
طول قسمت کانال
باید بیش از اندازه
زیاد باشد.

سازهای ذهنی بزرگ

این سازها از قبیل باس، سلو و هارپ زمانی که بلند نواخته شوند قادر به تولید سطوح صوتی بالاتر از ۹۰ دسی بل SPL هستند. گرچه قسمت اعظم انرژی در پایین تر از فرکانس ۲ کیلوهرتز قرار دارد، لکن همچون ویولا و ویولون، شنیده شدن ساختار هارمونیکی حائز اهمیت است. محافظت داخل گوشی مطلوب در این مورد نوع vented/tuned باونت ۳ میلیمتری است.

سازهای برونچی

این سازها می‌توانند سطوحی بالاتر از ۱۱۵ دسی بل SPL ایجاد کنند. به خاطر جهت دهانه ترومبون، شیپور فرانسوی و ترومپت، نوازنده‌گان آنها چندان در معرض صدای ساز خود قرار نمی‌گیرند، لکن نوازنده‌گان ردیف جلو محکوم به شنیدن اصوات بلندشان هستند. محافظت داخل گوشی مناسب نوع vented/tuned است که این امکان را به نوازنده می‌دهد تا انرژی پایه فرکانس کم را بشود اما انرژی هارمونیک‌های بالاتر را (ییشتراز ۱۵ ER) کاهش می‌دهد.

سازهای کوبه‌ای

سازی که در این مجموعه ییشتراز آسیب را می‌رساند سنج high hat است که در سمت چپ نوازنده طبل راست دست قرار می‌گردد. ادیو گرام نیز نشان‌دهنده فورفتگی (Notch) غیر مقارن در فرکانس ۶ کیلوهرتز می‌باشد. محافظت مورد نظر نظر FI-ER-20/HI-FI است. محافظت ییش از حد می‌تواند منجر به کاهش توانایی کنترل در نواختن همراه با آسیب به دست یا بازو شود.

جنبه دیگر برنامه محافظت شنایی، انجام آزمایش شنایی است. هدف از این کار، تشخیص افراد دچار افت شنایی، تشخیص افرادی که شنایی‌شان تغییر کرده و تعیین مؤثر بودن برنامه محافظت شنایی است.

این مسئله که نوازنده‌گی در ارکستر سمفونی واقعأ به شنایی آسیب می‌رساند یا نه، جای بحث دارد. مطالعات متعددی در خصوص سطوح صوتی ارکستر سمفونی و شنایی موسیقیدانان

سازهای برونچی قرار دارند و نوازنده‌گانی است که در جلوی سازهای کوبه‌ای می‌نوازنند. مساله قابل توجه آن است که آسیب سلول‌های موئی (و کاهش شنایی تحت بالینی یا subclinical) می‌تواند پیش از آن که آزمون‌های شنایی متداول وجود چنین افی را مشخص کنند اتفاق یافتد.

محافظت شنایی

نخستین مرحله در برنامه محافظت شنایی، تعیین تماس‌های بالقوه خطرناک از طریق اندازه‌گیری سطح صدا است. در صورت ابات خطرناک بودن آن، قدم بعدی کنترل میزان صدایی است که افراد در معرض آن قرار دارند. این عمل از دو طریق مهندسی و محافظت فردی انجام می‌شود. وسایل محافظت فردی شاید مؤثرترین راه برای جلوگیری از کاهش شنایی ناشی از نویز باشند اما ارزان‌ترین و رایج‌ترین آنها بشمار می‌آیند.

محافظه‌های داخل گوشی (earplug) که به‌ویژه برای موسیقیدانان طراحی شده ER-15، ER-20، ER-25 و Vented/tuned است. هر یک از این پلاک‌ها براساس مشخصات میزان کاهش صدا، در دسته خاصی از سازها کارآیی یافته دارند.

سازهای بادی چوبی

سطوح شدت معمولاً از ۱۰۰ دسی بل SPL فراتر نمی‌رود. آسیب شنایی یافته ناشی از بخش سازهای برونچی است که در پشت این سازها نواخته می‌شوند. بدلیل تمرکز انرژی سازهای برونچی در ناحیه فرکانسی بالا، محافظت داخل گوشی نوع ۱۵ ER کاهنده انتخابی محسوب می‌شود. در صورتی که نوازنده‌گان سازهای بادی به اندازه کافی از بخش سازهای برونچی دور باشند، محافظت داخل گوشی نوع vented/tuned نیز مطلوب است.

انواع فلوت

این سازها می‌توانند سطوحی بالاتر از ۱۰۵ دسی بل SPL را در گوش راست ایجاد نمایند. بدین خاطر آستانه‌های شنایی دو گوش نامتقارن می‌باشد. در این مورد، محافظت داخل گوشی نوع ۱۵ ER با کanal طویل به‌منظور حذف اثر انسداد توصیه می‌شود.

سازهای ذهنی کوچک

در مورد سازهایی چون ویولون و ویولا که در سمت چپ نواخته می‌شوند آستانه گوش چپ در فرکانس ۶ کیلوهرتز بدتر خواهد بود. برخلاف سازهای بادی، سازهای ذهنی کوچک قابلیت تولید سطوح بالاتر از ۱۱۰ دسی بل SPL را در برابر پرده گوش چپ دارند. از طرف دیگر، شنیدن هارمونیک‌ها در این سازها از اهمیت یافته برخوردار است. محافظت داخل گوشی انتخابی نوع ۱۵ ER

۴۰ سال و ۴۰ سال به بالا و سابقه نوازنده‌گی کمتر از ۳۰ سال و ۳۰ سال به بالا تفاوتی مشاهده نشد یا اختلاف موجود معنی دار نبوده است. سطح شنایی یا میانگین آستانه سه فرکانس ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز (PTA) در راه هوایی اکثر (۸۹/۴٪) گوش‌ها در حد طبیعی بوده و حداقل میزان افت شنایی در این محدوده فرکانسی در حد ملایم بودست آمد.

بنابراین می‌توان چنین تیجه گرفت که در نمونه مورد مطالعه، علی‌رغم وفور مشکلات شنایی از نظر وجود notch و افت شنایی در فرکانس‌های بالا، فرکانس‌های اصلی گفتاری تحت تأثیر قرار نگرفته یا به میزان ناچیزی متأثر شده است.

در مجموع با توجه به نتایج بررسی حاضر مشخص می‌شود که اکثر موسیقیدانان مورد مطالعه دچار مشکل شنایی دو طرفه در فرکانس‌های بالا به صورت notch در محدوده فرکانسی ۴-۸ کیلوهرتز (خصوصاً ۶ کیلوهرتز) و افت فرکانس‌های بالا می‌باشد. در عین حال، میانگین آستانه فرکانس‌های اصلی گفتاری در غالب افراد نمونه طبیعی بود. علاوه بر این نوع موسیقی، سن و سابقه نوازنده‌گی تاثیر بارزی در نتایج حاصله نداشته‌اند.

نظر به فراوانی بیشتر نوازنده‌گان سازهای زهی در هردو نوع موسیقی (ویولون و تار) و تفاوت‌های بارز در شیوه نواختن آنها، پی‌بردن به دلایل تشابه تأثیر این سازها بر شنایی نوازنده‌گان نیازمند بررسی بیشتر بر نمونه وسیع تر و در نظر گرفتن عوامل دیگری چون محیط تمرین و نحوه ضبط آهنگ می‌باشد.

از آنجایی که حساسیت شنایی در موسیقیدانان از اهمیت زیادی برخوردار است لذا ارزیابی منظم شنایی همراه با استفاده از محافظه‌های مناسب می‌تواند در حفاظت از شنایی این افراد مؤثر باشد.

حرفه‌ای در خارج از کشور انجام شده که بعضًا نتایج متفاوتی را ذکر کرده‌اند. چنین مطالعاتی در زمینه موسیقی ایرانی تاکنون صورت نگرفته است.

هدف کلی از انجام مطالعه حاضر، بررسی شنایی نوازنده‌گان سازهای کلاسیک و ایرانی بود که از طریق آزمون صوت خالص و در محدوده فرکانسی ۲۵۰-۱۰۰۰ هرتز صورت پذیرفت. در عین حال، متغیرهای سن و سابقه نوازنده‌گی نیز مدنظر قرار گرفتند. بررسی مذکور در سازمان صدا و سیما و در خردad ۱۳۷۱ با استفاده از تجهیزات بخش شنایی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به عمل آمد.

این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی بر روی ۳۳ نوازنده مذکور (۲۳ نوازنده سازهای کلاسیک و ۱۰ نوازنده سازهای ایرانی) در محدوده سنی ۲۲-۵۹ سال (میانگین 36 ± 8) و سابقه نوازنده‌گی ۶-۴۵ سال (میانگین 9 ± 20 سال) انجام شد. نوازنده‌گان هر دو نوع موسیقی به ترتیب فراوانی در سه دسته اصلی سازهای زهی، بادی و کوبه‌ای فعالیت داشتند. هیچ‌یک از افراد مورد مطالعه دارای سابقه ابتلاء به بیماری‌های گوش یا بیماری‌های مؤثر بر سیستم شنایی و فعالیت در محیط‌های پرسرو صدا (مانند جبهه و ...) نبودند.

براساس نتایج حاصله، از مجموع ۳۳ آزمودنی، یک نفر (۳٪) فاقد مشکل شنایی در دو گوش و ۳۲ نفر (۹۷٪) در یک (۱۲٪) یا دو گوش (۸۵٪) دچار مشکل شنایی بودند.

در مجموع، ۶ گوش (۱۹٪) شنایی کاملاً طبیعی داشته و ۶ گوش (۹۱٪) غیرطبیعی بودند که از این تعداد ۴۰ گوش (۶۶٪) notch (افت شنایی حداقل ۱۰ دسی‌بل در یک فرکانس نسبت به دو فرکانس مجاور) و ۲۰ گوش (۳۳٪) افت در فرکانس‌های بالا (High tone loss) داشتند.

بررسی آماری (آزمون χ^2) آستانه‌های شنایی نوازنده‌گان سازهای ایرانی و کلاسیک در فرکانس‌های ۱۰۰۰-۲۵۰ هرتز نشان‌دهنده فقدان اختلاف معنی دار بوده و لذا آستانه‌های شنایی نوازنده‌گان هر دو نوع ساز در یک حدود قرار داشتند. توزیع فراوانی notch بر حسب فرکانس نمایانگر فراوانی بیشتر موارد notch در فرکانس ۶ کیلوهرتز (۷۷٪) می‌باشد. علی‌رغم فراوانی بیشتر ۶ notch کیلوهرتز در گوش چپ آزمودنی‌های این مطالعه، آزمون مقایسه نسبتها اختلاف معنی داری را بین دو گوش از این نظر نشان نداد. میزان متوسط افت شنایی در فرکانس ۶ کیلوهرتز در حد ملایم (Mild) بود. علاوه‌براین، از نظر فراوانی ۶ notch کیلوهرتز بین نوازنده‌گان سازهای کلاسیک و ایرانی و همچنین ۶ notch کیلوهرتز و افت فرکانس‌های بالا در دو گروه سنی کمتر از