

گزارش نتایج غربالگری شنوازی نوزادان متولد شده در بیمارستانهای تهران - 1379

مهین صدائی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

هدف: غربالگری شنوازی نوزادان به عنوان یکی از بهترین روش‌های شناخت زودهنگام اختلال شنوازی و در پی آن اقدام به موقع برای پیشگیری از عوارض آن و در صورت امکان و نیاز، انجام توانبخشی مناسب.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر روی 175 نوزاد 7-0 روزه (گروه اول 112 مورد با تاریخچه سلامت و گروه دوم 638 مورد با سابقه خانوادگی در رده پرخطر^۱) در بیمارستانهای میرزا کوچک خان، بهارلو، و شهید اکبر آبادی تهران انجام شده است. صدا سازهای مورد استفاده طبل (برای تولید فرکانس‌های پایین) و رسیور (فرکانس‌های بالا) با شدت dB SPL 90-95 بوده اند و پاسخ مطلوب رفلکس پلکی گوشی (APR)، استارتل، توقف حرکات بود.

یافته‌ها: از گروه اول APR 51٪، 10٪ رفلکس استارتل، 22٪ هر دو رفلکس را نشان دادند و 17٪ هیچ پاسخی نداشتند. از گروه دوم 47٪، 24٪ رفلکس استارتل و 11٪ هر دو رفلکس را نداشتند و 18٪ بدون پاسخ بودند.

بحث و نتیجه گیری: از کل نمونه‌های مورد مطالعه (175 نوزاد) 14 نفر (8 دختر و 6 پسر) هیچ پاسخی نداشتند.

مقدمه:

این پژوهش سنجشی توصیفی است. در این مطالعه مشاهده رفتارهای شنوازی نوزادان مورد نظر بوده است.

برای این بررسی از بخش نوزادان و زایمان بیمارستانهای میرزا کوچک خان، بهارلو شهید اکبرآبادی و مهدیه تهران کمک گرفته شده است. که در همین جا لازم می‌دانم از همکاری مسئولین محترم بیمارستان و بخش نوزادان کمال سپاسگزاری را داشته باشم. روند کارپس از طی مراحل اداری و اجازه ورود به بخش نوزادان بشرح زیر بود:

- ابتدا با تکمیل پرسشنامه با همکاری مادر (موارد قید شده در پرسشنامه منضم می‌باشد).
- انتخاب محیط مناسب در بخش برای انجام تست (بررسی گرمایش نور و صدای محیط و...).

Low frequency استفاده از صداسازها (طبل بعنوان فرکانس پائین High frequency و رسیور فلزی بعنوان فرکانس بالا 90-95 dB SPL) و شدت

- رعایت فاصله زمانی بین دو ارایه
- رعایت فاصله تا بدن نوزاد بدلیل جلوگیری از تداخل فشردگی هوا
- و مشاهده عکس العمل‌های نوزاد بصورت:

موضوع و اهمیت آن

بر کسی پوشیده نیست که صدمات و ضایعات منجر به کاهش شنوازی (به هر میزان) نوزادان در روند رشد و تکامل گفتار، زبان، شخصیت و روابط عاطفی، اجتماعی و به تبع آن در آینده اثرات نا مطلوب بر آموزش و تحصیل وی میگذارد بویژه اگر این اختلال شنوازی در دوران جنبینی بدلا لیل ژنتیکی و یا غیر ژنتیکی و بهر حال بصورت مادرزادی در نوزاد شکل بگیرد.

تشخیص اختلال شنوازی هر چه به موقع و سریع تر، اقدام توان بخشی بمنظور کاهش تا رفع معضل و جلوگیری از عوارض ناشی از آن و در نهایت استفاده صحیح از باقیمانده شنوازی به لحاظ امکان برقراری ارتباط کودک با محیط اطراف، تماماً ارزشمندی غربالگری شنوازی را فزون می‌سازد.

هدف از این پژوهش، تعیین توزیع فراوانی فقدان پاسخ نوزادان به صدای مورد نظر بوده است.

روش و وسائل مورد استفاده:

- ثبت نتایج آزمون و عودت نوزاد به محل اولیه نزد مادر
 - کل زمان از شروع کار تا پایان برای هر نوزاد کمتر از 8 دقیقه بطول می‌انجامید.

Auro Palpebral Reflex رفلکس پلکی گوشی -
 (APR) استارتل -
 توقف / شروع حرکات -
 شایان ذکر است اگر با تکرار مجدد عکس العمل مشاهده نمی شد. در گروه رشدشگان (Fail) قرار می گرفت.

بررسی متون خارجی و داخلی:

هر چه نوزادان بیشتری زنده می‌مانند غربالگری شناوای گستردۀ تری انجام می‌شد و شناوی شناسان نوزادان بیشتری را با کم شناوی شناسایی می‌کردند. پس از تشخیص اولیه، انتخاب و تنظیم سمعک (تقویت کننده مناسب) است. شاید آزمایش بالای 6 ماه از طریق VRA اصولاً راحت تر و در دسترس تر می‌باشد ولی انجام این آزمایش برای نوزادان کمتر از 6 ماه متأسفانه خیلی مطلوب بنظر نمی‌رسد نکته مهم این که نوزادی که در آزمون رد (Fail) شود منطقی نیست هیچگونه اقدام توان بخشی و یا هر اقدام مورد نیاز دیگر برایش انجام نشود و رها شود تا بزرگتر شود و مجدد تست صورت گیرد.

- بهرحال باید گفت اولین غربالگری شناوای توسط الکساندر و اوینیگ از انگلستان در 1944 بمنظور حصول اطلاعاتی درباره شناوایی با استفاده از: اصوات ضربه ای، فریاد زدن و کف زدن و مشاهده پاسخ بصورت رفلکس پلکی گوشی (APR) بوده است.

- غربالگری شناوای واقعی تر و جدی تر توسط ودبیرگ - 1956 در سوئد با به کار گیری اصرات خالص (Pure tone) و مشاهده APR بود و سپس در ادامه کار ودبیرگ، فرودینگ 2000 نوزاد را با زنگوله کوچک (عنوان صدادساز) مورد ارزیابی قرار داد که نتایج قدری نگران کننده بود.

- اولین غربالگری در ایالات متحده در دنور بصورت پروژه غربالگری در سال 1964 توسط داونزوستریت با استفاده از مولد نویز 90 dB SPL با فرکانس مرکزی 3000 هرتز صورت گرفت که اگر چه برخی از نوزادان با آسیب شناوایی شناسایی شدند لیکن اشتباهات زیادی نیز متوجه نتایج بود. داونز در جهت بهبود آزمایش شناوای نوزادان و انجام پسی گیری های مربوطه بمنظور افزایش کیفیت و دقت نتایج از انجمن شناوایی گفتار امریکا (ASHA) (تقاضای تشکیل کمیته ای مشترک از اعضاء ASHA و آکادمی متخصصین کودکان و افتالمولوژی امریکا به منظور سازماندهی امر فوق مطرح نمود.

- تا مدت‌ها نوزادان از بین گروههای در معرض خطر ابتلا به High Risk Registered Children کم شناوای شناسایی می‌شدند ولی شناوایی شناسان متوجه شدند شاید فقط نیمی از سخت شناویان از بین HR ها هستند.

- ودر ادامه گروهی از محققین دیگر 12731 نوزاد را در سال 1976 تخت غربالگری شناوایی رفتاری قرار دادند. تقریباً

همه آنها یکبار پس از 6 ماه و بار دیگر 3 سال بعد مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند.

6 مورد از 23 مورد مبتلا به کاهش شناوایی عمیق تشخیص داده شده و در بدرو تولد شناسایی شده بودند. در ایران برای اولین بار در سال های 70 - 1369 (تقریباً 1990-91) تعدادی نوزاد در 24 ساعت بدرو تولد توسط صدایی - اشاره با هدف بررسی نوزادان و غربال آنها که قادر پاسخ (رفلکس) هستند، انجام گرفت.

در سالهای بعد 72-71، 75-74 و 79-78 به ترتیب توسط صدایی - اصلانی - قدس، صدایی کریمی - ذکانی و صدایی - کرخی - هاشمی غربالگری شناوایی نوزادان تکرار شد که حدود 600 نوزاد را تشکیل می‌دادند.

بررسی داده های پژوهش:

در اینجا ابتدا به اطلاعات حاصله از آخرین پژوهش (79-78) روی 175 نوزاد، پرداخته و سپس مقایسه ای کوتاه با پژوهش های قبل صورت می‌گیرد لازم به یادآوری است که اگر چه از 2 وسیله صدادساز (HF,LF) استفاده شده است و برخی از نوزادان به LF و بعضی HF عکس المعل نشان ندادند و گروهی از نوزادان مورد مطالعه به هیچیک از صدایها پاسخ نداشتند در این پژوهش نوزادانی که به هیچ صدایی پاسخ ندادند تحت عنوان (No Response) NR مطرح شده اند.

بطور کلی از 175 نوزاد مورد بررسی 112 نوزاد با توجه به تاریخچه گیری طبیعی و 63 نوزاد (35 درصد) با شرایط تولد و سابقه پزشکی و فامیلی در گروه معرض خطر (HRR=High Risk Registered) قرار گرفتند.

از 112 مورد با شرح حال طبیعی 14 نوزاد (8 درصد) هیچ عکس العملی به صدایها صدادساز نداشتند.

از 63 مورد HR، 30 نوزاد دارای بیلی رویین بالا بودند که 46 درصد به LF و 43 درصد به HF و 11 درصد NR نسبت به هر دو صدا بودند.

در اولین پژوهش که روی 100 نوزاد غربالگری شناوای صورت گرفت 16 درصد HR و 14 مورد NR نسبت به هر دو صدا (بالا و پائین) بودند و در پژوهش (71-72) از 120 نوزاد 72 نوزاد (86 درصد) پاسخ بشکل APR و 11 نفر (13 درصد) استارتل و 1 مورد (1 درصد) توقف در حرکات داشت و 29 مورد در کل NR بودند که در 2 مورد از 29 نفر، مادر هنگام زایمان داروی ستوسینون بالایی را دریافت کرده بود. (در گزارش ها آمده است این عامل می‌تواند

پیشنهادات:

در ارائه اصوات به نوزادان چه به صورت غربالگری یا غیر آن باید به شدت صدا توجه داشته تا موجب ضربه صوتی نشود. – انجام غربالگری نوزادان با برنامه ریزی خوب و مدون در بخش های زایمان و نوزادان و بعد از آن در مراکز بهداشت که برای واکسیناسیون مراجعه می نمایند. زیرا که در تمام جوامع پیشرفت هه عمده تحقیقات و پژوهشها از همین غربالگری ها (نه تنها شناوی بلکه کلیه تخصص ها) رویکرده و جان می گیرد.

پی نویس:

1. High risk

حداقل دو یا سه روز پس از تولد موجب تاخیر در پاسخ باشد که متأسفانه در این پژوهش امکان بررسی در سه روز پس از تولد نوزاد میسر نبود) و 6 مورد از گروه مورد مطالعه پاسخ مشکوک داشتند.

البته در ادامه این پژوهش علاوه بر 120 نوزاد به 63 مورد از خانواده های نوزادان ارزیابی شده در پژوهش اول، دعوتنامه ارسال شد تا برای آزمون مجدد مراجعت نمایند که متأسفانه اغلب یا آدرس اشتباه و کامل نبود یا جایه جا شده بودند و ... که به هر حال 14 مورد ارجاع داشتند از بين آنها در تکرار ادیومتری: 5 مورد NR و فقط 9 مورد پاسخ داشتند و در تمپانومتری 11 مورد دارای تمپانوگرام نوع A، 2 مورد نوع B و 1 مورد C بودند.

در پژوهش بعدی (74-75) از 157 نوزاد: 137 مورد (87 درصد) عکس العمل به صدای داشتند و بقیه (20 نوزاد = 13 درصد) NR بودند.

از کل افراد مورد مطالعه در این پژوهش 3 نفر دارای بیلی رویین بالا بودند که 1 نفر NR و از 29 مورد که نسبت فamilی درجه یک داشتند. 3 نفر و از 16 مورد که مصرف داروهای سم گوش (اتوکسیتی) در دوران بارداری داشتند، 3 نفر NR بودند. از کل افراد این بررسی 5 نفر دچار آنومالی کرانیوفاسیال بودند که 2 نفر از آنها هیچ پاسخی نشان ندادند.

بحث:

کلیه پژوهش های انجام شده به همراه چند پژوهش تقریباً مشابه خارجی در جدول شماره 1 نشان داده شده است:

محدودیتهای که در این پژوهش متصور است:

- کیفی بودن آزمون
- در صورت وجود مشکلات خاص حلقه ای، بهر حال رفلکس نظری نوزاد طبیعی مشاهده می شد.
- پاسخ دو گوشی است.
- مشکلات حمل و نقل و پی گیری های بعدی
- عدم همکاری والدین در مراجعت به مراکز مجهر شناوی برای پی گیری بدو دلیل زیر:

الف) بی توجهی و کم اطلاعی والدین از اثرات حاصله از مشکل شناوی

ب) نقص آدرس، دوری مسیر و ...

مزیت های آزمون:

- در دسترس بودن ابزار صدا ساز (ارزان و راحت الوصول)
- مشاهده سریع عکس العمل ها.
- انجام آزمون و مشاهده پاسخ ها در کمتر از یک دقیقه.

جدول شماره(1) مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش های قبلی

ملاحظات دیگر پژوهش	HRR	تعداد فراوانی R/NR	تعداد کل	پژوهشگر(ان)	محل پژوهش	سال
	%16	NRT %15 NRR%14 NRB%16	100	صدائی - افشار	بیمارستان میرزاکوچک خان	69-70
از 29 NR دوز بالا ستوسینون از 14 مورد: R-9 و Q-5	؟	R (85)/71 NR (29)/24 Q (6)/5	14+120 سال بعد	صدائی - اسلامی قدس	شهید اکبرآبادی	71-72
از 3 مورد Hbil 1 مورد NRB ... 2 مورد CFA 5 از 5 نوزاد	40	R (127)/81 NR (30)/19 (NRB)20	157	صدائی - کریمی ذکائی	میرزاکوچک خان مهدیه	74-75
19 مورد کم شنوا	وزن کمتر از 1500 gr	-----	1066	مک دونالد	-----	-1967 (μ)
SNHL %5	*** *** *** + پیلیروبین بالا	-----	204	کلارک و کانزوی	-----	-1978 (μ)
از کل 175 نوزاد 25 نفر NRB	(63)%35 (11)%18 NRB	NRT (16)%9 NRR (30)%17 NRB (14)%8	175	صدائی-کرخی هاشمی	میرزاکوچک خان بهارلو	78-79

منابع

- 1- Katz, J . 1994. *Handbook of Clinical Audiology*. 4 th ed, Baltimore: Williams & Wilkins.
- 2- Northern, J.h., Downs, M . 1991. *Hearing in Children*. 4 th ed. Baltimore: Williams & Wilkins.
- 3- Mc Cormick, B. 1992. *Pediatric Audiology , 0-5 years*, 1st ed. London: Whurr Publishers.