

ارزیابی گوش میانی با استفاده از فرکانس و دامنه

تشدید گوش خارجی

جمیله فتاحی ●

دکتر عبدالله موسوی - مهین صدایی - سقراط فقیرزاده

ABSTRACT

Title: Comparison of external ear resonance characteristic in a group of 7-9 year old children with A & B type tympanogram, Tehran, 1376 Hijri.

Methods and Materials:

This cross - sectional analytical study examines the clinical utility of the external ear resonance (EER) peak amplitude measurement as an index of the possible middle ear effusions. The EER peak amplitude and frequency of 180 ears in 98 children of 7-9 years old were recorded. 120 of them (30 girls & 30 boys) had normal hearing and showed type A tympanograms. The remainder (60 ear of 38 boys) showed type B tympanograms. These children were examined at the clinic of audiology department, rehabilitation faculty, Tehran university of medical sciences and health services, year 1376 hijri.

The tests included: 1) Otoscopy, 2) Puretone air - condition test, 3) Tympanometry and 4) E.E.R peak amplitude and frequency measurement through test - retest.

Results: 1- The average of E.E.R peak frequency for normal hearing girls, normal hearing boys and hearing impaired boys is 3205 Hz ($SD=564$), 3202 Hz ($SD=634$) and 2953 ($SD=371$) respectively.

2- The average of E.E.R peak amplitude is 16.0 dB SPL ($SD=2.6$), 16.6 dB SPL ($SD=3.0$) and 23.5 dB ($SD=3.0$) for normal hearing girls, normal hearing boys and hearing impaired boys respectively.

3- The correlation of the mean of E.E.R peak amplitude and frequency for two normal groups, girls and boys, is not significant ($p>0.01$).

4- the mean test/retest variability in the E.E.R peak amplitude is 16.0 dB SPL and 3.1 Hz for frequency. These results indicate high validity and consistency of E.E.R characteristics measurements.

5- E.E.R peak amplitude is significantly correlated with the presence of type B tympanogram ($p=0.00$) we find a 6.9 dB SPL increase in average E.E.R peak amplitude in boys with type B tympanograms in comparison to boys with type A results but correlation of average E.E.R peak frequency of two groups is significant too ($p=0.00$).

* The results are valid only within the context of this research.

* The results of this research have been compared with similar studies in abroad.

دو این پژوهش ابتدا مشخصات فرکانس و دامنه تشذیب گوش خارجی در نمونه‌های دارای شوابی هنجار و تپانوگرام نوع A ارزیابی شد. سپس با مشخصات فرکانس و دامنه تشذیب افراد دارای تپانوگرام نوع B که شاهه ابتلاء اویت میانی همراه با ترشح بود مقایسه گردید. ۱۲۰ گوش به طور مساوی مربوط به، عدد ختر و پسر ۷ تا ۹ ساله دارای تپانوگرام نوع A بود و ۶۰ نمونه دیگر به ۳۸ پسر دارای تپانوگرام نوع B در سین ۷ تا ۹ سال تعلق داشت. فرکانس و دامنه تشذیب گوش خارجی در ۱۸۰ گوش طی دوره‌ی آزمون اولیه و آزمون مجدد ارزیابی گردید. با مقایسه میانگین دامنه تشذیب گروه پسران دارای تپانوگرام نوع A با پسران دارای تپانوگرام نوع B، مشخص شد میان این متغیر در گروه اخیر ۹/۹ دسی بل SPL پیشتر است که این اختلاف از نظر آماری معنی دار است ($P < 0.01$). لئه تفاوت میانگین فرکانس دو گروه نیز از نظر آماری معنی دار بود. بررسی تایج آزمون اولیه آزمون مجدد نشان داد که آزمون تکرار پذیر و دارای قابلیت بالاست. به این ترتیب ارزیابی دامنه فرکانس تشذیب گوش خارجی در موارد ویژه روش جایگزینی خوبی برای تپانومتری به معمور ردبایی مایع در گوش میانی می‌باشد.

مقدمه:

با تپانوگرام نوع A مقایسه شود.

مواد و روشها

مشخصات نمونه‌ها

کودکان مورد بررسی در این مطالعه از مراجعین بخش شوابی شناسی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تعداد ۹۸ نفر (۳۰ دختر و ۶۸ پسر) در محدوده سن ۷ تا ۹ سال (میانگین: ۷/۸) بود. ۶۰ گوش مربوط به ۳۸ پسر ۷ تا ۹ ساله دارای تپانوگرام نوع B بود. ۲۲ نفر آنها به صورت دوطرفه تپانوگرام نوع B داشتند و ۱۶ نفر در یک گوش این نوع تپانوگرام را نشان می‌دادند.

هنجاریابی روی ۶۰ دختر و پسر (۱۲۰ گوش) انجام شد. در هر سن تعداد افراد به طور مساوی بود. مثلا در سن ۷ سال ۱۰ دختر (۲۰ گوش) و ۱۰ پسر (۲۰ گوش) ارزیابی شد.

موائل کار

برای کل نمونه‌ها اتوسکبی انجام شد تا از نبودن جرم در مجرای گوش خارجی اطمینان حاصل شود. سپس آزمایش سنجش شوابی با صوت خالص از طریق انتقال هوایی در فرکانس‌های ۲۵۰ تا ۸۰۰ هرتز و پس از آن، تپانومتری انجام شد. با توجه به تایج این دو آزمایش، کودکان در دو گروه شوابی طبیعی با تپانوگرام نوع A و گروه دارای تپانوگرام نوع B قرار می‌گرفتند. در صورتی که مقدار متوسط آستانه‌های صوت خالص در فرکانس‌های ۱/۵ و ۲ کیلوهرتز ۱۵ دسی بل و کمتر بود شوابی هنجار محاسب می‌شد.^(۶)

به وسیله دستگاه پرورب تیوب ساخت شرکت مدنی^۵ مدل ۱۵۰۰ IGO، مشخصه‌های فرکانس تشذیب، اندازه‌گیری شد. بلند گو در فاصله یک متری نقطه آزمایش در زاویه صفر آزمیخت و

اویت میانی شایع ترین علت کم شوابی کودکان می‌باشد و یکی از علل شایع جراحی در سینین کودکی است^(۴). در ایالات متحده، سالانه تقریباً ۱۲۰ میلیون نسخه با تجویز آتنی بیوتیک نوشته می‌شود که پیش از ۲۵٪ آن مربوط به اویت میانی است. یک راه تأیید وجود اویت میانی همراه با ترشح در کودکان، اقدامات طبی و ادیبولوژیک است^(۲). امروزه برای کودکی که دچار این بیماری می‌شود تشخیص بر پایه معاینه بالینی، ارزیابی شوابی با استفاده از صوت خالص (PTA) و تپانومتری است. از آنجا که شیوع این بیماری در سال اول زندگی پیشتر است^(۶)، در این سین آزمایش‌های ادیبولوژی که به صورت آبجکتیو انجام می‌شود از ارزش پیشتری برخوردار می‌باشد. ارزیابی انتشار صوت از گوش^۳ (OAЕ) یک آزمون آبجکتیو برای ردبایی کم شوابی مختصراً ناشی از اویت میانی معرفی شده ولی در حال حاضر دسترسی به تجهیزات آن مشکل است. بعلاوه به طور مستقیم وجود مایع را در گوش نشان نمی‌دهد. تنها آزمون آبجکتیو شایع برای ردبایی مستقیم ترشح گوش میانی تپانومتری است که حساسیت آن ۹۰٪ می‌باشد^(۷). متأسفانه گاهی موقع نمی‌توان شرایط لازم برای انجام این آزمون را فراهم کرد، نظیر هنگامی که در جایگذاری سرپرور اشکال وجود دارد یا کودکی که موقع آزمایش تحرک دارد. از این روند دسترسی به آزمون جایگزین در مجموعه آزمایش‌های ادیبولوژیک برای بررسی وجود ترشح در گوش میانی بسیار حائز اهمیت است.

برخی تحقیقات نشان داده‌است ارزیابی دامنه فرکانس تشذیب گوش خارجی این ویژگی را دارد (مکنزی^۳ و دمپستر^۲، ۱۹۹۰ و مک‌فرسن، ۱۹۹۳). مکنزی و دمپستر^(۱۹۹۰) دریافتند دامنه تشذیب گوش کودکان ۶ ساله دارای تپانوگرام نوع B نسبت به کودکان دارای تپانوگرام نوع A، ۵/۷ دسی بل SPL پیشتر است^(۳). این مطالعه طراحی شد تا مشخصات فرکانس تشذیب گوش خارجی گروه دارای تپانوگرام نوع B نسبت به گروه دارای شوابی طبیعی

بحث

شاو^{۱۱} (۱۹۷۴) با بررسی تعداد زیادی از افراد بزرگسال، فرکانس تشید مجري گوش خارجی را حدود ۲۶۰۰ هرتز بدست آورده (۳) بتسل^{۱۲} (۱۹۸۹) مشخصات تشید ۷۸ کودک ۳ تا ۱۳ ساله را ارزیابی کرد. در این مطالعه میانگین فرکانس تشید ۲۸۴۸ هرتز (در محدوده ۱۷۷۶ تا ۴۰۳۹) و میانگین دامنه ۱۸/۹ دسی بل SPL در محدوده ۱۱ تا ۲۷ تعیین شد (۱). تحقیقات مکنزی و دمپستر^{۱۳} (۱۹۹۰) پیرامون مشخصات فرکانس تشید ۲۵۰ کودک ۳ تا ۱۲ ساله حاکی از آن است که با افزایش سن تا ۷ سالگی، میانگین فرکانس تشید کاهش می‌یابد. در کودکان ۷ ساله و یافتر، تشید مشابه بزرگسالان یعنی ۲۷۵۷ هرتز (در محدوده ۱۶۵۵ تا ۳۴۶۶) می‌باشد (۳).

یافته‌های این پژوهش از نظر دامنه و فرکانس تشید در هنجاریابی‌های یادشده با مطالعات گذشته کمی اختلاف دارد، به طوری که فرکانس تشید نمونه‌های مورد مطالعه نسبت به پژوهش مکنزی^{۱۴} (۱۹۹۰) در محدوده فرکانسی بالاتر بدست آمده است.

پژوهش محققین پیرامون دامنه و فرکانس تشید گوشها طبیعی و گوشها دچار اویت میانی به شرح زیر است:

- مکنزی و دمپستر^{۱۵} (۱۹۹۰) دریافتند دامنه تشید در کودکان ۶ ساله دارای تمپانوگرام نوع B، از ۵/۷ دسی بل یافتر است (۳).
- مکفرسن و همکاران^{۱۶} (۱۹۹۳) کودک با سابقه اویت مزمن را مورد ارزیابی قرار دادند. تایج ادیولوژیک با اطلاعات اتوالوژیک حاصل از جراحی مقایسه شد. آنها بین دامنه تشید با عدم یا وجود مایع در گوش میانی، همبستگی معنی داری پیدا کردند. در ۱۵٪ گوش‌های خشک، دامنه مساوی ۲۴ دسی بل یا یافتر و در ۷۹٪ گوش‌های بدون مایع، دامنه مساوی ۲۲ دسی بل

صفر قائم قرار داشت و کالیبراسیون محیط و پروب تیوب با صوت ۱۲۵ تا ۸۰۰ هرتز با روش جانشینی^{۱۷} انجام می‌شد. پس از آن کودک در نقطه آزمایشی نشسته، وضعیت قرارگیری پروب تیوب طبق استاندارد بوده و از تراگوس یا شیار درون تراگوس^{۱۸} به اندازه ۱۰ میلیمتر بعلاوه فاصله ابتدای مجرأ تا شیار درون تراگوس علامت گذاری می‌شد (۸).

با رعایت شرایط کالیبراسیون، محرک صوتی ارائه و منحنی فرکانس تشید روى صفحه نمایشگر ظاهر می‌شد و سپس فرکانس و دامنه آن تعیین می‌گردد. برای بررسی تغییرپذیری فردی، پروب تیوب را از گوش پیرون آورده مجددًا جایگذاری کرده آزمون مجدد انجام می‌شد. تایج حاصل از ارزیابی‌ها با استفاده از برنامه آماری SPSS نسخه ۴ تجزیه و تحلیل شد.

نتایج

نتایج این پژوهش برای هر یک از گروههای آزمایشی و کل نمونه‌ها در جدول ۱ مشاهده می‌شود.

- با توجه به آزمون‌های آماری انجام شده فرکانس و دامنه تشید دو گروه پسران دارای تمپانوگرام نوع A و نوع B اختلاف معنی داری داشت و بین میانگین دامنه فرکانس تشید دو گروه، ۶/۹ دسی بل اختلاف وجود داشت که این تفاوت معنی دار می‌باشد. بین میانگین فرکانس تشید دو گروه نیز ۲۴۹ هرتز اختلاف وجود داشت.

- فرکانس و دامنه تشید گروه دختران با گروه پسران دارای شناوری هنجار و تمپانوگرام نوع A اختلاف معنی داری نداشت.

- بین فرکانس و دامنه تشید در آزمون اولیه و آزمون مجدد اختلاف معنی داری وجود نداشت که نشانه قابلیت بالای این ارزیابی و کنترل منطقی متغیرهای آزمایش می‌باشد.

جدول ۱- نتایج ارزیابی فرکانس و دامنه تشید گوش خارجی کودکان ۷ تا ۹ ساله تهران

دامنه فرکانس تشید (دسی بل SPL)			فرکانس تشید (هertz)			تعداد	گروه مورد مطالعه
انحراف معیار	محدوده	میانگین	انحراف معیار	محدوده	میانگین		
۴/۵	۳۲/۵ تا ۹/۵	۱۸/۶۷	۵۴۹	۴۷۶۰ تا ۲۰۰۰	۳۱۲۰/۶	۱۸۰	کل نمونه‌ها
۲/۶	۲۰/۵ تا ۹/۵	۱۶/۱۰	۵۶۴/۴	۴۴۹۶ تا ۲۰۰۰	۳۲۰۶/۱	۶۰	گروه دختران دارای تمپانوگرام نوع A
۲/۹	۲۳ تا ۱۱	۱۶/۶	۶۳۴/۳	۴۷۶۰ تا ۲۱۲۳	۳۲۰۲/۴	۶۰	گروه پسران دارای تمپانوگرام نوع A
۳/۰	۳۲/۵ تا ۱۳/۵	۲۳/۵	۳۷۱/۰	۴۲۴۲ تا ۲۲۵۰	۲۹۵۳/۴	۶۰	گروه پسران دارای تمپانوگرام نوع B

نتایج پژوهش حاضر در مورد مقایسه فرکانس تشدید گوشهای هنجار و گوش‌های دارای اوتیت میانی تا حدودی با یافته‌های سایر مطالعات هماهنگی دارد. همه این پژوهش‌ها حاکی از وجود اختلاف بین فرکانس تشدید گوش‌های هنجار و گوش‌های دارای مایع است ولی این اختلاف معنی دار نیست. در حالی که در پژوهش حاضر، این متغیر در دو گروه اختلاف معنی داری داشت و میانگین فرکانس تشدید در گوش‌های دارای مایع ۲۴۹ هرتز کمتر بود. یافته‌های این پژوهش مبنی بر افزایش دامنه تشدید گوش‌های دارای مایع نسبت به گوش‌های هنجار نیز با مطالعاب یاد شده هماهنگی دارد ولی میزان افزایش دامنه در این تحقیق ۶/۹ دسی بل است که به مطالعه مکنزی و دمپستر (۱۹۹۰) نزدیک‌تر است. به این ترتیب ارزیابی مشخصات فرکانس تشدید شاخصی برای ردیابی وجود ترشح در گوش میانی است ولی نیاز به پژوهش بیشتر در این زمینه غیرقابل انکار می‌باشد.

یا کمتر مشاهده شد (۷). در پژوهش حاضر نیز ۹۵٪ گوش‌های بدون مایع دامنه مساوی ۲۲ دسی بل یا کمتر داشتند و دامنه بیشتر از ۲۳ دسی بل وجود نداشت. در حالی که در ۸۱/۸٪ گوش‌های دارای مایع دامنه مساوی ۲۲ دسی بل یا بیشتر مشاهده شد و در ۴۳/۳٪ گوش‌های دارای تمپانوگرام نوع B دامنه ۲۴ دسی بل و بیشتر بود.

استراکان^{۱۲} و همکاران^{۱۳} ۱۸۰ گوش مربوط به ۱۰۰ کودک ۳ تا ۱۵ ساله در معرض کم شناوری ناشی از اوتیت میانی همراه با ترشح رامورد ارزیابی قرار دادند. آنها دریافتند که میانگین دامنه فرکانس تشدید در گروه دارای شناوری طبیعی ۱۷/۹ دسی بل (SPL = ۵/۷) و در گروه دچار آسیب شناوری ۲۱/۸ دسی بل (SPL = ۴/۴) می‌باشد. لذا اختلاف دامنه تشدید دو گروه معنی دار بود. به این ترتیب که دامنه تشدید گروه دارای آسیب شناوری ۳/۹ دسی بل SPL بیشتر بود (۷).

به نویس

1-External Ear Resonance	2-Oto Acoustic Emission	3-Mackenzie
4-Dempster	5-Madsen	6-Azymuth
7-Warble Tone	8-Sweep	9-Substitution method
10-Inter-tragal notch	11-Shaw	12-Bentler
13-Strachan		

منابع

- 1- Bentler R.A., 1991, The resonance frequency of the external auditory canal in children, *Ear & Hearing*, 12 (2), 89-90
- 2- Jung T.T.K., Rhee C.K., 1991, Otolaryngologic approach to the diagnosis and management of otitis media, *Otolaryngologic clinics of north America*, 24, 931-945
- 3- Mackenzie K., Dempster J.H., 1990, The resonance frequency of the external auditory canal in children, *Ear & Hearing*, 11(4) 296-298
- 4- Maw R., 1997, Otitis media with effusion Eds. Adams D. A, Cinnamond M. J., "Scott - Brown's otolaryngology", vol 6, 6th ed., Bath: Butter worth - Heineman, 6/7/1 - 6/7/23
- 5- Mc pherson B., Smyth V., Scott J. 1993, External ear resonance as a screenin technique in children with otitis media with effusion, *Int. J. Pediatric, otorhinolarynology*, 25 (1-3), 81-89
- 6- Northern J.L. and Downs M. P., 1991, "Hearing in Children" 4th ed., Baltimore: williams & Wilkins
- 7- Strachan D., Mcpherson B., Smyth V., scott J., 1996, Hearing screening for children with otitis media with effusion using external ear resonance, *J. of audiology Medicine*, 5 (2), 73-82
- 8- Westwood G.F.S., Bamford J. M., 1995, Probetube microphone measures with very young infants: Real ear to coupler differences and longitudinal changes in real ear unaided respons, *Ear & Hearing*, 16 (3), 263-273