

Research Article

The first survey of distribution of inherited deafness patterns in individuals referred to genetic center of Ahvaz welfare organization, Southern Iran

Ali Mohammad Foroughmand¹, Hamid Galehdari¹, Gholamreza Mohammadian², Abdolrahman Rasekh³, Jasem Ghavabesh²

¹- Department of Genetics, Faculty of Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

²- Welfare Organization of Ahvaz, Genetic Counseling Centre, Iran

³- Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

Received: 10 January 2011, accepted: 1 June 2011

Abstract

Background and Aim: Deafness is a heterogeneous disorder induced by genetic and environmental factors. It is the most common hereditary sensory-neural disorder that affects 1/1000 to 1/2000 of the newborns. More than 70% of hearing loss cases are caused by genetic disorders, 85% of which result from nonsyndromic autosomal recessive sensory-neural hearing loss. Up to now, more than 100 genes contributing in hearing loss have been determined. Alteration of these genes may result in hearing loss. This study was performed to identify the inheritance patterns of deafness and its relation with ethnicity, gender and consanguineous marriages.

Methods: In this survey, data from 356 families affected by hearing loss and referred to welfare organization of Ahvaz during the time were collected based on sex, ethnic groups and relativity.

Results: The results state a high frequency of autosomal recessive deafness caused by consanguineous marriages within Arab and non-Arab ethnic groups ($p<0.05$). But no significant difference in gender.

Conclusion: In conclusion, the high frequency of autosomal recessive deafness among the population with a high frequency of consanguineous marriages is considerable. The dominant pattern of deafness observed in this population was autosomal recessive.

Keywords: Syndromic deafness, non-syndromic deafness, inheritance patterns, consanguineous marriages, Arab, non-Arab population

مقاله پژوهشی

بررسی توزیع الگوهای کم‌شنوایی ارثی در کم‌شنوایان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره ژنتیک سازمان بهزیستی اهواز

علی‌محمد فروغ‌مند^۱، حمید گله‌داری^۱، غلامرضا محمدیان^۲، عبدالرحمن راسخ^۳، جاسم غوابش^۴

^۱- گروه ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

^۲- مرکز مشاوره ژنتیک، بهزیستی اهواز، ایران

^۳- گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در بیش از ۷۰ درصد، کم‌شنوایی‌ها به دلیل ناهنجاری‌های ژنتیکی ایجاد می‌شود. تاکنون بیش از ۱۰۰ مکان ژنی گزارش شده است که تغییر آنها می‌تواند به کم‌شنوایی منجر گردد. هدف از این بررسی، تعیین فراوانی الگوهای توارثی در جمعیت کم‌شنوای مراجعه‌کننده به سازمان بهزیستی اهواز و ارتباط آن با عوامل دیگر از قبیل قومیت، جنسیت و ازدواج‌های خویشاوندی بود.

روش بررسی: در این بررسی پرونده ۳۵۶ خانواده مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره ژنتیک سازمان بهزیستی اهواز مورد مطالعه قرار گرفت. افراد مبتلا به کم‌شنوایی با توجه به قومیت، جنسیت و همچنین رابطه خویشاوندی والدین آنها با هم در دستجات مختلف و براساس الگوی توارثی حاصل از بررسی نحوه انتقال کم‌شنوایی در شجرة خانواده‌های کم‌شنو، تسمیه‌بندی گردید.

یافته‌ها: توارث اتوزومی نهفته؛ فراوانی بیش از ۶۰ درصد، رایج‌ترین الگوی ژنتیکی بود. فراوانی اغلب انواع ازدواج‌های خویشاوندی در جمعیت غیرعرب بیشتر از عرب بود ($p < 0.05$) تفاوت معنی‌داری بین دو جنس دیده نشد ($p > 0.05$).

نتیجه‌گیری: در کنار مشاهده تفاوت‌های بین دو جمعیت در فراوانی ازدواج‌های خویشاوندی تفاوت معنی‌داری بین کم‌شنوایی‌های توارثی و کم‌شنوایی‌های حاصل از عوامل محیطی وجود داشت و الگوی غالب کم‌شنوایی در منطقه الگوی آتوزومی نهفته است.

وازگان کلیدی: کم‌شنوایی سندرمی، کم‌شنوایی غیرسندرمی، الگوی توارثی ازدواج خویشاوندی، عرب، غیرعرب

(دریافت مقاله: ۱۰/۱۰/۸۹، پذیرش: ۱۱/۳/۹۰)

مقدمه

بر اساس برآورده از Prasad و همکاران(۸) و Storm و همکاران(۹) تقریباً نیمی از کم‌شنوایی‌های دوران کودکی منشأ ژنتیکی دارند، و همچنین بر اساس گزارش Willems ۹۰ درصد موارد این نقص به دلیل اختلالات ژنتیکی ایجاد می‌شوند(۱۰). بیش از ۱۰ سال است که نقش اختلالات ژنتیکی در بروز اختلالات شنوایی شناسایی شده است، و تاکنون صدها ژن در این ارتباط گزارش شده است(۱۱-۱۳). پایه ارزیابی ژنتیکی، تشخیص دقیق حالت‌های مشکوک است. ارزیابی ژنتیکی برای

کاهش شنوایی و کم‌شنوایی از شایع‌ترین نقص‌های حسی در انسان است که از هر ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نوزاد یک مورد را تحت تأثیر قرار می‌دهد(۱-۵). یکی از برنامه‌های اصلی سازمان جهانی بهداشت (WHO) تشویق کشورها برای ارائه و اجرای برنامه‌هایی در قالب طرح ملی پیش‌گیری از اختلال شنوایی و نقص شنوایی است. در همین رابطه تلاش برنامه‌های بین‌المللی بر این است که اختلالات جدی شنوایی در سنین پایین‌تر تشخیص داده شود(۶-۷).

جدول ۱- توزیع و درصد فراوانی الگوهای توارثی کم‌شنوایی‌ها در کل، در جمعیت عرب و جمعیت غیرعرب

الگوی توارث	کل				عرب				غیر عرب			
	تعداد	درصد	تعداد	درصد از کل	تعداد	درصد	تعداد	درصد از کل	تعداد	درصد	تعداد	p
آتوژومی نهفتہ	۴۵۰	%۶۹/۲۳	۱۷۲	%۶۹/۳۵	۲۷۸	%۳۸/۲	۲۷۸	%۶۹/۱۵	%۶۱/۷	%۶۹/۱۵	۰/۰۰۰	
آتوژومی بارز	۵۱	%۷/۸۵	۲۳	%۹/۲۷	۲۸	%۴۵	۲۸	%۶/۹۶	%۵۴/۹	%۶/۹۶	۰/۵۷۶	
وابسته به جنس نهفتہ	۵۵	%۸/۴۶	۲۳	%۹/۲۷	۳۲	%۴۱/۸	۳۲	%۷/۹۶	%۵۸	%۷/۹۶	۰/۲۸۱	
تک‌گیر	۶۶	%۱۰/۱۵	۲۳	%۹/۲۷	۴۳	%۳۴/۸	۴۳	%۱۰/۷	%۶۵	%۱۰/۷	۰/۰۱۹	
محیطی	۲۸	%۴/۳	۷	%۲/۸۲	۲۱	%۲۵	۲۱	%۵/۲۲	%۷۵	%۵/۲۲	۰/۰۱۳	
جمع	۶۵۰	%۱۰۰	۲۴۸	%۱۰۰	۴۰۲	-	-	%۱۰۰	-	-	-	

عرب و غیرعرب در همین راستا می‌تواند مفید و قابل توجه باشد. این بررسی می‌تواند به سؤالاتی پیرامون الگوی وراثتی کم‌شنوایی‌های شایع و شناخت قومیتی که ابتلای بیشتری دارد پاسخ دهد. هدف از این بررسی تعیین فراوانی الگوهای وراثتی در جمعیت کم‌شنوای مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره ژنتیک سازمان بهزیستی اهواز در سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۸۲ و ارتباط آن با عوامل دیگر از قبیل قومیت، جنسیت و ازدواج‌های خویشاوندی است.

روش بررسی

در این بررسی پرونده ۳۵۶ خانواده که به دلیل دارا بودن افراد کم‌شنو (در دامنه بین dB ۹۰-۵۶) در خانواده و یا خویشاوندان برای مشاوره ازدواج یا بارداری در سال‌های ۱۳۷۴ به بهزیستی اهواز مراجعه کرده بودند مورد مطالعه قرار گرفت. نیمی از این جمعیت را خانواده‌های عرب تشکیل می‌دادند. اثبات کم‌شنو بودن افراد مبتلا قبل از توسط متخصصان و با استفاده از دستگاه‌های تخصصی انجام گرفته بود (دستگاه ادیومتر مدل Interacoustic AC5 شرکت AZ26 Madsen کشور دانمارک). با توجه به اطلاعات فردی ۶۵۷ تا ۶۵۰ فرد کم‌شنو در زمینه قومیت (عرب و غیرعرب)، جنسیت و همچنین رابطه خویشاوندی والدین

کودکان کم‌شنو که به تازگی تشخیص داده شده‌اند باید مورد توجه باشد، بهویژه اگر هیچ علت خاصی تعیین نشده باشد. به عنوان مثال، خانواده کودکی که به کاهش شنوایی متعاقب منژیت مبتلا شده است به ارزیابی ژنتیکی نیاز ندارد(۱۱).

اختلالات شنوایی ژنتیکی به دو دسته کم‌شنوایی ژنتیکی سندرومی و غیرسندرومی تقسیم می‌شوند. تاکنون بیش از ۴۰۰ سندروم شناسایی شده است که در آنها اختلال شنوایی به دنبال ابتلا به بیماری و همراه سایر علائم به وجود می‌آید(۱۱ و ۱۴). اما در دسته دوم، یعنی کم‌شنوایی‌های ژنتیکی غیرسندرومی، درصد بالایی از موارد کم‌شنوایی بدون ظهور ناهنجاری‌های دیگر بروز می‌کند، و عموماً یک ژن منفرد در بروز این عارضه نقش دارد و در آن الگوهای متفاوت وراثتی کروموزومی و میتوکندریالی مشاهده می‌شود(۱۱).

جمعیت خوزستان ترکیبی از قومیت‌های مختلف از جمله فارس و عرب است. این ترکیب جمعیتی می‌تواند بر توزیع صفات ژنتیکی و بیماری‌های ارثی تأثیرگذار باشد. شناخت ویژگی‌های ژنی جمعیتی و بیماری‌های رایج در میان این جمعیت‌ها می‌تواند در توسعه راههای آموزش و جلوگیری از گسترش اختلالات ژنتیکی اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. نگرش کلی به انواع کم‌شنوایی‌ها در اهواز با توجه به الگوی وراثتی و همچنین جمعیت

جدول ۲- توزیع فراوانی کم‌شنوایی‌ها در جمیعت‌های عرب و غیرعرب بر حسب رابطه خویشاوندی والدین

نوع ازدواج	کل			عرب			غیر عرب		
	درصد از ازدواج‌های خویشاوندی	تعداد (درصد)	درصد از ازدواج‌های خویشاوندی						
دخترعمو-پسرعمو*	۵۲/۲۴	۹۳(۲۱/۵۲)	۴۷/۷۵	۸۵(۳۷/۷۸)	۳۵	۱۷۸(۲۷)			
دخترخالله-پسرخالله**	۷۹/۷۱	۵۵(۱۲/۷۳)	۲۰/۲۹	۱۴(۶/۲۲)	۱۳/۶	۶۹(۱۰/۵)			
دختردایی-پسرعمه**	۷۸/۱۸	۴۳(۹/۹۵)	۲۱/۸۱	۱۲(۵/۳۳)	۱۰/۸	۵۵(۸/۳۷)			
دخترعمه-پسردایی***	۳۲/۳۵	۱۱(۲/۵۵)	۶۷/۶۴	۲۳(۱۰/۲۲)	۶/۷	۳۴(۵/۱۷)			
خویشاوند درجه ۲ و به بعد	۸۰/۲۳	۱۳۸(۳۱/۹۴)	۱۹/۷۶	۳۴(۱۵/۱۱)	۳۳/۸۶	۱۷۲(۲۶/۱۸)			
جمع ازدواج‌های خویشاوندی*	۶۶/۹۳	۳۴۰(۷۸/۷)	۳۳/۰۷	۱۶۸(۷۴/۶۷)	۱۰۰	۵۰۸(۷۷/۳۲)			
جمع ازدواج‌های غیرخویشاوندی***	۶۱/۷۴	۹۲(۲۱/۳)	۳۸/۲۵	۵۷(۲۵/۳۳)	-	۱۴۹(۲۲/۶۸)			
جمع کل	-	۴۳۲(۱۰۰)	-	۲۲۵(۱۰۰)	-	۶۵۷(۱۰۰)			

$$p=.0/005^{****}, p=.0/058^{***}, p=.0/000^{***}, p=.0/06^{*}$$

غیرعرب در مقایسه با افراد عرب است. ازدواج‌های خویشاوندی با فراوانی بیش از ۷۷ درصد در جمیعت هدف مشاهده گردید (جدول ۲). همچنین در این جدول فراوانی خویشاوندی برای هر نوع ازدواج (دخترعمو-پسرعمو و بقیه انواع ازدواج‌ها) و برای مجموع ازدواج‌ها محاسبه و مقایسه شد که به جز برای دخترعمو و پسرعمو برای بقیه موارد ازدواج‌های خویشاوندی تفاوت‌های معنی‌داری مشاهده شد (جدول ۲). در عین حال ازدواج‌های خویشاوندی درجه ۱ با بیش از ۵۰ درصد و ازدواج‌های خویشاوندی درجه ۲ و به بعد در غیرعرب بیشتر و در مجموع فراوانی ازدواج‌های خویشاوندی در غیرعرب ۶۱ درصد بود. از طرف دیگر، توزیع جنس کم‌شنوایی در هر دو جنس دختر و پسر تقریباً نزدیک به هم بود، اگر چه تفاوت‌های قابل توجهی بین دو جمیعت از نظر فراوانی جنسی قابل مشاهده است (جدول ۳). جدول ۴ نشان می‌دهد که تفاوت قابل توجهی بین فراوانی کم‌شنوایی‌های ارشی و کم‌شنوایی‌های حاصل از عوامل محیطی وجود دارد.

آنها با هم در دستجات مختلف تقسیم‌بندی شدند. در این بررسی با توجه به الگوی توارث که از طریق رسم شجره خانواده‌ها صورت گرفت، سعی شد تا افراد مبتلا بر اساس رابطه خویشاوندی، نوع الگوی وراثتی، موارد محیطی و تک‌گیر و جنسیت افراد طبقه‌بندی شوند. برای بررسی‌های آماری از آزمون کای دو استفاده گردید.

یافته‌ها

در این بررسی بیش از ۶۰ درصد کم‌شنوایان استان خوزستان دارای الگوی وراثتی اتوزومی نهفته بودند (جدول ۱). این مقدار بیش از مجموع تعداد دیگر الگوهای توارثی آتوزومی بارز ووابسته به جنس نهفته بود ($p<0.001$). از طرف دیگر، موارد کم‌شنوایی ناشی از عوامل محیطی و تک‌گیر در مقایسه با الگوی آتوزومی نهفته فقط حدود ۱۴ درصد را در بر می‌گرفت (جدول ۱)، اگرچه این دو الگو تفاوت‌های معنی‌داری بین دو جمیعت مورد بررسی نشان می‌دهند. نکته دیگر در این رابطه، فراوانی مبتلایان

جدول ۳- فراوانی کم‌شنوایی بر حسب جنسیت و الگوی توارثی

جنس	کل					
	عرب		غیرعرب		p	جنس
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
دختر	۳۰۴	%۴۶/۳	۱۱۰	%۳۸/۲	۱۹۴	%۶۳/۸
پسر	۳۵۳	%۵۳/۷	۱۳۸	%۳۹	۲۱۵	%۶۰/۱
دختر با الگوی آتوژومی نهفته	۲۵۲	۵۵/۶۲	۹۵	%۳۷/۷	۱۵۷	%۶۲/۳
پسر با الگوی آتوژومی نهفته	۲۰۱	۴۴/۳۷	۸۰	%۳۹/۸	۱۲۱	%۶۰/۲

ازدواج‌های خویشاوندی در منطقه تأثیر پذیرد. در همین راستا مطالعات در بعضی از کشورها توسط محققانی مانند Tabchi و همکاران (۲۰۰۰) در عربستان و Fageeh (۲۰۰۳) در لبنان مؤید همین مطلب است(۱۷و۱۸). رجوع به جدول ۲ و مشاهده ازدواج‌های خویشاوندی با فراوانی بیش از ۷۷ درصد بدون شک می‌تواند دلیل قوی برای این استدلال باشد. نکته جالب دیگر در این رابطه، فراوانی ازدواج‌های خویشاوندی درجه ۱ با بیش از ۵۰ درصد است. در این ازدواج‌ها بیشترین فراوانی اختصاص به ازدواج‌های دخترعمو-پسرعمو دارد که بیش از ۵۰ درصد این ازدواج‌ها در ازدواج‌های درجه ۱ و ۳۵ درصد ازدواج‌های خویشاوندی به این گروه تعلق دارد.

با مقایسه نوع ازدواج‌های خویشاوندی در والدین افراد کم‌شنوایی در جمعیت‌های عرب و غیرعرب مشاهده می‌شود که

جدول ۴- مقایسه الگوهای توارثی و غیرتوارثی کم‌شنوایی بین قومیت‌های عرب و غیرعرب

الگوی کم‌شنوایی	کل	عرب	غیر العرب	p
توارثی	۲۱۸	۳۳۸	۵۵۶	.۰۰۰۰۰
غیرتوارثی	۳۰	۶۴	۹۴	.۰۰۰۰۰
کل	۲۴۸	۴۰۲	۶۵۰	.۰۰۰۰۰

بحث

کم‌شنوایی‌های ژنتیکی به صورت آتوژومی بارز و نهفته و وابسته به X نهفته و بارز و همچنین با الگوی میتوکندریایی مشاهده می‌شوند، که با توجه به گزارش‌های قبلی شایع‌ترین فرم، کاهش شنوایی غیرسندرومی حسی-عصبي با الگوی آتوژومی مغلوب است(۱۵و۱۶). اگرچه الگوهای وراثتی و موارد تک‌گیر و محیطی افراد غیرعرب توزیعی همانند الگوی افراد عرب را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، الگوی وراثت با قومیت بستگی ندارد، ولی فراوانی افراد مبتلا در افراد غیرعرب قابل توجه است.

در مجموع، با توجه به فراوانی الگوی آتوژومی نهفته در بین هر دو جمعیت و همچنین الگوی توارث وابسته به جنس نهفته ضرورت مشاوره ژنتیک در این جمعیت‌ها برای جلوگیری از گسترش عارضه کم‌شنوایی امری ضروری و غیرقابل اغماض است. فراوانی کم افراد کم‌شنوایی در دسته‌های تک‌گیر و محیطی در این بررسی احتمالاً به دلیل عدم ارجاع این افراد به بهزیستی و بخش ژنتیک است. برای ریشه‌یابی این تفاوت انجام مطالعات جدی لازم است. ولی به صورت ابتدایی تفاوت‌های کمی جمعیتی، ارجاع دادن افراد به مراکز مشاوره ژنتیک، توجه به اهمیت مشاوره ژنتیک در قومیت‌های متفاوت می‌تواند از جمله عوامل مؤثر باشد.

همان‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود فراوانی کم‌شنوایی‌های با الگوی وراثت آتوژومی نهفته بیشترین کمیت را به خود اختصاص می‌دهد. این توزیع الگوی وراثتی می‌تواند از نوع

نهاخته می‌توانند در ترسیم یک خطمشی کلی برای مطالعات مولکولی مرتبط با ژن‌های درگیر در کم‌شنوایی‌ها تعیین کننده باشند. از طرف دیگر، اهمیت توجه مشاوران ژنتیک به الگوی غالب کم‌شنوایی در منطقه بین دو جمعیت عرب و غیرعرب را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند برای خانواده‌های دارای سابقه خویشاوندی زنگ خطری باشد تا بیشتر به مشاوره‌های قبل از ازدواج اهمیت دهد (۱۹ و ۲۱). یادآوری خطرات احتمالی همراه ازدواج‌های خویشاوندی و زمینه‌سازی برای کاهش این ازدواج‌ها، و کنترل تعداد اولاد خانواده‌های در خطر از طریق ارتقای فرهنگ عمومی در دستیابی به این اهداف می‌تواند نقش قابل توجهی داشته باشد.

نتیجه‌گیری

در مجموع می‌توان گفت که در کنار مشاهده تفاوت‌های بین دو جمعیت در فراوانی ازدواج‌های خویشاوندی تفاوت معنی‌داری بین کم‌شنوایی‌های ارثی و کم‌شنوایی‌های حاصل از عوامل محیطی وجود دارد، و الگوی غالب کم‌شنوایی در منطقه الگوی آتوزومی نهاخته است. البته با ارتقای فرهنگ در زمینه ازدواج‌های خویشاوندی و توسعه مشاوره ژنتیک در سطح کشور، به خصوص برای خانواده‌های در معرض خطر، می‌توان به کنترل و کاهش اختلالات ارثی از جمله کم‌شنوایی امیدوار بود.

REFERENCES

- Modamio-Høybjør S, Moreno-Pelayo MA, Mencía A, del Castillo I, Chardenoux S, Armenta D, et al. A novel locus for autosomal dominant nonsyndromic hearing loss (DFNA44) maps to chromosome 3q28-29. *Hum Genet*. 2003;112(1):24-8.
- Nance WE. The genetics of deafness. *Ment Retard Dev Disabil Res Rev*. 2003;9(2):109-19.
- Falk MM. Biosynthesis and structural composition of gap junction intercellular membrane channels. *Eur J Cell Biol*. 2000;79(8):564-74.
- Marazita ML, Ploughman LM, Rawlings B, Remington E, Arnos KS, Nance WE. Genetic epidemiological studies of early-onset deafness in the U.S. school-age population. *Am J Med Genet*. 1993;46(5):486-91.
- Cohen MM, Gorlin RJ. Epidemiology, etiology, and genetic patterns. In: Gorlin RJ, Toriello HV, Cohen MM, editors. *Heredity Hearing Loss and its Syndromes*. NY: Oxford University Press; 1995. p. 9-21.
- Kudo T, Ikeda K, Oshima T, Kure S,

- Tammasaeng M, Prasansuk S, et al. GJB2 (connexin 26) mutations and childhood deafness in Thailand. *Otol Neurotol.* 2001;22(6):858-61.
7. Nekahm D, Weichbold V, Welzl-Mueller K, Hirst-Stadlmann A. Improvement in early detection of congenital hearing impairment due to universal newborn hearing screening. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2001;59(1):23-8.
8. Prasad S, Cucci RA, Green GE, Smith RJ. Genetic testing for hereditary hearing loss: connexin 26 (GJB2) allele variants and two novel deafness-causing mutations (R32C and 645-648delTAGA). *Hum Mutat.* 2000;16(6):502-8.
9. Storm K, Willocx S, Flothmann K, Van Camp G. Determination of the carrier frequency of the common GJB2 (connexin-26) 35delG mutation in the Belgian population using an easy and reliable screening method. *Hum Mutat.* 1999;14(3):263-6.
10. Willems PJ. Genetic causes of hearing loss. *N Engl J Med.* 2000;342(15):1101-9.
11. Robson CD. Congenital hearing impairment. *Pediatr Radiol.* 2006;36(4):309-24.
12. Murgia A, Orzan E, Polli R, Martella M, Vinanzi C, Leonardi E, et al. Cx26 deafness: mutation analysis and clinical variability. *J Med Genet.* 1999;36(11):829-32.
13. Harris KC, Erbe CB, Firszt JB, Flanary VA, Wackym PA. A novel connexin 26 compound heterozygous mutation results in deafness. *Laryngoscope.* 2002;112(7 Pt 1):1159-62.
14. Sasanfar R, Tolouei A, Hoseinpour A, Farhud DD, Dolati M, Hoghooghi Rad L, et al. Frequency of a very rare 35delG mutation in two ethnic groups of Iranian populations. *Iranian J Publ Health.* 2004;33(4):26-30.
15. Reardon W. Genetic of deafness. *J Med Genet.* 1992;29(8):521-6.
16. Lefebvre PP, Van De Water TR. Connexins, hearing and deafness: clinical aspects of mutations in the connexin 26 gene. *Brain Res Brain Res Rev.* 2000;32(1):159-62.
17. Tabchi B, Rassi B, Akl E, Fares G. Epidemiology of profound neurosensory deafness in Lebanese children. *J Med Liban.* 2000;48(5):294-7. French.
18. Fageeh NA. Prospective study of hearing loss in schools for deaf children in Assir region, Saudi Arabia. *West Afr J Med.* 2003;22(4):321-3.
19. Erbe CB, Harris KC, Runge-Samuelson CL, Flanary VA, Wackym PA. Connexin 26 and connexin 30 mutations in children with non-syndromic hearing loss. *Laryngoscope.* 2004;114(4):607-11.