

## کیفیت تغذیه میان وعده‌ای نوجوانان ۱۲-۱۸ سال

فسرین سلامانی باروچ<sup>\*</sup> شهرزاد پاشایی‌پور<sup>\*\*</sup> افسر رضایی‌پور<sup>\*</sup> اندوشیروان کاظمنژاد<sup>\*\*\*</sup>

### چکیده

زمینه و هدف: نوجوانی دوران منحصر به فردی در زندگی است. آگاهی در مورد تغذیه مطلوب در طی این دوران می‌تواند از بسیاری از بیماری‌های مرتبط با تغذیه در دوران بزرگسالی پیشگیری کند. متأسفانه در رده‌های اخیر شاهد تغذیه میان وعده نامطلوب نوجوانان بوده‌ایم، این مطالعه با هدف تعیین کیفیت تغذیه میان وعده‌ای نوجوانان ۱۲-۱۸ ساله منطقه ۱۷ شهر تهران انجام گرفته است.

روش بررسی: این بررسی یک مطالعه پیمایشی از نوع مقطعی است نمونه‌ها شامل ۹۰۷ دختر و پسر ایرانی ۱۲-۱۸ ساله مشغول به تحصیل در یکی از مدارس راهنمایی و یا دبیرستان منطقه ۱۷ شهر تهران بودند که با روش خوش‌ایی انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از جمله مجذور کای استفاده شده است.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین درصد (۳۵/۱٪) واحدهای مورد بررسی ۱۶-۱۴ ساله، ۵۲/۱٪ پسر، ۲۶/۱٪ اول دبیرستان، ۵/۷۱٪ دارای ۱-۳ خواهر یا برادر هستند. همچنین بیشترین آنها دارای شاخص توده بدنی (Body Mass Index=BMI) طبیعی می‌باشند. ۲۱٪ دسته خوراکی شامل چیپس و پفک را بالای حد متوسط به عنوان میان وعده مصرف می‌کنند. ۴/۶٪ یک بار در روز تغذیه میان وعده دارند. عصرها خوراکی میان وعده خورده‌اند. ۵۶/۹٪ واحدهای مورد مطالعه گاهی اوقات خوراکی میان وعده می‌خورند. بین برخی از متغیرهای فردی مثل سن، جنسیت، مقطع تحصیلی، سن پدر و مادر، تحصیلات

پدر و مادر و شغل مادر با نوع خوراکی میان وعده ارتباط آماری معنادار ( $p < 0.05$ ) مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد نوع، زمان، تعداد رفعتات تغذیه میان وعده‌ای نوجوانان در سطح خوبی نبوده و نیاز به آموزش در این زمینه به نوجوانان و والدین آن‌ها ضروری است.

واژه‌های کلیدی: نوجوانی، وضعیت تغذیه، ایران

نویسنده مسئول:  
فسرین سلامانی باروچ،  
دانشکده پرستاری و  
مامایی دانشگاه علوم  
پزشکی تهران  
e-mail:  
[salmaani@sina.tums.ac.ir](mailto:salmaani@sina.tums.ac.ir)

- دریافت مقاله: مرداد ماه ۱۳۸۵ - پذیرش مقاله: بهمن ماه ۱۳۸۵ -

### مقدمه

جمعیت کشور ایران یعنی حدود ۱۶ میلیون نفر را نوجوانان تشکیل می‌دهند و در نظر گرفتن سلامت این قشر عظیم اجتماع بسیار مهم می‌باشد (۱). نوجوانی مرحله بین کودکی و بزرگسالی است و با تغییرات بسیاری همراه است. تغییرات جسمانی، روان‌شناختی و اجتماعی نوجوانان باعث می‌شود که نیازهای آنان نیز بسیار متنوع باشد. با به وجود آمدن تغییرات فیزیولوژیک از جمله رشد سریع در

آینده هر کشوری بستگی به چگونگی مراقبت از کودکان و نوجوانان آن کشور دارد. با تمرکز بر رفع نیازهای سلامتی آنان، احتمال این که در آینده بزرگسالان جامعه الگوی زندگی سالم و ارزشمندی داشته باشند افزایش می‌یابد (۱). در حال حاضر ۲۷٪

\* مدیر کارهه آموزشی پهداشت جامعه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

\*\* کارشناس ارشد پرستاری بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

\*\*\* استاد گروه آموزشی آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس

بررسی‌های مختلف نشان داده که در اثر عوامل مختلفی مانند در دسترس بودن غذاهای راحت و سریع، تبلیغات گمراه کننده، سبک زندگی و آگاهی کم، انتخاب غذاها از نظر تعادل، تنوع و اعتدال در بین نوجوانان در معرض خطر است. گزارش تحقیقات گروه بهداشتی ایالات متحده حاکی از آن است که ۹۰٪ نوجوانان بین غذا، میان و عده می‌خورند اما میان و عده‌های ۶۱٪ آنان شامل چربی و کربوهیدرات فراوان، کم فیبر و کم مغذی است و تقریباً ۳۹٪ آن‌ها از غذاهایی چون لبپیات، میوه و سبزیجات به عنوان میان و عده استفاده می‌نمایند (۶). نزدیک به ۲۵٪ انرژی روزانه نوجوانان از تغذیه میان و عده‌ها به دست می‌آید. بنابراین انتخاب خوراکی میان و عده‌ای سالم و همچنین زمان آن بسیار مهم است. نوجوانان باید مواد دارای فیبر فراوان، موادغذایی کم چرب مانند شیر کم چرب و یا بدون چربی، پنیر، ماست، خوراکی‌های شیرین بدون چربی، میوه و سبزیجات تازه، گوشت کم چرب، سس مایونز بدون چربی و خوراکی‌های دارای گندم را انتخاب کنند. همچنین توصیه می‌شود که میان و عده‌ها هر ۳ یا ۴ ساعت و بین و عده‌های اصلی غذا خورده شوند (۷).

متأسفانه در نوجوانان میان و عده‌های شور مانند چوب شورها، چیپس‌ها و یا محصولات شیرین مانند شکلات و آدامس استفاده می‌شود که بیانگر عدم آگاهی نوجوان از خوراکی‌های میان و عده‌ای سالم و بهداشتی است (۸). میان و عده‌های نامناسب از قبیل چیپس، پفک، نوشابه‌های گازدار، آب نبات و امثال آن‌ها به علت این که پرانرژی هستند

این دوران نیازهای تغذیه‌ای نیز به شدت افزایش می‌یابد، بدیهی است که نیازهای تغذیه‌ای در سراسر زندگی وجود دارد اما در طی نوجوانی از هر زمان دیگری به جز زمان بارداری بیشتر می‌شود و سطح آن در زمان بزرگسالی کاهش می‌یابد (۳). نوجوانی دوران منحصر به فردی در زندگی است که آگاهی در مورد تغذیه مطلوب در طی این دوران می‌تواند از بسیاری از بیماری‌های مرتبط با تغذیه در دوران بزرگسالی پیشگیری کرده و یا شروع آن‌ها را به تأخیر اندازد، برای بسیاری از نوجوانان کمیت و کیفیت نامطلوب تغذیه‌ای، مشکلات گوناگون سلامتی را به دنبال خواهد داشت. تغذیه ناکافی در این دوران می‌تواند بلوغ جنسی را کند و یا به تأخیر اندازد و باعث کُندی و یا توقف رشد قدی و کاهش توده استخوانی شود، بنابراین دریافت انرژی کافی در این دوران بسیار ضروری است (۴). انجمن تغذیه ایالات متحده آمریکا توصیه می‌کند که نوجوانان باید از مواد مغذی مورد نیاز جهت رشد خود آگاهی داشته باشند. سبک زندگی اغلب آنان شامل عادات غذایی نامنظم، تغذیه به همراه انجام فعالیت‌های دیگر و تغذیه میان و عده است. تغذیه میان و عده می‌تواند هم به عنوان یک کمک کننده و هم مانعی جهت دریافت مواد مغذی باشد. بنابراین نوجوانان باید به انتخاب میان و عده‌های مغذی نظری، میوه‌ها و سبزیجات تازه، لبپیات، بیسکویت‌های سرشار از گندم و دانه‌های مغذدار (مانند آجیل) تشویق شوند. در این گروه سنی غذاهای دارای چربی فراوان توصیه نمی‌شود (۵).

## روش بروسی

این بررسی یک مطالعه پیمایشی از نوع مقطعی بوده و در منطقه ۱۷ شهر تهران در سال ۱۳۸۴-۸۵ انجام شده است. جمعیت هدف کلیه نوجوانان (دختر و پسر) منطقه ۱۷ شهر تهران بودند. معیارهای لازم جهت ورود به مطالعه شامل: قرار داشتن در گروه سنی ۱۲-۱۸ سال، اشتغال به تحصیل در یکی از مدارس راهنمایی یا دبیرستان‌های منطقه مورد نظر و همچنین نداشتن بیماری بود که مستلزم استفاده از رژیم غذایی خاصی باشد. نمونه‌گیری به روش خوش‌های تصادفی انجام گرفت و حجم نمونه بر اساس مطالعات انجام شده و در نظر گرفتن ضریب اثر خوش و با فرض یکسان بودن وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانش‌آموزان منطقه، تعداد ۹۰۷ نفر محاسبه گردید. که پس از مطالعه برای بررسی اثر خوشة (نوع مدرسه) از آزمون‌های مربوطه از جمله Mantel-Haenszel استفاده شد و مشخص گردید که اثر خوش‌های معنadar نیست.

ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای مشتمل بر دو بخش بود که، قسمت اول مربوط به اطلاعات فردی دانش‌آموز و قسمت دوم آن سؤالاتی در مورد کیفیت تغذیه میان وعده شامل نوع، زمان و تعداد دفعات تغذیه میان وعده بود. لازم به ذکر است که در این قسمت، مواد غذایی به هفت دسته تقسیم بندی شدند و مقدار مصرف هر دسته غذایی در هفته مشخص شد، سپس حد متوسط مقدار مصرف در نظر گرفته شد و کمتر و بیشتر از آن نیز تعیین گردید. به

چنانچه به مقدار زیاد مصرف شوند موجب افزایش وزن، چاقی و کاهش اشتها و حذف وعده‌های اصلی غذایی و در نتیجه منجر به کمبودهای تغذیه‌ای می‌گردد (۹).

از طرفی اکثر نوجوانان نسبت به ظاهر خود بسیار حساس هستند. میل به جذابیت، تناسب اندام و فشار همسالان می‌تواند منجر به تغذیه ناسالم شود و خطرات جدی در سلامتی آنان ایجاد نماید (۵) در طی این دوران بسیاری از نوجوانان به طور نامنظم غذا می‌خورند و ترس از چاقی و داشتن اندام نامتناسب سبب تغییراتی در الگوی دریافت غذا و در نتیجه دریافت ناکافی مواد مغذی در آنان می‌گردد. علاوه بر آن تمایل نوجوانان به کناره گیری از خانواده‌ها و صرف وقت بیشتر در خارج از منزل و با گروه هم سن و سال و احساس مستقل بودن آن‌ها منجر به تغییراتی در عادات غذایی آنان می‌گردد که این خود می‌تواند بر وضعیت تغذیه‌ای نوجوانان اثر سوء به جای گذارد (۱۰).

لذا با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت کیفیت تغذیه و میان وعده‌های غذایی در نوجوانان، انجام پژوهشی با هدف تعیین کیفیت تغذیه میان وعده‌ای نوجوانان ۱۲-۱۸ ساله منطقه ۱۷ شهر تهران ضروری به نظر می‌رسد. این منطقه به عنوان پایگاه جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد و بر اساس خطمشی‌های کلی دانشگاه، منطقه‌ای است که جهت انجام تحقیقاتی که بر اساس نیاز مردم می‌باشد شکل گرفته و به عنوان یک منطقه تحقیقاتی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارد.

## یافته‌ها

۹۰۷ دانشآموز در مطالعه شرکت داشتند. یافته‌ها نشان داد که بیشترین درصد واحدهای مورد مطالعه ( $\%35/1$ ) ۱۴-۱۶ ساله،  $\%52/8$  پسر،  $\%26/1$  دانشآموز اول دبیرستان و  $\%71/5$  دارای ۱-۳ خواهر یا برادر بودند (جدول شماره ۱). در مورد مشخصات خانوادگی،  $\%50/8$  سن پدرانشان بین ۴۰-۵۰ سال، میزان تحصیلات پدرانشان بین ۳۰-۴۰ سال، میزان تحصیلات پدران  $\%31$  آن‌ها مقطع راهنمایی و میزان تحصیلات مادران  $\%32$  آن‌ها نیز مقطع راهنمایی بود. شغل پدر  $\%40/5$  آن‌ها آزاد و شغل مادر  $\%92/1$  آن‌ها خانه‌دار بود (جدول شماره ۲). همچنین بیشترین واحدهای مورد مطالعه دارای BMI طبیعی بودند.  $\%60/6$  سه وعده در روز غذا می‌خوردند و حدود نیمی از واحدهای مورد بررسی ( $\%51/2$ ) همیشه صباحانه می‌خورند.  $\%56/9$  واحدهای مورد مطالعه گاهی اوقات تغذیه میان وعده‌ای داشته‌اند و  $\%5/5$  آن‌ها هرگز تغذیه میان وعده‌ای نداشته‌اند.  $\%46$  یک بار در روز تغذیه میان وعده داشته‌اند  $\%62$  عصرها خوارکی میان وعده خورده‌اند.  $\%28$  دسته خوارکی شامل چیپس و پیک را بالای حد متوسط به عنوان میان وعده مصرف کرده‌اند و از دسته‌های دیگر مواد غذایی زیر حد متوسط استفاده کرده‌اند (جدول شماره ۳). در مورد ارتباط بین مشخصات فردی و دسته‌های مختلف موادغذایی به عنوان میان وعده، نتایج یافته‌ها نشان داد که از میان مشخصات فردی در نظر گرفته شده سن نوجوان ( $p=0/0001$ ), جنسیت ( $p=0/004$ ), مقطع تحصیلی ( $p=0/0001$ ) و سن پدر ( $p=0/016$ ) با مصرف

عنوان نمونه در دسته لبنيات با توجه به این که تعداد مواد غذایی این دسته پنج مورد (شیر، ماست، پنیر، خامه و بستنی) بود و مقدار مصرف توسط دانشآموزان از صفر تا هفت بار در هفته بوده است پس حداقل نمره ۳۵ و حداقل نمره صفر تعیین شد و  $\%50$  مصرف آن حد متوسط در نظر گرفته شد یعنی کلیه کسانی که دارای نمره  $17/5$  شدند در گروه متوسط قرار گرفته و کلیه کسانی که دارای نمره بیش از  $17/5$  بودند دسته غذایی مذکور را بالاتر از حد متوسط و بقیه زیر حد متوسط مصرف کرده بودند. جهت تمامی دسته‌های مواد غذایی همچون لبنيات (شیر، ماست، پنیر، خامه و بستنی)، نان و غلات (نان، شیرینی، غلات، سبزیات زمینی، بیسکویت یا کیک)، میوه و سبزیجات (میوه، آب میوه، سالاد)، نوشیدنی‌ها (نوشابه، چای و قهوه)، خشکبار (آجیل، انجیر خشک، برگه‌ها)، دسته چیپس و پیک و شکلات و دسته ساندویچ و پیتزا نیز این گونه محاسبه شد.

جهت کسب اعتبار علمی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا، و جهت تعیین اعتماد علمی ابزار از روش آزمون مجدد استفاده شد، ضریب پایایی محاسبه گردید  $\alpha=.83$  به دست آمد که حد قابل قبولی بود. در تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت بیان خصوصیات فردی نظیر جداول فراوانی و درصد فراوانی از آمار توصیفی و جهت بررسی ارتباطات از آمار استنباطی نظیر آزمون مجدول کای استفاده شد. همچنین محاسبات با کمک نرم افزار SPSS انجام شد.

داشت. بین مصرف نوشیدنی‌ها به عنوان میان وعده با سن نوجوان ( $p=0.0001$ ) و مقطع تحصیلی ( $p=0.0001$ ) اختلاف معنادار وجود داشت. همچنین بین سن نوجوان ( $p=0.001$ ), سن مادر ( $p=0.049$ ) و تحصیلات پدر ( $p=0.024$ ) با مصرف چیپس و پفک به عنوان میان وعده اختلاف معناداری وجود ندارد. با این ترتیب بین سن نوجوان ( $p=0.039$ ), جنسیت ( $p=0.011$ ) و سن مادر ( $p=0.003$ ) با مصرف دسته نان و غلات به عنوان میان وعده اختلاف معناداری وجود داشت و با مشخصات فردی دیگر اختلاف معنادار وجود نداشت. در میان متغیرهای فردی فقط بین شغل مادر ( $p=0.021$ ) با مصرف دسته میوه و سبزیجات به عنوان میان وعده اختلاف معنادار وجود دست نیامد.

دسته لبنيات به عنوان تغذیه میان وعده اختلاف معنادار دارد و با مشخصات فردی دیگر از جمله سن مادر، تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، تعداد خواهر و برادر و BMI اختلاف معناداری وجود ندارد. به همین ترتیب بین سن نوجوان ( $p=0.039$ )، جنسیت ( $p=0.011$ ) و سن مادر ( $p=0.003$ ) با مصرف دسته نان و غلات به عنوان میان وعده اختلاف معناداری وجود داشت و با مشخصات فردی دیگر اختلاف معنادار وجود نداشت. در میان متغیرهای فردی فقط بین شغل مادر ( $p=0.021$ ) با مصرف دسته میوه و سبزیجات به عنوان میان وعده اختلاف معنادار وجود

**جدول ۱:** توزیع فراوانی دانشآموزان منطقه ۱۷ شهر تهران بر حسب مشخصات فردی در سال ۱۳۸۵

مشخصات دانشآموزان	وضعيت	تعداد	مشخصات دانشآموزان	مشخصات دانشآموزان	وضعيت	تعداد	درصد
گروههای سنی	تک فرزند	۲۶	تعداد خواهر و برادر	۲/۲	۱۰-۱۲	۲۰	۷۱/۵
	۱-۳	۶۵۱		۲۴/۶	۱۲-۱۴	۲۱۴	۲۵
	بیش از ۳	۲۲۶		۳۵/۱	۱۴-۱۶	۲۱۸	۰/۰
	بدون جواب	۴		۲۸/۱	۱۶ سال به بالا	۲۵۵	
جنسیت	جمع	۹۰۷	خوردن میان و عده	۱۰۰	جمع	۹۰۷	۱۰۰
	همیشه	۳۴۱		۴۷/۲	دختر	۴۲۸	۳۷/۶
	گاهی اوقات	۵۱۶		۵۲/۸	پسر	۴۷۹	۵۶/۹
	هرگز	۵۰		۱۰۰	جمع	۹۰۷	۰/۰
قطع تحصیلی	یک بار در روز	۳۹۲	تعداد دفعات خوردن میان و عده	۴/۶	راهنمایی	۴۲۱	۴۶
	دو بار در روز	۳۰۲		۵۳/۶	دبیرستان	۴۸۶	۳۵
	بیش از دو بار	۱۶۳		۱۰۰	جمع	۹۰۷	۱۹
	جمع	۸۵۷		۹۰۷			۱۰۰

جدول ۲: توزیع فراوانی دانشآموzan منطقه ۱۷ شهر تهران بر حسب مشخصات خانوادگی در سال ۱۳۸۵

درصد	تعداد	وضعیت	مشخصات دانشآموzan	درصد	تعداد	وضعیت	مشخصات دانشآموzan
۲۱/۶	۲۸۷	ابتداي و كمتر راهنمائي	تحصيلات مادر	۲۰/۶	۲۲۳	كمتر از ۴۰ سال ۴۰-۵۰	سن پدر
۲۲	۲۹۲	دبيرستان		۵۰/۸	۴۶۱	۵۰-۶۰	
۲۶/۷	۲۴۲	دانشگاهي		۱۶	۱۴۴	۶۰ سال به بالا	
۸/۵	۷۷	بدون جواب		۶	۵۶	بدون جواب	
۱/۲	۹	جمع		۱/۶	۱۳		
۱۰۰	۹۰۷			۱۰۰	۹۰۷	جمع	
۶/۲	۵۶	بيكار	شغل پدر	۵/۴	۴۹	۲۰-۳۰	سن مادر
۱۸	۱۶۲	كارگر		۵۴	۴۹۲	۳۰-۴۰	
۳۲/۵	۳۰۵	كارمند		۳۲/۶	۲۹۶	۴۰-۵۰	
۴۰/۵	۳۶۸	آزاد		۷	۶۴	۵۰ سال به بالا	
۱/۸	۱۶	بدون جواب		۱	۶	بدون جواب	
۱۰۰	۹۰۷	جمع		۱۰۰	۹۰۷	جمع	
۹۲/۱	۸۳۵	خانه دار	شغل مادر	۲۴/۵	۲۲۲	ابتداي و كمتر راهنمائي	تحصيلات پدر
۷/۹	۷۲	شاغل		۳۱	۲۸۲	دبيرستان	
				۲۸	۲۵۲	دانشگاهي	
				۱۴/۷	۱۳۴	بدون جواب	
				۱/۸	۱۷		
۱۰۰	۹۰۷	جمع		۱۰۰	۹۰۷	جمع	

جدول ۳: توزیع فراوانی مطلق و نسبی دانشآموzan منطقه ۱۷ شهر تهران بر حسب مقدار و نوع تغذیه میان وعده در سال

۱۳۸۵

درصد	تعداد	مجموع		نیز حد متوسط بالای حد متوسط		مقدار مصرف فراوانی	دسته مواد غذایی
		درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۱۰۰	۸۵۷	۱۱/۴	۹۷	۸۸/۶	۷۶۰	لبنيات	
۱۰۰	۸۵۷	۱۸	۱۵۵	۸۲	۷۰۲	نان و غلات	
۱۰۰	۸۵۷	۲۷/۵	۲۳۶	۷۲/۵	۶۲۱	میوه و سبزیجات	
۱۰۰	۸۵۷	.	.	۱۰۰	۸۵۷	ساندوچ و پیتزا و ...	
۱۰۰	۸۵۷	۴/۵	۳۷	۹۵/۵	۸۲۰	نوشیدنی	
۱۰۰	۸۵۷	۲۸	۲۲۹	۷۲	۶۱۸	چیپس و پفک	
۱۰۰	۸۵۷	۱۸/۵	۱۵۹	۸۱/۵	۶۹۸	خشکبار	

میان وعده می خورند که ۳۹٪ آنان میان

وعده‌های ناسالم حاوی سطوح بالای چربی،  
شکر و نمک را مصرف می‌کنند، این مسئله به  
ویژه در تغذیه کودکان و نوجوانان حائز اهمیت**بحث**الگوهای تغذیه‌ای ناسالم در جهان در حال  
گسترش است. تحقیقات انجمن ملی تغذیه در  
استرالیا نشان داده است که ۹۰٪ افراد خوارکی

نیز نشان داد که اکثر افراد بیشتر عصرها و کمتر در صبح‌ها میان وعده می‌خورند (۱۶).

در تعیین تعداد دفعات تغذیه میان وعده‌ای در نوجوانان ۱۲-۱۸ ساله منطقه ۱۷ شهر تهران نتایج نشان داده است که: بیشترین درصد واحدهای مورد مطالعه (۴۶٪) یک بار در روز و کمترین درصد (۱۹٪) بیش از دو بار در روز خوراکی میان وعده خورده‌اند.

نتایج تحقیق Cross نشان می‌دهد که اکثریت کودکان در همه گروه‌های سنی حداقل یک بار در روز خوراکی میان وعده می‌خورند (۱۶). فاتحی می‌نویسد: استفاده از خوراکی میان وعده به خصوص ناسالم آن، اگر به مقدار زیاد و در زمان نامناسب مصرف شود موجب افزایش وزن، چاقی، کاهش اشتها و حذف وعده‌های اصلی غذایی و در نتیجه منجر به کبودهای تغذیه‌ای می‌گردد (۹). لذا پژوهشگران توصیه می‌کنند الگوهای صحیح تغذیه میان وعده از نظر نوع، زمان و مقدار آن به دانش‌آموزان آموزش داده شود تا شاهد عواقب ناگوار تغذیه ناسالم نباشیم.

ارتباط بین متغیرهای فردی و دسته‌های مختلف مواد غذایی در قسمت یافته‌ها به طور کامل شرح داده شد. با استفاده از آزمون آماری مجذور کای اختلاف معناداری بین استفاده از لبنيات به عنوان میان وعده و سن نشان داده شد ( $p < 0.0001$ ). Read و همکاران در تحقیق خود با عنوان تفاوت‌های سنی در مصرف شیر به عنوان یک میان وعده می‌نویسند: از دهه گذشته مصرف خوراکی میان وعده افزایش یافته است و نوجوانان مقداری از انرژی خود را از این طریق به دست می‌آورند و در این میان مصرف کلسیم جهت سلامت استخوان‌ها بسیار مهم

است چرا که می‌تواند به دنبال خود چاقی و بیماری‌های مزمن را به همراه داشته باشد (۱۱). در مورد نوع تغذیه میان وعده‌ای در نوجوانان ۱۲-۱۸ ساله منطقه ۱۷ شهر تهران نتایج مبین آن است که اکثریت واحدهای مورد مطالعه (۲۸٪) دسته تغذیه میان وعده‌ای شامل چیپس و پفک را نسبت به سایر مواد غذایی به مقدار بالای حد متوسط، و از دسته‌های دیگر زیر حد متوسط مصرف می‌کنند.

نتایج تحقیق آزادبخت نیز نشان داد که ۲۸٪ از دانش‌آموزان مصرف پفک را بر پسته و بادام ترجیح می‌دهند و ۳۷٪ آنان نیز مصرف بیسکویت کرم دار را بر سبوس دار ترجیح می‌دهند (۱۲).

نتایج تحقیقات Wildey, Cullen, Hsieh و بسیاری از پژوهشگران دیگر نیز تغذیه میان وعده‌ای ناسالم در کودکان و نوجوانان را تأیید می‌کنند (۱۳، ۱۱ و ۱۴).

یافته‌ها در مورد زمان تغذیه میان وعده نوجوانان نشان داد که بیشترین درصد واحدهای مورد بررسی (۶۲٪) عصرها خوراکی میان وعده می‌خورند و کمترین درصد (۵٪) بعد از شام میان وعده می‌خورند. در همین رابطه Morton می‌نویسد: اغلب کودکان و نوجوانان خوراکی میان وعده‌ای خود را عصرها و یا بین صبحانه و نهار میل می‌کنند زیرا بیشتر در این زمان‌هاست که آنان با همسالان خود در ارتباط هستند و خوراکی میان وعده می‌خورند و همچنین در این زمان‌ها بدن به انرژی بیشتری جهت فعالیت‌های خود نیاز دارد و سعی می‌کند کمبد انرژی خود را با تغذیه میان وعده جبران کند (۱۵). نتایج تحقیق Cross با عنوان الگوهای تغذیه میان وعده

وزن، غذاهایی مانند نان، برنج و سبیل زمینی باید به طور کامل حذف شوند (۱۹).

### نتیجه‌گیری

با توجه به این که نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیشتر نوجوانان از خوراکی‌های ناسالم جهت تغذیه میان و عده‌ای خود استفاده می‌کنند لذا پیشنهاد می‌گردد الگوهای صحیح تغذیه‌ای از جمله تغذیه میان و عده از نظر نوع، زمان و تعداد دفعات مصرف آن به نوجوانان و والدین آن‌ها آموزش داده شود تا منجر به ارتقای سطح آگاهی و عملکرد آنان شود. لذا پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های مشابه در مناطق مختلف شهر تهران و نیز مدارس دولتی و غیردولتی به منظور بررسی و مقایسه تغذیه میان و عده‌ای دانشآموزان انجام یابد. همچنین طی مطالعاتی، تأثیر آموزش به والدین در کیفیت تغذیه میان و عده‌ای دانشآموزان، مورد بررسی قرار گیرد.

### تشکر و قدردانی

محققین بر خود لازم می‌دانند که از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران و همچنین سازمان آموزش و پرورش تهران به جهت همکاری‌های قابل توجه در انجام این تحقیق تشکر و قدردانی نمایند.

است، نتایج یافته‌های آنان نشان داد که سن نوجوانان با انتخاب میان و عده حاوی کلسیم ارتباط دارد، لبنتیات و از جمله شیر که سرشار از کلسیم می‌باشد در نوجوانان با سن بالاتر کمتر مصرف می‌شود (۱۷). نتایج تحقیق Cullen نیز این یافته را تأیید می‌کند (۱۲). یافته‌های مطالعه حاضر نیز نشان داد که با افزایش سن در نوجوانان میزان استفاده از خوراکی‌های ناسالم از جمله چیپس و پفک افزایش می‌یابد (۰/۰<۰). در همین رابطه Galobardes در تحقیق خود با عنوان تغذیه و وضعیت اقتصادی- اجتماعی می‌نویسد: در سال‌های اخیر نتایج تحقیقات نشان داده است که متأسفانه با افزایش سن و سطح آموزشی دانشآموزان انتخاب خوراکی میان و عده‌ای ناسالم در آنان افزایش می‌یابد و هنوز دلیل آن به روشنی مشخص نیست و جا دارد که به آن پرداخته شود (۱۸). همچنین یافته‌ها نشان داد که دختران نسبت به پسران کمتر از نان و غلات به عنوان میان و عده استفاده می‌کنند (۰/۰<۰). در نتایج تحقیق خود می‌نویسد: یکی از مشکلات مربوط به عادات بد غذایی دختران نوجوان شیوع بالای چاقی نسبت به پسران است. بسیاری از نوجوانان برای کاهش وزن خود رژیمهای غذایی نادرستی را انتخاب می‌کنند، یافته‌های مطالعه حاضر نیز نشان داد که ۲۵٪ دختران فکر می‌کنند که در رژیمهای کاهش

### References

- 1 - Stanhope M, Lancaster J. Community and public nursing health. Nursing. St. Louis: Mosby Co; 2000. P. 527.
- 2 - ملک افضلی حسین. مجموعه آموزش عمومی بهداشت باروری. انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران دفتر صندوق ملل متحد در ایران، سال ۱۳۸۰؛ ص ۲۵.
- 3 - Rolfe S, Debruyne L, Whitney. Life span nutrition. Belmont: West/Wades worth; 1998. P. 294.

- 4 - McLachlan M. Adolescent Nutrition. <http://www.who.int>.2003.
- 5 - Edelman CL, Mandle CL. Health promotion throughout the life span. Philadelphia: Mosby Co; 2002. P. 562.
- 6 - Mitchell MK. Nutrition across the life span. Philadelphia: W. B. Saunders Co; 1997. P. 156-157.
- 7 - Mayo foundation for Medical Education and Research. <http://www.mayoclinic.com>.2003.
- 8 - Hilsenrath C. The NPD group reports kids are choosing healthier snacks. New York; 2004.
- ۹ - فاتحی صدیقه. اهمیت صحنه و میان و عده‌های غذایی مناسب برای دانشآموزان. مجله بهورن، سال ۵۴؛ ۱۳۸۱
- ۱۰ - سجادی پروین و همکاران. بررسی وضعیت تغذیه‌ای دختران ۱۴-۱۸ ساله بابل. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، سال ۱۳۷۹؛ شماره ۱: صفحات ۳۴-۳۹
- 11 - Hsieh P. Factors influencing students decisions to choose healthy or unhealthy snacks at the university of Newcastle. J Nurs Research. 2004; 12(2): 83-91.
- ۱۲ - آزادبخت لیلا و همکاران. ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشآموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان منطقه ۱۷ تهران در زمینه تغذیه سالم. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، سال ۱۳۸۲؛ دوره ۵: صفحات ۴۰۹-۴۱۶
- 13 - Cullen KW. Fruits, vegetables, milk, and sweetened beverages consumption and access to a la carte/snack bar meals at school. Am J Public Health. 2004; 94(3): 463-467.
- 14 - Wildey MB, Pampalon SZ, Pelletier RL, et al. Fat and sugar levels are high in snacks purchased from student stores in middle schools. Journal of the American Dietetic Association. 2000; 100(3): 319-322.
- 15 - Morton H. Parental strategies and young children's snacking behavior. Australian Journal of Nutrition and Dietetics. 1999; 56(4): 265-269.
- 16 - Cross AT, Babicz D, Cushman LF. Snacking patterns among 1800 adults and children. J Am Diet Assoc. 1994; 94(12): 1398-403.
- 17 - Read MH, Novotny R, Auld G, et al. Age differences in milk consumption as a snack and by eating occasion. Topics Clin Nutr. 2002; 17: 55-62.
- 18 - Galobardes B. Diet and socioeconomic position. International Journal of Epidemiology. 2001; 30: 334-340.
- 19 - Kristy MH. Herbold NH. Diet, activity, and other health- related behaviors in college-age women. Nutr Rev. 1998; 56: 65-75.

