

## تأثیر عصاره هیدروالکلی بر گ عناب بر سطح قند خون، لیپیدها و لیپوپروتئین ها در رت های دیابتی شده با آلوکسان منوهیدرات

زهرا شیردل<sup>۱\*</sup>، حسین مدنی<sup>۲</sup>، رویا میربدلزاده<sup>۳</sup>

### چکیده

مقدمه: دیابت، شایع ترین بیماری آندوکرین است که در آن قند خون و به دنبال آن چربی خون افزایش می یابند. این بیماری دارای عوارض دراز مدت چشمی، کلیوی، عصبی و عروق خونی است. تحقیقات نشان داده اند که برخی عصاره های گیاهی اثر ضد دیابتی دارند و لذا می توانند در افراد مبتلا به دیابت به منظور پایین آوردن قند خون، مورد استفاده واقع شوند. لذا در این تحقیق تصمیم گرفته شد با ایجاد رت های دیابتی به طور آزمایشگاهی، شرایطی مشابه با دیابت نوع ۱ در موش های صحرائی ایجاد شود و بعد از تایید دیابت، تأثیر هیپوگلیسمیک عصاره هیدروالکلی بر گ عناب و نیز تغییرات متابولیسمی گلوکز، لیپوپروتئین ها (HDL, VLDL, LDL)، تری گلیسرید و کلسترول تام مورد بررسی واقع شود.

رووش ها: در این تحقیق رت ها به ۳ گروه ۱۰ تایی بصورت زیر تقسیم شدند: ۱- گروه شاهد: تزریق سرم فیزیولوژی (به صورت داخل صفاقی) ۲- گروه کنترل دیابتی: تزریق آلوکسان منوهیدرات (۱۲۰mg/kg) به صورت داخل صفاقی در سه روز متناوب (پس از این مدت قند خون بررسی و دیابت تایید شد). ۳- گروه عناب: تزریق آلوکسان منوهیدرات (۱۲۰mg/kg) به صورت داخل صفاقی در سه روز متناوب، پس از این مدت قند خون بررسی و دیابت تایید شده و به دنبال تایید دیابت، تزریق عصاره هیدروالکلی بر گ عناب به میزان (۱۰۰mg/kg)، به صورت داخل صفاقی و به مدت ۵ روز متناوب انجام شد. پس از ۴۸ ساعت، حیوانات بیهوش شده و از همه گروه ها خونگیری به عمل آمد و عوامل سرمی گلوکز، لیپوپروتئین ها (HDL, VLDL, LDL)، تری گلیسرید و کلسترول تام توسط کیت های آنزیمی بررسی شدند.

یافته ها: نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد عصاره بر گ عناب توانسته میزان سرمی گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول و VLDL را در رت های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل دیابتی بطور معنی داری ( $P=0.001$ ) کاهش دهد. در ضمن بر گ عناب بطور معنی داری ( $P=0.02$ ) HLD خون را در رت های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل افزایش داد. در ضمن عصاره مذکور، میزان LDL رت های دیابتی را هم کم کرد ولی در مقایسه با گروه کنترل از اختلاف معنی دار نداشت ( $P=0.12$ ).

نتیجه گیری: با در نظر گرفتن یافته ها، مشخص می شود که بر گ عناب می تواند در افراد دیابتی برای کاهش قند و چربی خون مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: عناب، قند خون، لیپید، دیابت

۱- گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان

۲- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

۳- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور اردبیل

\*شناسنی: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان شهریار، دانشگاه پیام نور بجنورد، تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۴۲۵۳؛ نمبر: ۲۴۱۳۳۹۱-۰۵۸۴

پست الکترونیک: shirdel\_58@yahoo.com

## مقدمه

دیابت شایع ترین بیماری آندوکرین است که مشخصه آن افزایش قند خون (هیپرگلیسمی) و اختلال در متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین می باشد . این بیماری بر اثر اختلال در ترشح انسولین ، عملکرد انسولین و یا هر دوی آنها پدید می آید و طی روند بیماری ، همه دستگاهها و اندام های بدن ، درگیر می شوند. با توجه به عوارض داروهای شیمیایی پایین آورنده قند خون و نیز گران بودن آنها ، دستیابی به ترکیباتی که بتوانند با حداقل عوارض جانبی، قند خون را کاهش دهنده ضروری به نظر می رسد. به علت افزایش روزافزون دیابتی ها و عوارض مختلف دیابت، توجه به این بیماری امری ضروری است [۱، ۲].

از آنجا که استفاده از گیاهان دارویی از دیرباز رواج داشته و در درمان بیماری های مختلف از یک یا چند گیاه یا عصاره های گیاهی استفاده می شده است و نقش معجزه آسای برخی از این گیاهان در درمان بیماری ها مشخص بوده ، کاربرد این گیاهان در سال های اخیر نشان داده اند که برخی ترکیبات زیادی در سال های اخیر نشان داده اند که برخی ترکیبات گیاهی اثر ضد دیابت دارند و لذا می توانند در افراد مبتلا به دیابت به منظور پایین آوردن قند خون ، مورد استفاده واقع شوند. از آن جمله تاثیر هیپوگلیسمیک عصاره الكلی برگ شوند. از آن جمله تاثیر هیپوگلیسمیک عصاره الكلی برگ گیاه گل قاصد توسط عده زیادی از محققین به اثبات رسیده است [۳]. عصاره آبی برگ *Vermonia colorata* (از تیره کاسنی) و عصاره الكلی آووکادو نیز پتانسیل هیپوگلیسمیک بالقوه ای از خود نشان داده اند [۴ و ۵]. لذا هدف از تحقیق حاضر دستیابی به ترکیبی است که بتوانند با حداقل عوارض جانبی، بر دیابت موثر باشد و برای پایین آوردن قند خون در افراد دیابتی مورد استفاده واقع شود .

## روش ها

حیوانات مورد استفاده : به منظور انجام آزمایش ها، از موش های صحرایی بالغ (Rat) با نام علمی *Rattus Norvegicus Allivias* استفاده شد. حیوانات از لانه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خریداری و در لانه حیوانات دانشگاه پیام نور اصفهان نگهداری شدند. بعد از سپری شدن

دوره سازش پذیری با شرایط لانه ، رت های هر گروه توزین و نشانه گذاری شدند و تزریق هر گروه با دوزهای مشخص انجام گردید.

برای دیابت زایی در رت ها از ماده آلوکسان مونو هیدرات<sup>۱</sup> (تولید کارخانه مرک آلمان) استفاده شد که از شرکت یاسا طب اصفهان خریداری گردید. این ماده به مقدار ۱۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن رت به صورت محلول در سرم فیزیولوژی ( کلرور سدیم ۹ در ۱۰۰ ) و به صورت داخل صفاقی<sup>۲</sup> به هر حیوان تزریق شد. تزریق این ماده به رت ها باعث تشدید روند نکروز و آپوپتوز در سلول های بتای جزاير لانگرهانس لوزالمعده می شود که این روش برای ایجاد دیابت در انواع حیوانات نیز مورد استفاده قرار گرفته است [۶]. با تزریق این ماده شرایطی مشابه دیابت نوع ۱ انسانی در موش های صحرایی ایجاد می شود. در این تحقیق رت ها به ۳ گروه ۱۰ تایی بصورت زیر تقسیم شدند:

۱- گروه شاهد: تزریق سرم فیزیولوژی ( به صورت داخل صفاقی )

۲- گروه کنترل دیابتی: تزریق آلوکسان منوهیدرات (۱۲۰mg/kg) به صورت داخل صفاقی در سه روز متناوب (برای اثبات دیابت طی روشه به نام « روش stone » توسط لوله هماتوکریت خونگیری به عمل آمد، به طوریکه خون وریدی از سینوس اوربیتال گوشه داخلی چشم رت ها توسط لوله هماتوکریت جمع آوری شد . برای این کار بعد از نگه داشتن حیوان توسط انگشت شست و سبابه ، انتهای لوله هماتوکریت را به آرامی در حفره داخلی چشم وارد کرده و با حرکت چرخشی ته لوله به وریدهای سینوس داخل چشمی وارد شد . مویرگ های موجود در این ناحیه ، حساس بوده و در اثر فشار پاره می شوند و خون از سر آزاد لوله ها فوران می کند . بعد از خروج چند قطره درشت خون ، لوله هماتوکریت ، برداشته شده و لوله آزمایشی برای جمع آوری خون به آرامی با گوشه چشم تماس داده شد . در این روش می توان بیش از یک مرتبه خون وریدی را از سینوس اوربیتال رت ها به دست آورد

1-alloxan monohydrate  
2- intraperitoneal

## محاسبات آماری

در این تحقیق از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) برای مقایسه میانگین های گروه های آزمایشی استفاده شد. آزمون فوق توسط برنامه نرم افزاری SPSS انجام پذیرفت. سپس با استفاده از اطلاعات بدست آمده از این محاسبات، کلیه نمودارهای مربوط، در برنامه نرم افزاری Excel رسم شد.

## یافته ها

### مقایسه غلظت سرمی گلوکز در گروه عناب با سایر گروه ها

همانطور که در نمودار ۱ مشاهده می شود، اختلاف میانگین در دو گروه عناب و کنترل دیابتی، قویاً معنی دار است ( $P=0.001$ ) و نتیجه گرفته می شود که عصاره هیدروالکلی برگ عناب به طور چشمگیری قندخون را کاهش داده است. اما اختلاف میانگین های مشاهده شده بین دو گروه عناب و شاهد نیز معنی دار می باشد ( $P=0.001$ ) که موید این امر است که قند خون توسط عصاره عناب توانسته به طور چشمگیری از مقدار  $767/82$  در رت های دیابتی به مقدار  $250/94$  mg/dl کاهش یابد اما به حد گروه شاهد نرسد.

### مقایسه غلظت سرمی تری گلیسرید گروه عناب با سایر گروه ها

نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان می دهد که اختلاف میانگین در دو گروه عناب و کنترل دیابتی قویاً معنی دار است ( $P=0.001$ ) و نمودار ۲ نیز گویای این واقعیت است که عناب به طور چشمگیری تری گلیسرید را کاهش داده است و جالب این که اختلاف میانگین ها در دو گروه عناب و شاهد معنی دار نمی باشد ( $P>0.05$ ) که موید این است که عناب، تری گلیسرید را تا حد شاهد کاهش داده است.

### مقایسه گروه عناب با سایر گروه ها از لحاظ غلظت کلسترول خون

نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان می دهد که اختلاف میانگین غلظت کلسترول دو گروه عناب و کنترل دیابتی معنی دار است ( $P=0.01$ ) و این بدان معنی است که عناب

که برای آزمایش های مراحل اولیه یعنی حصول اطمینان دیابتی شدن موش ها روش مناسبی است. سپس با استفاده از کیت های آنزیمی، قند خون مورد بررسی قرار گرفته و ثبت شد).

- ۲- گروه عناب: تزریق آلوکسان منوهیدرات به میزان  $120\text{mg/kg}$  به صورت داخل صفاقی در سه روز متناوب. پس از این مدت قند خون به روش گروه دوم بررسی و دیابت، مورد تایید قرار گرفت و به دنبال تایید دیابت، تزریق عصاره هیدروالکلی برگ عناب به میزان  $100\text{mg/kg}$ ، به صورت داخل صفاقی و به مدت ۵ روز متناوب انجام شد.

۴۸ ساعت پس از آخرین تزریق، از همه گروه ها خونگیری به عمل آمد و از سرم حاصل برای اندازه گیری میزان گلوکز، کلسترول تام، تری گلیسرید و لیپوپروتئین های خون (LDL و HDL, VLDL) به وسیله کیت های آنزیمی (ساخت کارخانه زیست شیمی ایران) استفاده شد.

## روش تهیه عصاره هیدروالکلی برگ عناب

ابتدا برگ عناب تحت نظر کارشناس، از منابع طبیعی شهر اصفهان خریداری و پس از شستشو، با استفاده از آسیاب پودر آن تهیه شد و با کمک ترازوی حساس،  $100$  گرم از آن جدا گردیده و درون ارلن یک لیتری ریخته شد و  $400$  سی سی الکل  $96$  درصد به آن اضافه گردید به گونه ای که سطح پودر را بپوشاند. ارلن به مدت  $24$  ساعت بر روی دستگاه تکان دهنده قرار گرفت، سپس بوسیله قیف بوخرن و کاغذ صافی، محلول صاف شده و مجداً به تفاله باقیمانده، الکل  $75$  درصد اضافه شد و این بار نیز ارلن به مدت  $12$  ساعت بر روی تکان دهنده قرار داده شد. در نهایت محلول صاف شده توسط دستگاه تقطیر در خلاء (که روی دمای  $50$  درجه و سرعت چرخش  $90$  دور در دقیقه تنظیم شده بود) تا  $\frac{1}{3}$  حجم اولیه تغليظ گردید. برای جدا نمودن پروتئین ها و تصفیه مواد، محلول صاف شده  $3$  بار توسط کلروفرم دکانته شد. محلول دکانته شده در انکوباتور و دمای زیر  $50$  درجه قرار داده، بعد از چند روز پودر خشک شده بدست آمد که محتوى ماده خالص و موثر گیاه می باشد.

آماری معنی دار است ( $P = 0.02$ ) و نتیجه گرفته می شود که عناب بطور چشمگیری سبب افزایش HDL در رت های دیابتی شده است. اختلاف میانگین دو گروه عناب و شاهد از نظر آماری معنی دار است ( $P=0.04$ ) که نشان میدهد هر چند عناب توانسته HDL را از مقدار ۲۶/۵۸ در رت های دیابتی به مقدار ۳۸/۵۰ mg/dl افزایش دهد، اما توانسته آنرا به حد شاهد برساند (نمودار ۵).

### مقایسه غلظت سرمی LDL گروه عناب با سایر گروه ها

نتایج حاصل از آنالیز واریانس حاکی از آن است که اختلاف میانگین مشاهده شده در دو گروه عناب و کنترل دیابتی معنی دار نیست ( $P=0.12$ ) و نتیجه می شود عناب توانسته است بطور چشمگیر سبب کاهش LDL خون شود هر چند که مقدار LDL را از ۳۹/۰۴ mg/dl در رت های دیابتی به مقدار ۲۹/۶۸ mg/dl کاهش داده است. بین دو گروه عناب و شاهد نیز از نظر آماری اختلاف میانگین معنی داری وجود ندارد ( $P=0.29$ ) که نشان می دهد عناب توانسته LDL را تا حد شاهد پائین بیاورد (نمودار ۶).


کلسترول را بطور قابل قبولی کاهش داده است. اما بین دو گروه عناب و شاهد از نظر آماری اختلاف معنی دار مشاهده نمی شود ( $P>0.05$ ) که با کمی دقت در نمودار ۳، می توان دریافت که عناب، کلسترول را به حد شاهد، حتی کمی پایین تر از شاهد رسانده است.

### مقایسه گروه عناب با سایر گروه ها از لحاظ غلظت VLDL خون

نتایج حاصل از آنالیز واریانس حاکی از آن است که اختلاف میانگین دو گروه عناب و کنترل دیابتی از نظر آماری معنی دار است ( $P=0.001$ ) که نشان می دهد عناب به طور چشمگیری VLDL پلاسمای را کاهش می دهد. بین دو گروه عناب و شاهد از نظر آماری اختلاف معنی داری از نظر آماری مشاهده نمی شود ( $P>0.05$ ) که نشان می دهد عناب توانسته است میزان VLDL خون را تا حد شاهد کاهش دهد (نمودار ۴).

### مقایسه غلظت سرمی HDL گروه عناب با سایر گروه ها

نتایج حاصل از آنالیز واریانس حاکی از آن است که اختلاف میانگین دو گروه عناب و کنترل دیابتی از نظر




نمودار ۱- مقایسه غلظت سرمی گلوكز در گروه عناب با سایر گروه ها

روش آماری: (ANOVA)

حجم نمونه: هر گروه ۱۰ رت نر بالغ

گروه ۲ و ۳:  $p=0.001$

گروه ۱ و ۳:  $p=0.001$




نمودار ۲- مقایسه غلظت سرمی تری گلیسرید گروه عناب با سایر گروه ها

روش آماری: (ANOVA)

حجم نمونه: هر گروه ۱۰ رت نر بالغ

گروه ۲ و ۳:  $p=0.001$

گروه ۱ و ۳:  $p>0.05$




نمودار ۴- مقایسه غلظت سرمی VLDL گروه

عتاب با سایر گروه

(ANOVA:

حجم نمونه: هر گروه ۱۰ رت نر بالغ


 $P=0.01$ : ۲ و ۳ $P>0.05$ : ۱ و ۳

نمودار ۳- مقایسه غلظت سرمی کلسترول گروه

عتاب با سایر گروه ها

(ANOVA:

حجم نمونه: هر گروه ۱۰ رت نر بالغ


 $P=0.01$ : ۲ و ۳ $P>0.05$ : ۱ و ۳

نمودار ۵- مقایسه غلظت سرمی گلوکز در گروه

عتاب با سایر گروه ها

(ANOVA:

حجم نمونه: هر گروه ۱۰ رت نر بالغ

 $P=0.02$ : ۲ و ۳ $P=0.04$ : ۱ و ۳

نمودار ۶- مقایسه غلظت سرمی گلوکز در گروه

عتاب با سایر گروه ها

(ANOVA:

حجم نمونه: هر گروه ۱۰ رت نر بالغ

 $P=0.12$ : ۲ و ۳ $P=0.29$ : ۱ و ۳

## بحث

است[۱۰و۱۲]. با دیابتی شدن رتها میزان LDL افزایش و میزان HDL کاهش می یابد که مطابق نتایج Abou-Seif MA,Ishla,Bhartnagar, Winocour, Durrington Yussef AA میباشد.[۱۳و۱۴]. عصاره هیدروالکلی برگ عناب توانست میزان LDL را کاهش و HDL را افزایش دهد. با توجه به این که طور غیر مستقیم در تشکیل ذرات LDL دخالت می کند، لذا افزایش میزان VLDL پلاسما منجر به افزایش LDL پلاسما می گردد. از آنجا که عصاره نامبرده سبب کاهش چشمگیر VLDL شد، لذا انتظار می رود که میزان LDL نیز کاهش یابد. با توجه به این که غلاظت HDL پلاسما با تری گلیسرید رابطه عکس دارد و با در نظر گرفتن این که برگ عناب توانست میزان تری گلیسرید را کاهش دهد، لذا باید انتظار داشت که با کاهش میزان تری گلیسرید ، HDL افزایش یابد. در ضمن با بهبود مسیر متابولیسمی گلوکز ، متابولیسم پروتئین ها نیز بجای گرایش به سمت اثرات کاتابولیک ، مسیرهای آنابولیک را خواهند پیمود که در نتیجه آن، سنتز پروتئین هایی نظیر APo-A1 که ۷۰٪ ساختمان HDL را می سازند ، افزایش می یابد که به نوبه خود منجر به افزایش غلاظت HDL در رت ها می گردد[۱۵و۱۶].

### نتیجه گیری

با توجه به یافته ها مشخص می شود که برگ عناب می تواند به عنوان دارویی برای کاهش قند و چربی خون در افراد دیابتی استفاده شود. در ضمن با توجه به این که کاهش HDL در افراد دیابتی یک عامل خطر برای بیماری های قلبی و عروقی است و هر  $1\text{ mmol/l}$  کاهش در میزان HDL خطر بیماری های قلبی را  $1/5$  برابر افزایش می دهد[۱۷]، پس شاید بتوان گفت که مصرف عصاره مذکور می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش دهد که مسلمان نیاز به تحقیقات بیشتری خواهد بود.

### پیشنهادهای تحقیقاتی

۱- سنجش میزان هورمون انسولین قبل و بعد از تزریق عصاره برگ عناب.

در این تحقیق افزایش گلوکز پلاسما که با تخریب سلول های بتای جزایر لانگرهانس و توسط ماده آلوكسان منوهیدرات انجام شد، مشابه با یافته های JD,Byung Hyung [۷] و کاهش قند خون توسط عصاره هیدروالکلی Fahlettin Kelestimur و Aydin Erenmemisoglu می باشد[۸]. یکی از اثرات عصاره مذکور، احتمالا مهار کردن فسفریلаз کبدی است تا این که از تجزیه گلیکوژن در سلول های کبدی جلوگیری کند و همچنین بتواند تا حدودی فعالیت آنزیم هایی را که موجب پیشبرد سنتز گلیکوژن می شوند، افزایش دهد.

با بالا رفتن مقدار قند خون در رت های دیابتی متعاقب تزریق آلوكسان، میزان تری گلیسرید نیز افزایش یافت که مشابه یافته های Zhang XF و Tan Bk و نشان دهنده نقش انسولین در تنظیم متابولیسم لیپید هاست[۹]. عصاره هیدروالکلی برگ عناب مطابق با یافته های Amarraj Ignacimuthu باعث کاهش تری گلیسرید گردید[۱۰]. کاهش چشمگیر در میزان تری گلیسرید توسط عصاره هیدروالکلی برگ عناب را می توان بدین صورت توجیه نمود : با بهبود کنترل گلیسمیک و کاهش گلوکز خون توسط عصاره زنجبیل، مصرف شدن گلوکز بجای چربی ها برای تولید انرژی ، افزایش یافته و استیل کوآنزیم A حاصل از اسید پیرویک بجای این که وارد مرحله سنتزی تری گلیسریدها گردد، وارد چرخه کربس شده و سبب متابولیسم نهایی گلوکز می گردد[۹].

با کاهش تری گلیسرید توسط برگ عناب، میزان VLDL نیز مطابق یافته های Amarraj Ignacimuthu و بطور معنی داری کم می شود. در این رابطه باید گفت افزایش تری گلیسرید داخل سلولی، سبب افزایش سنتز VLDL می گردد. از آنجا که میزان تری گلیسرید توسط عصاره نامبرده بطور چشمگیری کاهش یافت، در نتیجه باید انتظار داشت که سنتز VLDL نیز کم شود.

افزایش غلاظت پلاسمایی کلسترول بدنبال تزریق آلوكسان مطابق با نتایج بررسی های Moorthy,Yadaw,Baquer می باشد[۱۱]. تزریق عصاره میزان کلسترول را کاهش داد که این نتیجه مطابق یافته های Amarraj Ignacimuthu و

۴- بررسی دقیق متابولیسم لیپیدها و پروتئین ها در شرایط دیابت قبل و بعد از تزریق عصاره.

۵- بررسی های بافتی لوزالمعده ، پیش و پس از تزریق آلوکسان منوهیدرات ، و پس از تزریق عصاره ( عدم بررسی بافتی پانکراس یکی از نقاط ضعف کار بوده است).

۲- بررسی تغییرات گلوكونئوژنر و گلیکوژنولیز کبدی قبل و بعد از تزریق عصاره مذکور.

۳- بررسی میزان و فعالیت آنزیم های لیپوپروتئین لیپاز و لیپاز حساس به هورمون قبل و بعد از تزریق عصاره.

## ماخذ

1. Jodeph F.smith. Antidiabetic drugs , *Medical library* 2003; 5 : 5-6.
2. فیلیپ بارت، و گلن برونستین، دیابت قندی - مبانی طب داخلی سسیل . دکتر سیامک ملکی ( ویراستار) بیماری های متابولیک ، غدد بهداشت زنان - ویرایش ۵ تهران انتشارات ارجمند ۱۳۸۲؛ صفحه ۱۰۳.
3. Hussain Z,Waheed A , Qureshi RA , Burdi dk verspohl EJ , Kan N , et al , The effect of medical plant's on Islamabad and murree rejoin of Pakistan on insulin secretion from INS-1 cell's *Phytother Res* 2004; 18(1) : 73-77.
4. Sy GY , Cisse A,Nongonierma RB , Sarr M , Mbodj NA , Faye B , Hypoglycemic and antidiabetic activity of acetonec extract of Veronia clorata leaves in normoglycemic and alloxan – induced diabetic rats . *J Ethnopharmacol* 2005 ک ۹۸ (1-2):171-175.
5. Gondwe M,Kamadyaapa DR . Tufts AM , C huturgwoon AA , Ojewole JA, Musabayane CT.Effects of persea Americana Mill (Lauracea)Avocado ethanolic leaf extract on blood glucose and kidney function in STZ-induced diabetic rats and on kidney cell lines of the proximal and distal tubules .2008; 30(1):25-35.
6. Soto C, del Razo LM, Neri L. Alloxan decreases intracellular potassium content of the isolated frog skin epithelium . *Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol* 2001; 130(1): 19-27.
7. Byung-Hyun Park,Jin-Woo Park.The protective effect of Amomum xanthides extracts against alloxan-induced diabetic rats through the suppression of NF  $\kappa$ B activation. *Experimental and Medicine* 2001;33: 64-68.
8. Aydin Erenmemisoglu,Fahrettin Kelestimur , Huluci Koker A,Huseyin Ustun,Yal cin Tekol, Muzaffar Ustadal,Hypoglycemic effect of Ziziphus jujube leaves .*J Pharm Pharmacol* 1994; 47:72-4.
9. Zhang X F , Tan B K H , Effects of an ethanolic extract of Gynura procumbens on serum glucose,cholesterol and triglyceride levels in normal and streptozotocin- induced diabetic rats. *Singapore Med J* 2003;41(1) : 1-6.
10. Ignacimuthu S,Amarlag T.,Effect of leaf of Ziziphus jujube on diabetic rats. *Indian journal of Pharmacology* 1998; 30:107-108.
11. Yadav UC.Moorthy K, Baquer NZ. Effects of sodium-orthovanadate and Trigonella foenum-graecum seeds on hepatic and renal lipogenic enzymes and lipid profile during alloxan diabetes. *J Biosci* 2004; 29(1): 81-91.
12. Ashok K.Tiwari & J.Madhusudana Rao.Diabetes mellitus and Multiple therapeutic approach of phytochemicals.present status and future prospects. *Current science*.2002 ; 83(1):30-38.
13. Winocour PH, Durrington PN, Bhatnagar D, Ishola M, Arrol S, Mackness M, Abnormalities of VLDL, IDL and LDL characterize insulin dependent diabetes mellitus. *Arterosclerosis and Thrombosis* 1992;12:920-928.
14. Abou-Seif MA,Yussef AA,, Evaluation of some biochemical changes in diabetic patients. *Clin Chem Acta* 2004; 346(2):161-170.
15. نقش ، نوشین . بررسی ارتباط لیپیدها و لیپوپروتئین های پلاسما با منیزیم درون و برون سلولی در رت های دیابتی شده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ، دانشگاه اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۷۸۰
16. Georg P, Ludvic B, Lipids and diabetes. *J clin Basic CXardio* 2000; 3:159-162 .
17. Peter P.Toth, The good cholesterol. High-Density lipoprotein.American heart association 2005; 111: e89-e91.

