

اثر عصاره آبی گیاه صبر زرد (Aloe vera) بر قند و چربی های خون در موش های صحرایی نر دیابتی

منیر جدیدالاسلامی^۱، مهدی عباس نژاد^{*}، محمدرضا شهرکی^۲

چکیده

مقدمه: صبر زرد از گیاهان دارویی است که برای درمان التهاب، بهبود سوختگی و تقویت سیستم ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه به دلیل عوارض جانبی کمتر و ارزان تر بودن گیاهان دارویی، مصرف آنها رو به افزایش است. هدف این مطالعه بررسی اثر صبرزرد بر قند خون، لیپیدها و لیپوپروتئین ها در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود.

روش ها: جمعیت مورد مطالعه شامل ۵۶ سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار آلبینو با وزن ۱۵۰-۲۰۰ گرم بودند. حیوانات مورد آزمایش به ۷ گروه تقسیم گردیده که ۶ گروه آنها با استرپتوزوتوسین (۶۵mg/Kg-IP) دیابتیک شدند. پس ازیک هفتگی خوننگیری جهت اندازه گیری قندخون ناشتا به منظور دیابتی شدن حیوانات انجام گرفت. گروه های دیابتیک به جز گروه کنترل دیابتی روزانه به ترتیب مقداری (۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ mg/kg) عصاره صبرزرد و ۵ گلیین کلامید را از طریق گواژه به مدت ۴ هفته دریافت نمودند. در پایان دوره در شرایط ناشتا، خوننگیری جهت اندازه گیری قند خون، لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم انجام شد.

یافته ها: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که فقط دوز ۴۰۰mg/kg صبرزرد و ۵ گلیین کلامید موجب کاهش معنی دار قند (به ترتیب، $23/12 \pm 22/6$ و $51/26 \pm 37/19$) گردید. همچنین دوز های ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰ mg/kg صبرزرد و ۵ گلیین کلامید موجب کاهش معنی داری در غلاظت تری گلیسیرید و کلسترول نسبت به گروه کنترل دیابتیک گردیدند. تمامی دوز های صبرزرد و گلیین کلامید موجب کاهش LDL شدند اما اثری بر HDL نداشتند.

نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که عصاره صبرزرد موجب کاهش قند، کلسترول، LDL و TG می گردد که شناخت دقیق آن نیاز به مطالعه بیشتری دارد.

واژگان کلیدی: صبرزرد، قند خون، دیابت، کلسترول، تری گلیسیرید، لیپوپروتئین

۱- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲- گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

* نشانی: کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی؛ تلفن: ۰۹۱۳۱۴۰۹۰۰۹؛ نمبر: ۰۲۴۱۳۲۲۰۰۳۲؛ پست الکترونیک: mabbas@mail.uk.ac.ir

مقدمه

دیابت قندی بیماری متابولیکی است که به صورت افزایش مزمن قند خون و اختلال در متابولیسم قندها، چربی‌ها و پروتئین‌ها مشخص می‌شود [۱]. دو نوع دیابت وجود دارد: دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع ۱، دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع ۲ در دیابت نوع ۱ سلول‌های بتای پانکراس تخریب و تولید انسولین کاهش می‌یابد که خود منجر به عدم مصرف قند توسط سلول‌های بدن، تخریب چربی‌ها و گلوکونثوزن می‌گردد. در دیابت نوع ۲ که به آن دیابت بالغین نیز گفته می‌شود، حساسیت گیرنده‌های انسولین در بعضی بافت‌ها از جمله عضلات اسکلتی و بافت چربی کاهش می‌یابد [۳،۲]. استرس اکسیداتیو القا شده در دیابت در پیشرفت بیماری نقش دارد. افزایش ترکیبات اکسیدان ممکن است از طریق افزایش تولید آنها و یا کاهش سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی بدن ایجاد شود [۴]. افزایش تولید رادیکال‌های آزاد ناشی از تقلیل آنتی اکسیدان‌های دفاعی احتمالاً منجر به اختلال عملکرد سلولی و آسیب اکسیداتیو به غشاها می‌گردد و حساسیت به پراکسیداسیون لیپیدها را افزایش می‌دهد [۵]. تاکنون انواع زیادی از داروهای ضد دیابتی به بیماران معروف شده که عمدتاً ترکیبات شیمیایی هستند [۶]، اما اخیراً توجه زیادی به درمان گیاهی شده [۵] و اغلب گیاهان حاوی مقادیر قابل توجهی از آنتی اکسیدان‌ها شامل: توکوفرول‌ها (ویتامین E)، کاروتونوئیدها، اسیداسکوربیک (ویتامین C)، فلاونوئیدها و تان‌ها هستند. یک ویژگی مهم گیاهان دارویی استفاده شده در دیابت فعالیت آنتی اکسیدانی آنهاست [۷، ۵].

صبر زرد (*Aloe vera*) متعلق به خانواده Liliaceae است که در حدود ۳۶۰ گونه دارد. این گیاه برگ‌های سبز مایل به خاکستری به شکل نیزه دارد که حاوی ژل روشن در یک بافت لعابدار مرکزی است [۵]. صبر زرد دارای خاصیت ضد تومور و ضد فعالیت تیروزیناز می‌باشد، همچنین در درمان اولیه معده مفید است [۸]. این گیاه که سرشار از ویتامین E و C است مقاومت بدن را در مقابل رادیکال‌های آزاد تقویت می‌کند و به همین دلیل اثر ضد سمی دارد [۹]. سه آنترانوئید isobarbaloin، barbaloin

روش‌ها

عصاره از شرکت دارو سازی باریج اسانس با مشخصات زیر تهیه گردید:

aloenin و aloenin از صبر زرد جدا شده که دو آنترانوئید اول خاصیت مسهله دارند [۱۰]. Barbaloin سلول‌های B جزایر لانگرهانس را از آسیب ایجاد شده توسط رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند [۱۱]. سه گلوکان maloyl به نام‌های وراسیل گلوکان A، وراسیل گلوکان B و وراسیل گلوکان C از ژل صبر زرد جدا شده اند که وراسیل گلوکان B اثرات ضد التهابی و ضد تکثیری قوی دارد در حالیکه، وراسیل گلوکان C افعای تکثیر سلولی و ضد التهابی نشان می‌دهد [۱۲]. اولین مطالعه اثر هیپوگلیسمیک گونه‌های آلوئه توسط Agarwal در سال ۱۹۸۵ انجام شد که یک دستور غذایی ویژه شامل برگ‌های صبر زرد به ۳۱۶۱۷ بیمار دیابتی، روزانه دو بار به مدت ۵ سال بود و نشانه‌هایی از کاهش سطوح قندخون، تری گلیسرید و کلسترول تام سرم را گزارش کرد [۱۳]. استفاده از شیره خشکانیده گیاه، وجود یک فاکتور هیپوگلیسمیک را نشان داده که سطوح گلوکز خون را در موش‌های دیابتی شده با آلوکسان کاهش می‌دهد [۱۴، ۱۵]. یک مطالعه انجام شده با ژل صبر زرد در موش‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین اثر آن را از طریق دریافت مزمن ثابت می‌کند [۱۶]. در تنافض با گزارش‌های ذکر شده، یک افزایش در سطوح گلوکز پلاسمای موش‌های دیابتی شده با آلوکسان در مطالعات حاد و مزمن با یک محصول طبیعی حاوی ژل صبر زرد مشاهده شد [۱۷]. همچنین، اثرات هیپرگلیسمیک ژل صبر زرد بر سطوح قند خون ناشتا و HbA1c نشان داده شده است [۱۸].

با توجه به اظهارات فوق الذکر و ویژگی‌های مربوط به خواص مختلفی که به عصاره این گیاه استناد داده شده به نظر می‌رسد عصاره آن بر عوامل متابولیسمی موثر باشد و نیز با توجه به گزارش‌های متنافض در مورد اثرات ضد دیابتی این گیاه، در این تحقیق ما بر آن شدیم تا اثر عصاره صبر زرد را بر موش‌های دیابتی در خصوص قند و بعضی از چربی‌های خون بررسی کنیم.

تری گلیسرید و کلسترول به ترتیب $11/25\%$ و $10/6\%$ و ضریب تغییرات HDL و LDL، $4/5$ بود.

داده های حاصله با نرم افزار SPSS آنالیز گردیدند. میانگین داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و پس آزمون Tukey مقایسه شدند. نتایج حاصل از این بررسی به صورت $\text{mean} \pm \text{SE}$ گزارش و $^{*}/^{**}$ به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.


یافته ها

نمودار ۱ اثر دریافت دهانی عصاره صبرزرد را بر قند خون ناشتا در غلظت 100 ، 200 ، 300 ، 400 mg/kg و اثر 5 mg/kg گلی滨 کلامید را به ازای وزن بدن نسبت به گروه شاهد نشان می دهد. میانگین میزان قند خون در گروه شاهد و کنترل دیابتی به ترتیب $30/4 \pm 20/4$ و $77 \pm 20/35$ است. نتایج آنالیز آماری نشان می دهد که میانگین قند خون گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی دار دارد ($P < 0/05$) که نشان دهنده دیابتی بودن این گروه است. میانگین قند خون در موش های صحرایی دیابتی تیمار شده با عصاره 100 ، 200 ، 300 mg/kg صبر زرد نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی دار ندارد (P < 0/05) که بیانگر عدم تأثیر دوزهای ذکر شده بر قند خون ناشتا است، اما قند خون ناشتا در گروه دریافت کننده 400 mg/kg صبرزرد و گروه دریافت کننده گلی滨 کلامید نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی دار ندارد که بیانگر کاهش قند خون ناشتا در این دو گروه است.


نمودار ۲ اثر دریافت دهانی عصاره صبر زرد و گلی بن کلامید را بر تری گلیسرید در غلظت های ذکر شده نشان می دهد. میانگین میزان تری گلیسرید در دو گروه شاهد و کنترل دیابتی به ترتیب $6/11 \pm 3/7$ و $14/45 \pm 1/4$ است. که تفاوت معنی داری را نشان می دهد (P < 0/05). میانگین میزان تری گلیسرید در گروه دریافت کننده دوز 100 mg/kg عصاره صبرزرد نسبت به شاهد اختلاف معنی دار نشان می دهد، اما میانگین میزان تری گلیسرید در گروه های دیابتی تیمار شده با دوز 200 ، 300 و 400 mg/kg صبر زرد و گلی بن کلامید اختلاف معنی دار ندارد.

رنگ : بی رنگ ، بو : تقریباً بی بو ، شفافیت : ابری ، اسیدیته : $4/41$ ، وزن مخصوص : $1/003$ g. جمعیت مورد بررسی در این مطالعه 56 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار آلبینو به وزن $150-200$ گرم بودند. حیوانات از حیوانخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تهیه گردیده و تحت شرایط 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی، دمای حدود 25 درجه سانتیگراد و رطوبت مناسب نگهداری شده و تغذیه آنها توسط غذای استاندارد و بدون محدودیت انجام گرفت.


حیوانات مورد بررسی پس از توزیں به طور تصادفی به هفت گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه ۱: شاهد. گروه ۲: کنترل دیابتی. گروه $3-6$: دیابتی های تیمار شده به ترتیب با دوزهای 100 ، 200 ، 300 و 400 mg/kg عصاره صبرزرد [۵] به مدت چهار هفته و به صورت دهانی که به کمک کاتر تجویز گردید. گروه ۷: دیابتی تیمار شده با گلی BIN کلامید (5mg/kg). موش های صحرایی گروه 2 تا 7 پس از 18 ساعت بی غذایی شبانه با تزریق داخل صفاقی (IP) استرپتپوزتوسین (65 mg/kg) [۱۶] دیابتیک شدند. حیوانات دیابتی شده پس از یک هفته علائم پرخوری، پرنوشی و پرادراری را نشان دادند. سپس کلیه حیوانات، در شرایط 18 ساعت بی غذایی شبانه، با اتر بیوهش گردیده و پس از بیوهشی، دم حیوانات در آب 40°C گذاشته شد و سپس حدود نیم سانتی متر از دم بریده و از ورید دمی خونگیری صورت گرفت و سرم آنها از گلbulول های قرمز به منظور سنجش قند خون جدا گردید. حیواناتی که قند خون بیش از 250 mg/dl داشتند به عنوان دیابتی تلقی شدند. ضریب تغییرات قند $1/4\%$ می باشد. سپس گروه های گفته شده در فوق، عصاره صبرزرد و گلی BIN کلامید را به مدت 4 هفته دریافت نمودند. بعد از 4 هفته یعنی در پایان آزمایش، حیوانات توزیں شده و پس از 18 ساعت بی غذایی شبانه با تزریق داخل صفاقی کاتامین بیوهش گردیده و سپس سر حیوانات بریده گردید و از ورید گردنی خونگیری صورت گرفت. اندازه گیری عوامل سرمی نظری گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، HDL و LDL نیز به روش آنژیمی و با استفاده از کیت های تجاری تهیه شده از شرکت زیست شیمی تهران انجام پذیرفت. ضریب تغییرات




نمودار ۱- تأثیر دوزهای متفاوت عصاره آبی صبر زرد بر غلضت سرمی گلوکز.هر ستون Mean \pm SE را نشان می دهد (موش n=8). * p<0.05 سطح معنی دار در برابر گروه شاهد است.



نمودار ۲- تأثیر دوزهای متفاوت عصاره آبی صبر زرد بر غلضت سرمی تری گلیسرید.هر ستون Mean \pm SE را نشان می دهد (موش n=8). * p<0.05 سطح معنی دار در برابر گروه شاهد است.



نمودار ۳- تاثیر دوزهای متفاوت عصاره آبی صبر زرد بر غلضت سرمی کلسترول. هر ستون Mean \pm SE را نشان می دهد
(* p < 0.05). (n=8).




نمودار ۴- تاثیر دوزهای متفاوت عصاره آبی صبر زرد بر غلضت سرمی HDL. هر ستون Mean \pm SE را نشان می دهد (n=8). (* p < 0.05).

عصاره و گلین کلامید نسبت به شاهد تفاوت معنی دار نشان نداد (نمودار ۳). همانطور که از نمودار ۴ بر می آید، میانگین میزان HDL در گروههای مختلف با یکدیگر اختلاف معنی دار ندارد.

میانگین میزان کلسترول شاهد و کنترل دیابتی به ترتیب ، $118/37 \pm 9/83$ ، $84 \pm 7/08$ است. میانگین کلسترول گروه دریافت کننده دوز 100mg/kg نسبت به شاهد تفاوت معنی دار دارد ($P < 0.05$)، اما میزان کلسترول در گروههای دریافت کننده دوزهای 200 ، 300 و 400mg/kg

در بقیه گروههای دریافت کننده عصاره صبر زرد و گلیبن کلامید نسبت به شاهد تفاوت معنی‌دار نشان نمی‌دهد (نمودار ۵).

میانگین میزان LDL گروه شاهدو کنترل دیابتی به ترتیب $34/75 \pm 25/8$ و $59/75 \pm 7/09$ است که تفاوت معنی‌دار بین آنها وجود دارد ($P < 0.05$)، اما میانگین میزان LDL



نمودار ۵- تاثیر دوزهای مختلف عصاره آبی صبر زرد بر غلضت سرمی LDL. هر ستون Mean \pm SE را نشان می‌دهد (موس = ۸). * p < 0.05 سطح معنی دار در برابر گروه شاهد است.

[۱۶]. آنها بیان داشتند که پولپ برگ صبر زرد عاری از ژل، در درمان قند خون در دیابت نوع ۲ مفید است [۱۶]. عامل افزایش قند خون احتمالاً در بخش پولپ برگ صبر زرد قرار دارد و پولپ برگ صبر زرد عاری از ژل در درمان دیابت شیرین مفید است. در مطالعات دیگری نشان داده شده است که عصاره ژل صبر زرد اثر افزایش قند خون در موش‌های دیابتی نوع ۲ نشان می‌دهد که نتایج منفی برخی از تحقیقات را، هنگامی که از عصاره آبی تمام برگ استفاده می‌شود، توجیه می‌کند [۱۶]. اختلاف نظر در مورد فعالیت های صبر زرد احتمالاً به دلیل تفاوت در بخش‌های استفاده شده از گیاه، نظیر عصاره برگ، ژل، پولپ، پوست برگ یا مدل دیابتی شدن حیوانات می‌باشد [۱۶]. در حقیقت فعالیت آلوئه با توجه به گونه گیاه، بخش مورد استفاده گیاه، نوع تهییه عصاره و مدل‌های دیابت فرق می‌کند. نتایج مطالعه ما نشان دهنده کاهش قند خون در موش

بحث

نتایج مطالعه اخیر نشانگر این واقعیت است که عصاره صبرزرد توانسته به طور معنی دار سطح گلوكز خون را در حیوانات دیابتی کاهش دهد. دوزهای ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ mg/kg صبرزرد، تری گلیسرید و کلسترول را کاهش داده است. همچنین تمامی دوزهای بکار گرفته شده صبرزرد، LDL خون را کاهش داده اند، اما صبر زرد در دوزهای بکار رفته تأثیری بر HDL نداشته است. نتایج بدست آمده در بخش اثر عصاره بر میزان قندخون با نتایج Ragasekaran و همکارانش در سال ۲۰۰۴ مطابقت دارد. این محققین اثر کاهش قند خون را متعاقب دریافت دهانی ژل صبر زرد در موش‌های دیابتی شده نشان دادند [۱۹] در حالیکه Okyar و همکارانش در سال ۲۰۰۱ بیان کردند که عصاره پولپ برگ صبر زرد، قند خون را در موش‌های دیابتی نوع ۱ و ۲ کاهش می‌دهد اما عصاره ژل صبر زرد، قند خون را در موش‌های دیابتی نوع ۲ افزایش می‌دهد

ویژگی اختصاصی دیابت مزمن است. آسیب با واسطه پراکسیداسیون لیپیدها در دیابت شیرین نوع ۱ و ۲ مشاهده شده است [۵]. گلوتیشن (GSH) یک تری پیتید است که به طور نرمال با غلظت بالا در داخل سلول وجود دارد [۲۷] و سیستم‌های سلولی را در برابر اثرات توکسیک پراکسیداسیون لیپیدها محافظت می‌کند [۲۸]. سطوح کاهش یافته GSH در کبد و کلیه در طی دیابت نشان دهنده افزایش مصرف آن ناشی از استرس اکسیداتیو است [۲۹]. عصاره صبر زرد سطوح GSH را به طور معنی دار در موش‌های دیابتی افزایش می‌دهد، این اثر نشان دهنده این است که عصاره مزبور می‌تواند بیوسنتز GSH را افزایش داده یا استرس اکسیداتیوی را که منجر به کاهش GSH می‌شود کاسته و یا هر دو تأثیر را بصورت همراه اعمال کند این وضعیت منعکس کننده قدرت آنتی اکسیدانی عصاره صبرزرد است، که به وسیله کاهش سطوح گلوکر خون از گلیکوزیلاسیون و غیر فعال نمودن آنزیم‌ها جلوگیری می‌کند [۵]. ترکیبات آنتی اکسیدان گیاهی جذب گلوکر را در روده کاهش می‌دهند. این اثر احتمالاً با مهار آنزیم‌های گوارشی نظری آلفا آمیلاز و آلفا گلوكوزیداز، که در هیدرولیز کربو هیدرات شرکت دارند، مهار انتقال گلوکر از غشای چین خورده روده کوچک و به تاخیر انداختن تخلیه محتويات معده به روده کوچک صورت می‌گیرد [۲۶].

همچنین نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که گلی بن کلامید سطوح قند خون ناشتا، تری گلیسرید، کلسترول و LDL را کاهش داده است. سولفونیل اورهای نظری گلی بن کلامید (GB) به طور کلینیکی به عنوان آزاد کننده انسولین در دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین استفاده می‌شود [۳۰]. GB ترشح انسولین را از سلول‌های بتای پانکراس موجود تحریک می‌کند و برای درمان نوع ۱ دیابت استفاده می‌شود. GB بوسیله مهار کanal های پتانسیمی حساس به ATP در غشا پلاسمایی عمل می‌کند. مهار کanal حساس به ATP، منجر به دپولاریزاسیون غشاء، فعال شدن کanalهای کلسیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ و در نتیجه افزایش ورود Ca^{2+} می‌گردد. افزایش در Ca^{2+} سیتوپلاسمی در نهایت موجب آزاد شدن انسولین می‌شود

های دیابتی می‌باشد که احتمالاً می‌تواند به دلایل زیر باشد:

افزایش قند خون با یک کاهش محسوس در سطح گلیکوزن کبد مرتبط می‌باشد. متابولیسم گلیکوزن کبدی یکی از مراحلی است که نقش مهمی را در حفظ نرمال غلظت گلوکر ایفا می‌کند. گلیکوزن سنتاز و گلیکوزن فسفوریلаз دو آنزیم تنظیم کننده کلیدی هستند که مراحل محدود کننده سرعت سنتز گلیکوزن و تجزیه گلیکوزن را به ترتیب کاتالیز می‌کنند [۱۹]. شواهد تجربی نشان داده است که صبر زرد سطوح گلیکوزن کبدی را به وسیله کاهش فعالیت گلیکوزن فسفوریلاز و افزایش فعالیت گلیکوزن سنتاز اصلاح می‌کند [۱۹]. فسفوریلاسیون گلوکر به وسیله هگزوکیناز که مرحله اول گلیکولیز است در دیابت شدیداً آسیب می‌بیند [۲۰]. تعداد زیادی از محققان گزارش کرده‌اند که فعالیت کبد و سطوح mRNA هگزوکیناز در طی دیابت کاهش می‌یابد [۲۲، ۲۱]. هگزوکیناز یک آنزیم وابسته به انسولین و حساس به آن است. استفاده از انسولین توانایی ترجمه mRNA هگزوکیناز، سرعت سنتز و فعالیت آنزیم را افزایش می‌دهد بنابراین یک توضیح ممکن برای افزایش یافتن فعالیت هگزوکیناز این است که عصاره صبر زرد احتمالاً کد کردن mRNA هگزوکیناز را در موش‌های دیابتی فعال می‌کند [۱۹]. سازوکار احتمالی این است که صبرزرد عمل هیپوگلیسمی خود را توسط پتانسیل بالقوه آزاد سازی انسولین از سلول‌های بتای جزایر لانگرهانس یا آزاد سازی آن از فرم باند شده انجام می‌دهد [۲۴، ۲۳].

تحقیقات انجام شده در سال‌های گذشته حاکی از این است که آسیب ناشی از رادیکال‌های آزاد در شرایط استرس اکسیداتیو عامل اصلی مرگ سلول و آسیب بافتی در بیماری‌های مزمن نظری آترواسکلروز، سرطان و دیابت می‌باشد [۲۵]. تحت شرایط فیزیولوژیکی، سیستم دفاعی آنتی اکسیدان گستردگی دهن را بر علیه اثرات مضر رادیکال آزاد محافظت می‌کند [۵] بطوری که پیشنهاد استفاده از آنتی اکسیدان‌ها برای دیابت ارائه شده است [۲۶]. استرس اکسیداتیو ناشی از افزایش قندخون در اثر درمان با عصاره گیاه صبرزرد بهبود می‌یابد [۵]. پراکسیداسیون لیپیدها یک

سازی انسولین از سلول‌های بتای پانکراس یا از فرم باند شده آن می‌شود.^۴ به دلیل وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی در عصاره، آنزیم‌های بدن از آسیب رادیکال‌های آزاد محافظت می‌گردند و پراکسیداسیون لیپیدها نیز تخفیف می‌یابد.^۵ صبرزرد بیوستر و فعالیت GSH را که یک ترکیب ضد اکسیداتیوی است افزایش می‌دهد.

سپاسگزاری

نویسنده‌گان مقاله مراتب تشکر خود را از شرکت باریج اسانس و آقایان دکتر کاشانیان، دکتر اکبری و نمایده محترم شرکت در زاهدان، آقای مهدی رضایی ابراز می‌دارند.

GB در مقایسه با ترکیبات متنوع که دارای ویژگی‌های ضد دیابتی هستند اغلب به عنوان یک داروی استاندارد در مدل دیابتی ایجاد شده با استرپتوزوتوسین استفاده می‌شود [۵]. در تحقیق انجام شده، عصاره آبی گیاه صبر زرد باعث کاهش غلظت سرمی عوامل بیوشیمیایی نظیر قندخون، تری کلیسرید، کلسترول، LDL شده است که این اثرات احتمالاً ناشی از حصول وضعیت‌های زیر می‌باشند:

۱- صبرزرد سطح گلیکوژن کبدی را از طریق کاهش فعالیت گلیکوژن فسفوریلاز و افزایش فعالیت گلیکوژن سنتاز اصلاح می‌کند. ۲- کدکردن mRNA هگزوکیناز را افزایش می‌دهد که باعث افزایش گلیکولیز و مصرف گلوکز برای تولید انرژی می‌شود. ۳- عصاره این گیاه باعث آزاد

ماخذ

- پژوهشکی عمومی، زاهدان. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سال تحصیلی ۱۳۸۴-۱۳۸۵.
1. Erkelen DW. Insulin resistance syndrome and type 2 diabetes mellitus. *Am J cardiol* 2001; 88: 38-42 .
 2. Basciano H, Fedrico O, Adeli K. Fructose ,insulin resistance and metabolic dyslipidemia. *Nut Metabz* 2005; 2: 5-29.
 3. Kasper K, Braunwald E, Fauci A, Houser S, Longo D, Jameson J.L. *Harisons Principals of Internal Medicine*, 16 edition ,Volum II . NewYork : Mc Grow ; 2005.
 4. Giugliano D, Ceriello A, Paolisso G. Oxidative stress and diabetic vascular complications. *Diabetes Care* 1996; 19: 257-67.
 5. Rajasekaran S, Sivagnanamm k, subramanian S. Anti oxidant effect of Aloe vera gel extract in Streptozotocin – induced diabetes in rats. *pharmacol Reports* 2005; 57: 90-96.
 6. Li W.L, Zheng H.C, Bukura J, Dekimpe N. Natural medicines used in the traditional chinese medical system for therapy of diabetes mellitus. *J Ethnopharmacol* 2004; 92: 1-21.
 7. Letita M, Timothy J. Anti oxidant activity in medicinal plants associated with the symptoms of diabetes mellitus used by the Indigenous peoples of the North American boreal forest. *J Ethnopharmacol* 2002; 82: 197-205.
 8. Young lee Ki, T.Weintraub Susan, Pal Yu B. Isolation and identification of a phenolic antioxidant from *Aloe barbadensis*. *Free radical biology and Medicine* 2000; 28: 261-265.
 9. صبری بن亨گی،اعظم . بررسی اثر گیاه صبرزرد بر عالیم قطع مورفین در موشهای صحراوی ماده. پایان نامه دکترای

17. Koo MWL. Aloe vera :antiulcer and anidiabetic effects. *phytother Res* 1994; 8: 461-464.
18. Tanaka m, Misawa e, Ito y, Habara n, Nomaguchi k, Yamada m, and “et al”. Identification of Five Phytosterols from Aloe Vera Gel as Anti-diabetic compounds. *Biol Pharm Bull* 2006; 29: 1418-1422 .
19. Rajasekaran S, Sivagnanam K, Ravi K, Subramanian S. Hypoglycemic Effect of Aloe vera Gel on Streptozotocin – Induced Diabetes in Experimental Rats . *J med food* 2004; 7: 61-66.
20. Vestergaard H. Studies of gene expression and activity of hexokinase, phosphofructokinase and glycogen synthase in human skeletal muscle in states of altered insulin-stimulated glucose metabolism. *Dan Med Bull* 1999; 46: 13-34.
21. Reul BA, Amin SS, Buchet JP, Ongemba LN, Crans DC, Brichard SM. Effects of vanadium complexes with organic ligands on glucose metabolism: a comparison study in diabetic rats. *Br J Pharmacol* 1999; 126: 467-77.
22. Saxena AK, Srivastava P, Baquer NZ. Effects of vanadate on glycolytic enzymes and malic enzyme in insulin-dependent and -independent tissues of diabetic rats. *Eur J Pharmacol* 1992; 216: 123-6.
23. Pari L, Umamaheswari J. Antihyperglycaemic activity of Musa sapientum flowers: effect on lipid peroxidation in alloxan diabetic rats. *Phytother Res* 2000; 14:136-8.
24. Pari L, Saravanan G. Antidiabetic effect of Cogent db, a herbal drug in alloxan-induced diabetes mellitus. *Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol* 2002; 131: 19-25.
25. Ines V, Fedrico L. Plant polyphenol anti oxidants and oxidative stress. *Biological Research* 2000; 33 : 159-165 .
26. Ashok K, Rao J. Diabetes mellitus and multiple therapeutic of phytochemical : present status and future prospects. *current scienc* 2002; 83 : 30-38 .
27. Lu SC. Regulation of hepatic glutathione synthesis: current concepts and controversies. *Faseb J* 1999; 13: 1169-83.
28. Nicotera P, Orrenius S. Role of thiols in protection against biological reactive intermediates. *Adv Exp Med Biol* 1986; 197: 41-51.
29. Anuradha CV, Selvam R. Effect of oral methionine on tissue lipid peroxidation and antioxidants in alloxaninduced.diabetic rats. *J Nutr Biochem* 1993; 212–217.
30. Ohgami N, Kuniyasu A, Furukawa K, Miyazaki A, Hakamata H, Horiuchi S, and “et al”. Glibenclamide Acts as an Inhibitor of Acyl-CoA:Cholesterol Acyltransferase Enzyme. *Biochemi and Biophys Res Communications* 2000; 277: 417-422.