

تأثیر سابقه خانوادگی بر غربالگری عوامل خطر قلبی عروقی

حسین فخرزاده^{*}، آزاده سادات خضری^۱، علی رفائی^۱، رسول پورابراهیم^۱، محمد جعفر محمودی^۲، رامین حشمت^۱، فاطمه بندریان^۱

چکیده

مقدمه: با گسترش الگوی زندگی شهری، شاهد افزایش روزافزون شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در کشور هستیم. لذا غربالگری این عوامل خطرساز از اولویت‌های ساختار بهداشتی کشور است. هدف از این مطالعه بررسی ارزش روش غربالگری به کمک سابقه خانوادگی بوده است.

روش‌ها: ۱۰ مدرسه راهنمایی واقع در منطقه ۶ شهرداری تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌ای جهت بررسی سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی عروقی در میان دانش آموزان توزیع گردید که به کمک والدینشان آن را تکمیل کردند. پس از جدا کردن خانواده‌های با یا بدون سابقه خانوادگی، آنها به صورت جداگانه جهت بررسی بیشتر به بیمارستان شریعتی دعوت شدند. برای آنالیز اطلاعات از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۰ و تست‌های آماری T-test، Chi-Square و تست‌های توصیفی استفاده شد.

یافته‌ها: بر اساس پرسشنامه اولیه، حدود ۴۰٪ خانواده‌ها سابقه خانوادگی مثبت داشتند. از میان خانواده‌های با سابقه فامیلی مثبت (پر خطر)، ۷۲٪ از گروه شاهد (گروه کم خطر)، ۳۴٪ به درمانگاه مراجعه نمودند. میانگین کلسترول تام (TC) و LDL-C در خانواده‌های پر خطر بطور معنی داری بالاتر بود. میانگین قند خون ناشتا در پدران و فرزندان خانواده‌های پر خطر نیز بالاتر بود ($P < 0.05$). فراوانی افراد با کلسترول تام بالای 200 mg/dl و قند خون ناشتا بالای 100 mg/dl در خانواده‌های پر خطر بیشتر بود. فراوانی افراد با LDL-C بالای 130 mg/dl در پدران و فرزندان خانواده‌های پر خطر بالاتر بود. میانگین سن، فشار خون، HDL-C، TG و BMI در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.

نتیجه‌گیری: میزان مشارکت و فراوانی عوامل خطر قلبی عروقی در خانواده‌های با سابقه خانوادگی مثبت بطور معنی داری بیشتر است. لذا یافته‌های این مطالعه، استفاده از سابقه خانوادگی را جهت غربالگری تایید می‌نماید.

واژگان کلیدی: سابقه خانوادگی، غربالگری، عوامل خطر قلبی عروقی، مدارس

۱- مرکز تحقیقات غدد درون ریزو متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲- بیمارستان امیراعلم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

*نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات غدد درون ریزو و متابولیسم، کد پستی

۱۴۱۱۴؛ تلفن: ۰۲-۰۲۶۹۰۲۸۰؛ نمبر: ۰۹۳۹۹۰۸۸۰؛ پست الکترونیک: emrc@tums.ac.ir

مقدمه

نهایت بیشتر دچار CVD شده اند. پرسیدن سابقه خانوادگی به خانواده های پر خطر یادآوری می کند که باید برای کاهش عوامل خطر تلاش کنند [۴]. از سوی دیگر غربالگری در مدارس امتیازات ویژه ای دارد: نخست آن که تحصیل در مدارس برای همه اجباری است. دوم این که دانش آموزان می توانند حاملین خوبی برای انتقال پیام های سلامتی به خانواده های خود باشند و سوم رفatarهای بهداشتی افراد عمدها در سنین کودکی شکل می گیرد و دانش آموزان دارای یک عامل خطر می توانند گروه هدف جهت انجام مداخلات مختلف جهت کاهش عوامل خطر و همچنین پیگیری جهت مطالعات آینده نگر باشند. ما در این مطالعه قصد داریم تأثیر استفاده از سابقه خانوادگی بر بازدهی غربالگری عوامل خطر قلبی عروقی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

روش ها

این مطالعه مورد- شاهدی بر اساس مشارکت دانش آموزان دوره راهنمایی و والدین آنها در منطقه ۶ آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد. از بین مدارس راهنمایی منطقه ۶، ۱۰ مدرسه به طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. در مدارس مورد بررسی پس از توضیح کلی در مورد اهمیت بیماری های قلبی عروقی، پرسشنامه پیام سلامت جهت بررسی وجود سابقه خانوادگی بیماری های قلبی عروقی در خانواده درجه یک و پدربرزگ و مادربرزگ دانش آموزان، در میان آنها توزیع گردید. دانش آموزان پرسشنامه ها را در منزل به کمک والدین خود کامل نمودند.

از میان ۹۰۰ پرسشنامه توزیع شده، ۷۷۹ پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شد (میزان پاسخ کلی ۹۷٪/۵٪) که ۲۹۷ مورد از آنها دارای سابقه خانوادگی مثبت (گروه مورد) و ۴۸۲ مورد دارای چنین سابقه ای نبودند (گروه شاهد). همه این خانواده ها از طریق پیگیری تلفنی جهت انجام معاینه و بررسی آزمایشگاهی به درمانگاه لیپید بیمارستان دکتر شریعتی دعوت شدند.

از گروه مورد، ۲۱۴ خانواده و از گروه شاهد ۱۶۴ خانواده به درمانگاه مراجعه نمودند. متناسب با امکانات

بیماری های قلبی - عروقی (CVD) شایع ترین علت مرگ و میر در کشور می باشند. با توجه به افزایش روز افزون شهرنشینی و الگوی زندگی شهری، امروزه بیماری های قلبی عروقی به صورت اپیدمی در آمده اند به طوری که حدود ۳۰٪ مرگ و میر انسان ها را شامل می شوند. ۳۳٪ مردان و ۱۰٪ زنان قبل از ۶۰ سالگی دچار سکته قلبی می شوند و ۷۰٪ از این افراد هیچگاه بهبودی کامل نمی یابند. طبق آمار منتشر شده، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از ناتوانی و مرگ و میر^۱ CVD در ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است [۱-۳] در حالی که هزینه پیشگیری از این بیماری ها بسیار کمتر است. جهت پیشگیری از CVD روش های متفاوتی پیشنهاد شده است؛ از جمله:

۱- آموزش همگانی که تأثیر محدودی دارد، چون همه افراد این پیام ها را دریافت نمی کنند و یا در صورت دریافت ممکن است آنها را به درستی متوجه نشوند. از طرف دیگر اغلب افراد موفق به تغییر رفتار نمی شوند یا میزان تغییر رفتار آنها کافی نیست [۴].

۲- بررسی آزمایشگاهی همه افراد جامعه که هزینه و وقت زیادی لازم دارد. همچنین بسیاری از حوادث قلبی عروقی در افرادی رخ می دهد که سابقه وجود عوامل خطر را ندارند.

۳- بررسی آزمایشگاهی افراد با سابقه خانوادگی مثبت: از آنجایی که ژن های موثر بر بیماری های قلبی عروقی شناخته نشده اند، باید برای بدست آوردن اطلاعات ژنتیکی فرد، از سابقه خانوادگی استفاده نمود. از سوی دیگر سابقه خانوادگی مجموعه ای از اطلاعات محیطی و رفتارهای بهداشتی فرد را هم در بر می گیرد [۵]. مطالعات نشان داده اند که اختلالات چربی خون، اضافه وزن و سایر عوامل خطر در بعضی خانواده ها تجمع یافته اند [۵]. همچنین در مطالعات متعدد نشان داده شده است که افرادی از خانواده های با سابقه خانوادگی مثبت که در زمان مطالعه قادر عوامل خطرساز^۲ (RF) بوده اند، در

¹ Morbidity and mortality

² Risk factor

برابر یا بیشتر از ۱۴۰ mmHg به عنوان پرفشاری خون در نظر گرفته شد.

$\text{HDL} < ۴۰$ یا $\text{LDL} \geq ۱۳۰$ یا $\text{TG} \geq ۲۰۰$ به عنوان دیس لیپیدمی در نظر گرفته شد. قند خون ناشتا بین ۱۰۰-۱۲۶ mg/dl به عنوان IFG^۱ و قند خون ناشتا برابر یا بیشتر از ۱۲۶ mg/dl به عنوان دیابت قندی دسته بندی شد.

برای آنالیز اطلاعات از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۰ و تست‌های Chi-Square، T-test و تست‌های توصیفی استفاده شد.

یافته‌ها

در گروه با سابقه فامیلی مثبت (گروه مورد) از ۲۹۷ خانواده دعوت شده، ۲۱۴ خانواده به درمانگاه مراجعه نمودند. لذا میزان مشارکت این گروه در غربالگری ۷۲٪ بود. در گروه بدون سابقه خانوادگی مثبت (گروه شاهد)، از ۴۸۲ خانواده دعوت شده، ۱۶۴ خانواده در طرح شرکت کردند (میزان مشارکت ۳۴٪). میانگین مقادیر متغیرهای اندازه‌گیری شده و مشخصات دموگرافیک افراد شرکت کننده در جدول ۱ آورده شده است. میانگین TC و LDL-C در فرزندان، پدران و مادران گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد به‌طور معنی‌داری بالاتر بود. میانگین سطح FBS در فرزندان و پدران گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد به‌طور معنی‌داری بالاتر بود (جدول ۱). نتایج مقایسه فراوانی عوامل خطر قلبی عروقی در دو گروه در جدول ۲ آورده شده است. فراوانی هیپرکلسترولمی (TC ≥ ۲۰۰) در فرزندان، پدران و مادران گروه پرخطر در مقایسه با گروه شاهد به‌طور معنی‌داری بالاتر بود (جدول ۲).

فراوانی سطح سرمی LDL بالا در فرزندان و پدران گروه مورد تفاوت معنی دار با گروه شاهد داشت ولی در مادران تفاوت معنی دار دیده نشد. فراوانی IFG و دیابت در فرزندان، پدران و مادران گروه مورد و شاهد تفاوت معنی دار داشت.

² Impaired Fasting Glucose

درمانگاه، روزانه تعداد مشخصی از خانواده‌ها به درمانگاه دعوت شدند. ابتدا خانواده‌ها پرسشنامه موجود را پاسخ دادند، سپس اطلاعات دموگرافیک آنها جمع آوری و از آنها نمونه خون گرفته شد. اندازه گیری قد بصورت ایستاده با تقریب ۰/۵ سانتیمتر با ترازوی استاندارد و با وزن با تقریب ۰/۵ کیلوگرم با ترازوی استاندارد و با حدافل لباس انجام شد. نمایه توده بدنی (BMI) محاسبه گردید. فشار خون از بازوی راست و پس از ۵ دقیقه آرامش در وضعیت نشسته بوسیله فشارسنج جیوه ای استاندارد مناسب، دو بار اندازه گیری شد و میانگین دو اندازه گیری فاز ۱ کروتوکوف به عنوان فشارخون سیستولیک و میانگین دو اندازه گیری فاز ۲ کروتوکوف به عنوان فشارخون دیاستولیک ثبت گردید. نمونه خون وریدی بعد از ۱۲ ساعت ناشتایی به منظور تعیین شاخص‌های متابولیک جمع آوری گردید. کلسترون تام سرم (TC) و گلوكز ناشتا (FBS) و تری گلیسرید (TG) سرم با روش کالریمتریک و با استفاده از کیت‌های استاندارد (پارس آزمون، ایران) با دستگاه اتوآنالایزر هیتاچی ۹۰۲ (Boehringer Mannheim, Germany) و سطوح لیپوپروتئین‌های پرچگال (HDL) و کم چگال (LDL) (مستقیماً) توسط روش‌های ایمونوتوریبدومتریک با استفاده از کیت مناسب (پارس آزمون، ایران) و با استفاده از همان دستگاه اندازه گیری شد.

معیار سابقه خانوادگی مثبت عبارت بود از وجود سابقه حوادث قلبی عروقی حاد (شامل سکته‌های قلبی، حوادث عروقی مغز و آنژین صدری ناپایدار) قبل از ۵۵ سالگی در مردان و قبل از ۶۵ سالگی در زنان خانواده درجه اول فرزند (پدر، مادر، خواهر، برادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ). نحوه اثبات سابقه بیماری قلبی، عروقی در خانواده بر اساس گزارش شخصی^۱ افراد شرکت کننده بود.

BMI برابر یا بیشتر از ۲۵ به عنوان اضافه وزن در نظر گرفته شد.

صرف داروی ضدفسار خون یا فشار خون دیاستولی برابر یا بیشتر از ۹۰ mmHg یا فشار خون سیستولی

¹ Self report

جدول ۱- متغیرهای دموگرافیک و میانگین عوامل خطرساز قلبی عروقی در خانواده دو گروه مورد و شاهد

مادران		پدران		فرزندان		میانگین
گروه شاهد	گروه مورد (پرخطر)	گروه شاهد	گروه مورد (پرخطر)	گروه شاهد	گروه مورد (پرخطر)	
۴۱/۶±۶	۴۰/۹±۵/۲	۴۳/۲±۲/۱	۴۳/۹±۳/۹	۱۲/۳±۰/۲	۱۲/۱±۰/۴	سن (سال)
۱۲۸ نفر زن	۱۷۵ نفر زن	۸۱ نفر مرد	۱۲۹ نفر مرد	۷۴ دختر، ۹۰ پسر	۹۶ دختر، ۱۱۸ پسر	جنس
۲۸/۰۲ ± ۷/۷۳	۲۷/۹۵ ± ۴/۰۵	*۲۵/۸۳ ± ۴/۲۲	۲۸/۰۵ ± ۳/۵۱	۲۲/۶۴ ± ۱۶/۷۶	۲۱/۷۳ ± ۴/۵۱	(kg/m ²) BMI
۱۱۵/۲ ± ۱۵/۴۹	۱۱۳/۱ ± ۱۳/۱۸	۱۱۲/۳ ± ۱۳/۵۴	۱۰۷/۷ ± ۱۴/۳۳	۱۰۲/۲ ± ۱۲/۲	۹۹/۵ ± ۱۹/۷	فشار خون سیستولی (mmHg)
۷۶/۱ ± ۱۰/۰۸	۷۴/۴ ± ۷/۷۱	۷۰/۲ ± ۱۱/۲۶	۶۹/۳ ± ۱۰/۲۶	۶۲/۸ ± ۷/۱	۶۳/۳ ± ۶/۹	فشار خون دیاستولی (mmHg)
×۱۹۱/۵۰ ± ۴۰/۲۴	۲۰۲/۱۱ ± ۳۸/۶۰	*۲۰۰ ± ۴۳/۰۲	۲۱۶/۶۰ ± ۳۸/۵۸	*۱۵۴/۷۳ ± ۲۷/۳۷	۱۷۰/۳۸ ± ۲۶/۴۸	کلسترول تام (mg/dl)
×۱۱۴/۸۰ ± ۳۳/۶۷	۱۲۳/۱۸ ± ۲۹/۴۵	*۱۲۴/۶۴ ± ۳۳/۱۷	۱۳۹/۴۶ ± ۲۹/۳۲	*۸۹/۷۱ ± ۲۱/۰۹	۱۰۲/۷۳ ± ۱۹/۱۵	(mg/dl) LDL-C
۶۴/۰۸ ± ۲۱/۲۵	۶۵/۸۷ ± ۱۹/۲۲	۵۸/۳۱ ± ۱۷/۶۱	۶۲/۴۵ ± ۱۶/۱۷	۴۸/۵ ± ۱۷/۲	۵۱/۴ ± ۱۳/۵	(mg/dl) HDL
۱۳۹/۸۸ ± ۷۸/۱۸	۱۳۷/۶۳ ± ۸۱/۲۷	۱۹۰/۱۱ ± ۱۱۳/۰۹	۱۸۷/۰۵ ± ۹۶/۳۲	۱۱۱/۶۱ ± ۵۰/۹۳	۱۰۵/۰۱ ± ۴۴/۶۸	تری‌گلیسرید (mg/dl)
۱۰۰/۷۵ ± ۳۳/۰۵	۱۰۱/۹۱ ± ۳۳/۰۷	*۱۰۰/۳۲ ± ۲۷/۱۲	۱۱۰/۰۸ ± ۲۶/۵۷	*۹۴/۸۸ ± ۷/۳۴	۹۷/۴۱ ± ۷/۵۸	قند خون ناشتا (mg/dl)

* مقادیر ± نشانگر میانگین ± انحراف معیار هستند. * در مقایسه، مقادیر P از نظر آماری معنی دار بود ($P < 0.05$).

تعداد گروه شاهد = ۱۶۴ نفر

تعداد گروه مورد = ۲۱۴ نفر

جدول ۲- فراوانی عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی عروقی در خانواده‌های دو گروه مورد و شاهد

مادران		پدران		فرزندان		میانگین
گروه شاهد	گروه پرخطر	گروه شاهد	گروه پرخطر	گروه شاهد	گروه پرخطر	
۱۲۸ نفر	۱۷۵ نفر	۸۱ نفر	۱۲۹ نفر	۱۶۴ نفر	۲۱۴ نفر	تعداد کل
(۶۸)۸۷	(۷۴)۱۳۰	(۷۳/۲)۵۹	(۸۱/۴)۱۰۵	(۲۱)۳۴	(۲۵)۵۳	اضافه وزن
(۱۱/۷)۱۵	(۷)۱۲	(۲۳/۴)۱۸	(۱۴/۷)۱۹	(۱۰)۱۶	(۸)۱۷	پرفشاری خون
(*۲۲/۱)۲۹	(۵۳/۱)۹۳	*(۲۵/۹)۲۱	(۶۴/۲)۸۳	*(۳/۷)۶	(۱۴)۳۰	هیپرکلسترولمی mg/dl (TC ≥ ۲۰۰)
(۳۲)۴۱	(۳۸/۹)۶۸	*(۴۲/۹)۳۳	(۵۹)۷۶	*(۲/۴)۴	(۸/۹)۱۹	(mg/dl) LDL-C ≥ ۱۳۰
(۸/۶)۱۱	(۳/۴)۶	(۱۰)۸	(۹)۱۲	(۱۳)۲۱	(۱۲)۲۵	(mg/dl) HDL ≤ ۴۰
(۱۴/۴)۱۵	(۱۵/۴)۲۷	(۳۶/۴)۲۹	(۳۹/۵)۵۱	(۴/۳)۷	(۲/۸)۶	(mg/dl) TG ≥ ۲۰۰
*(۲۶)۳۳	(۳۹/۱)۶۸	*(۴۴/۲)۳۶	(۶۳/۸)۸۲	*(۲۳/۲)۳۸	(۳۴/۱)۷۳	(mg/dl) FBS ≥ ۱۰۰

* در کل جدول عدد سمت راست نشانگر تعداد و عدد داخل پرانتز، نشانگر درصد است. * در مقایسه، مقادیر P از نظر آماری معنی دار بود. ($P < 0.05$).

رخ می‌دهند، این در حالیست که پیشگیری از CVD بسیار کم هزینه تر است. روند آترواسکلروز و بسیاری از عوامل خطر قلبی عروقی و رفتارهای بهداشتی افراد از سینین پایین شکل می‌گیرد و به همین علت است که امروزه پیشگیری و غربالگری از سینین پایین بسیار مورد توجه

بحث

امروزه بیماری‌های قلبی عروقی (CVD)، هزینه‌های سنگینی را بر فرد و جامعه تحمیل می‌کنند و مهم‌تر این که حوادث حاد قلبی عروقی عمده‌تاً در سینین اوج بهره‌وری

نمودند در حالی که از گروه بدون سابقه خانوادگی ۳۴٪ در طرح شرکت نمودند. این یافته نشان می دهد که میزان مشارکت خانواده های پرخطر در غربالگری بیشتر است و این افراد انگیزه بیشتری برای پیگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماری های قلبی عروقی دارند.

اگرچه در مطالعه ما تفاوت معنی داری در میانگین فشار خون و فراوانی پرفشاری خون در دو گروه یافت نشد، ولی در سایر مطالعات نشان داده شده است که فراوانی پرفشاری خون در جوانان با سابقه خانوادگی مثبت، بیشتر است [۸، ۱۰، ۱۱].

همچنین در مطالعه ما بین سابقه خانوادگی مثبت و عوامل خطر کلسترول، LDL-C و FBS بالا ارتباط معنی دار وجود دارد که این موضوع نشان می دهد سابقه خانوادگی می تواند یک عامل پیشگویی کننده مناسب برای غربالگری افراد در معرض خطر باشد. در مطالعه ای مشابه [۹] هم ارتباطی معنی دار بین سابقه خانوادگی مثبت با وجود TC، LDL-C، BP، دیاستولی و BMI بالا در فرزندان یافت شد که یافته های این مطالعه استفاده از سابقه خانوادگی CVD را در غربالگری کودکان تایید می کند. با این روش غربالگری (استفاده از سابقه خانوادگی)، در مطالعه ما ۷۹٪ فرزندان با دیس لیپیدمی و ۷۱٪ والدین با دیس لیپیدمی شناسایی شدند. در مطالعه مشابه Koski [۹]، با این روش ۷۵٪ کودکان با دیس لیپیدمی شناسایی شدند.

این مطالعه قابل استفاده بودن سابقه خانوادگی در غربالگری زوردرس عوامل خطر قلبی عروقی را نشان می دهد، به ویژه که این روش مقرن به صرفه و انجام پذیر می باشد و یک قدم اولیه در شناسایی خانواده های پرخطر جهت مداخلات و برنامه های آموزشی بعدی محسوب می شود.

قرار گرفته است. از آنجا که تحصیل برای همه افراد جامعه الزامی است و دانش آموزان در امور مدرسه جدیت به خرج می دهند، غربالگری به کمک دانش آموزان، راهکار مناسبی به نظر می رسد [۶]. در این مطالعه، کلاً ۸۶٪ دانش آموزان در تکمیل کردن پرسشنامه ها و تحويل آنها همکاری نمودند که نشان دهنده مشارکت خوب دانش آموزان است.

امروزه بحث بر سر این است که خانواده های پرخطر جامعه باید مورد توجه و غربالگری ویژه قرار گیرند، چرا که مطالعات نشان داده اند که ۷۵٪ حوادث قلبی عروقی تنها در ۱۴٪ خانواده ها رخ می دهند و این نشان می دهد که کسر کوچکی از جامعه، بار عظیمی از CVD را به دوش می کشد. این موضوع اهمیت شناخت هرچه سریعتر این خانواده های پر خطر و پیگیری و آموزش این گروه از سنین پایین را مورد تأکید قرار می دهد [۵، ۷]. در مطالعات مختلف نشان داده شده که سابقه خانوادگی یک عامل پیشگویی کننده مناسب برای شناخت خانواده های پرخطر است [۴، ۵-۹]، زیرا در ساقه فامیلی مجموع عوامل ژنتیکی و محیطی شامل شیوه زندگی مورد بررسی قرار می گیرد. با این روش همچنین می توان افراد در معرض خطر خانواده های پر خطر را تشخیص داد که این افراد، گروه هدف برای مداخلات آموزشی و تغییر شیوه زندگی می باشند. در مطالعه ما ۸۶٪ دانش آموزان پرسشنامه سابقه خانوادگی را تحويل دادند که از میان پرسشنامه ها، ۴۰٪ دارای سابقه خانوادگی مثبت بودند. در مطالعه Koski در فنلاند، ۳۲٪ خانواده ها سابقه خانوادگی مثبت داشتند [۹].

برای بررسی میزان مشارکت خانواده ها بر حسب وجود و یا عدم وجود سابقه خانوادگی مثبت، این دو گروه در دو دوره متفاوت به بیمارستان شریعتی دعوت شدند که از میان خانواده های با سابقه خانوادگی مثبت، ۷۲٪ مراجعه

ماخذ

- Nathan D. Wong, Ph. D., F.A.C.C, Henry R. Black, M.D, F.A.C.P., Julius M. Gardin, M.D., F.A.C.C, F.A.C.P. *Preventive cardiology*. 1st Edition, McGraw-Hill Inc. 2000

- Denise G. Simons-Morton, M.D., Ph.D., Jeffrey, A. Cutler, M.D., MPH. *Cardiovascular Disease Prevention Research at the National Heart, Lung, and Blood Institute*. *Am J Prev Med* 1998; 14:

- 317-330.
3. Robert O. Bonow, M.D., Lynn A. Smaha, M.D. , Ph.D.; Sidney C. Smith, Jr, m.d.; George A. Mensah, M.D.; Claude Lenfant, M.D. World Heart Day 2002: The International Burden of Cardiovascular Disease: Responding to the Emerging Global Epidemic. *Circulation* 2002; 106: 1602-1605.
 4. Steven Hunt phD, Mara Gwinn M.D. Family History Assesment: strategies for prevention of cardiovascular dis. *Am J of prev Med* 2003; 24: 136-142.
 5. Sharon L.R , Kardia, phD, Stephan M.D , Patricia A. Peysen phD family-centered Approaches to understanding and preventing coronary Heart diseas. *Am J prev Med* 2003; 24: 143-151.
 6. Nicklas et al. School-based program for health-risk reduction. *Annals of the New York academy of science* 1997; 817: 208-224.
 7. Roger Williams M.D et al. Usefullness of cardiovascular family history data for population-based preventive medicine and medical research
 - (The health family tree study and the NHLBI family heart study). *Am J Cardiol* 2001; 87: 129-135.
 8. Linda E. Muhonen M.D-Trudy L. Burns ph.D. Coronary risk factors in adolescents related to their knowledge of familial coronary heart dis. and hypercholesterolemia—The Muscatine study. *Pediatrics* 1994; 93: 444-451.
 9. Keijo Koski et al. Predictors of coronary heart dis. among children and adolescents in families with premature coronary heart dis. in central eastern Finland. *Scand J prim health care* 2000; 18: 170-176.
 10. CL shear, LS webber. The relationship between parental history of vascular disease and cardiovascular disease risk factors in children. *American Heart association, Inc.* 2001; 103: 1369.
 11. Johnson and Nichlas. CVD Risk in parents of children with elevated Blood pressure, "Heart Smart"- family health promotion. *J Clin Hypertension* 1987; 3: 559-66.