

بررسی عیار اتوآنتی بادی علیه انواع LDL تغییر یافته در بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی

صدیقه عسگری*^۱، مژگان قاری‌پور^۲، غلامعلی نادری^۳، بابک ثابت^۴، علیرضا خسروی^۵، محمد هاشمی^۶

چکیده

مقدمه: آترواسکلروز، فرآیندی است که با هیپرکلسترولمی و ایجاد fatty streak آغاز می‌گردد. همچنین مطالعات قبلی نقش سیستم ایمنی را در این روند نشان داده‌اند. LDL (لیپوپروتئین با دانسیته کم) می‌تواند دچار تغییراتی گردد که از جمله مهمترین آنها اکسیداسیون می‌باشد. سیستم ایمنی، علیه LDL اکسید جدید تولید شده آنتی‌بادی اختصاصی می‌سازد. تیترا اتوآنتی‌بادی مذکور در جمعیت‌های انسانی به‌عنوان روشی تشخیصی در شناخت میزان پیشرفت آترواسکلروز بکار می‌رود. رابطه‌ای بین افزایش تیترا اتوآنتی‌بادی علیه اکسید LDL و نیز افزایش وقوع بیماری قلبی عروقی نشان داده شده است. در این مطالعه میزان اتوآنتی‌بادی علیه LDL اکساید (MDA-LDL، Cu²⁺-LDL) و Native-LDL در بیماران آنژیوگرافی غیرطبیعی و آنژیوگرافی طبیعی و گروه شاهد مورد مقایسه قرار گرفته است.

روش‌ها: این مطالعه به شیوه موردی-شاهدی در سه گروه بیماران با آنژیوگرافی غیر طبیعی (دارای گرفتگی عروق کرونر)، بیماران با آنژیوگرافی طبیعی و افراد ظاهراً سالم بعنوان گروه شاهد انجام شد. تعداد نمونه در هر گروه ۲۰ نفر بود. تیترا اتوآنتی‌بادی علیه اکسید LDL گروه‌های مختلف با روش الیزا تعیین و سپس توسط آزمون آماری ANOVA مقایسه گردید.

یافته‌ها: نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که میانگین جذب مشاهده شده در مورد اتوآنتی‌بادی علیه اکسید LDL ناشی از مالون‌دی‌آلدید در گروه‌ها بترتیب برابر با ۰/۴۱۵±۰/۳۶۱، ۰/۳۶۱±۰/۳۶۱، ۰/۰۹۳±۰/۰۷۸ می‌باشد (p<۰/۰۰۵). مقدار اتوآنتی‌بادی علیه Native-LDL و نیز Cu²⁺-LDL تفاوت معنی‌داری نداشته است.

نتیجه‌گیری: از آنجا که مقادیر اتوآنتی‌بادی علیه اکسید LDL بطور معنی‌دار در گروه آنژیوگرافی غیرطبیعی از افراد به ظاهر سالم و نیز افراد با آنژیوگرافی طبیعی بالاتر است، بنابراین تعیین مقادیر آنتی‌بادی جهت تشخیص بالینی سریع میزان پیشرفت آترواسکلروز مفید می‌باشد.

واژگان کلیدی: بیماری‌های قلبی عروقی، اتوآنتی‌بادی LDL اکساید، الیزا

- ۱- Ph.D فارماکولوژی، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- ۲- MSc بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- ۳- Ph.D بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- ۴- M.D، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- ۵- متخصص قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- ۶- فوق تخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

***نشانی:** اصفهان، میدان جمهوری اسلامی، خیابان خرم، مرکز درمانی تحقیقاتی صدیقه طاهره^(س)، صندوق پستی: ۸۱۴۶۵-۱۱۴۸؛ تلفن: ۳۳۵۹۶۹۶ و ۳۳۵۹۷۹۷-۰۳۱۱؛ نامبر: ۳۳۷۳۴۳۵-۰۳۱۱؛ پست الکترونیک: crc@mui.ac.ir

مقدمه

چگونگی فرآیندی که منجر به آترواسکلروز می‌شود، هدف تحقیقات بی‌شماری بوده و اکنون بسیاری از عوامل مؤثر در ایجاد آترواسکلروز شناخته شده‌اند. ظهور سلول‌های کف‌آلود در سطح آندوتلیوم، اولین علامت ایجاد ضایعه آترومی است [۱]، ماکروفاژهای خونی، سلول‌های ماهیچه‌ای صاف، مونوسیت‌ها و نیز ذرات لیپوپروتئینی به‌ویژه لیپوپروتئین با وزن ملکولی کم (LDL) در ایجاد سلول‌های کف‌آلود نقش دارند [۲]. از سوی دیگر LDL می‌تواند در معرض تغییراتی همچون اکسیداسیون، استیل‌اسیون و یا متیلاسیون واقع شود [۳]. اخیراً نقش آنتی‌ژنی لیپوپروتئین‌های تغییر یافته به‌ویژه LDL اکساید (OX-LDL) در ایجاد آترواسکلروز به اثبات رسیده است. LDL تغییر یافته از آنجا که پروتئین خارجی است لذا دارای خاصیت ایمنوژن است و می‌تواند سیستم ایمنی را به ساختن آنتی‌بادی اختصاصی تحریک کند [۴]. امروزه نشان داده شده است که سازوکارهای ایمنی در ایجاد و توسعه آترواسکلروز اثر دارند [۵]. آنتی‌ژن‌های متعددی در این واکنش‌های ایمنی نقش داشته‌اند [۶ و ۷] به طوری که اهمیت آنتی‌بادی‌های ضد LDL اکساید (OX-LDL) در مطالعات مختلف حیوانی و انسانی، در ایجاد آترواسکلروز مشخص شده است [۸-۱۰]. ولی به هر حال هنوز ارتباط دقیق بین اتوانتی‌بادیهای (OX-LDL) در جریان خون و آترواسکلروز مشخص نگردیده است. بسیاری از مطالعات موردی-شاهدی افزایش این آنتی‌بادی را در بیماران مبتلا به آترواسکلروز نشان داده‌اند [۱۱-۱۴]. اما در برخی از مطالعات نیز چنین ارتباطی نشان داده نشده است [۱۵ و ۱۶]. با توجه به اختلاف گزارش‌هایی که در این مورد وجود داشته است، هدف این مطالعه مقایسه میزان اتوانتی‌بادی علیه LDL اکساید توسط مس (LDL-OX-(Cu²⁺)) و LDL اکساید توسط مالون دی‌آلدیید (MDA-OX-LDL) و نیز اثر آنتی‌بادی علیه LDL (Native-LDL) در بیماران با آنژیوگرافی مثبت و آنژیوگرافی منفی و گروه کنترل بوده است.

روش‌ها

این مطالعه از نوع مقطعی مورد-شاهدی می‌باشد. دو گروه از بیماران آنژیوگرافی مثبت و آنژیوگرافی منفی مجموعاً ۴۳ نفر بیمار مرد و زن (بدون محدودیت سن و جنس) مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان چمران اصفهان انتخاب شدند. گروه اول شامل بیمارانی بود که دچار گرفتگی عروق بودند و گروه دوم بیمارانی که آنژیوگرافی هیچ‌گونه گرفتگی را در آنان نشان نداد. گروه سوم متشکل از ۲۳ نفر افراد سالم بود (بدون سابقه دیابت، کلسترول و یا تری‌گلیسرید بالا). بیماران با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد AMI از مطالعه حذف شدند. آنژیوگرافی توسط روش استاندارد از طریق شریان فمورال راست انجام گردید، تشخیص و تعیین آنژیوگرافی مثبت و منفی بر اساس تعاریف انجمن قلب آمریکا^۱ انجام شد. نمونه‌های خونی متعاقب ۱۴ ساعت ناشتا بودن و روز قبل از انجام آنژیوگرافی جمع‌آوری گردید.

جداسازی لیپوپروتئین‌ها و تغییرات در آنها

LDL با دانسیته $1.063 < d < 1.019$ g/ml توسط اولتراسانتریفوژ با کمک شیب غلظتی KBr از جمع‌آوری سرم ۱۰ نفر داوطلب سالم جداسازی شد [۱۷] و میزان پروتئین موجود در LDL با متدلوژی تعیین گردید. به منظور اکسیداسیون LDL توسط مس از روش Steinbrecher et al استفاده گردید [۱۸]. جهت تهیه اپی‌توب MDA-LDL از MDA تازه تهیه شده مطابق روش Fogleman استفاده شد. کلیه مراحل روی یخ انجام گرفت [۱۹].

تعیین مقادیر اتوانتی‌بادی علیه Cu²⁺-LDL و

MDA-LDL

روش انتخابی، شیوه غیر رقابتی الایزا (non-competitive enzyme-linked immunosorbent) است. ۱/۳ پلیت مخصوص الایزا ۹۶ خانه‌ای با ۱۰۰ میکرولیتر از Cu²⁺-LDL، ۱/۳ دوم با ۱۰۰ میکرولیتر از MDA-LDL

¹ American Heart Association

یافته‌ها

نتایج بدست آمده نشان داده است که مقدار اتوانتی‌بادی علیه MDA-LDL در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق (با آنژیوگرافی مثبت) برابر با $3/551 \pm 0/451$ و در گروه بیماران قلبی بدون گرفتگی عروق برابر با $0/361 \pm 0/20$ و در گروه افراد شاهد (بدون سابقه ابتلا به بیماری قلبی) برابر $0/093 \pm 0/078$ می‌باشد که تفاوت بین گروه‌های مختلف با گروه شاهد از لحاظ آماری معنی‌دار است (جدول ۱). مقدار اتوانتی‌بادی علیه Native-LDL در گروه بیماران شاهد در حد بیشترین مقدار و در گروه بیماران با آنژیوگرافی مثبت در حداقل مقدار موجود است که نمایانگر تبدیل LDL به OX-LDL می‌باشد و نهایتاً منجر به تشکیل مقادیر بیشتر اتوانتی‌بادی علیه OX-LDL می‌شود. تفاوت مقادیر اتوانتی‌بادی علیه Cu^{+2} -LDL بین گروه‌های مختلف قابل ملاحظه نمی‌باشد (اشکال ۳-۱).

بحث


مطالعه حاضر نشان می‌دهد که میزان اتوانتی‌بادی علیه MDA-LDL در گروه بیماران با آنژیوگرافی مثبت بطور معنی‌داری بیش از سایر گروه‌ها می‌باشد. این در حالی است که مطالعه سالونن و همکاران نیز ارتباط مستقیم بین اتوانتی‌بادی MDA-LDL و پیشرفت آترواسکلروز را نشان داده‌اند [۲۱].

(۵ $\mu\text{g/ml}$) در محلول بافر فسفات سالین (PBS) و $1/3$ آخر با native-LDL پوشانیده شد. جهت جلوگیری از اکسیداسیون native-LDL، از PBS حاوی $2/7$ میلی مولار EDTA و 20 میلی مولار بوتیل‌هیدروکسی تولوئن (BHT) استفاده گردید. پلیت به مدت 16 ساعت در دمای 4 درجه سانتیگراد انکوبه و پس از آن 4 بار با PBS حاوی 20 Tween $0/05$ ، 8 BSA، شستشو داده شد و سپس با 1 PBS حاوی 5 BSA بلوکه شد. پس از 2 ساعت انکوباسیون در حرارت اطاق، پلیت مجدداً 4 بار با PBS $0/1$ میلی مولار شستشو داده شد و پس از آن نمونه پلاسما که به صورت $1/20$ در 1 PBS میلی مولار حاوی BSA 2 رقیق شده بود؛ به کل خانه‌های پلیت اضافه و به مدت 2 ساعت در دمای اطاق انکوبه شد. سپس چهار بار با PBS $0/1$ میلی مولار حاوی (توئین 20 $0/05$ و BSA 2) شستشو داده شد. آنتی IgG F انسانی متصل به آنزیم پراکسیداز تهیه شده از انستیتو پاستور تهران به میزان 100 به هر چاهک افزوده و پس از آن سرم افراد که به صورت $1/3000$ در $0/05$ PBS حاوی توئین 20 و BSA $0/8$ به پلیت افزوده و 2 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه شد. پس از چهار بار شستن با 1 PBS میلی مولار، سوبسترای پراکسیداز (ارتو- فنیل‌دی‌آمین OPD) به مقدار 100 ml با غلظت 3 g/l به بافر سیترات $3/5$ میلی مولار حاوی پراکسید هیدروژن با $5/5$ pH افزوده شد. واکنش در تاریکی انجام گرفته و با افزودن 100 ml از 1 مولار HCl پس از 30 دقیقه متوقف شد. جذب کلیه چاهک‌ها در 492 nm خوانده شد [۲۰].


جدول ۱- مقایسه تیتراژ اتوانتی‌بادی علیه انواع LDL اکسید شده و نیز Native-LDL با روش الایزا

Auto Anti Cu^{+2} -LDL	Auto Anti Native-LDL	Auto Anti MDA-LDL	گروه
$0/252 \pm 0/101$	$0/046 \pm 0/014$	$3/551 \pm 0/415$ *	گروه آنژیوگرافی مثبت n=20
$0/239 \pm 0/146$	$1/076 \pm 0/626$	$0/361 \pm 0/20$ *	گروه آنژیوگرافی منفی n=20
$0/220 \pm 0/145$	$1/398 \pm 0/555$	$0/093 \pm 0/078$ *	گروه کنترل n=23


* $P < 0/05$



شکل ۱- مقایسه پراکندگی تیترا اتوانتی بادی علیه Native-LDL به روش الیزا



شکل ۲- مقایسه پراکندگی تیترا اتوانتی بادی علیه OX-LDL به روش الیزا (Cu²⁺-LDL)



شکل ۳- مقایسه پراکندگی تیترا اتوانتی بادی علیه OX-LDL به روش الیزا (MDA-LDL)

وجود دارد که به علت حضور غلظت‌های مختلف اپی‌توپ‌ها ناشی از روش آماده‌سازی می‌باشد. همچنین مطالعاتی نیز نشان داده است که اختلافاتی در واکنش آنتی‌بادی‌های OX-LDL هنگام استفاده از LDL اکسید شده توسط مس به عنوان آنتی‌ژن وجود دارد. چندین مطالعه موردی - شاهدهی نیز افزایش تیتراژ آنتی‌بادی علیه OX-LDL را در افراد مبتلا به بیماری عروق محیطی و افراد آنژیوگرافی مثبت نشان داده است [۲۷ و ۲۸]. در مطالعه‌ای میزان آنتی‌بادی علیه OX-LDL در افراد مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد با افراد کنترل مقایسه شده و نتایج نشان داده است که در تمامی افراد در زمان پذیرش، میزان آن نسبت به گروه کنترل به‌طور معنی‌دار ($p < 0.05$) افزایش داشته است و یک ماه بعد مقدار آن ($p < 0.01$) کاهش یافته و به حد طبیعی رسیده که این امر می‌تواند بیانگر اهمیت این عوامل خطر در شروع MI باشد [۲۹].

در مطالعه‌ای نیز مشخص شده است که میزان این آنتی‌بادی در دو گروه بیماران AMI و CAD با میزان گلبول‌های سفید همبستگی داشته ولی با میزان لیپید پروفایل ارتباطی نداشته است و بطور کلی میزان آنتی‌بادی‌های OX-LDL، گلبول‌های سفید و CRP در افراد AMI نسبت به CAD بالاتر بوده و قله منحنی غلظت کراتینیناز بطور معنی‌دار با میزان آنتی‌بادی OX-LDL در افراد AMI در رابطه است [۳۰]. اگرچه میزان آنتی‌بادی مذکور در بیماران به آئین ناپایدار نسبت به آئین پایدار بیشتر بوده، مقادیر اکسی‌استرول‌ها در این دو گروه تفاوتی نداشته است که می‌تواند ناشی از تولید بیش از حد OX-LDL در افراد مبتلا به آئین ناپایدار باشد. با توجه به نقش گسترده‌ای که انواع OX-LDL در ایجاد و توسعه بیماری‌های قلبی عروقی دارد، لذا ضروری به نظر می‌رسد مطالعاتی در جهت تعیین عملکرد گیرنده‌های ملکولی OX-LDL انجام گیرد.

سپاسگزاری

این پژوهش بر اساس طرح تحقیقاتی شماره ۷۷۰۰۴ با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده و مؤلفین مراتب تقدیر و تشکر خود را از آن معاونت اعلام می‌دارند.

در برخی مطالعات نیز عدم تغییر آنتی‌بادی علیه MDA-LDL در گروه‌های بیمار و کنترل نشان داده شده است. این گوناگونی ناشی از متدهای اندازه‌گیری آنتی‌بادی است [۲۲]. زیرا در برخی از مطالعات از متد رادیوایموناسی و برخی دیگر از متد الایزا استفاده شده است. به طور کلی فقدان روشهای استاندارد و یکسان در اندازه‌گیری این فاکتور توسط گروههای مختلف می‌تواند علت این تفاوت باشد [۲۳]. علاوه بر این، تعریف آترواسکلروز بین مطالعات مختلف متفاوت است. آنچه مهم است این‌که پاسخ‌های ایمنی، بسته به مرحله بیماری می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال در موش‌های Apo E knockout در مرحله تشکیل fatty streak، پاسخ ایمنی به OX-LDL بسیار قوی است در صورتی که در سایر مراحل تشکیل پلاک این پاسخ کندتر می‌شود [۲۴]. پلاک‌های تازه حاوی سلول‌های کف‌آلود^۱ و نیز OX-LDL هستند و احتمالاً سبب افزایش پاسخ ایمنی، علیه خود می‌شوند و بیشتر از پلاک‌های آهکی سیستم ایمنی را تحریک می‌کنند [۲۴]. همچنین مطالعات مختلف نشان داده است تحت شرایط طبیعی سیستم ایمنی نقش‌های مختلفی را در آترواسکلروز ایفا می‌کند. تحت شرایط پاتولوژیک سخت مثل هیپرکلسترولمیای شدید، این نقش ممکن است بوسیله لیپوپروتئین‌های پروآتروژن تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین اهمیت پاسخ‌های آنتی OX-LDL می‌تواند متفاوت باشد.

مطالعاتی نیز نشان داده است که میزان آنتی‌بادی علیه MDA-LDL در طول دو سال مطالعه ارتباطی با میزان پیشرفت آترواسکلروز کاروتید گردن نداشته است [۲۶]. مطالعه حاضر نشان داده است که در بین سه گروه مورد مطالعه، میزان آنتی‌بادی علیه Cu^{+2} -LDL تفاوت معنی‌داری نداشته است. مطالعه سالونن و همکارانش نیز مؤید نتایج این مطالعه می‌باشد. وی اعلام داشت تفاوت معنی‌داری بین میزان آنتی‌بادی علیه Cu^{+2} -LDL در گروه‌های مختلف وجود نداشته است که احتمالاً ناشی از دانسیته کم اپی‌توپ‌های غالب آنتی‌بادی‌های OX-LDL می‌باشد. با توجه به مطالعات انجام شده، تنوع زیادی در تیتراژ آنتی‌بادی‌های نمونه‌های سرمی یکسان

¹ Foam cell

مآخذ

1. Steinberg D, Parthasarathy S, Carew TE, Khoo JC, Witztum JL. Beyond cholesterol: modifications of low density lipoprotein that increase its atherogenesis. *N Engl Med* 1989; 320: 915-24.
2. Newby AC, Libby P, Venereal AC. Plaque instability the real challenge for atherosclerosis research in the next decade? *Cardiovascular. Res.* 1999; 41: 321-322.
3. Cross C. Oxygen radical and human disease. *Ann. Int. Med.* 1987; 107: 326-545.
4. Hörrkkö S, Binder C, J Shaw PX, Chang M K, Silverman G, Palinski W. Role of oxidation in Atherosclerosis Free radical, *biol. med.* 2000; 28: 1771-1779.
5. Ross, R. Atherosclerosis an inflammatory disease. *N. Engl. J. Med.* 1999; 340: 115-126.
6. Witztum J. L. Pulaski W. Are immunological mechanisms relevant for the development of Atherosclerosis? [editorial]. *Immunol.* 1999; 90: 153-156.
7. Abraham, R. Choudhury, A. Bal, V. Rath S. Disruption of T cell tolerance by directing a self antigen to I macrophage-specific scavenger receptors. *J. Immune.* 1997; 158: 4029- 4035.
8. Witztum, I. L.; Steinbrecher, U. P.; Kesiniemi, Y. A.; Fisher, M. Autoantibodies to glycosylated proteins in the plasma of patients with diabetes mellitus. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 1984; 81: 3204-3208.
9. Steinbrecher, U. P.; Fisher, M.; Witztum, I. L.; Curtis, L. K. Immunogenicity of homologous low density lipoprotein after methylamine, ethylating, acetylating, or carbamylation: generation of antibodies specific for derivative lysine. *J. Lipid Res.* 1984; 25: 1109-1116.
10. Palinski, W. Rosenfeld, M. E. Ylii-Herttuala, S. Gurtner, G. C. Socher, S. S. Butler, S. W. Parthasarathy, S. Carew, T. E. Steinberg, D. Witztum, I. L. Low density lipoprotein undergoes oxidative modification in vivo. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 1989; 86: 1372-1376.
11. Bui M. Sack M. Moutsatsos G, Lu D, Katz P, McCown R, Breall J, Rackley C. Autoantibody titers to oxidized low-density lipoprotein in patients with coronary atherosclerosis. *Am Heart J.* 1996; 131: 663-667.
12. Maggi E. Marchesi E. Ravetta V. Martignoni A, Finardi G, Bellomo G. Presence of autoantibodies against oxidatively modified low-density lipoprotein in essential hypertension: a biochemical signature of an enhanced in vivo low-density lipoprotein oxidation. *J Hypertens.* 1995; 13: 129-138.
13. Bergmark C, Wu R, de Faire U, Lefvert AK, Swedenborg J. Patients with early-onset peripheral vascular disease have increased levels of autoantibodies against oxidized LDL. *Arterioscler Thromb Vasc Bio*, 1995; 15: 441-445.
14. Puurunen M, Manttari M, Manninen V, Tenkanen L, Alfthan G, Ehnholm C, Vaarala O, Aho K, Palosuo T. Antibody against oxidized low-density lipoprotein predicting myocardial infarction. *Arch Intern Med.* 1994; 154: 2605-2609.
15. Uusitupa M, Njiskanen L, Luorna J, Vilja P, Mercuri M, Raurarnaa R, Yla-Herttuala S. Autoantibodies against oxidized LDL do not predict atherosclerotic) vascular disease in non-insulin-dependent diabetes mellitus. *Arterioscler Thromb Vasc Biol.* 1996; 16: 1236-1242.
16. Van de Vijer L, Steyger R, Poppel G, Boer J, Kruijssen D, Seidell J, Princen H. Autoantibodies against MDA-LDL in subjects with severe and minor atherosclerosis and healthy population controls. *Atherosclerosis.* 1996; 122: 245-253.
17. Lopes-virella M, Koskinen S, Mironova M, Horne D, Klein R, Chassereau C, Enockson C, Virella G. The preparation of Copper-oxidized LDL for measurement of oxidized LDL for measurement of oxidized LDL antibodies by EIA. *J Atherosclerosis* 152(2000)-107-115.
18. Steinbrecher UP. Oxidation of human low density lipoprotein results in derivatization of lysine residues of apolipoprotein B by lipid peroxide decomposition products. *J Biol Chem* 1987, 262: 3603-8
19. Harberland M.E. Fogelman A.M. Edwards S.p. Specificity of receptor-mediated recognition of Malondialdehyde modified low density lipoproteins. *Procs. Natl. Acad. Sci.* 1982; vol. 79, march. 1712-1716.
20. Fogelman A.M. Shechter I. Sager J. Hickman M. Child J s. Edwards P.A. 1980. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 1980; 77.
21. Palinski W, Rosenfeld ME, Yla-Herttuala S et al. Low density lipoprotein undergoes oxidative modification in vivo. *Proc Natl Acad Sci*: 1989. 86. 1372-1376
22. Salonen, I. T. Ylii-Herttuala, S. Yamamoto, R. Butler, S. Carpel, H. Salonen, R. Nyysönen, K. Palinski, W. Witztum, I. L. Autoantibody against oxidized LDL and progression of carotid Atherosclerosis. *Lancet* 1992; 339: 883-887.
23. Hanson G.K. Cell mediated immunity in Atherosclerosis. *Curr. Opin. Lipidol.* 1999; 8: 301-311.
24. Palinski W, Horkko S, Miller E, Steinbrecher UP, Powell HC, Curtiss LK, Witztum JL. Cloning of monoclonal autoantibodies to epitopes of oxidized lipoproteins from apolipoprotein E-deficient mice: demonstration of epitopes of oxidized low density lipoprotein in human plasma. *J Clin Invest.* 1996; 98: 800-814.
25. Libby, P. Hanson G. K. Pober J. S. Atherogenesis and inflammation. In: Chien, K. R. Molecular basis of cardiovascular atherosclerosis. *Curr. Opin. Lipidol* 1997; 8: 301-311.
26. Virella G, Yirella I, Leman RB, Pryor MB, Lopcs-Virella MF. Anti-oxidized low-density lipoprotein antibodies in patients with coronary heart disease and normal healthy volunteers. *Int J Clin Lab Res* 1993; 23: 95-101.

27. Ylii-Herttuala, S. Palinski, W. Rosenfeld, M. E. Parthasarathy, S. Carew, T. E. Butler, S. Witztum, I. L. Steinberg, D. Evidence for the presence of oxidatively modified low density lipoprotein in atherosclerotic lesions of rabbit and man. *J. Clin. Invest.* 1989; 84:1086-1095.
28. Reaven, P. D. Napoli, C. Merat, S. Witztum, I. L. Lipoprotein modification and Atherosclerosis in aging. *Exp. Gerontol.* 2000; 34:527- 537.
29. Inone T, Yaguchi I, Uchida T, Kamishirado H, Nakahara S, Hagashi T, Morooka S. Clinical significance of the antibody against oxidized low-density lipoprotein in acute myocardial infarction. *Cardiology*, 2002; 98(1-2): 13-17.
30. Tsai WC, Li YH, Chao TH, Chen JH. Relation between antibody against oxidized LDL and extent of coronary atherosclerosis. *J Formoss Med Assoc* 2002; Oct, 101(10): 681-4.