

بررسی ارتباط دو پلی مورفیسم ژن آدیپونکتین (A/G+45) و (G/A-11391) با دور کمر و دیابت نوع ۲ در یک جمعیت ایرانی

یلدا رومی^۱، مهسا محمد آملی^۱، شیرین حسنی رنجبر^{۱*}، پریسا بالایی^۱، محمدعلی سجادی^۱، باقر لاریجانی^۱

چکیده

مقدمه: آدیپونکتین، یک پروتئین مترشحه از بافت چربی است که طبق مطالعات متعددی که پیش از این انجام شده است سطوح پلاسمایی آن با پارامترهای مختلف سندروم متابولیک در ارتباط است. به نظر می‌رسد این اثر، نتیجه بر هم کنش ژنتیک (پلی مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی در ژن آدیپونکتین) با عوامل محیطی (چاقی) باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی احتمال همراهی دوپلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن آدیپونکتین در موقعیت‌های +45 و -11391 با افزایش دور کمر و دیابت شیرین نوع دو در یک جمعیت ایرانی انجام شده است.

روش‌ها: این مطالعه به روش مورد-شاهدی با انتخاب ۲۴۳ بیمار دیابتی به عنوان گروه مورد و ۱۷۳ فرد سالم به عنوان گروه شاهد انجام شده است. پس از استخراج DNA، تعیین ژنوتیپ به روش PCR-RFLP انجام شد.

یافته‌ها: ما همراهی معنی‌داری بین پلی مورفیسم T/G+45 و ژن آدیپونکتین با دور کمر مشاهده نکردیم. در افراد دیابتی بالای ۴۰ سال همراهی معنی‌داری بین افزایش دور کمر با پلی مورفیسم A/G-11391 و ژن آدیپونکتین مشاهده شد ($P=0.024$). نتیجه گیری: به نظر می‌رسد نقش پلی مورفیسم G/T+45 در ایجاد دیابت نوع ۲ غیر وابسته به چاقی شکمی باشد و نقش پلی مورفیسم A/G-11391 در ایجاد دیابت نوع ۲ در سن بالای ۴۰ سال وابسته به چاقی شکمی (دور کمر >90) است.

واژگان کلیدی: آدیپونکتین، پلی مورفیسم، دیابت ۲، چاقی شکمی

۱- مرکز تحقیقات غدد/پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران

*نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، کد پستی ۱۴۱۱۴۱۳۱۳۷ تلفن: ۰۲۷-۸۸۲۲۰۰۵۲، نمایر: ۸۸۲۲۰۰۵۲، پست الکترونیک: sh_hasani@sina.tums.ac.ir

از ۱۱۳۷۷ و G/T و +۴۵T/G می‌باشدند [۲۹]. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم‌های ۲ منطقه شایع ژن آدیپونکتین (۴۵ و +۴۵) با دور کمر (شاخص چاقی شکمی) و دیابت نوع ۲ در یک جمعیت ایرانی است.

روش‌ها

جمعیت مورد مطالعه

روش مطالعه، مورد شاهدی است. گروه مورد شامل ۲۴۳ بیمار دیابتی نوع ۲ است که بطور تصادفی از مراجعه کنندگان به کلینیک دیابت شهر رفسنجان انتخاب شده‌اند و گروه شاهد شامل ۱۷۳ فرد سالم است که از جمعیت سالم همان شهر انتخاب شده‌اند. (جمعیت مورد مطالعه همان جمعیت مورد بررسی در ۲ مطالعه قبلی گروه است) [۲۵،۳۰]. معیارهای ورود به مطالعه: ابتلا به دیابت نوع ۲، سن بالای ۳۰، نژاد فارس و معیارهای خروج از مطالعه: ابتلا به دیابت نوع ۱ و نژاد غیر فارس بودند.

تشخیص دیابت براساس معیارهای انجمان دیابت آمریکا گذاشته شد [۳۱]. پس از اخذ رضایت‌نامه، ابتدا یک پرسشنامه در خصوص اطلاعات فردی و دموگرافیک برای شرکت کنندگان تکمیل شد. سنجش دور کمر در حالت ایستاده و توسط یک همکار ثابت براساس اندازه‌گیری وسیع ترین ناحیه لبه تحتانی دنده تحتانی و کرست ایلیاک و با واحد سانتی‌متر صورت گرفت و معیار چاقی شکمی به عنوان عامل خطر ابتلا به دیابت نوع دو با توجه به نتایج مطالعات قبلی در آسیا، دور کمر بیش از ۹۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شد [۳۲-۲۲،۳۵]. از افراد تحت مطالعه نمونه خون در لوله حاوی ETDA به میزان ۵-۳ cc به منظور نگهداری در دمای ۲۰-درجه سانتی‌گراد و استخراج DNA آن تهیه شد. مطالعه حاضر توسط کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد تأیید قرار گرفت.

مقدمه

امروزه چاقی وابسته به تغذیه و ایجاد سندروم متابولیک به عنوان یک مشکل بهداشتی جهانی مطرح است [۲۰]. آدیپونکتین یک آدیپوکاین است که بطور اختصاصی از بافت چربی تمایز یافته ترشح می‌شود و سطح پلاسمایی آن با افزایش توده چربی به صورت معکوس کاهش می‌باید [۳،۴] و اثرات متابولیک بر متابولیسم چربی و گلوکز [۵]، اثرات ضد التهاب [۳] و آنتی آتروزئیک دارد [۶] و این اثرات را از طریق حسامی کردن بدن به انسولین اعمال می‌کند [۷،۸]. طی مطالعات متعددی سطح پلاسمایی آدیپونکتین در چاقی مدل‌های حیوانی [۹،۱۰] و انسان خصوصاً احساسی کاهش یافته است [۱۱-۱۳]. کاهش آدیپونکتین در پلاسما وابسته به عوامل متعددی است از جمله کاهش تولید و یا افزایش پاکسازی از خون (کلیرانس) توسط کبد.

علاوه بر عوامل ژنتیکی مؤثر بر سطح پلاسمایی آدیپونکتین (مثل پلی مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی ژن آدیپونکتین)، عوامل محیطی مثل حذف رژیم غذایی پرچرب که کلیرانس آدیپونکتین را به تاخیر می‌اندازد [۱۴] و رژیم غذی از کربوهیدرات که با سطوح پایین آدیپونکتین ارتباط دارد [۱۵] نیز به نظر می‌رسد بر سطح آدیپونکتین کمتر مطالعه شده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این میزان از رژیم‌های طولانی مدت (نه کوتاه مدت) اثر می‌پذیرد [۱۶،۱۷]. در برخی مطالعات ارتباط بین پلی مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی ژن آدیپونکتین (SNPs) با سطوح پلاسمایی آدیپونکتین بررسی و تأیید شده است [۱۸-۲۰]. فرضیه این است که بروز عوارضی مانند دیابت نوع ۲ در واقع ناشی از اثر تجمعی اختلال ژنتیک (SNPs ژن آدیپونکتین) با عوامل محیطی (چاقی) می‌باشد [۲۱-۲۳]. همراهی برخی پلی مورفیسم‌های ژن آدیپونکتین در افراد لاغر با ابتلا به دیابت نوع ۲ از نظر آماری بی معنی است [۲۴]. البته ارتباط پلی مورفیسم‌های مختلف ژن آدیپونکتین با دیابت نوع ۲ و چاقی در جمعیت‌های مختلف متفاوت است [۲۵-۲۸]. ژن آدیپونکتین پلی مورفیسم‌های گوناگونی دارد که بطور وسیع مورد مطالعه قرار گرفته‌اند که شامل G/A-۱۱۳۹۱ و G/C

گردید. همه روش‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار STATA ویرایش ۸ و SPSS ویرایش ۱۵ انجام شد.

یافته‌ها

در مطالعه ما میانگین \pm انحراف معیار استاندارد (SD) سن بیماران ۵۳ ± ۱۰ و گروه کترل ۴۱ ± ۹ سال بود. مقادیر استاندارد دور کمر در گروه مورد ۹۱ ± ۹ و در گروه شاهد ۹۷ ± ۱۱ سانتی‌متر بود. در دو گروه دیابتی و غیر دیابتی تفاوت فراوانی ژنتیک‌های مختلف موقعیت $+45$ ژن آدیپونکتین در مقایسه افراد دارای دور کمر بالای ۹۰ با دور کمر پایین ۹۰ از نظر آماری معنی دار نبود (جدول ۱). همچنین در مردم زنوتیپ‌های موقعیت -11391 نیز نتایج به همین گونه بود (جدول ۱). همین بررسی در افراد بالای ۴۰ سال نیز انجام شد که نتایج در جایگاه $+45$ به همین شکل فاقد اعتبار آماری بود (جدول ۲). ولی در موقعیت -11391 تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (جدول ۲) به این معنی که در افراد بالای ۴۰ سال فراوانی ژنوتیپ GG مربوط به پلی مورفیسم -11391 در بیماران دارای دور کمر بالای ۹۰ به طور معنی داری بیشتر از افراد دارای دور کمر پایین از ۹۰ cm بود ($P=0.02$, OR: $3/61$, CI: $0.95\% - 1.16\%$).

استخراج DNA و آنالیز مولکولی پلی مورفیسم ژن آدیپونکتین

از نمونه خون جمع‌آوری شده در لوله حاوی EDTA و با استفاده از روش salting out استخراج شد. آنالیز مولکولی پلی مورفیسم $+45$ T/G و -45 G/A به روش گرارش شده توسط Schaffer و همکاران انجام گرفت [۳۶]. برای آنالیز مولکولی پلی مورفیسم -11391 G/A روش PCR-RFLP استفاده شد.

upstream
S'-CATCAGAATGTGTGGCTTGC-3'
Down stream
پرایمر

S'-AGAACGAGCCTGGAGAACTG-3'
PCR پس از انکوباسیون توسط آنزیم MspI برش زده شد که پس از هضم آنزیم منجر به تولید قطعات 137 و 26 جفت باز (bps) در حضور آلل A شد. محصولات هضم بر روی ژن آگارز $3/5\%$ که با اتیدیوم بروماید رنگ‌آمیزی شده بود مورد بررسی قرار گرفت.

آنالیز آماری

معنی دار بودن اختلاف بین گروه‌های مختلف برای آللهای ژنوتیپ‌های ژن آدیپونکتین با نسبت شانس (OR) و با فاصله اطمینان (CI) 95% تخمین زده شد. میزان معنی دار بودن با آزمون Chi-square و فیشر (Fisher exact analysis) محاسبه شد.

جدول ۱- فراوانی ژنوتیپ‌های پلی مورفیسم ۴۵ T/G و -11391 G/A در دو گروه بیماران دیابتی و غیر دیابتی تفکیک شده براساس شاخص دور کمر

بیماران غیر دیابتی			بیماران دیابتی				
Total	WC ≤ 90	WC > 90	Total	WC ≤ 90	WC > 90		
۹۹(۶۹/۲۳)	۲۳(۵۸/۹۷)	۷۶(۷۳/۰۷)	۱۶۵(۷۰/۸۱)	۷۴(۶۹/۸۱)	۹۱(۷۱/۶۵)	TT	
۳۷(۲۵/۸۷)	۱۲(۳۰/۷۶)	۲۵(۲۴/۵۳)	۶۱(۲۶/۱۸)	۲۸(۲۶/۴۱)	۳۳(۲۹/۹)	TG	+۴۵
۷(۴/۸۹)	۴(۱۰/۲)	۳(۲/۸)	۷(۳)	۴(۳/۷۷)	۳(۲/۳۶)	GG	
۱۴۳(۱۰۰)	۳۹(۱۰۰)	۱۰۴(۱۰۰)	۲۳۳(۱۰۰)	۱۰۶(۱۰۰)	۱۲۷(۱۰۰)	Total	
۷۲(۵۰/۹۳)	۳۱(۹۳/۹۳)	۴۱(۹۳/۱۸)	۲۱۹(۹۳/۱۹)	۹۶(۸۹/۷۱)	۱۲۳(۹۶/۰۹)	GG	
۵(۶/۴۹)	۲(۶/۰۶)	۳(۶/۸۱)	۱۵(۶/۳۸)	۱۱(۱۰/۲۸)	۴(۳/۱۲)	GA	
			۱(۰/۴۲)	۰(۰)	۱(۰/۷۸)	AA	-11391
۷۷(۱۰۰)	۳۳(۱۰۰)	۴۴(۱۰۰)	۲۳۵(۱۰۰)	۱۰۰(۱۰۷)	۱۲۸(۱۰۰)	Total	

*No significant differences were observed.

جدول ۲. فراوانی ژنوتیپ پلیمورفیسم G/A - ۱۱۳۹۱ T/G + ۴۵ زن آدیپونکتین در دو گروه بیماران دیابتی و غیر دیابتی بالای ۴۰ سال تفکیک شده بر اساس شاخص دور کمر.

بیماران غیر دیابتی			بیماران دیابتی		
Total	WC≤ ۹۰	WC> ۹۰	Total	WC≤ ۹۰	WC> ۹۰
۹۲(۶۸/۶۵)	۲۲(۵۷/۸۹)	۷۰(۷۲/۹۱)	۱۴۹(۷۰/۲۸)	۶۷(۶۹/۷۹)	۸۲(۷۵/۶۸)
۳۵(۲۶/۱۱)	۱۲(۳۱/۵۷)	۲۳(۲۲/۹۵)	۵۶(۲۶/۴۱)	۲۵(۲۶/۰۴)	۳۱(۲۶/۷۲)
۷(۵/۲۲)	۴(۱۰/۵۲)	۳(۱۲/۳)	۷(۳/۳۰)	۴(۴/۱۶)	۳(۲/۵۸)
۱۳۴(۱۰۰)	۳۸(۱۰۰)	۹۶(۱۰۰)	۲۱۲(۱۰۰)	۹۶(۱۰۰)	۱۱۶(۱۰۰)
۶۸(۹۳/۱۵)	۳۰(۹۳/۷۵)	۳۸(۹۲/۶۸)	۱۹۹(۹۲/۹۹)	۸۶(۸۶/۶۵)	۱۱۳(۹۶/۵۸)*
۵(۶/۸۴)	۲(۶/۲۵)	۳(۷/۳۱)	۱۵(۷)	۱۱(۱۱/۳۴)	۴(۳/۴۱)
۷۳(۱۰۰)	۳۲(۱۰۰)	۴۱(۱۰۰)	۲۱۴(۱۰۰)	۹۷(۱۰)	۱۱۷(۱۰۰)
Total			Total		

در آزمون chi-square، $P < 0.05$ از نظر آماری معنی‌دار در نظر گرفته شد.

و $T/G + ۴۵$ در ۲۵۷۹ فرد در دو گروه چاق (۱۲۲۹) نفر و کترل (۱۳۵۰) نفر بررسی شدند که پس از آن ارتباط قوی بین پلیمورفیسم‌های C-۱۱۳۷۷ و $T + ۲۷۶$ با چاقی شدید یافت شد. هابلوتاپ‌های مرتبط با چاقی با سطوح بالای آدیپونکتین سرم همراه بودند که پیشنهاد دهنده ارتباط بین هایپر-آدیپونکتینیما با وزن‌گیری بود. همچنین در این بررسی پلیمورفیسم G/A-۱۱۳۹۱ با میزان بالاتر سطح سرمی آدیپونکتین در کودکان چاق همراه بود و به عنوان یک پیشنهاد گفته شده که شاید پلیمورفیسم A-۱۱۳۹۱ (Adypocyte collagen domain-containing) ACDC زیاد می‌کند [۲۰]. همچنین در یک بررسی در دانمارک ارتباط بین پلیمورفیسم A-۱۱۳۹۱ و چاقی شکمی دیده شده است [۲۷].

در یک بررسی دیگر در جمعیت هیسپانیک ۱۸ پلیمورفیسم زن آدیپونکتین از نظر ارتباط با چاقی با در نظر گرفتن ۶ معیار مختلف برای چاقی (BMI-دور کمر-نسبت دور کمر به لگن-بافت چربی زیر جلدی-بافت چربی احشایی-نسبت چربی احشایی به چربی زیر جلدی) بررسی شده‌اند که بین ۷ پلیمورفیسم با چاقی ارتباط پیدا شد. این ارتباط در پلیمورفیسم‌های تاکیه پرومتوژن بازتر بود [۳۸].

در یک جمعیت کره‌ای غیر دیابتیک بین پلیمورفیسم‌های $T/G + ۴۵$ و سطح سرمی آدیپونکتین و چاقی و مقاومت به انسولین ارتباط یافت شده است [۲۶]. که این یافته با یافته مطالعه ما مبنی بر عدم وجود رابطه آماری معنی‌دار بین پلیمورفیسم $+ ۴۵$ و افزایش دور کمر در

مقایسه فراوانی ژنوتیپ GG مربوط به پلیمورفیسم - ۱۱۳۹۱ در بیماران دیابتی تفکیک شده بر اساس شاخص دور کمر اختلاف معنی‌داری را نشان داد (۰.۹۵٪، CI: ۰.۲، OR: ۳/۶۱). (P=۰.۰۲).

بحث

هدف از این مطالعه، بررسی اثر دو پلیمورفیسم شایع زن آدیپونکتین (G/A-۱۱۳۹۱ T/G + ۴۵) بر اندازه دور کمر در افراد دیابتی و غیر دیابتی نژاد فارس بود. اندازه دور کمر به عنوان یک شاخص برای چاقی شکمی در نظر گرفته شده است. مطابق معیار (Adult treatment panel) ATPIII اندازه دور کمر بیشتر از ۱۰۲ برای مردان و بیش از ۸۸ برای زنان چاقی شکمی در نظر گرفته می‌شود و طبق معیار WHO دور کمر بیش از ۳۷ اینچ چاقی شکمی است [۳۵، ۳۷]. در این مطالعه با توجه به سایر مطالعات انجام شده در آسیایی‌ها خصوصاً جمعیت ایرانی عدد بیشتر از ۹۰ سانتی‌متر به عنوان چاقی شکمی در نظر گرفته شد [۲۲، ۲۳، ۳۲-۳۵] در مطالعه دیگری که توسط نویسنده‌گان همین مقاله انجام شده است، آلل A در پلیمورفیسم G/A-۱۱۳۹۱ فقط در زنان و آلل G در پلیمورفیسم T/G-۱۱۳۹۱ در هر دو جنس زنان و مردان نقش حمایتی در برابر افزایش وزن داشتند [۲۵].

اثر این پلیمورفیسم A-۱۱۳۹۱ در یک بررسی روی جمعیت فرانسوی تایید شده است در این بررسی اثرات پلیمورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی G/A-۱۱۳۷۷C/G-۱۱۳۹۱

ب DST آمده در مطالعه قبلی گروه [۲۵] که در تناقض با نتایج مطالعات انجام شده در کره [۲۶] و ایتالیا [۲۸] می‌باشد. با توجه به این که در یک مطالعه فرضیه تاثیر سن بر اثرات هایپوآدیپونکتینیما تایید شده است [۴۰] به نظر می‌رسد در مطالعه ما نیز این نتیجه در جمعیت ایرانی وجود پلی مورفیسم G/A ۱۱۳۹۱- تایید شده است چون اثر افزایش وزن آن در بالای ۴۰ سال از نظر آماری معنی‌دار بود. نهایتاً به نظر می‌رسد تکرار بررسی در یک جمعیت بزرگتر از نظر افزایش اعتبار نتایج بدست آمده مفید باشد. بررسی اثر سایر پلی مورفیسم‌های شایع در جمعیت ایران بر روی BMI و دور کمر و رابطه آن با بروز دیابت نوع ۲ نیز توصیه می‌شود.

سپاسگزاری

اجرای این مطالعه با حمایت مالی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. در نهایت از تمام همکارانی که در بیمارستان علی ابن ابیطالب و سازمان انتقال خون رفسنجان و آزمایشگاه ژنتیک مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان دکتر شریعتی تهران نهایت همکاری را مبذول داشتند، تشکر و قدردانی بجا می‌آوریم.

تناقض است. مشابه یافته مطالعه جمعیت کره‌ای در یک جمعیت ایتالیایی نیز تایید شده است که در این مطالعه نیز بین پلی مورفیسم +۲۷۶ و +۴۵ با مقاومت به انسولین و سایر شاخص‌های مربوط به آن از جمله افزایش وزن ارتباط معنی‌داری وجود دارد [۲۸].

البته در برخی مطالعات دیگر وجود رابطه خطی سطح پلاسمایی آدیپونکتین با BMI یا دور کمر کلاً رد شده است [۳۹، ۲۱]. در مطالعه قبلی گروه ایجاد دیابت تیپ ۲ در پلی مورفیسم T/G +۴۵ مستقل از چاقی و BMI ذکر شده است [۲۵]. در حالی که در برخی مطالعات قبلی پیشنهاد شده است که بروز عوارضی مانند دیابت نوع ۲ و پر فشاری خون به دنبال پلی مورفیسم‌های ژن آدیپونکتین وابسته به حضور چاقی هم زمان است. یعنی این عوارض در افراد لاغر وجود این پلی مورفیسم‌ها کمتر دیده می‌شود [۲۴].

این نتیجه به طور نسبی توسط نتایج بدست آمده در مطالعه ما تایید می‌شود. یعنی بروز دیابت نوع ۲ در افراد چاق (>۹۰ دور کمر) بالای ۴۰ سال وجود پلی مورفیسم ۱۱۳۹۱G/A- در ژن آدیپونکتین در جمعیت ایرانی بالاتر است. که مشابه نتایج مطالعات فرانسوی [۲۰] و دانمارکی [۲۷] و هیسپانیک [۳۸] می‌باشد. اما در مورد پلی مورفیسم +۴۵T/G این نتیجه بدست نیامد مانند نتایج

مأخذ

1. Reaven, G.M. The Insulin resistance syndrom: Definition and dietary approach to treatment. *Annu Rev Nutr* 2005; 25:391-406.
2. Despres J.P. Health consequences of visceral obesity. *Ann Med* 2001; 33: 534-541.
3. Hotamisligil G.S, Shargill N.S, Spiegelman B.M. Adipose expression of tumor necrosis factor- alpha: direct role in obesity-linked insulin resistance. *Science* 1993; 259: 87-91.
4. Yang Q, et al .Serum retinal binding protein 4 contributes to insulin resistance in obesity and type2 diabetes. *Nature* 2005; 436: 356-362.
5. Kershaw E.E, Flier J.S. Adipose tissue as an endocrine organ *J Clin Endocrinol Metab* 2004; 89: 2548-2556.
6. Lara-Castro C, FuY, Chung BH, Gravy WT. Adiponectin and the metabolic syndrome: mechanisms mediating risk for metabolic and cardiovascular disease. *Curr opin Lipidol* 2007; 18: 263-270.
7. Yamauchi T, Kamon J, Minokoshi Y, et al. Adiponectin stimulates glucose utilization and fatty-acid oxidation by activating AMP-
- activated protein kinases. *Nat Med* 2002; 8(11): 1288-95.
8. Berg AH, Combs TP, DU X, et al. The adipocyte-secreted protein Acrp 30 enhances hepatic insulin action. *Nat Med* 2001; 7(8): 947-53.
9. Hu E, Liang P, Spiegelman B.M, Adipo Q is a novel adipose-specific gene dysregulated in obesity. *J Biol Chem* 1996; 271: 10697-10703.
10. Hottak,et.al.Circulating concentrations of the adipocyteprotein adiponectin Are decreased in parallel with reduced insulin sensitivity during the progression to type2Diabetes in rhesus monkeys. *Diabetes* 2001; 50: 1126-1133.
11. Ryo M,et al Adiponectin as a biomarker of the metabolic syndrome. *Circ J* 2004;64:975-981.
12. Yatagai T, et al. Hypoadiponectinemia is associated with visceral fat accumulation and insulin resistance in Japanese men with type2 diabetes mellitus. *Metabolism* 2003; 52: 1274-1278.
13. YamamotoY, Hirose H, SaitoL et al. Adiponectin, an adipocyte-derived Protein, predicts future insulin-resistance: two-year follow up study in Japan-

- nese population. *J Clin Endocrinol Metab* 2004; 89: 87-90.
14. Nils Halberg, Todd D. Schraw, Zhao V. Wang et al. Systemicfate of the adipocyte-derived factor adiponectin. *Diabetes* 2009; 58(9): 1961-1970
 15. Hye Kyung Chung, RD, Jey Sook Chae et al. influence of adiponectin gene polymorphisms on adiponectin level and insulin resistance index in response to dietary intervention in overweight-obese patients with impaired fasting glucose or newly diagnosed type2 diabetes *Diabetes care* 2009; 32(4):552-558.
 16. Pischon T, Girmon CJ, Rifai N, et al. Association concentration in men. *Am J Clin Nutr* 2005; 81: 780-786.
 17. Nelson TL, Steven s JR, Hickey MS. Adiponectin levels are reduced, independent of polymorphisms in the adiponectin gene, after supplementation with alpha-linolenic acid among healthy adults. *Metabolism* 2007; 56(9): 1209-15
 18. Pollin TL, Tanner K, O'Connell J, et al. Linkage of plasma adiponectin levels to 3q27 explained by association with variation in the APM1 gene. *Diabetes* 2005; 54: 268-274.
 19. Heid IM, Wagner SA, Gohlke H, et al. Genetic architecture of the APM1 gene and its influence on adiponectin plasma levels and parameters of the metabolic syndrome in 727 healthy Caucasians. *Diabetes* 2006; 55: 375-384
 20. Bouatia-Naji N, Meyer D, Lobbens S, et al. ACDC/ Adiponectin polymorphisms are associated with severe childhood and adult obesity. *Diabetes* 2006; 55:545-550
 21. Altan Onat, Gulay Hergenc, Dursun Dursunoglu et al. Relatively high levels of serum adiponectin in obese women, a potential indicator of anti inflammatory - dysfunction :relation to sex hormone-binding globulin. *Int J Biol Sci* 2008; 4(4): 208-214.
 22. Masoud Amini, Mohsen Jan ghorbani. Diabetes and impaired glucose regulation in first degree relation of patients with type2 Diabetes in Isfahan, Iran: prevalence and risk factors. *The review Diabets studies* 2007;4:169-176
 23. Hadi Harati, Farzad Hadaegh et.al population-based incidence of type 2 Diabetes and its associated risk factors: results from a six-year cohort study in Iran. *BMC public health* 2009; 9: 186.
 24. Crimmins NA, Martin J. Polymorphisms in adiponectin receptor genes ADIPOR1 and ADIPOR2 and insulin resistance. *Obes Rev* 2007; 8:419-23.
 25. Shirin Hasani Ranjbar, Ozra Tabatabaei Malazy, Mahsa M Amoli et al. Adiponectin gene polymorphisms and type2 diabetes in an Iranian population .Gender differences in association between polymorphisms of gene with abdominal obesity. *IJPH* 2009; 9(2):116-122.
 26. Jang Y, Chae JS, Koh SJ, Hyon YJ, Kim JY, Jeong YJ, Park S, Ahn CM, Lee JH: The influence of the adiponectin gene on adiponectin concentrations and parameters of metabolic syndrome in non-diabetic Korean women. *Clin Chim Acta* 2008; 391: 85-90.
 27. Lanko LB, siddiq A, lecoeur C, et al. ACDC/ adiponectin and PPAR-gamma gene polymorphisms: Implications for features of obesity. *Obes Res* 2005; 13(12); 2113-21.
 28. Claudia Menzaghi, Tonino Ercolino et al. A Haplotype at the Adiponectin locus Is associated with obesity and other features of the insulin Resistance Syndrome. *Diabetes* 2002; si: 2306-2312.
 29. Gable OR, Matin J , Whittall R, et al. Common adiponectin gene variants show different effect on risk of cardiovascular disease and type2 diabetes in European subjects. *Ann Hum Genet* 2007;71(pt4):453-66.
 30. Shirin Hasani Ranjbar, Parvin Amiri, Issam Zineh, et al. CXCL5 Gene polymorphism association with diabetes mellitus. *Mol Diag Ther* 2008; 12(6): 391-394.
 31. The expert committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus .fallow up report on the diagnosis of diabetes mellitus. *Diabetes care* 2003;26(11):3160-7
 32. Farzad Hadaegh, Mohammad-Reza Bozorgmanesh et.al. High prevalence of undiagnosed Diabetes and abnormal glucose tolerance in the Iranian urban population: Tehran lipid and Glucose study. *BMC public health* 2008; 8: 176.
 33. Heshmat R, khashayar P, Meybodi HR et al. the appropriate waist circumference cut-off for Iranian population. *Acta Med Indones* 2010; (42) (4): 209-15.
 34. Mirmiran P, Esmaeil Zadeh A, Azizi F. Detection of cardiovascular risk factors by anthropometric measures in Iranian adults :receiver operating characteristic(ROC) curve analysis. *Eur J clin Nutr* 2004; 58:1110-1118
 35. James B Meigs. The metabolic syndrome (insulin resistance syndrome or syndrome X) 2009 Up to date [uptodate.com].
 36. Schaffler A, Buchler C, Muller-Lader U, et al. Identification of variables influencing resistant serum levels in patients with type1 and type2 diabetes mellitus. *Horm Metab Res* 2004; 36(10): 702-7.
 37. Grundy S, Cleeman J, Daniels S et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome. An American heart association / National heart, lung, and blood Institute scientific statement. *Circulation* 2005; 112:2735.
 38. Sutton BS, Weinert S, Langefeld CD et al. Genetic analysis of adiponectin and obesity in Hispanic families: The IRAS family study. *Hum Genet* 2005; 117: 107-118.
 39. Yasui T, Tomita J, Miyatani Y, et al. Associations of adiponectin with sex hormone binding globulin levels in aging male and female populations. *Clin Chim Acta* 2007; 386:69-75.
 40. Iwashima Y, Katsuya T, Ishikawa K, et al. Hypoadiponectinemia is an independent risk factor for hypertension. *Hypertension* 2004; 43:1318-23.