

شیوع چاقی و سندروم متابولیک در دختران ۱۸-۱۱ سال شهرستان رفسنجان، سال ۱۳۸۶

زینت سالم^{*}، رضا وزیری نژاد^۱

چکیده

مقدمه: چاقی شایع ترین علت مقاومت به انسولین و سندروم متابولیک در کودکان و نوجوانان است. این دو عامل مهمترین عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی هستند. این بررسی با هدف تعیین میزان شیوع چاقی و سندروم متابولیک در دختران ۱۸-۱۱ سال شهرستان رفسنجان طراحی شد.

روش‌ها: در این مطالعه مقطعي و توصيفي، جمعيت مورد مطالعه را كليه دانش آموزان دختر مقاطع راهنمائي و دبيرستانی شهرستان رفسنجان تشکيل می دادند. ۱۲۲۱ نفر با روش نمونه گيري چند مرحله ای و تصادفي ساده، انتخاب شدند. برای هر نفر يك پرسشنامه انفرادي شامل اطلاعات دموگرافيك تكميل گردید. سپس اطلاعات تن سنجي شامل وزن، قد و دور كمر ثبت و فشار خون از بازوی راست اندازه گيری شد. پس از تعیین شیوع چاقی، از ۷۶ نفر داوطلب چاق ۵CC خون ناشتا برای انجام آزمایش‌های قند، تری گلیسرید و HDL کلسترول جمع آوری گردید. با استفاده از معیار تشخيصی ATPIII میزان شیوع این سندروم محاسبه شد.

یافته‌ها: در این بررسی میانگین سنی دختران $14/34 \pm 1/7$ سال بود. $2/11\% - 4/12\%$ (٪ ۹/۴ - ٪ ۱۲/۴) نمونه‌ها دارای اضافه وزن و $4/2\% - 3/3\%$ (٪ ۰/۵ - ٪ ۰/۶) دارای چاقی بودند. $2/1/2\% - 1/1/8\%$ (٪ ۰/۶ - ٪ ۰/۸) از نمونه‌ها

دارای چاقی مرکزی بودند. در مجموع $3/9\%$ افراد (٪ ۵ - ٪ ۲/۸) با سندروم متابولیک شناسايی شدند.

نتيجه‌گيري: با توجه به وجود دو مشكل چاقی و سندروم متابولیک در دختران راهنمائي و دبيرستانی رفسنجان، پيشنهاد می شود اين میزان ها در کودکان دبستانی نيز بررسی شود و بر اساس نتایج بدست آمده برنامه ریزی‌های لازم انجام گيرد.

واژگان کلیدی: سندروم متابولیک ، چاقی ، دختران نوجوان

- گروه پژوهشی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

* نشانی: گروه پژوهشی اجتماعی، دانشکده پژوهشی، رفسنجان؛ تلفن: ۰۳۹۱۵۲۲۴۰۰۳؛ نماير: ۰۳۹۱۵۲۲۵۰۰۹، پست الکترونيک:

z_salem@rums.ac.ir

مقدمه

داد که ۳۰٪ نوجوانان در معرض خطر اضافه وزن و ۱۵٪ آنها دارای اضافه وزن هستند [۹]. میزان شیوع سندروم متابولیک در کودکان ۸-۱۹ ساله با خطر اضافه وزن ۶/۸٪ و در کودکان با اضافه وزن ۷ / ۲۸٪ گزارش شده است [۱۰]. اگرچه این سندروم در بالغین مطالعه شده است ولی در مورد کودکان و نوجوانان اطلاعات کمتری در دسترس است . نتایج مطالعات نشان داده که که تقریباً ۴٪ نوجوانان آمریکایی با خطر اضافه وزن دارای فنوتیپ سندروم متابولیک هستند. بعلت روند افزایش اضافه وزن و چاقی در چند دهه اخیر در امریکا احتمالاً شیوع فنوتیپ این سندروم نیز در حال افزایش خواهد بود [۱۱]. سایر مطالعات شیوع بالای دیابت نوع ۲ را نیز در کودکان و نوجوانان گزارش کرده اند [۱۲].

بعضی مطالعات وجود عوامل خطر را در جوانان نشان داده اند [۱۳] و علاوه بر آن فنوتیپ سندروم متابولیک در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن ۴ برابر بیشتر از نوجوانان در معرض خطر اضافه وزن گزارش شده است [۱۱]. هم چنین در نمونه های هیپرأنسولینیمیک نسبت به نمونه های نرموانسولینیمیک ۳۶ مرتبه اضافه وزن ۲/۵ برابر پرفشاری خون و ۳ برابر دیس لیپیدمی بیشتری مشاهده شده است و شیوع سندروم متابولیک نیز با چاقی افزایش نشان داده است [۱۵]. اختلال تحمل گلوکز در کودکان و نوجوانان چاق (بترتیب ۲۵٪ و ۲۱٪) نیز گزارش شده است [۱۶].

اگر چه این سندروم در کودکان و نوجوانان مشابه بالغین است اما توافقی روی تعیین این سندروم در کودکان وجود ندارد. بعضی محققین به استناد پانل سوم درمان بالغین (ATPIII)^۲ وجود سه شاخص از پنج شاخص را برای تشخیص این سندروم در کودکان لازم می دانند [۱۰]. ATPIII درمان کاهش خطر را به عنوان اهداف ثانویه تعیین نموده است [۱۰] و بهترین روش درمانی در زمینه کاهش عوامل خطر را تشخیص اولیه صحیح این سندروم می داند . بنابراین تعیین این سندروم در کودکان و نوجوانان به منظور برآورد میزان اهمیت این مشکل بهداشتی در جمیعت جوان ضروری خواهد بود [۱۵]. لذا با توجه به افزایش میزان مرگ

چاقی در میان کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می شود که می تواند به بیماری های مزمن تهدیدکننده منجر شود [۱]. افزایش وزن و چاقی مهمترین علت ایجاد کننده فشارخون نیز محسوب می گردد [۲]، علاوه بر آن با وجود چاقی هیپرتری گلیسریدمی و کاهش میزان HDL کلسترول نیز ایجاد شده که این عوامل از علل اصلی سندروم متابولیک محسوب می شوند [۳]. هم چنین چاقی شکمی نیز یکی از ویژگی های این سندروم است که باعث مقاومت به اثرات انسولین در استفاده از گلوکز توسط بافت محیطی شده و هیپرأنسولینیمی ایجاد شده می تواند به پرفشاری خون و نتایج متابولیکی ناشی از آن منجر شود [۴].

یه عبارتی چاقی، شایع ترین علت سندروم متابولیک در کودکان و نوجوانان شناخته شده است [۵]. این عامل به عنوان یکی از مهمترین عوامل موجود در این سندروم نه تنها در بالغین بلکه در میان کودکان و نوجوانان در حال افزایش است که با افزایش میزان مرگ و میر و ابتلاء همراه بوده و افزایش بار اقتصادی کلان را در سیستم مراقبت های بهداشتی درمانی ایجاد می کند [۶].

چاقی ، پرفشاری خون ، اختلالات لیپیدمیک ، اختلال در متابولیسم گلوکز ، ایجاد حالت پرو ترومبوتیک و التهابی مجموعه ای از عالیم کلینیکی این سندروم هستند [۷]. این سندروم حدود پانزده سال پیش به فرهنگ علمی پزشکی اضافه شد . در سال ۲۰۰۱ برنامه ملی آموزش کلسترول امریکا در پانل سوم درمان بالغین ، راهنمای اجمالي برای تشخیص این سندروم را متشر کرد و وجود سه معیار یا بیشتر را به عنوان این سندروم تعیین نمود [۷]. شب لغزنه این سندروم بطرف بیماری دیابت و گرفتاری قلبی عرقی قابل برگشت خواهد بود [۷]. در کشورهای توسعه یافته چاقی رو به افزایش است به طوریکه ۱۰/۵-۲۷٪ کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی هستند [۸]. روند آن در کودکان کشور های در حال توسعه و توسعه یافته تقریباً مشابه است. بطوریکه نتایج مطالعه NHANES^۱ نشان

² Adult Treatment Panel III

^۱ National Health and Nutritional Examination Survey

BMI ارائه شده توسط مرکز کنترل بیماری‌ها (CDC)^۱ استفاده شد و نمونه هایی که در صدک ≥ 85 و صدک ≥ 95 قرار می‌گرفتند به ترتیب به عنوان اضافه وزن و چاق تقسیم بنده شدند [۳].

برای تعیین چاقی شکمی (توزیع چربی بدن) با استفاده از دور کمر بر حسب سن، صدک مساوی یا بیشتر از ۹۰ به عنوان چاقی شکمی تعیین گردید [۳]. فشارخون نمونه‌ها پس از ده دقیقه استراحت از بازوی راست گرفته شد و سپس میانگین دو بار اندازه گیری در آنالیز استفاده شد.

برای تعیین پر فشاری خون، از جداول ارائه شده توسط چهارمین گزارش، تشخیص، ارزیابی و درمان فشار خون کودکان و نوجوانان استفاده شد که در این جداول فشار سیستول و دیاستول بر اساس قد، سن و جنسیت ارائه شده است و صدک‌های ≥ 90 به عنوان قبل از پر فشاری خون و ≥ 95 و ≥ 99 به عنوان پر فشاری خون درجه ۱ و ۲ تعیین گردید [۶، ۱۷].

پس از غربالگری و تعیین نمونه‌های دارای اضافه وزن و چاق (بر اساس شاخص توده بدن)، مجدداً فرم موافقت نامه برای نمونه گیری خون به تمام نمونه‌های دارای عامل خطر تحويل داده شد و ضمن توجیه قسمت دوم طرح از دانش آموزان در خواست شد ضمن موافقت آگاهانه خود و خانواده، با طرح همکاری نمایند. بنابراین با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی از کل نمونه‌های دارای اضافه وزن و چاق، ۷۶ نفر بطور داوطلبانه وارد مطالعه شدند و نمونه خون ناشتای آنها برای اندازه گیری قند، تری گلیسرید و HDL کلسترول جمع آوری شد.

در این بررسی هیپر تری گلیسریدمی با تری گلیسرید ناشتای بیشتر یا مساوی 110 mg/dl ، کاهش HDL کلسترول ناشتا با میزان کمتر یا مساوی 45 mg/dl و اختلال در قند ناشتا با میزان قند ناشتا بیشتر یا مساوی 110 mg/dl و کمتر از 126 mg/dl در نظر گرفته شد. هر سه عامل بیوشیمیایی با استفاده از کیت پارس آزمون و دستگاه اتو آنالیزر BT3000 در آزمایشگاه پاتو بیولوژی دانشکده پزشکی رفسنجان انجام شد. وجود حداقل سه

و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران و عدم وجود اطلاعات کافی در زمینه سندرم متابولیک در نوجوانان رفسنجانی، این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع چاقی و سندرم متابولیک در دختران نوجوان شهر رفسنجان طراحی شد. این بررسی با استفاده از شاخص تشخیصی ATPIII وجود سه شاخص را در نمونه‌های مورد بررسی به عنوان سندرم متابولیک در نظر گرفته است.

روش‌ها

این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است. جمعیت مورد مطالعه را دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستانی شهر رفسنجان تشکیل می‌دادند. بر اساس اطلاعات موجود در اداره آموزش و پرورش این شهر در زمان مطالعه ۴۲۴۶ دانش آموز دختر در حال تحصیل بودند. نمونه مورد نظر ۱۲۲۱ نفر تعیین گردید. برای محاسبه حجم نمونه از ضرایب زیر استفاده شد (اطمینان ۹۵٪، شیوع چاقی و اضافه وزن ۰.۲۵٪ [۱۶]، دقت ۰.۲۵٪). در گام اول مدارس به طور خوش ای انتخاب شدند سپس تعداد نمونه‌های هر مدرسه به نسبت جمعیت تحت پوشش آن تعیین گردیدند. پس از تعیین حجم نمونه، نمونه‌های هر مدرسه به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. ضمن هماهنگی با اداره آموزش و پرورش و مدارس مورد نظر، همکاران طرح پس از آموزش‌های لازم به مدارس مربوطه مراجعه و پس از کسب رضایت آگاهانه پرسشنامه انفرادی شامل اطلاعات دموگرافیک را تکمیل نمودند؛ سپس اطلاعات تن سنجی شامل اندازه گیری قد، وزن، دور کمر به شرح زیر انجام شد: توزین وزن با ترازوی Seca (ساخت آلمان)، حداقل لباس و بدون کفش با دقت ۵۰۰ گرم انجام شد. قد در حالت ایستاده و بدون کفش بطوریکه پاشنه ها بهم چسبیده و باسن و ناحیه پس سری و شانه هادر امتداد یک خط راست در برابر متر متصل به دیوار قرار گرفته و پس از مماس نمودن گونیا با فرق سر قد با دقت ۰/۵ سانتی متر اندازه گیری شد. دور کمر در حالت ایستاده در فاصله بین آخرین دنده و سر ایلیاک در هنگام بازدم اندازه گیری شد [۱۱]. پس از اندازه گیری‌ها، شاخص توده بدن محاسبه و برای تعیین کم وزنی، اضافه وزن و چاقی از چارت‌های

بعضی از اطلاعات دموگرافیک دختران مورد بررسی در جدول ۱ ارائه شده است. به طوریکه در جدول مشاهده می‌شود، ۹۲/۷٪ (۱۱۳۲ نفر) دختران در مدارس دولتی تحصیل می‌کردند.

در این بررسی ۱۱/۲٪ نمونه‌ها (۱۱۲/۴٪ ۹۵CI = ۱۱/۶ - ۱۱/۰) دارای اضافه وزن و ۲/۴٪ (۳/۳٪ ۱/۵ - ۱/۰) n = ۱۳۷ دارای چاقی بودند (جدول ۲).

اضافه وزن و چاقی در مناطق شهری نسبت به روستایی بیشتر بود . [۱۳/۹٪ با (۱۶/۱٪ ۹۵CI= ۱۱/۷ - ۱۱/۰) و ۱۲/۴٪ [در مقابل ۱۲/۴٪ با (۱۶/۳٪ ۸/۴٪ ۹۵CI= ۱۶/۰ - ۸/۰)] و ۱۳/۹٪ [n=۱۳۳] چاقی در گروه سنی ۱۱-۱۴ سال نسبت

شاخص در نمونه‌ها، نشانه وجود سندرم متابولیک بود (با شاخص ATPIII).

آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۲ انجام شد. مقایسه متغیرهای کیفی با آزمون کای دو صورت پذیرفته است و میزان‌های شیوع با درصد بیان شده اند.

یافته‌ها

در این بررسی میانگین سنی دختران ۱۴/۳۴±۱/۷ سال بود.

جدول ۱- فراوانی متغیرهای مقطع تحصیلی، نوع مدارس، محل سکونت و سابقه فاکتورهای خطر قلبی عروقی در دختران ۱۱-۱۸ سال

متغیر	فراوانی	درصد
مقطع تحصیلی		
راهنمایی	۶۰۱	۴۹/۲
دیپرستان	۶۲۰	۵۰/۸
نوع مدارس		
دولتی	۱۱۳۲	۹۲/۷
غیر انتفاعی	۸۹	۷/۳
محل سکونت		
شهری	۹۵۴	۷۸/۱
روستایی	۲۶۷	۲۱/۹
سابقه چاقی در خانواده		
بلی	۵۳۸	۴۴/۱
خیر	۶۸۳	۵۵/۹
سابقه فشار خون		
بلی	۲۳۳	۱۹/۱
خیر	۹۸۸	۸۰/۹
سابقه دیابت		
بلی	۱۷۱	۱۴
خیر	۱۰۵۰	۸۶
سابقه هیپرلیپیدمی		
بلی	۲۰۲	۱۶/۵
خیر	۱۰۱۹	۸۳/۵
نوع مطالعه : مقطعي		تعداد نمونه: ۱۲۲۱ نفر

جدول ۲- توزیع فراوانی دختران ۱۸-۱۱ سال تحت بررسی شهر رفسنجان بر حسب تقسیم بنده نمایه توده بدن و گروههای سنی

														شاخص توده بدن (kg/m ²)
جمع		چاق		اضافه وزن		وزن نرمال		کم وزن		تعداد درصد		تعداد درصد	تعداد درصد	تعداد درصد
۱۰۰	۶۶۴	۲/۳	۲۲	۱۱/۹	۷۹	۷۳	۴۸۵	۱۱/۷	۷۸					
۱۰۰	۵۵۷	۱/۳	۷	۱۰/۸	۵۸	۷۷/۶	۴۳۲	۱۰/۸	۶۰					
۱۰۰	۱۲۲۱	۲/۴	۲۹	۱۱/۲	۱۳۷	۷۵/۱	۹۱۷	۱۱/۳	۱۳۸					جمع
توزیع فراوانی گروههای سنی (سال)														
۱۰۰	۱۴-۱۱ سال													
۱۰۰	۱۸-۱۵ سال													

نوع مطالعه: مقطعی، تعداد نمونه ۱۲۲۱، آزمون کای دو

جدول ۳- میانگین و انحراف معیار قند، تری گلیسرید، HDL ناشتا در دختران ۱۸-۱۱ سال تحت بررسی

نوع مطالعه: مقطعی	تعداد نمونه ۷۶ نفر	متغیر بیوشیمیایی (mg/dl)	شاخص آماری	میانگین	انحراف معیار
		FBS		۹۲/۸۳	۱۵/۵
		TG		۱۲۰/۹	۵۴/۸
		HDL		۴۶/۶	۴/۶

به گروه سنی ۱۵-۱۸ سال بیشتر بود . هر چند اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود . هم چنین ۷/۷٪ افراد (۴۶ نفر) با اضافه وزن و چاق فشار خون سیستولیک و ۲۱/۱٪ (۳۵ نفر) آنها فشار دیاستولیک بالا داشتند. این اختلافات از نظر آماری معنی دار بود (آزمون کای دو، $P<0.01$).

با انجام آزمایش های بیوشیمیایی، ۷/۹٪ (۱۴٪ - ۱/۸٪) نمونه ها دارای اختلال در قند ناشتا و ۹۵CI = ۵۵/۹٪ - ۳۳/۵٪ مبتلا به هیپر تری گلیسریدمی بودند. HDL ۱۵/۸٪ مبتلا به دیاستولیک آنها در مرحله قبل از پرفشاری خون قرار داشتند. فشار خون سیستولیک ۳/۸٪ (۴/۹٪ - ۲/۷٪) نمونه ها کمتر از ۰/۱٪ (۱۴٪ - ۰/۱٪) نمونه های مورد بررسی دارای اختلالات لیپیدی بودند. جدول ۳ میانگین این سه عامل را نشان می دهد .

نمونه های با اضافه وزن و چاق سابقه هیپر لیپیدمی در خانواده و ۱۵/۸٪ (۲۱/۳٪ - ۱۰/۳٪) نمونه های ۹۵CI = ۰٪ - ۲۷٪ و

به گروه سنی ۱۵-۱۸ سال بیشتر بود . هر چند اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (۱۵/۲٪ - ۱۷/۹٪) (n=۱۰۱) و در مقابل (۱۴/۴٪ - ۱۱/۷٪) (n=۱۵) نمونه های مورد بررسی دارای چاقی مرکزی بودند). نمونه های ۰/۶۲٪ (۵۵/۷٪ - ۷۰٪) (n=۱۰۴) و مبتلا به اضافه وزن سابقه چاقی را در فامیل نیز دارا بودند ($P<0.01$). (P<0.01).

هم چنین ۰/۵٪ (۶/۴٪ - ۴٪) (n=۶۳) نمونه های فشار خون سیستولیک آنها در مرحله قبل از پرفشاری خون قرار داشتند. فشار خون سیستولیک ۰/۳٪ (۴/۹٪ - ۲/۷٪) (n=۱۴) نمونه های مبتلا به دیاستولیک در مرحله پرفشاری خون درجه یک و دو قرار می گرفت .

فشار خون دیاستولیک ۰/۷٪ (۹/۲٪ - ۶/۶٪) (n=۹۴) در مرحله قبل از پرفشاری خون قرار داشت . فشار خون دیاستولیک ۰/۲٪ (۱/۴٪ - ۰/۱٪) (n=۴۷) و ۰/۰۲٪ (۰/۰۸٪ - ۰/۰۰۲٪) (n=۱۷) و

از عوامل اصلی در بروز سندروم متابولیک احتمال بروز این مشکل را در سال‌های بعدی افزایش دهد به طوریکه این عامل در استفاده از گلوکوز محیطی مقاومت ایجاد نموده و با ایجاد هیپرأنسولینیمی می‌تواند منجر به پرفشاری خون و نتایج متابولیکی بعدی شود[۴]. از طرفی این زنگ خطر می‌تواند پیشرفت بروز دیابت نوع دو را نیز پیشگویی کند که بروز این بیماری می‌تواند شاخص مهمی در ایدمی شدن بیماری‌های قلبی عروقی در آینده باشد [۵]. در بررسی ما ۳/۹٪ دختران دارای سندروم متابولیک بودند. در بررسی انجام شده در پسران دبیرستانی ژاپن شیوع سندروم متابولیک ۱/۲٪ و در بین پسران چاق ۱۵/۲٪ بود[۲۲]. در مطالعه‌ای دیگر میزان شیوع سندروم متابولیک در کودکان ۸-۱۹ سال با خطر اضافه وزن ۶/۸٪ و در کودکان با اضافه وزن ۲۸/۷٪ گزارش شده است[۱۰]. میزان شیوع سندروم در میان نوجوانان با سن کمتر از ۱۸ سال ۴۰/۵٪ [۲۳] و در بررسی دیگر ۱۹/۲٪ بوده است [۲۱]. در بررسی Weiss و همکاران شیوع سندروم متابولیک با شدت چاقی نیز افزایش می‌یافتد و در پسران شدیداً چاق میزان آن به ۵۰٪ نیز می‌رسید [۵]. در میزان شیوع ۳/۹٪، که در مطالعه ما بدست آمده است نکاتی وجود دارد که این میزان را کاملاً توجیه پذیر می‌سازد. اول اینکه این میزان برای تمامی دختران مورد مطالعه ۱۱-۱۸ سال برآورد گردیده است و چنانچه گروه‌های پر خطر از این جمعیت جدا شده و مورد بررسی قرار گیرند احتمالاً مشابه آنچه در مطالعه سایرین دیده شد شیوع بالایی را نشان خواهد داد. دیگر اینکه بایستی توجه نمود که پاره ای از عوامل خطر در جمعیت تحت بررسی در مطالعه ما کمتر وجود داشته است مثلاً شیوع چاقی شکمی در مطالعه ما چندان بالا نیست و شاید دلیل آن بتواند جنسیت افراد تحت بررسی باشد که معمولاً نسبت به بروز چاقی شکمی در خود حساسیت خاصی دارند. از جمله سایر عوامل مورد توجه بایستی به عواملی مانند ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی منطقه جغرافیایی محل زندگی و سبک زندگی افراد تحت بررسی در مطالعه ما اشاره نمود. بررسی‌های سازمان بهداشت

= n) دیابت فامیلی و ۷/۱۸٪ (۶/۲۴٪ - ٪ ۸/۱۲ = ٪ ۹۵CI و n = ۳۱) سابقه فشارخون در خانواده داشتند. با استفاده از شاخص ATPIII میزان شیوع سندروم متابولیک در جمعیت تحت بررسی در این مطالعه برابر ۹٪ (۵/۰٪ - ٪ ۸/۲) = ٪ ۹۵CI تخمین زده شد.

بحث

مطالعه حاضر نشان داد که اضافه وزن ، چاقی، سندروم متابولیک و پرفشاری خون در دختران مورد بررسی شهر رفسنجان به عنوان مشکلات بهداشتی مطرح می‌باشد. در این مطالعه نتایج بررسی ما از نظر چاقی و اضافه وزن با بیشتر مطالعات گزارش شده از سایر نقاط ایران و جهان مشابه است، بعارتی دختران نوجوان رفسنجانی نیز از سطوحی از چاقی و اضافه وزن رنج می‌برند. وجود چاقی در این شهر در مقایسه با سایر شهرهای ایران و کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تقریباً مشابه است [۳، ۸، ۱۶، ۲۰-۲۱]. نتایج حاضر نشانگر این است که حتی در شهرهای کوچک نیز "گذر تغذیه" همراه با کاهش فعالیت فیزیکی و افزایش دریافت مصرف انرژی و استفاده از غذاهای آماده نه تنها در بالغین که در نوجوانان و کودکان نیز اثرات خود را به جای گذاشته است [۱] اگرچه نتایج مطالعات داخل کشورها و بین کشورها با هم متفاوت است . در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که گذر اقتصادی و فرهنگی را طی می‌کنند، به همراه این معضل بهداشتی سو تغذیه نیز با شدت‌های مختلف خود را نشان می‌دهد؛ به طوریکه در مطالعه ما ۳/۱۱٪ نمونه‌ها دارای کم وزنی بودند که خود نشانگر این است که درصد قابل ملاحظه‌ای از افراد تحت بررسی در مطالعه ما نه تنها از حالت فزون تغذیه که از سوء تغذیه از نوع کم خواری نیز رنج می‌برند [۳]. در بررسی حاضر شیوع چاقی مرکزی ۲/۱٪ مشاهده شد که در مقایسه با مطالعه Castillo E Halley شیوع کمتری داشت [۲۱]. اگرچه این میزان در مطالعه حاضر پایین بوده است اما می‌تواند به عنوان یک زنگ خطر محسوب شده و به عنوان یکی

تعیین پرفشاری خون، پاسخگوی این اختلاف باشد. چرا که در بررسی ما سن نمونه‌ها در محدوده ۱۱–۱۸ سال بود و از جداول ارائه شده توسط چهارمین کمیته ملی مشترک گزارش، تشخیص، ارزیابی و درمان فشار خون کودکان و نوجوانان استفاده شد، در حالی که در بررسی شعبانی سن نمونه‌ها ۶–۱۳ سال بود و از معیار STF(Second Task Force) استفاده شده بود [۲۹]. در بررسی I Saito افراد مورد بررسی پسران بودند. میزان‌های شیوع پرفشاری خون در این بررسی نشان دهنده وجود یکی از مهمترین عوامل خطر در بروز بیماری قلبی عروقی در دختران این شهر می‌باشد، اگر چه این میزان‌ها غیرقابل انتظار هم نیستند زیرا به موازات افزایش اضافه وزن و چاقی، شیوع فشار خون نیز افزایش می‌یابد. این موضوع با سازوکارهای پیشنهادی در مورد چاقی و فشار خون با ترشح لپتین و سیستم رنین آنژیوتانسین توسط Francischetti مرتبط می‌باشد [۹].

در بررسی ما جمعاً از کل دختران چاق، ۷/۹٪ آنان قند ناشتای مختلف شده داشتند. Sinha و همکاران نیز در ۲۵٪ از کودکان چاق و ۲۱٪ نوجوانان چاق اختلال تحمل گلوکز را گزارش نمودند. در بررسی این محقق بهترین شاخص در پیشگویی اختلال تحمل گلوکز شاخص توده بدن بود [۱۴]. مقایسه بررسی ما با این بررسی نشان داد میزان اختلال در قند ناشتا نسبت به مطالعه فوق کمتر است. در بررسی فوق تست تحمل گلوکز انجام شده بود در حالیکه در بررسی ما قند ناشتا اندازه‌گیری شد. شاید کمتر بودن این شاخص در مطالعه ما نسبت به مطالعه فوق بدلیل تفاوت بین دو روش تشخیصی باشد. به هر حال بررسی فوق نشان می‌دهد که اختلال در قند ناشتای نمونه‌های مورد بررسی احتمال بروز دیابت را در سال‌های آینده برای این نمونه‌ها پیشگویی می‌کند زیرا ۱۵/۸٪ آنان دارای سابقه خانوادگی دیابت نیز بودند. به استناد مطالعه انجام شده در آمریکا پس از سه سال پی‌گیری ۳/۷٪ نمونه‌ها به دیابت نوع ۲ مبتلا شدند [۳۰]. در بررسی Altinli و همکاران در کودکان والدین دیابتی نوع ۲، نسبت به گروه کنترل میزان انسولین ناشتا، انسولین یک و دو ساعت پس از

جهانی نشان می‌دهد که درصد افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن تشخیص داده نشده در بین کشورهای مختلف منطقه مدیترانه شرقی با میزان‌های متفاوت خود را نشان می‌دهد. علاوه بر آن این سازمان گزارش کرده است که در منطقه مدیترانه شرقی ۳۰٪ افراد سالم، ۵۰٪ دارای یک عامل خطر بیماری مزمن و ۱۵٪ دارای این بیماری‌ها بوده و ۵٪ نیز دچار بیماری حاد می‌باشند. این نسبت‌ها اهمیت سبک زندگی در بروز چاقی و قرار گرفتن در معرض خطر بیماری‌های مزمن از قبیل بیماری‌های قلبی عروقی را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود مرگ ناشی از این بیماریها بمدت ده سال از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، ۱۷٪ افزایش یابد [۲۴]. در یک بررسی انجام شده در بالغین تهرانی، شیوع سندروم متابولیک ۳۳٪ گزارش شده است که این میزان نسبت به موارد گزارش شده در امریکا بالاتر بوده است [۲۵، ۲۶]. چنانچه شیوع بدست آمده در مطالعه ما با نتایج این مطالعه مقایسه شود، می‌توان پیش‌بینی نمود که جمعیت تحت بررسی در مطالعه ما در سال‌های بعد که افزایش سن خواهد داشت و وارد دوره جوانی، میانسالی و کهنسالی خواهد شد، در خطر بروز سندروم متابولیک خواهد بود. زیرا با افزایش سن، کاهش فعالیت و سایر عوامل موثر بر چاقی، خطر بروز این سندروم نیز افزایش می‌یابد.

در بررسی حاضر در مجموع ۱۰/۱٪ افراد در مرحله قبل از پرفشاری خون و پرفشاری خون سیستولیک و ۹/۲٪ آنها در مرحله قبل از پرفشاری خون و پرفشاری خون دیاستولیک قرار داشتند، همچنین در مجموع ۲۷/۷٪ نمونه‌های با اضافه وزن و چاق فشار خون سیستولیک و ۲۱/۱٪ آنها فشار دیاستولیک بالا داشتند. این نتایج ما با بررسی Rao [۲۷] و Menghetti [۲۸] هم خوانی دارد. در حالیکه در بررسی شعبانیان ۳/۵٪ و ۳/۳٪ دختران به ترتیب پرفشاری خون سیستولیک و دیاستولیک داشتند [۲۹] و در بررسی I Saito ، ۱۹/۹٪ نمونه‌ها فشار خون بالا داشتند [۲۲] که نتایج ما با این دو مطالعه متفاوت است و به نظر می‌رسد. جنس، سن گروه مورد بررسی و معیار انتخاب شده در مطالعه حاضر برای

بلکه خانواده‌ها نیز از همکاری با طرح خودداری می‌کردند به طوریکه از ۱۶۶ دختر جوانی که برای مرحله دوم دعوت شدند فقط ۷۶ نفر با موافقت خود و خانواده با این طرح همکاری نمودند، علاوه براین عدم تامین بودجه کافی نیز یکی از مشکلات اجرائی این طرح بود شاید در صورت دارا بودن بودجه کافی و ارائه هدایا به نمونه‌ها درصد همکاری افزایش می‌یافت.

سپاسگزاری

محققین بر خود لازم می‌دانند از شورای پژوهشی دانشگاه به علت تصویب طرح و پرداخت هزینه‌های این پروژه، اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان به ویژه آقای حسین طاهری کارشناس بهداشت این اداره مدیران و مریبان بهداشت مدارس انتخاب شده و دانش آموزان انتخاب شده در پروژه هم چنین خانم‌ها فریبا خاتمی و فاطمه امینی با همکاری‌های صادقانه، آقایان دکتر محمود محمودی هماهنگ کننده آزمایشگاه و علیرضا فتوحیان که در انجام آزمایشات همکاری نموده‌اند قدردانی و سپاسگزاری نمایند.

صرف غذا، نمایه توده بدن و فشار سیستولیک بالاتر بود. این بررسی پیشنهاد می‌کند کودکان والدین دیابتی تمایل بیشتری برای مقاومت به انسولین و سندروم متابولیک دارند [۳۱]. هم چنین در مطالعه ما [۴۴/۷] این افراد دارای هیپرتری گلیسریدمی و ۸/۱۵٪ دارای HDL Halley کمتر از محدوده نرمال بودند. در مطالعه Castillo E اختلال لیپیدی با کاهش HDL کلسترول نشان داده شد [۲۱]. هم چنین در بررسی Mir اختلال لیپیدی ۴۷٪ گزارش شد [۳۲]. نتایج مطالعه ما با این بررسی‌ها مشابه است.

این بررسی نشان داد چاقی و سندروم متابولیک به عنوان مشکل بهداشتی در دختران این شهر مطرح می‌باشد. بنابراین محققین بررسی این عوامل خطر را در کودکان سن ۱۱ - ۶ سال پیشنهاد می‌نمایند. هم چنین در سیاست‌های بهداشتی، تخصیص بودجه ملی در جهت برنامه‌ریزی برای تعیین و تشخیص و برنامه‌های مداخله‌ای در جهت پیشگیری و درمان این عوامل خطر پیشنهاد می‌شود.

از جمله محدودیت‌ها و مشکلات این مطالعه می‌توان موارد زیر را نام برد: مهمترین محدودیت این بررسی عدم همکاری دانش آموزان در مرحله دوم بود. نه تنها دختران

ماخذ

1. Mosavi Jazayeri SM. Overweight and obesity among school -aged children of metropolitan Tehran, Iran . *P J Nutr* 2005;4(5):342-344
2. B.Abal Khail. Overweight and obesity among Saudi Arabian children and adolescents between 1994 and 2000. *East Mediterr Health J* 2002; 8(4,5)
3. Malekzadeh R , Mohamadnejad M , Merat S , Pourshams A , Etemad A . Obesity pandemic : An Iranian perspective . *Arch Iran Med* 2006;8(1):1-7.
4. Pyörälä M, Miettinen H, Laakso M, Pyörälä K.. Hyperinsulinemia predicates coronary heart disease risk in healthy middle aged men . the 22 year follow -up results of the Helsinki policemen study . *Circulation* 1998;98:398-404.
5. Weiss R-Dziura J , Burgert T., Obesity and Metabolic syndrome in children and adolescents . *NEJM* 2004; 350(23): 2362-74.
6. National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI). New practice guidelines to be issued – Average blood pressure levels on rise among American children teenagers . http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension/child_tbl.htm. Full report expected in late Summer, 2004. Received 11/22/2007.
7. Erica W, Lorraine L. *Public Health* Metabolic syndrome: Waist not want .*CMAJ* 2004; 170 (9)::1503
8. Jana P . Andrew H. Childhood obesity Preventive and treatment .1st edition . CRC . Press. LONDON . 2001 . P . 30
9. Francischetti EA, Genelhu VA .Obesity – hypertension: an ongoing pandemic. *Int J Clin Pract* 2007;61(2):269-80.
10. Jessup A, Joanne S.Harrel I. The Metabolic syndrome :look for it in children and adolescents , too. *Clin Diabetes*. 2005 www.FindArticles.Com.
11. Duncan GE, Li SM, Zhou XH.. Prevalence and trends of a metabolic syndrome Phenotype among U.S adolescents , 1999-2000.*Diabetes Care* 2004 ; 27 : 2438-43 .

12. Wabitsch M, Hauner H, Hertrampf M, Muche R, Hay B, Mayer H, et al. TypeII diabetes and impaired glucose Regulation in Caucasian children and adolescents With obesity living in Germany. *Obesity* 2004; 28(2): 307-313.
13. Fleminy M. Adolescent obesity , Nutrition and Physical Activity . An overview . Washington , DC. 2002 . P 14.
14. Sinha R, Fisch G, Teague B, Tamborlane WV, Banyas B, Allen K, et al ..Prevalence of impaired glucose tolerance among children and Adolescents with marked obesity. *NEJM* 2002; 346(11):802-810.
15. Rodríguez-Morán M, Salazar-Vázquez B, Violante R, Guerrero-Romero F. Metabolic syndrome among children and adolescents aged 10-18 years . *Diabetes Care* 2004; 27 (10):2516-17.
16. Moayeri H, Bidad K, Aghamohammadi A, Rabbani A, Anari S, Nazemi L, Cholami N, Zadhoureh S, Hatmi ZN .Overweight and obesity and associated factors in adolescents in Tehran, Iran, 2004-2005. *Eur J Pediatr* 2006;165 (7):489-93.
17. National Heart lung and blood Institute. Blood pressure tables for children and adolescents from the fourth report on the diagnosis, evaluation and treatment of High blood pressure in children and adolescents. http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension/child_tbl.htm. received 9/11/2006.
- دوست محمدیان اعظم ، کشاورز سیدعلی ، ۱۸
درستی احمد رضا ، محمودی محمود ، صدرزاده.
حاله بررسی وضع تغذیه و ارتباط فعالیت بدنی و
نگرش تغذیه ای با نمایه توده بدن برای سن در
دختران دبیرستانی ۱۴-۱۸ ساله شهر سمنان
(۱۳۸۲-۱۳۸۳). *محله علمی دانشگاه علوم*
پزشکی سمنان ۱۳۷۴، ۱۳۷۴، جلد ۶؛ (شماره ۳):
۱۹۴-۱۸۷
19. Mozaffari H, Nabaei B. Obesity and related risk factors. *Indian J Pediatr* 2007; 74(3):265-7.
20. Janghorban M, Parvin F, Prevalence of overweight and thinness in high school girls in Kerman, Iran. *Int J Obes Relat Metab Disord* 1998; 22(7):629-33.
21. Halley Castillo E, Borges G, Talavera JO, Orozco R, Vargas-Alemán C, Huitrón-Bravo G, et al . Body mass index and the prevalence of metabolic syndrome among children and adolescents in two Mexican populations.. *J Adolesc Health* 2007; 40(6):521-6.
22. Saito I, Mori M, Shibata H, Hirose H, Tsujioka M, Kawabe H. Prevalence of metabolic syndrome in young men in Japan . *J Atheroscler Thromb* 2007;14(1): 27-30.
23. Kaler SN, Ralph-Campbell K, Pohar S, King M, Laboucan CR, Toth EL .High rates of the metabolic syndrome in a First Nations Community in western Canada: prevalence and determinants in adults and children. *Int J Circumpolar Health* 2006; 65(5):389-402.
24. Khatib o. Non communicable disease: risk factor regional strategies for prevention and care. *East Mediterr Heath J* 2004; 10(6):778-788.
25. Azizi F , Salehi p, Etemadi A, Zahedi Asl . Prevalence of metabolic syndrome in an urban population : Tehran lipid and glucose study. *Diabetes Res Clin Pract* 2003; 61: 29-37.
26. Ford ES , Giles WH , Diets WH . Prevalence of metabolic syndrome among US adults : findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey . *JAMA* 2002; 287 :359-359.
27. Rao S, kanade A, kelkar R. Blood pressure among overweight adolescents from urban school children in Pune, India. *Eur J Clin Nutr* 2007; 61(5): 633-41.
28. Menghetti E, Cairella G, Castoro F, Censi L, D'Addesa D, Martone D, Rosano A, Scanu A, Sonni L, Spagnolo A. [Increase of hypertension among adolescents in Rome]. *Minerva Pediatr* 2007;59(1):1-5.
29. Shabanian R ,Ahraniani BM, Abdolahi M , Ashrafi MR . Blood pressure distribution among healthy schoolchildren aged 6-13 years in Tehran . *East Mediterr Health J* 2005 ; 11(5-6) : 968-76.
30. CDC(NCHS) National Center for Heath Statistics. Prevalence of overweight among children and adolescents united states. 1999. 2002. Fact sheet .
31. Altinli S, Elevli M, Ozkul AA, Kara PG, Karsidag K, Dogru M.Insulin resistance and metabolic syndrome in children of parents with diabetes mellitus. *J Pediatr Endocrinol Metab* 2007;20(3):431-6.
32. Mir S, Tabel Y, Darcan S. Is Presence of Hypertension in Obese Children Correlate with the Criteria of Metabolic Syndrome? *J Trop Pediatr* 2007 5 27;