

سطح پوشش واکسن پنوموکوک در جهان و توزیع سروتاپهای استرپتوکوک پنومونیه پس از دریافت واکسن در کشورهای دریافت‌کننده واکسن: مرور ساختار یافته

سعیده رحمانی^۱، منوچهر کرمی^۲، پگاه آمری^۳، مریم آدابی^۴، امین دوستی ایرانی^۵

^۱دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

^۲دانشیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

^۳کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

^۴استادیار، باکتری شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات بروسلوز، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

^۵استادیار، مرکز تحقیقات مدل‌سازی بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

نویسنده را بط: امین دوستی ایرانی، نشانی: همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران، ۰۸۱۳۸۳۸۰۷۵۵

پست الکترونیک: a.doosti@umsha.ac.ir

تاریخ دریافت: ۹۸/۰۲/۲۵؛ پذیرش: ۹۸/۰۶/۰۹

مقدمه و اهداف: پس از معرفی واکسن نوموکوک افزایش بیماری به علت سروتاپهای غیر اختصاصی واکسن در کشورهای دریافت‌کننده واکسن مشاهده شده است. هدف از این مطالعه تعیین توزیع مکانی پوشش واکسن سروتاپهای شایع استرپتوکوکوس پنومونیه پس از معرفی واکسن در کشورهای دریافت‌کننده واکسن بود.

روش کار: پایگاه‌های معتبر بین‌المللی شامل Scopus^۱ و Medline^۲ تا نوامبر سال ۲۰۱۸ جست‌وجو شد. مطالعه‌هایی که شیوع سروتاپهای استرپتوکوک پنومونیه در افراد حامل، بیمار، جایگزینی سروتاپهای و شیوع سروتاپهای شایع استرپتوکوکوس را بررسی کرده بودند؛ وارد مطالعه شدند. توزیع مکانی کشورهای دریافت‌کننده واکسن با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS نسخه ۱۰.۶.۱ تعیین شد.

یافته‌ها: از مجموع ۶۹۸۹ مقاله در نهایت ۳۲۴ مقاله وارد مطالعه شدند. بیشترین سهم کشورهای دریافت‌کننده واکسن به ترتیب در مناطق آفریقا، اروپا و غرب اقیانوس آرام بود. پوشش واکسیناسیون در کشورهای دریافت‌کننده واکسن تا سال ۲۰۱۷ رو به افزایش بود. سروتاپهای شایع پس از معرفی واکسن شامل ۶B1۹ A, 5, 3, 14, 19F, 7F, 23F, ۱۲ F, ۸, ۱۵A/B, ۱۱A سروتاپهای غیر اختصاصی واکسن بودند.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد که با وجود افزایش پوشش واکسیناسیون پنوموکوک در کشورهای دریافت‌کننده واکسن، در بسیاری از کشورهای جهان، واکسن پنوموکوک در برنامه ایمن‌سازی آن‌ها نیست. علاوه بر این پس از معرفی واکسن سروتاپهای A, ۱۹, ۱۴, ۱۹F, ۷F, ۲۳F, ۶B ۳, ۵، همچنان از سروتاپهای شایع در کشورهای دریافت‌کننده واکسن هستند. بنابراین سیاست‌گذاران سلامت در کشورهای مختلف باید بر اساس سروتاپهای شایع پنوموکوک برای ایمن‌سازی اقدام کنند.

وازگان کلیدی: استرپتوکوک پنومونیه، واکسن پنوموکوک، سروتاپ، مرور ساختار یافته

مقدمه

جهان محسوب می‌شود (۶). اکنون در بسیاری از کشورها واکسن‌های مؤثر علیه ۱۰ یا ۱۳ نوع سروتاپ از بیش از ۹۰ نوع سروتاپ پنوموکوک استفاده می‌شود که منجر به کاهش معنی‌داری در بیماری‌های مهاجم و حاملی سروتاپهای واکسن داشته است. با وجود این موفقیت، سروتاپهای غیر اختصاصی واکسن^۱، در میان حامل‌های سالم افزایش یافته و بهطور بالقوه می‌توانند از سبب‌های مهم بیماری‌های مهاجم شوند (۷).

استرپتوکوکوس‌ها، باکتری‌های گرم مثبت و گاهی ساکن طبیعی دستگاه تنفس هستند، اما تعدادی از آن‌ها مانند استرپتوکوکوس پنومونیه، می‌تواند باعث ایجاد بیماری‌های بالینی مانند عفونت گوش میانی، پنومونی و بیماری شدید پنوموکوکی شود (۱,۲). حداقل ۹۵ نوع سروتاپ استرپتوکوک وجود دارد، اما تنها تعداد کمی از آن‌ها موجب بیماری‌های شدید می‌شوند (۳-۵). استرپتوکوک پنومونیه شایع‌ترین علت بیماری‌های شدید مانند عفونت‌های پنومونی باکتریایی و سپتیسمی در میان کودکان

^۱Non-vaccine serotypes

روش کار

روش جستجو و معیارهای ورود به مطالعه

مطالعه‌های منتشر شده در سطح جهان تا تاریخ ۱۰/۱۱/۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفت. برای دستیابی به مقاله‌های مناسبی که بتوان اطلاعات آنان را در راستای هدف‌های مطالعه استخراج کرد، Web of science، Scopus و Medline استفاده شد.

در این مطالعه از راه کار جستجوی ساختارمند با هدف یافتن مطالعه‌های مرتبط با موضوع پژوهش و منطبق با معیارهای ورود در پایگاه‌های داده‌های الکترونیک استفاده شد. راه کار جستجو و استفاده از ترکیب کلید واژه‌های زیر تهیه شد:

- ۱#Streptococcus pneumoniae [Mesh terms]
- ۲#Pneumococcal Infections [Mesh terms]
- ۳#Invasive pneumococcal diseases [tw]
- ۴#(۴#OR #2 OR #3)
- ۵#Heptavalent Pneumococcal Conjugate Vaccine [Mesh terms]
- ۶#PCV* [tw]
- ۷#PCV7 [tw]
- ۸#PCV10 [tw]
- ۹#PCV13 [tw]
- ۱۰#(۱۰#OR #6 OR #7 OR #8 OR #9)
- ۱۱#Serogroup [Mesh terms]
- ۱۲#Serotype [tw]
- ۱۳#(۱۳#OR #12)
- ۱۴#Prevalence [Mesh terms]
- ۱۵#Incidence [Mesh terms]
- ۱۶#(۱۶#OR #15)
- ۱۸#Animals [Mesh terms]
- ۱۹#(۱۹#AND #10 AND #13 AND #17 NOT #18)

معیارهای انتخاب مطالعه

مطالعه‌ایی که شیوع حالت حاملی، شیوع سروتاپهای پس از مطالعه شده باشد، در تمامی منطقه‌های سازمان جهانی بهداشت انتخاب کرده بودند، در تمامی منطقه‌های سازمان جهانی بهداشت انتخاب وارد مطالعه شدند. هیچ گونه محدودیتی از نظر زمان و زبان مقاله‌های منتشر شده وجود نداشت.

اپیدمیولوژی بیماری شدید پنوموکوکی (IPD)^۱ به طور قابل توجهی تغییر کرده است (۴). سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده است که حدود ۵۰-۶۰ درصد از ۱/۶ میلیون مرگ‌ومیر اتفاق افتاده در سال ۲۰۰۵ در کودکان کمتر از ۵ سال ناشی از عفونت پنوموکوکی بوده است (۸). با وجود اثربخشی بالا برای واکسن کونزوگه هفت ظرفیتی پنوموکوک (PCV7)^۲ در سراسر جهان، پوشش واکسن PCV7 در برخی از کشورها در مقایسه با ایالات متحده آمریکا پایین گزارش شده است (۹). واکسیناسیون PCV7 منجر به کاهش حالت حاملی نازوفارنکس (NP) به علت سروتاپهای نوع واکسن می‌شود، همچنین شیوع حالت حاملی به علت سروتاپهای غیر اختصاصی واکسن افزایش یافته و جایگزینی به علت تغییر سویه‌های دیگر سروتاپ رخ داده است (۱۰). معرفی واکسن کونزوگه هفت ظرفیتی پنوموکوک (PCV7) در برنامه ایمن‌سازی کودکان در نروز در سال ۲۰۰۶ میلادی به طور قابل ملاحظه‌ای شیوع پنوموکوک به علت سروتاپهای نوع واکسن^۳ را در همه گروه‌های سنی کاهش داد. علاوه بر این، افزایش کمی در بروز بیماری به علت سروتاپهای غیر اختصاصی واکسن (جایگزینی سروتاپ مشاهده شد (۱)). دو واکسن کونزوگه جدید، واکسن کونزوگه ۱۰ ظرفیتی پنوموکوک (PCV10)^۴ و واکسن کونزوگه ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک (PCV13)^۵ هستند که شامل تعداد زیادی از سروتاپها است. واکسن PCV13 شامل سروتاپهای ۱، ۳، ۵، ۷F6، A، ۷F6، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ است که بیشتر این سروتاپها پس از اجرای واکسن کونزوگه ۷ ظرفیتی پنوموکوک (PCV7) در اروپا، آسیا و آفریقا پدید آمداند و شرط لازم تولید و ایجاد این دو واکسن هستند (۹). بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، یک تجزیه و تحلیل جامع برای ارزیابی شیوع سروتاپهای پنوموکوک پس از استفاده از واکسن کونزوگه ۷ ظرفیتی پنوموکوک (PCV7) به منظور انتقال تجربیات به کشورهای کم‌درآمد ضروری است (۱۱). با توجه به اهمیت شناسایی سروتاپهای شایع بیماری‌زا در تولید واکسن و تنوع جغرافیایی مناطق اندمیک این بیماری، هدف از این مطالعه تعیین توزیع مکانی واکسن پنوموکوک، پوشش واکسن در کشورهای دریافت‌کننده به تفکیک مناطق سازمان جهانی بهداشت و همچنین تعیین توزیع سروتاپهای شایع پنوموکوک در کشورهای دریافت‌کننده واکسن پس از معرفی واکسن بود.

^۱Invasive Pneumococcal Disease; IPD

^۲7-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine; PCV7

^۳Vaccine serotypes

^۴10-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine; PCV10

^۵13-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine; PCV13

تعداد و سهم کشورهای دریافت‌کننده واکسن در مناطق آفریقا، آمریکا، مدیترانه شرقی، اروپا، جنوب شرقی آسیا و منطقه غرب اقیانوس آرام به ترتیب ۳۹ (۸۷ درصد)، ۲۶ (۷۴ درصد)، ۱۶ (۷۳ درصد)، ۴۲ (۸۲ درصد)، ۳ (۲۷ درصد) و ۲۱ (۷۸ درصد) بود.

پوشش واکسن پنوموکوک به تفکیک مناطق سازمان جهانی بهداشت در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود. به طور کلی پوشش واکسن پنوموکوک در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ افزایش یافته و بیشترین افزایش پوشش مربوط به منطقه جنوب شرقی آسیا بود که از ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۶، به ۸۹ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است. سطح پوشش واکسن پنوموکوک به تفکیک کشورهای دریافت‌کننده واکسن در مناطق سازمان جهانی بهداشت بر حسب درصد برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در جدول شماره ۲ نشان داده شده است.

اطلاعات استخراج شده از مقاله‌های دارای شرایط

سروتاپهای شایع استرپتوکوک پنومونیه به ترتیب شیوع، در کشورهای دریافت‌کننده واکسن در جهان، پیش و پس از دریافت واکسن در جدول شماره ۳ درج شده است. با توجه به اطلاعات استخراج شده از مطالعه‌های شایع‌ترین سروتاپهای پس از معرفی واکسن هنوز سروتاپهای اختصاصی واکسن کونزوگه ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک بوده و سروتاپهای غیر اختصاصی شایع پس از معرفی واکسن، سروتاپهای A/15A/22F/6C/A استند.

سروتاپهای شایع استرپتوکوک پنومونیه به تفکیک مناطق ۶ گانه سازمان جهانی بهداشت در کشورهای دریافت‌کننده واکسن پیش و پس از معرفی واکسن در جدول شماره ۴ گزارش شده است. یافته‌های مطالعه نشان داد که تنوع سروتاپهای شایع استرپتوکوک پنومونیه در مناطق مختلف بالا است، اما سروتاپهای اختصاصی واکسن کونزوگه ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک جزء سروتاپهای شایع هستند همچنین ترتیب و شیوع سروتاپهای اختصاصی و غیر اختصاصی واکسن کونزوگه ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک تغییر کرده و سروتاپهای شایع پیش از معرفی واکسن، تقریباً تمامی سروتاپهای اختصاصی واکسن

جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها

دو پژوهش مسؤول غربال کردن عنوان‌ها و خلاصه‌های مطالعه‌ها بودند و در مرحله بعد، با توجه به معیارهای ورود متن كامل مطالعه‌ها انتخاب شده، بررسی شدند. هر اختلاف نظر بین دو نویسنده توسط راهنمایی نویسنده مسؤول تصمیم‌گیری شد. متغیرهایی که از مطالعه‌ها انتخاب شده استخراج شده‌اند به شرح زیر است: نویسنده نخست، سال انتشار، مطالعه در دوره پیشین یا پس از معرفی واکسن بوده، کشور، منطقه سازمان جهانی بهداشت، حجم نمونه، گروه هدف از نظر حامل یا بیمار بودن، گروه سنی، سال معرفی واکسن در کشور مربوط، نوع واکسن تزریقی، تعداد سروتاپهای استرپتوکوکوس شناسایی شده از گروه هدف با توجه به نوع روش تشخیصی و اگر گزارش سروتاپهای بهصورت نمودار یا درصد گزارش شده بود به تعداد تبدیل می‌شدند. سپس مجموع تعداد سروتاپهای شناسایی شده با حجم نمونه کنترل می‌شد، نوع آزمون تشخیصی و نوع مطالعه در یک صفحه گستردۀ الکترونیک که از پیش طراحی شده وارد شدند. هم‌چنین پوشش واکسیناسیون به تفکیک کشورهای دریافت‌کننده و مناطق ۶ گانه سازمان جهانی بهداشت از سایت گزارش‌های این سازمان (۱۲) و مقاله‌های دارای شرایط استخراج شد. بهمنظور تعیین توزیع مکانی واکسن پنوموکوک، نقشه مکانی کشورهای دریافت‌کننده واکسن از نرم‌افزار ArcGIS نسخه ۱۰.۶ استفاده شد.

یافته‌ها

ارزیابی مطالعه‌ها

از مجموع ۶۹۸۹ مقاله که از پایگاه‌های اطلاعاتی ذکر شده شناسایی شد، پس از فرایند غربالگری مطالعه‌ها بر اساس معیارهای ورود در نهایت ۳۲۴ مقاله وارد این مرور نظاممند شد (شکل شماره ۱). مشخصات مطالعه‌های وارد شده در ضمیمه شماره ۲ نشان داده شده است.

توزیع مکانی پوشش وضعیت دریافت واکسن در کشورهای جهان و هم‌چنین پوشش واکسن پنوموکوک در کشورهای دریافت‌کننده واکسن در شکل شماره ۲ نشان داده شده است.

۶ گانه سازمان جهانی بهداشت و همچنین سال معرفی واکسن و نوع واکسن معرفی شده، در جدول شماره ۵ آورده شده است، همان‌گونه که مشاهده می‌شود نوع واکسن مصرفی در کشورهای مختلف متفاوت است و در برخی از کشورها به مرور زمان به دلیل پدیده جایگزینی سروتاپ‌ها، نوع واکسن مصرفی تغییر کرده است. سروتاپ‌های B, 9V, 14, 18C, 6,4, 19A, 19F, 23F, 1, 5, 7F, 3, 6A, 19A همان‌گونه که مشاهده می‌شود نوع واکسن مصرفی در کشورهای مختلف متفاوت است و در برخی از کشورها به مرور زمان به دلیل پدیده جایگزینی سروتاپ‌ها، نوع واکسن مصرفی تغییر کرده است. سروتاپ‌های F,15A/B,35B, 11A8,12


سروتاپ‌های شایع شناسایی شده هستند.

کونژوگه ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک که شامل: ۶,۴, B, 9V, 14, 18C, 6,4, 19A, 19F, 23F, 1, 5, 7F, 3, 6A, 19A غیراختصاصی واکسن کونژوگه ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک شامل سروتاپ‌های F,15A/B,35B, 11A8,12 تقریباً در تمامی مناطق مشترک هستند. البته اختلافاتی از نظر شیوع سروتاپ هر منطقه با منطقه دیگر وجود دارد.

سروتاپ‌های شایع استرپتوکوک پنومونیه به ترتیب شیوع، در کشورهای دریافت‌کننده، پس از دریافت واکسن به تفکیک مناطق



شکل شماره ۱ - فلوچارت فرایند انتخاب مقاله‌ها در مرور ساختاریافته سطح پوشش واکسن پنوموکوک



شکل شماره ۲ - توزیع جغرافیایی پوشش واکسیناسیون پنوموکوک در سطح جهان در سال ۲۰۱۷

جدول شماره ۱ - سطح پوشش واکسن پنوموکوک در کشورهای دریافت‌کننده واکسن به تفکیک مناطق سازمان جهانی بهداشت در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷

درصد پوشش واکسیناسیون PCV3 به تفکیک سال		منطقه
۲۰۱۷	۲۰۱۶	
۸۷/۴۳	۸۲/۶۶	AFRO
۸۱/۹۲	۸۱/۵۲	AMRO
۸۸/۰۶	۸۷/۲۳	EMRO
۸۶/۴۲	۸۶/۶۱	EURO
۸۹/۳۰	۵۳/۰۰	SEARO
۸۴/۴۴	۸۱/۰۶	WPRO

AFRO: آفریقا، AMRO: آمریکا، EMRO: مدیترانه شرقی، EURO: اروپا، SEARO: جنوب شرق آسیا، WPRO: غرب اقیانوسیه

جدول شماره ۲ - سطح پوشش واکسن پنوموکوک به تفکیک کشورهای مناطق ۶ گانه سازمان جهانی بهداشت

درصد پوشش واکسن PCV3		کشور	منطقه	درصد پوشش واکسن PCV3		کشور	منطقه
به تفکیک سال	۲۰۱۷			به تفکیک سال	۲۰۱۷		
۹۰	۸۴	Sierra Leone		۷۴	۷۴	Angola	
۷۹	۸۷	South Africa		۷۵	۶۳	Benin	
۸۷	۹۰	Swaziland	AFRO	۷۵	۸۳	Botswana	AFRO
۹۰	۸۹	Togo		۹۱	۹۱	Burkina Faso	
۹۰	۹۳	Uganda		۹۱	۹۴	Burundi	

PCV3 درصد پوشش واکسن به تفکیک سال ۲۰۱۷			PCV3 درصد پوشش واکسن به تفکیک سال ۲۰۱۶		
کشور	منطقه		کشور	منطقه	
۲۰۱۷	۲۰۱۶		۲۰۱۷	۲۰۱۶	
Tanzania			Cameroon		
Zambia		۵۱	Central African Republic		
Zimbabwe		۸۰	Congo		
Senegal		۹۶	Côte d'Ivoire		
Argentina		۹۲	Democratic Republic of the Congo		
Bahamas		۹۵	Eritrea		
Barbados		۹۵	Ethiopia		
Bolivia		۹۰	Gambia		
Brazil		۹۹	Ghana		
Canada		۷۹	Guinea-Bissau		
Chile		۷۱	Kenya		
Colombia		۸۲	Lesotho		
Costa Rica		۹۸	Liberia		
Dominican Republic	AMRO	۹۰	Madagascar		
Ecuador	AMRO	۸۸	Malawi		
El Salvador		۷۳	Mali		
Guatemala		۸۸	Mauritania		
Guyana		۸۴	Mauritius		
Honduras		۹۹	Mozambique		
Jamaica		۸۱	Namibia		
Mexico		۹۳	Niger		
Nicaragua		۹۹	Nigeria		
Panama		۹۹	Rwanda		
Paraguay		۹۵	Sao Tome and Principe		
Germany		۸۰	Georgia		
Greece		۸۰	Peru		
Hungary		۹۳	USA	AMRO	
Iceland		۹۴	Uruguay		
Trinidad and Tobago		.	Venezuela		
Ireland		۸۱	Afghanistan		
Israel		۹۷	Bahrain		
Italy	EURO	۷۹	Djibouti		
Kazakhstan		۳۳	Iraq		
Kyrgyzstan		۹۹	Kuwait		
Latvia		۸۲	Lebanon	EMRO	
Lithuania		۹۵	Libya		
Luxembourg		۹۹	Morocco		
Netherlands		۹۹	Oman		
Norway		۸۷	Pakistan		

PCV3 درصد پوشش واکسن			PCV3 درصد پوشش واکسن		
منطقه	کشور	به تفکیک سال	منطقه	کشور	به تفکیک سال
		۲۰۱۷			۲۰۱۷
	Portugal	۹۶		Qatar	۹۸
	Moldova	۷۸		Saudi Arabia	۹۸
	Russian	۷۰		Sudan (the)	۹۵
	San Marino	۵۳		United Arab Emirates (the)	۹۶
	Slovakia	۹۶		Yemen	۸۳
	Slovenia	۵۰		Albania	۹۹
	Spain	۸۷		Andorra	۹۸
	Sweden	۹۷		Armenia	۹۴
	Switzerland	۸۳		Azerbaijan	۹۶
	Turkey	۹۶		Belarus	۹۸
	UK and Northern Ireland	۹۲		Belgium	۹۴
	Uzbekistan	۹۹		Bulgaria	۹۱
	Bangladesh	۹۹		Cyprus	۸۱
	Myanmar	۱۴	SEARO	Denmark	۹۷
	Nepal	۴۶		Finland	۸۵
	Australia	۹۴	WPRO	France	۹۲
	Niue	۹۹		Fiji	۸۲
	Palau	۹۸		Japan	۹۸
	Papua New Guinea	۴۴		Kiribati	۹۱
	Philippines	۵۷		Lao People's Democratic Republic	۸۳
	Republic of Korea	۹۷		Marshall Islands	۷۲
	Singapore	۸۳		Micronesia	۶۵
	Solomon Islands	۸۱		Mongolia	۶۳
	Tonga	۹۹		New Zealand	۹۷
		.		Cambodia	۹۱

جدول شماره ۳ - سروتاپهای شایع استرپتوكوک پنومونیه در کشورهای دریافت‌کننده واکسن پیش و پس از دریافت واکسن

سروتاپهای شایع

14/6B/19F/19A/23F/6A/7B/3/9V/1/4/7F/18C/22F/8/11A/12F/18A/5	پیش از دریافت واکسن
19A/3/14/19F/7F/1/23F/6A/6B/11A/6C/4/22F/23A/8/35B/15A/9V/15B	پس از دریافت واکسن

جدول شماره ۴ - سروتاپ‌های شایع استرپتوكوک پنومونیه به تفکیک مناطق ۶ گانه سازمان جهانی بهداشت در کشورهای دریافت‌کننده واکسن پیش و پس از معرفی واکسن.

منطقه	سروتاپ‌های شایع پیش از واکسن	سروتاپ‌های شایع پس از واکسن
AFRO	1/19F/23F/6B/14/6A/5/3/19A/8/4/11A/9V/12F/15B/18C	1/19F/6A/14/23F/19A/6B/4/3/9V/5/13/18C/12F/8/15B/35B/10A/16F/34
AMRO	14/19A/3/7F/19F/22F/6C/11A/6A/35B/6B/23A/23B/23F/15A/12F/4/15B/16F/15C/9N/5/10A/8/9V/18C/33F/1	14/19F/6B/23F/19A/6A/3/18A/18C/9V/4/1/5/7F/35B/11A/22F/23A/12F
EMRO	14/19F/23F/1/3/6B/19A/5/6A/9V/4/18C/7F/8/6/15/11A/15A/12F	14/19F/23F/6B/19/6/9V/17/11/20/23/4/21/22/18C/5/33/1/15/16/10/19A/25/8
EURO	14/19A/3/7F/1/22F/19F/6A/4/11A/8/23F/6B/9V/23A/12F/10A/6C/23B/15B/9N/18C/35F/33F/15A/24F/35B	14/19F/23F/6B/9V/3/19A/1/6A/4/7F/8/18C/22F/12F/11A/9N
SEARO		6B/19F/14/23F/19A/1/2/5/18C/3/6A/4/7F/8/12A/9V
WPRO	19F/19A/23F/6B/3/14/6C/6A/23A/15A/11A/15B/35B/10A/15C/22F/16F/9V/34	19F/6B/23F/14/3/19A/6A/6C/9V/4/15B/23A/11A/15C/22F

جدول شماره ۵ - نوع واکسن و سال ادغام واکسن در برنامه ایمن‌سازی در کشورهای دریافت‌کننده و همچنین سروتاپ‌های شایع پس از معرفی واکسن به تفکیک مناطق WHO

منطقه	کشور	نوع واکسن	سال معرفی واکسن	سروتاپ‌های پس از واکسیناسیون
AFRO	Senegal	PCV7	2012	6B/23F/19F/1/14/6A/19A/11/15/10/2/3/5/20/18C/7
AFRO	Mozambique	PCV10	2013	1/5/14/23F/4/9V/6A/3
AMRO	Malawi	PCV13	2011	1/12F/23F/7F/19F/14/33F/5
AMRO	Ghana	PCV13	2012	19F/6B/6A/23F/11A/3/14/19A/15B/8
AMRO	Uruguay	PCV7/PCV13	2008 / 2010	1/3/7F/5/14/19F/19A/6B/6A/23F/4/9V/18C
AMRO	United States	PCV7/PCV13	2000/2010	6C/35B/7F/11A/23A/19F/23B/15A/6A/15B/16F/33F/15C/10A/9N/35F
AMRO	Peru	PCV7/PCV10	2009/2011	19F/11A/10A/6C/6B/19A/23B/23F/15C/13/15A/15B/35F/7C/14
AMRO	Mexico	PCV7/PCV13	2006/2012	19A/19F/23F/3/6A/6B/35A/14/9V
AMRO	Costa Rica	PCV7	2004	14/ 19F/3/ 23F/ 6B/11A/6A/18C/10A/15A/16F/35B/4/9V
AMRO	Colombia	PCV7	2009	14/3/1/18C/19A/6B/23F/15A/24F/9V/10A/15B
AMRO	Chile	PCV10	2011	14/19A/6B/3/6A/18C/7F/9V/1/5
EMRO	Canada	PCV7/PCV13	2001/2010	19A/7F/3/22F/14/19F/6B/6A/11A/4/5/23F/12F/9V/8/9N/18C/6C/23A
EMRO	Brazil	PCV10	2010	3/14/19A/12F/6B/6C/6A/23F/19F/4/8/7F/11A/5/9N/9V/18C/22F/20/10A/15C
EMRO	Argentina	PCV10/PCV13	2008/2010	14/1/19A/5/6B/18C/6A/7F/19F/3/23F/9V/4
EMRO	Tunisia	PCV7/PCV10/PCV13	2008/2012/2013	14/19F/1/3/23F/6B/19A/6A/4/18C/11A/19B/9/23/35B
EMRO	Saudi Arabia	PCV7/PCV13	2006/2010	23F/19F/6B/14/5/1/19A/9V/6A/7F/18C/4/15/3/11/23A/12F
EMRO	Qatar	PCV7/PCV13	2005/2010	3/14/1/19A/9V/23F/19F/12F/4/6B/35B/5/8/7C/18F/18/34
EMRO	Lebanon	PCV7/PCV10 .13	2006/2010	19F/6/3/14/1/19A/5/23F/4/18C/22F
EMRO	Kuwait	PCV7/PCV13	2006/2010	19F/23F/14/6A/6B/9V/19A/8/3/5/11A/1/20/15A/15B/4

سروتاپهای پس از واکسیناسیون	سال معرفی واکسن	نوع واکسن	کشور	منطقه
19F/23F/3/5/14/1/19A/9V/8/6B/6A/12F/35F/7F/10A/15C	2009/2011	PCV7/PCV13	Turkey	
3/7F/19A/14/4/22/8/23F/9V/1/6A/9/19F/6B/18C/11/15/23/10/6C	2007/2011	PCV7/PCV13	Switzerland	
11A/3/19A/1 5B/23A/6C/23B/35F/22F/21/33F/15C/19F/35B/1 0A/6A	2008/2009	PCV10 OR 13	Sweden	
7F/14/19F/5/8/6A/45/12F/22F/11A/24F/6C/9V/4/23F/6B/16F/23B	2001/2009/ 2010	PCV7/PCV10 /PCV13	Spain	
19F/6B/23F/14/6A/3/15B/11A/18C/19A/23A	-----	-----	Russia	
3/19A/1/7F/14/19F/6A/4/23F/6B/9V/23A/18C/23B/11A/5/8/21/16F/15A/22F/10A/35F/17F	2001/2009/ 2010	PCV7/PCV10 /PCV13	Portugal	
3/14/1/23F/4/19F/9V/6B/19A/18C/12F/9N/7F/8 /11A/22F/10A	2005/2010/ 2011	PCV7/PCV10 /PCV13	Poland	
7F/22F/4/19A/1/3/14/23F/9V/6A/33F/6B/19F/8 /9N/11A/6C/18C/35F/23A/10A/16F	2006/2011	PCV7/PCV13	Norway	
19A/14/7F/1/9V/8/4/6B/23F/3/11A/22F/10A/6 A/18C	2006/2011	PCV7/PCV10	Netherlands	
19A/1/3/7F/14/35F/19F/24F/22F/23B/8/23A/5/ 12/15/6	2001/2010	PCV7/PCV13	Italy	
6B/19A/11A/19F/6A/23A/23F/22F/35B/16F/3/18 C	2008/2010	PCV7/PCV13	Ireland	EURO
1/3/7F/19A/6/14/19F/12/6A/6B/23F/25A/33B/1 3	2008/2009/ 2010	PCV7/PCV10 /PCV13	Iceland	
11A/19A/15B/35F/3/23A/6B/6A/23F/38/19F/34 /10A/35B/31/14/18C	2005	PCV13	Hungary	
19F/6A/6B/19A/23F/14/9V/23B/23A/7F/22F/38/ 11A/3/21/16F/6C/15A	2005/2009/ 2010	PCV7/PCV10 /PCV13	Greece	
3/7F/19A/1/22F/12F/8/14/10A/9N/4/11A/19F/ 6C/24F/6A/23B/23A/23F/9V/33F/18C/15A/15B 35C/19B/6A/11B/23C/6D/15B/23B/17A/35A/22/ 23A/41F/35/7F/10B	2006/2009	PCV7/PCV13	Germany	
19A/6A/19F/15A/35B/3/11A/23A/7F/15B/23B/2 1/1/6B/15C/24F/10A/22F/35F	2001/2010	PCV7/PCV13	France	
1/14/19A/3/7F/8/6B/19F/22F/4/23F/6A/9V/18C /6C/11A/12F	2006 / 2010	PCV7/PCV13	England	
7F/1/3/19A/11A/8/9N/6C/14/6B/19F/22F/23A/ 35F/6A/12F/16F/18C/23B/33F/23F	2007/2011	PCV7/PCV13	Denmark	
	2001	PCV7	Czech Republic	
23A/15A/6C/23B/19A/11D/15B/35F/15C/6A/8/1 9C/22F/24F/39/3/31	2004/2009/ 2010	PCV7/PCV10 /PCV13	Cyprus	
3/19F/19A/6A/6C/7F/23A/11/9V/15A/18C/14/6 B/15C/23F/9N/22	2010	PCV10	Bulgaria	
19A/1/7F/14/5/6B/6A/33F/3/18C/19F/23F/9V/4 19F/23F/14/11/6B/15/9V/6A/20/6D/23A	2004 2006	PCV7 PCV7	Belgium Vietnam	
14/19F/19A/6B/23F/3/6A/15B/23A/15A/9V/4 6B/14/19A/19F/23F/6A	2005/2010/ 2011 2009	PCV7/PCV10 /PCV13 PCV7	Taiwan Singapore	WPRO

منطقه	کشور	نوع واکسن	سال معرفی واکسن	سروتایپ‌های پس از واکسیناسیون
Republic of Korea		PCV7/(PCV10 /PCV13)	2003 /2010	19F/19A/6A/23F/6B/3/11A/23A/14/9V/35B/6C/15/34/15A/10A/11
Japan		PCV7/PCV13	2010/2013	19A/3/6C/6B/15A/19F/23A/23F/35B/15C/11A/10A/22F/6A/15B/14/24F
Fiji		PCV10	2012	
China (Hong Kong)		PCV7/PCV10 /PCV13	2005/2009/ 2010	19F/23F/14/3/6B/6C/19A/6A/23A/4/15C
China		PCV7	2008	19F/19A/23F/14/6B/6A/3/15/15A/15B/9V/23A/511/20/11B/33/10
Australia		PCV7/PCV13	2001/2011	6C/19F/6A/23B/15B/23F/10A/22F/35B/6B/15C/33F/34/23A/7C/17F/21/10F/3
SEARO	Bangladesh	PCV10	2015	

پنوموکوکی را کاهش داده است، اما موارد بیماری ناشی از سروتایپ‌های غیر اختصاصی واکسن هنوز وجود دارد که نیاز به واکسن جدید با پوشش وسیع را نشان می‌دهد (۵). پس از معرفی واکسن پنوموکوک با ظرفیت بالاتر، سروتایپ‌های موجود در واکسن در مناطق مختلف به نسبت‌های متفاوت کاهش یافته است (۶). در اسپانیا واکسن‌های PCV7، PCV10 و PCV13 به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۱، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ معرفی و جایگزین شده‌اند. در این مطالعه بین سال‌های ۱۹۹۷-۹۹ (دوره‌ی پیش از معرفی واکسن) در اسپانیا سروتایپ‌های شایع B6 (درصد، ۱۴/۹۶)، A19 (درصد، ۱۶/۰۷)، 19F (درصد، ۱۵/۱۸)، 18C (درصد، ۷/۱۴) و ۴ (درصد، ۶/۲۵) بود که همه آن‌ها جزء سروتایپ‌های اختصاصی واکسن بودند. بین سال‌های ۲۰۰۵-۰۷ (دوره‌ی پس از معرفی واکسن) سروتایپ‌های شایع اختصاصی واکسن PCV7 (درصد، ۲۲/۰۸)، 14 (۱۴/۵۸)، 6A (۷/۰۸) و ۵ (درصد، ۵/۸۳) بود که با یافته‌های این مطالعه در منطقه اروپای سازمان جهانی بهداشت در مورد سروتایپ‌های A19 (درصد، ۵/۰) بود (۱۳)، که با یافته‌های این مطالعه در منطقه اروپای سازمان جهانی بهداشت در مورد سروتایپ‌های A6 (در دوره پس از معرفی واکسن هم خوانی دارد. این در حالی است که این دو سروتایپ در منطقه اروپا پیش از معرفی واکسن هم جزء سروتایپ‌های شایع هستند. سروتایپ‌های F22 و F12 که در دوره پیش از معرفی واکسن در این منطقه جزء سروتایپ‌های شایع بودند، پس از معرفی واکسن مشاهده نمی‌شوند، اما سروتایپ‌های جدیدی مانند F35، 33F، 15A، 24F و B35 پس از معرفی واکسن در این منطقه گزارش شده است که نشان دهنده توجه به این سروتایپ‌ها در تولید واکسن‌های جدید است.

استفاده‌ی گسترده از هر کدام از واکسن‌های پنوموکوک موجب کاهش چشم‌گیر بیماری شدید پنوموکوکی IPD به علت

بحث

یافته‌های این مطالعه نشان داد که در بیشتر کشورهای دریافت‌کننده واکسن، نوع واکسن مصرفی، واکسن کونژوگه ۱۰ ظرفیتی پنوموکوک و واکسن کونژوگه ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک هست. تعداد کشورهای دریافت‌کننده واکسن در مناطق مختلف سازمان جهانی بهداشت متفاوت است. بیشترین تعداد کشور دریافت‌کننده واکسن، کشورهای عضو منطقه آمریکا (AMRO) و کشورهای عضو منطقه اروپا (EURO) و کمترین تعداد کشور دریافت‌کننده واکسن کشورهای عضو منطقه آسیای جنوب شرقی (SEARO) است که این موضوع لزوم استفاده از واکسن پنوموکوک در برنامه ایمن‌سازی کشورهای این منطقه را نشان می‌دهد. با مقایسه سروتایپ‌ها پیش و پس از معرفی واکسن به خوبی مشخص شده است که ایمن‌سازی با واکسن پنوموکوک موجب تغییراتی در نوع سروتایپ‌ها شده است، اما با این حال برخی سروتایپ‌ها مثل A19، 19F، 23F، و B6 همچنان از سروتایپ‌های شایع در کشورهای دریافت‌کننده واکسن هستند.

یافته‌های این مطالعه اهمیت سروتایپ‌های شایع پس از معرفی و ایمن‌سازی گسترده واکسن پنوموکوک را ارائه می‌دهد و تفاوت منطقه‌ای را برجسته می‌کند. شیوع سروتایپ‌های غیر اختصاصی واکسن کونژوگه ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک به علت پدیده جایگزینی سروتایپ‌ها شروع به افزایش کرده که موجب بروز قابل توجهی از بیماری می‌شود که بر نیاز به واکسن‌های جدید با سروتایپ‌های اضافی برای کاهش بار بیماری تأکید می‌کند. این موضوع اهمیت بررسی و نظارت مستمر روی سروتایپ‌های شایع پنوموکوک را برجسته می‌کند.

اگرچه مصرف واکسن بروز و مرگ‌ومیر ناشی از عفونت‌های

سروتاپهای غیر اختصاصی واکسن کونزوگه ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک نسبت قابل توجهی از بیماری مهاجم پنوموکوکی را به خود اختصاص داده‌اند که این عامل نیاز به واکسن جدید با سروتاپهای غالب دیگر را برای کاهش بار بیماری مرتبط به استرپتوكوک پنومونیه نشان می‌دهد. تنوع جغرافیایی سروتاپهای و تغییر اپیدمیولوژی استرپتوكوک پنومونیه اهمیت نظارت مستمر روی سروتاپهای پنوموکوک برای راهنمایی و توصیه‌های واکسیناسیون را برجسته می‌کند (۶).

به نظر می‌رسد پس از معرفی واکسن سروتاپهای A1۹، ۱۹F، ۲۳F، و B6 همچنان از سروتاپهای شایع در کشورهای دریافت‌کننده واکسن هستند. یکی از سبب‌های شایع بودن چنین سروتاپهای ممکن است کارایی واکسن‌های تولید شده باشد که لازم است مطالعه‌های کارایی این واکسن‌ها را در کشورهای مختلف بررسی کنند. دلیل دیگر این موضوع ممکن است عدم رائمه واکسن در برخی از کشورهای مناطق ۶ گانه سازمان جهانی بهداشت باشد. برای مثال در مناطق آفریقا، آمریکا، مدیترانه شرقی، اروپا، آسیای جنوب‌شرقی و غرب اقیانوس آرام بهترتبی در ۱۳، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۷۳ و ۲۲ درصد کشورهای آن‌ها واکسن در اینمن‌سازی آن‌ها معرفی نشده است (۱۲). عدم دریافت واکسن در این کشورها ممکن است منجر به انتشار عامل بیماری به سایر کشورها و در نتیجه عدم کنترل موفق بیماری شود.

یافته‌های مطالعه‌های انجام شده به‌طور کلی نشان می‌دهد که دریافت واکسن، میزان بروز استرپتوكوک پنومونیه را در کشورهای دریافت‌کننده واکسن کاهش داده است (۲۲-۲۵). یافته‌های یک مطالعه در آمریکا در بازه زمانی ۱۹۹۹-۲۰۱۴ میلادی نشان داد که به‌طور معنی‌داری کاهش شدیدی در بروز بیماری مهاجم پنوموکوکی مربوط به سویه‌های PCV7 و PCV13 نسبت به پیش از زمان واکسیناسیون رخ داده است (۲۴). یافته‌های یک مطالعه در ۹۳ منطقه فرانسه که ارتباط بین پوشش واکسن PCV با میزان بروز منزئت منگوکوکی را در فاصله زمانی ۲۰۰۱-۱۶ بررسی کرده بود، نشان داد که میانگین پوشش واکسیناسیون PCV از ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۸۵ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است. از سوی دیگر میانگین تعداد موارد سروتاپ PCV7 منزئت

سروتاپهای اختصاصی واکسن در کودکان خردسال در کشورهای با درآمد بالا در آمریکای شمالی، اروپا و غرب اقیانوس آرام شد (۱۴-۱۶). در چین در سال ۲۰۱۳ شایع‌ترین سروتاپهای ۶A (۲۳/۵ درصد)، ۱۹A (۱۴/۱ درصد)، ۲۳F (۸/۸ درصد)، ۱۵B/C (۷/۷ درصد)، ۶B (۶/۷ درصد) و ۱۴ (۶/۰ درصد) بودند که درصد از سروتاپهای شناسایی شده را تشکیل می‌دادند و سطح پوشش واکسن PCV7 (۵۸/۶ درصد)، PCV10 (۵۹/۴ درصد) و PCV13 (۸۵/۱ درصد) گزارش شده است (۱۷). در مطالعه انجام شده در تایلند بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ و ۲۰۰۹-۱۲ سروتاپ A1۹ در بین کودکان کمتر از ۵ سال به‌طور معنی‌داری افزایش یافته (۵/۶ در برابر ۱۸/۳ درصد)، در سال ۲۰۱۲ میلادی، A1۹ عامل ۲۵ درصد از بیماری مهاجم پنوموکوکی در بین کودکان کمتر از ۵ سال بود و علاوه بر این سروتاپهای غیر اختصاصی واکسن نیز افزایش یافته (۱۴/۵ در برابر ۲۶/۸ درصد) و سروتاپ F2۳ کاهش یافته است (۱۸). در مطالعه انجام شده در استرالیا از ۴۸ سروتاپ شناسایی شده شایع‌ترین سروتاپ‌ها 6C، 19A، 15B, 16F, 19F, 11A، بودند. پس از معرفی واکسن کونزوگه ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک، کاهش شدیدی در شیوع برخی از سروتاپ‌ها مانند F2۳ که جزء سروتاپ اختصاصی واکسن کونزوگه ۷ ظرفیتی پنوموکوک بوده و همچنین سروتاپهای A6 و A1۹ که سروتاپهای اختصاصی واکسن کونزوگه ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک هستند، دیده شد (۱۹). مقایسه تغییرات توزیع سروتاپهای پنوموکوک بین افراد حامل کمتر از ۵ سال کره جنوبی در سال ۲۰۱۰، بین دوره پیش و پس از معرفی واکسن کونزوگه ۷ ظرفیتی پنوموکوک (PCV7)، نشان می‌دهد که درصد سروتاپهای PCV7 پس از معرفی واکسن به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است (از ۶۱/۹ درصد در دوره پیش به ۲۲/۸ درصد در دوره پس از معرفی واکسن) این کاهش بیشتر به‌دلیل سروتاپهای ۱۴, 19F, 23F, 18C, 6B و 9V است، در حالی که سروتاپهای 6C و 9V تغییری نکرده‌اند (۲۰). پس از معرفی واکسن کونزوگه ۷ ظرفیتی پنوموکوک و در سال‌های اولیه پس از معرفی واکسن با ظرفیت بالاتر، شایع‌ترین سروتاپ شناسایی شده در مناطق مختلف جهان سروتاپ A1۹ بود.

برای استخراج داده‌ها پیدا نشد. این محدودیت‌ها به طور بالقوه می‌توانند در یافته‌های این مطالعه ایجاد سوگیرایی داشته باشند.

نتیجه‌گیری

یافته‌های این مطالعه بیان‌گر آن است که در بسیاری از کشورهای جهان واکسن پنوموکوک با وجود توصیه سازمان جهانی بهداشت در برنامه ایمن‌سازی اضافه نشده، از این رو با تعیین سروتاپهای شایع باکتری در مناطق جنوب‌شرق آسیا، آفریقا، جنوب‌شرق آسیا و برخی از کشورها در منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت، می‌توان به سیاست‌گذاران نظام سلامت در کشورهایی که هنوز این واکسن در آن‌ها معرفی نشده است، پیشنهاد ادغام واکسن مناسب شامل سروتاپهای باکتری در برنامه ملی ایمن‌سازی آن‌ها ارائه داد. با توجه به اطلاعات استخراج شده از مطالعه‌ها شایع‌ترین سروتاپها پس از معرفی واکسن هنوز سروتاپهای اختصاصی واکسن کونژوگه ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک هستند، اما شیوع سروتاپهای غیراختصاصی واکسن کونژوگه ۱۳ ظرفیتی پنوموکوک به علت جایگزینی سروتاپها شروع به افزایش کرده که موجب بروز قابل توجهی از بیماری می‌شود که بر نیاز به واکسن‌های جدید با سروتاپهای اضافی با توجه به سروتاپهای شایع برای کاهش بار بیماری تأکید می‌شود.

تشکر و قدردانی

این مطالعه برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی است که مورد تأیید و حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان قرار گرفته است. از تمامی کسانی که نویسنده‌گان را در انجام آن یاری نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌شود.

1. Steens A, Bergsaker MA, Aaberge IS, Ronning K, Vestreheim DF. Prompt effect of replacing the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine with the 13-valent vaccine on the epidemiology of invasive pneumococcal disease in Norway. *Vaccine*. 2013; 31: 6232-8.
2. Hosseini SM, Poorolajal J, Karami M, Ameri P. Prevalence of nasopharyngeal carriage of *Streptococcus pneumoniae* in Iran: A meta-analysis. *Journal of Research in Health Sciences*. 2015; 15: 141-6.
3. Miernyk KM, Bulkow LR, Case SL, Zulz T, Bruce MG, Harker-Jones M, et al. Population structure of invasive *Streptococcus pneumoniae* isolates among Alaskan children in the conjugate

پنوموکوکی در این مناطق از ۰/۲۳ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۱ ۰/۰۴ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ رسیده است و یک روند کاهشی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ در مورد موارد سروتاپ PCV7 منتظریت مننگوکوکی مشاهده می‌شود، که نشان دهنده اثر واکسن روی کاهش موارد بیماری است، اما میزان بروز سروتاپهای غیر اختصاصی واکسن از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ رو به افزایش بوده و از ۰/۱۳ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۱ به ۰/۵۰ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۶ رسیده است (۲۳). بنابراین پایش منظم سروتاپهای غیر اختصاصی واکسن اهمیت زیادی در تولید واکسن‌های مناسب دارد.

یک مطالعه سری زمانی در بازه زمانی ۲۰۰۱-۱۴ در فرانسه نشان داد که موارد بیماری ناشی استرپتوكوک پنومونیه پس از معرفی واکسن‌های PCV7 و PCV13 به طور معنی‌داری کاهش یافته است، اما روند بروز سویه‌های غیر اختصاصی واکسن مثل F1۲، 24F، 6C، 3 و F1۹ روند رو به افزایشی را نشان می‌دهد (۲۶).

در ایران تا کنون واکسن PCV معرفی نشده است، اما مطالعه‌های انجام شده در برخی از مناطق کشور شیوع سروتاپهای جدا شده را گزارش کرده‌اند (۲۷ و ۲۸). بنابراین به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران سلامت در ایران باید در مورد معرفی واکسن PCV در برنامه کشوری واکسیناسیون، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

این مطالعه با محدودیت‌هایی مواجه بود. در برخی از مطالعه‌ها اطلاعات سروتاپ‌ها فقط در قالب گروه‌بندی (به عنوان مثال other) یا گزارش گروهی سروتاپ‌های یک گروه سرمی، زیرا تمام سروتاپ‌ها قابل ارزیابی نبوده‌اند) گزارش شده بودند و همچنین دسترسی به متن کامل برخی از مقاله‌ها امکان‌پذیر نبود. محدودیت دیگر این‌که مطالعه‌ای در کشورهای عضو منطقه جنوب‌شرقی آسیا پس از معرفی واکسن مطابق اهداف این مطالعه

منابع

1. vaccine era, 2001 to 2013. *Diagnostic Microbiology and Infectious Disease*. 2016; 86: 224-30.
2. Ampofo K, Pavía AT, Stockmann C, Hersh AL, Bender JM, Blaschke AJ, et al. The Changing Epidemiology of Invasive Pneumococcal Disease at a Tertiary Children's Hospital Through the 7-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine Era A Case for Continuous Surveillance. *Pediatric Infectious Disease Journal*. 2012; 31: 228-34.
3. Choe YJ, Choi EH, Lee HJ. The changing epidemiology of childhood pneumococcal disease in Korea. *Infection & chemotherapy*. 2013; 45: 145-58.
4. Balsells E, Guillot L, Nair H, Kyaw MH. Serotype distribution

- of *Streptococcus pneumoniae* causing invasive disease in children in the post-PCV era: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One.* 2017; 12: e0177113.
- 7. Menezes AP, Azevedo J, Leite MC, Campos LC, Cunha M, Carvalho Mda G, et al. Nasopharyngeal carriage of *Streptococcus pneumoniae* among children in an urban setting in Brazil prior to PCV10 introduction. *Vaccine.* 2016; 34: 791-7.
 - 8. Richter SS, Heilmann KP, Dohrn CL, Riahi F, Diekema DJ, Doern GV. Pneumococcal serotypes before and after introduction of conjugate vaccines, United States, 1999-2011. *Emerging Infectious Diseases.* 2013; 19: 1074-83.
 - 9. del Amo E, Esteva C, Hernandez-Bou S, Galles C, Navarro M, Sauca G, et al. Serotypes and Clonal Diversity of *Streptococcus pneumoniae* Causing Invasive Disease in the Era of PCV13 in Catalonia, Spain. *PLoS One.* 2016; 11: e0151125.
 - 10. Dagan R. Serotype replacement in perspective. *Vaccine.* 2009; 27: C22-4.
 - 11. Feikin DR, Kagucia EW, Loo JD, Link-Gelles R, Puhan MA, Cherian T, et al. Serotype-specific changes in invasive pneumococcal disease after pneumococcal conjugate vaccine introduction: a pooled analysis of multiple surveillance sites. *PLoS medicine.* 2013; 10: e1001517.
 - 12. World Health Organization. Immunization, Vaccines and Biologicals [updated 15 July 2019; cited 10 April 2019]. Available at: http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/.
 - 13. Salleras L, Dominguez A, Ciruela P, Izquierdo C, Navas E, Torner N, et al. Changes in serotypes causing invasive pneumococcal disease (2005-2007 vs. 1997-1999) in children under 2 years of age in a population with intermediate coverage of the 7-valent pneumococcal conjugated vaccine. *Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.* 2009; 15: 997-1001.
 - 14. Feikin DR, Kagucia EW, Loo JD, Link-Gelles R, Puhan MA, Cherian T, et al. Serotype-Specific Changes in Invasive Pneumococcal Disease after Pneumococcal Conjugate Vaccine Introduction: A Pooled Analysis of Multiple Surveillance Sites. *PLoS Medicine.* 2013; 10: e1001517.
 - 15. Navarro Torne A, Dias JG, Quinten C, Hruba F, Busana MC, Lopalco PL, et al. European enhanced surveillance of invasive pneumococcal disease in 2010: data from 26 European countries in the post-heptavalent conjugate vaccine era. *Vaccine.* 2014;32(29):3644-50.
 - 16. Moore MR, Link-Gelles R, Schaffner W, Lynfield R, Lexau C, Bennett NM, et al. Effect of use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in children on invasive pneumococcal disease in children and adults in the USA: analysis of multisite, population-based surveillance. *The Lancet Infectious Diseases.* 2015; 15: 301-9.
 - 17. Pan F, Han LZ, Huang WC, Tang J, Xiao SZ, Wang C, et al. Serotype Distribution, Antimicrobial Susceptibility, and Molecular Epidemiology of *Streptococcus pneumoniae* Isolated from Children in Shanghai, China. *PLoS One.* 2015; 10: e0142892.
 - 18. Phongsamart W, Srifeungfung S, Chatsuwan T, Nunthapisud P, Treerauthaweeraphong V, Rungnophakhun P, et al. Changing trends in serotype distribution and antimicrobial susceptibility of *Streptococcus pneumoniae* causing invasive diseases in Central Thailand, 2009-2012. *Human Vaccines & Immunotherapeutics.* 2014; 10: 1866-73.
 - 19. Collins DA, Hoskins A, Snelling T, Senasinghe K, Bowman J, Stemberger NA, et al. Predictors of pneumococcal carriage and the effect of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccination in the Western Australian Aboriginal population. *Pneumonia.* 2017; 9: 14.
 - 20. Cho EY, Kang HM, Lee J, Kang JH, Choi EH, Lee HJ. Changes in serotype distribution and antibiotic resistance of nasopharyngeal isolates of *Streptococcus pneumoniae* from children in Korea, after optional use of the 7-valent conjugate vaccine. *Journal of Korean Medical Science.* 2012; 27: 716-22.
 - 21. Troeger C, Blacker B, Khalil IA, Rao PC, Cao J, Zimsen SRM, et al. Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of lower respiratory infections in 195 countries, 1990-2013; 2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *The Lancet Infectious Diseases.* 2018; 18: 1191-210.
 - 22. Kleynhans J, Cohen C, McMorrow M, Tempia S, Crowther-Gibson P, Quan V, et al. Can pneumococcal meningitis surveillance be used to assess the impact of pneumococcal conjugate vaccine on total invasive pneumococcal disease? A case-study from South Africa, 2005-2016. *Vaccine.* 2019; 37: 5724-5730.
 - 23. Alari A, Cheysson F, Le Fouler L, Lanotte P, Varon E, Opatowski L, et al. Association of Pneumococcal Conjugate Vaccine Coverage With Pneumococcal Meningitis: An Analysis of French Administrative Areas, 2001-2016. *American journal of epidemiology.* 2019; 1; 188: 1466-1474.
 - 24. Gaviria-Agudelo CL, Jordan-Villegas A, Garcia C, McCracken GH, Jr. The Effect of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine on the Serotype Distribution and Antibiotic Resistance Profiles in Children With Invasive Pneumococcal Disease. *Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society.* 2017; 6: 253-9.
 - 25. Weil-Olivier C, van der Linden M, de Schutter I, Dagan R, Mantovani L. Prevention of pneumococcal diseases in the post-seven valent vaccine era: a European perspective. *BMC Infectious Diseases.* 2012; 7; 12:207.
 - 26. Alari A, Chaussade H, Domenech De Celles M, Le Fouler L, Varon E, Opatowski L, et al. Impact of pneumococcal conjugate vaccines on pneumococcal meningitis cases in France between 2001 and 2014: a time series analysis. *BMC Medicine.* 2016; 14: 211.
 - 27. Karimi M, Hosseini SM, Hashemi SH, Ghiasvand S, Zarei O, Safari N, et al. Prevalence of nasopharyngeal carriage of *Streptococcus pneumoniae* in children 7 to 14 years in 2016: A survey before pneumococcal conjugate vaccine introduction in Iran. *Human Vaccines & Immunotherapeutics.* 2019; 1-5.

Global Coverage of Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) and Serotype Distribution after Receiving Vaccine among Targeted PCV Vaccine Countries: A Systematic Review

Rahmani S¹, Karami M², Ameri P³, Adabi M⁴, Doosti Irani A⁵

1- MSc Student, Department of Epidemiology, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

2- Associate Professor, Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

3- MSc of Epidemiology, Department of Epidemiology, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

4- Assistant Professor, Brucellosis Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

5- Assistant Professor, Modeling of Noncommunicable Diseases Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

Corresponding author: Dppsti-Irani, A, a.doosti@umsha.ac.ir

(Received 25 February 2019; Accepted 27 July 2019)

Background and Objectives: After the introduction of the pneumococcal vaccine, an increase has been observed in the disease due to nonspecific stereotypes of the vaccine. This study was conducted to determine the spatial distribution of pneumococcal vaccine coverage and common stereotypes of streptococcus pneumonia after vaccine introduction in the vaccine recipient countries.

Methods: The Web of Sciences, Medline, and Scopus were searched using a designed search strategy. Studies that reported the prevalence of the stereotypes of streptococcus pneumonia and replacement of the stereotypes were included. In addition, the coverage of pneumococcal vaccination in the countries was extracted from the reports of the World Health Organization. The spatial distribution of vaccine recipient countries and vaccination coverage were determined using the ArcGIS 10.6.1.

Results: Of 6989 retrieved references, 325 studies were included. The highest proportion of vaccine recipient countries were in the African, European and Western Pacific regions. The vaccination coverage increased up to 2017 in the vaccine recipient countries. The common specific vaccine serotypes after the introduction of vaccine were 19A, 5, 3, 14, 19F, 7F, 23F, 6B. In addition, common nonspecific vaccine serotypes were 11A, 15A/B, 8, and 12F.

Conclusion: The results indicated pneumococcal vaccination is not included in the immunization program in many countries. In addition, common serotypes after vaccine introduction of include 19A, 5, 3, 14, 19F, 7F, 23F, 6B. Therefore, it is recommended the health policymakers have a plan for pneumococcal vaccine introduction based on the pattern of the commonly detected stereotypes.

Keywords: Streptococcus pneumonia, Pneumococcal vaccine, Serotype, Systematic review