

مرواری بر کاربرد ریزجلبک‌ها در تولید لوازم آرایشی - بهداشتی

ریزجلبک‌ها گروهی متنوع از میکرووارگانیسم‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی فتوسنتزکننده در اشکال و اندازه‌های مختلف هستند که با قرارگرفتن در شرایط استرس‌زا تکامل یافته و مکانیسم‌هایی در جهت حفظ بقای خود ابداع نموده‌اند. تولید ترکیبات بیوشیمیایی منحصربه‌فرد تحت عنوان ترکیبات زیستفعال یکی از این مکانیسم‌ها است. این ترکیبات ترمیم‌کننده و التیام‌دهنده پوست هستند و از پوست در برابر آسیبهای ناشی از عوامل مختلف محافظت می‌کنند و در بسیاری از موارد، از این محصولات در درمان بیماری‌ها و فرمولاسیون‌های آرایشی استفاده می‌کنند. امروزه محصولات آرایشی مشتق شده از ریزجلبک‌ها که سازگار با محیط زیست و این هستند، جایگزین محصولات موجود در بازار شدند. در این مقاله مرواری، پتانسیل بسیاری از گونه‌های ریزجلبک و مولکول‌های زیستفعال مشتق شده از آن‌ها در تولید مواد آرایشی بهداشتی مورد بحث قرار می‌گیرد. علاوه‌بر آن با ارائه محصولات میکروجلبک فعلی در بازار جهانی لوازم آرایشی، اهمیت این موجودات را در استفاده از ریزجلبک‌ها در تولید لوازم آرایشی با کیفیت برجسته‌تر می‌سازد و درنهایت هم با ارائه پیشنهاداتی از قبیل کپسوله‌سازی رنگدانه‌ها برای افزایش مقاومت و پایداری رنگدانه‌ها، کاربرد بیشتر آن‌ها را در صنایع آرایشی در آینده متصور می‌سازد.

کلیدواژه‌ها: ریزجلبک‌ها، محصولات آرایشی - بهداشتی، ترکیبات زیستفعال

دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ پذیرش مقاله: ۱۴۰۲/۰۶/۱۰

پوست و زیبایی؛ تابستان ۱۴۰۲، دوره ۱۴ (۲): ۱۲۹-۱۱۴

*^۱ بهاره نوروزی
**^۲ مهسا فناحی

^۱ محمدامین جهانگیرزاده

۱. گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

۲. انسیتیتو تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آرزوی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

نویسنده مسئول:
بهاره نوروزی

تهران، انتهای اتوبان شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات پست الکترونیک:

bahareh.nowruzi@srbiau.ac.ir

تعارض منافع: اعلام نشده است.

مقدمه

و بهداشتی رویکردی امیدوارکننده و نوآورانه در جهت توسعه محصولات سالم‌تر، کاربردی و پایدار باشد. از ریزجلبک‌ها می‌توان برای تولید برخی محصولات با ارزش یا ترکیبات زیستفعال استفاده کرد.^۱

با این حال، ترکیبات خالص شده یا عصاره‌های فعال زیستی ریزجلبکی معمولاً از نظر شیمیایی ناپایدار و به‌شدت مستعد تخریب اکسیداتیو هستند؛ به‌ویژه هنگامی که در معرض اکسیژن، نور، رطوبت، pH شدید و دماهای بالا قرار می‌گیرند. تخریب اکسیداتیو هم‌چنین ممکن است ترکیبات را مضر کرده و منجر به ایجاد طعم و بوی نامطبوع در محصول تولید شده و متعاقباً منجر به تأثیر منفی در پایداری محصول و مقبولیت محصول در نگاه مصرف کننده شود. علاوه‌بر

ریزجلبک‌ها گروهی ناهمگن از میکرووارگانیسم‌های فتوسنتزکننده یوکاریوتی و پروکاریوتی در اندازه‌ها (۰/۲ میکرومتر و حتی بزرگتر از ۷۰ میلی‌متر) و اشکال مختلف هستند که بسیاری از ترکیبات ارزشمند با کاربردهای صنعتی را تولید می‌کنند. این ترکیبات بیولوژیکی با ارزش بالا شامل رنگدانه‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها، پلی‌ساقاریدها، تری‌گلیسیریدها، اسیدهای چرب و ویتامین‌ها هستند.

به‌نظر می‌رسد فعالیت‌های ضدسرطانی، آنتی‌اکسیدانی، ضدالتها، ضدمیکروبی و تعديل‌کنندگی سیستم ایمنی، از جمله خواص مرتبط با این ترکیبات با ارزش باشد. این گونه خواص موجب شده تا استفاده از این ترکیبات در حوضه محصولات آرایشی

پاسخ‌های فیزیولوژیکی آن‌ها به عوامل زنده و غیرزنده، مانند شدت نور، دوره نوری، دما، مواد مغذی و فاز رشد متفاوتند. این عوامل بر فتوسنتر و مسیر و فعالیت متابولیسم سلولی تأثیر می‌گذارند که موجب تغییر در ترکیب سلولی می‌شود.^۳ در اکثر ریزجلبک‌ها، ترکیبات زیست‌فعال در زیست‌توده انباسته می‌شوند، با این حال در برخی موارد این متابولیت‌ها به عنوان اگزومتابولیت در محیط دفع می‌شوند. این ترکیبات می‌توانند مستقیماً از طریق متابولیسم‌های اولیه یا مانند پروتئین‌ها، اسیدهای چرب و ویتامین‌ها طی متابولیسم ثانویه سنتز شوند.

ظاهر رنگارنگ ریزجلبک‌ها ناشی از رنگدانه‌هایی است که نور مرئی را جذب و نقش اساسی در فتوسنتر برعهده دارند. سه دسته اصلی این ترکیبات کلروفیل‌ها، کاروتونئیدها و فیکوبیلیپروتئین‌ها هستند. کلروفیل - a رنگدانه اولیه در همه موجودات فتوسنتری است، بیشترین انرژی را از طول موج‌های نور آبی - بنفش و قرمز - نارنجی جذب می‌کند و به عنوان دهنده الکترون اولیه در زنجیره انتقال الکترون عمل می‌کند.

همه ریزجلبک‌ها حاوی یک یا چند نوع کلروفیل هستند که براساس ویژگی‌های ساختاری و جذب طول موج آن‌ها طبقه بندی می‌شوند. نوع - a^۴ - b در کلروفیتا و اوگلنوفیتا یافت می‌شود. کلروفیل - c - d و - e را می‌توان در ریزجلبک‌های دریایی و دیاتوم‌های آب شیرین یافت. دسته دیگر کاروتونئیدها هستند که جزو مواد محلول در چربی با رنگ‌های متفاوت از قهوه‌ای، قرمز، نارنجی تا زرد هستند.^۵

این رنگدانه‌ها دو نقش کلیدی در فتوسنتر دارند؛ جذب نور در مناطق طیف مرئی و محافظت نوری سیستم‌های فتوسنتری. تمام کاروتونئیدهایی که مستقیماً در فتوسنتر نقش دارند، کاروتونئیدهای اولیه نامیده می‌شوند؛ جایی که در انتقال انرژی جذب شده به کلروفیل‌ها شرکت می‌کنند بنابراین، طیف

این‌ها، حلالت ضعیف در آب معمولاً از جمله مشکلات پیش‌ رو و مربوط به کاربرد ترکیبات زیست‌فعال در محصولات مختلف است.

برای مثال در محصولات غذایی دارویی و کاربردی، جذب این ترکیبات ممکن است به دلیل شرایط دستگاه گوارش و خواص فیزیکی و شیمیایی آن‌ها با مشکل مواجه شود. در این زمینه، سیستم‌های کپسوله‌سازی یک رویکرد امیدوارکننده در نظر گرفته می‌شوند که با موفقیت در زمینه‌های مختلف به کار گرفته شده‌اند. این فرآیند شامل احاطه کردن یک ماده در یک پوشش از طریق تکنیک‌های مختلف است که منجر به تولید نانو یا میکروذرات می‌شود. این استراتژی با چندین مزیت همراه است که از آن‌ها می‌توان به محافظت از ترکیب در طول پردازش، ذخیره‌سازی و توزیع تا مصرف و همچنین ارتقای کنترل انتشار، پوشاندن طعم‌ها و بهبود حلالت اشاره کرد.^۶

بررسی‌ها نشان داده بیشترین اثر ترکیبات ریزجلبکی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن‌هاست که به طور کلی می‌توان آنرا با استفاده از روش‌های متعدد مانند مهار رادیکال سوپراکسید، مهار رادیکال هیدروکسیل، مهار رادیکال ۱،۱ - دی‌فنیل - ۲ - پیکریل هیدرازیل، اسید تیوباربیتوریک، تیوسیانات آهن، مهار رادیکال ۲، ۲۰ - آزینوبیس - ۳ - اتیل بنزوتیزولین - ۶ - سولفونات و سنجش مهار پراکسید لیپید اندازه‌گیری کرد. پس از مشخص شدن فعالیت آنتی‌اکسیدانی ترکیبات زیست‌فعال، محققان دریافتند که عصاره‌های ریزجلبکی یا ترکیبات زیست‌فعال مشتق شده از آن‌ها پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به محصولات جدید همچون لوازم آرایشی، دارویی، مواد غذایی، بیوپلاستیک‌ها و بیوپلیمر‌ها دارند.^۷

ترکیبات زیست‌فعال مستخرج از ریزجلبک‌ها

ریزجلبک‌ها مجموعه‌ای از مولکول‌های بیوشیمیایی تولید می‌کنند که با توجه به سویه ریزجلبکی و

می‌توانند حتی سطوح بالاتری نسبت به مقادیر موجود در سبزیجات داشته باشند.^۸

معرفی برخی ترکیبات زیست‌فعال مستخرج از ریزجلبک‌ها

آستاگزانتین: از هماتوکوکوس پلوویالیس (رنگ قرمز) به دست می‌آید و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ده برابر قوی‌تر از سایر کاروتونوئیدها (مانند بتاکاروتون، زاگزانتین و غیره) و ۱۰۰ برابر قوی‌تر از آلفا توکوفرول دارد. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که آستاگزانتین در پاسخ‌های التهابی سیستم ایمنی، در فشار خون بالا، سرطان، بیماری‌های چشم و بیماری‌های قلبی - عروقی و هم‌چنین در مقابله با پیرشدگان پوست بسیار مؤثر است.^۹

لیکوپن: به خانواده کاروتونوئیدها تعلق داشته و یک آنتی‌اکسیدان کارآمد است که می‌تواند رادیکال‌های آزاد مشتق شده از اکسیژن را خنثی کند. امروزه از لیکوپن در فرمولاسیون‌های مراقبت فردی به عنوان یک عامل ضدپیری استفاده می‌شود. علاوه‌بر آن از آتابنا و اژینیکولا می‌توان به عنوان یکی از منابع لیکوپن یاد کرد.^{۱۰}

فوکوگزانتین: یک رنگدانه کاروتونوئیدی است که مصرف آن با بهبود مقاومت به انسولین و کاهش سطح گلوکز خون همراه با اثرات ضدسرطانی و ضدالتهابی همراه است. فئوداکتیلیوم تریکورنوتوم که یک دیاتوم دریایی است، منبعی غنی از فوکوگزانتین می‌باشد.^{۱۱}

فیکوسیانین: یک رنگدانه فتوسنتزی آبی رنگ که می‌توان از آن به عنوان رنگ در لوازم آرایشی مانند خط چشم و رژ لب استفاده کرد. مطالعات نشان داده برخی از فعالیت‌های بیولوژیکی مانند فعالیت‌های ضدتوموری، ضدباکتریایی، ضدالتهابی و محافظت از کبد، به طور مستقیم با ظرفیت آنتی‌اکسیدانی آن مرتبط هستند. آرتروسپیرا ماکسیما و آرتروسپیرا پلاتنسیس دو منبع غنی از فیکوسیانین هستند.^{۱۲}

جذب‌کننده نور سلول را گسترش می‌دهد. برخی از گونه‌های ریزجلبکی می‌توانند به عنوان پاسخی به تنش‌های محیطی مانند نور باشد بالا، کمبود مواد مغذی و تغییرات دما، تحت فرآیند کاروتونوئیدهای ثانویه گیرند. این مواد که به عنوان کاروتونوئیدهای ثانویه طبقه‌بندی می‌شوند، نقش عمده‌ای در مکانیسم‌های محافظتی سلول ایفا می‌کنند. وجود این کاروتونوئیدها مانع از تشکیل گونه‌های فعال اکسیژن می‌شود که ناشی از خاصیت آنتی‌اکسیدانی این گروه از رنگدانه‌ها است. نمونه‌هایی از کاروتونوئیدهای اولیه عبارتند از آلفا کاروتون، بتاکاروتون، لوئین، ویولاگزانتین، زاگزانتین و نئوگزانتین؛ در حالی که کاروتونوئیدهای ثانویه معمولی شامل آستاگزانتین، کانتاگزانتین و اکیننون هستند. علاوه‌بر کلروفیل‌ها و کاروتونوئیدها، فیکوبیلی‌پروتئین (کمپلکس رنگدانه - پروتئین) نیز معمولاً در سیانوباکتری‌ها، رودوفیتا و کریپتومنادها وجود دارد که اجزای سلولی فلورسنت محلول در آب هستند.^{۱۳}

با توجه به توالی اسیدهای آمینه و طیف جذب، فیکوبیلی‌پروتئین‌ها را می‌توان به چهار کلاس اصلی تقسیم کرد: آلوفیکوسیانین (سیز مایل به آبی)، فیکوسیانین (آبی)، فیکواریترین (قرمز) و فیکواریتروسینین (نارنجی). تولیدکنندگان اصلی رنگدانه‌های میکروجلبکی گونه‌های آرتروسپیرا پلاتنسیس، پورفیریدیوم کروئنتوم، هماتوکوکوس پلوویالیس و دونالیلا سالینا هستند که به ترتیب قادر به جمع‌آوری مقدار قابل توجهی از فیکوسیانین، فیکواریترین، آستاگزانتین و β -کاروتون هستند.^{۱۴}

ریزجلبک‌ها هم‌چنین منبع ارزشمندی از ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. ویتامین‌های A، B1، B2، B6، C، E، K، نیاسین، نیکوتینات، بیوتین و اسیدفولیک از جمله نمونه‌هایی هستند که در این میکروارگانیسم‌ها یافت می‌شوند. در برخی از جنس‌های ریزجلبکی مانند آرتروسپیرا، کلرلا و سیندسیموز، ویتامین A، B2، B1، E و نیاسین

آرایشی متعددی مانند محافظت از سیستم ایمنی، محافظت از سلول، محافظت در برابر اشعه فرابنفش و محافظت از غشاء دارد. اکتوئین‌ها را می‌توان در باکتری‌های هالوفیل مانند هالوموناس الونگاتا، هالوموناس بولیوینسیس، بروی‌باکتریوم اپیدرمیدیس، کروموهالوباکتر ایسرائیلنسیس یا کروموهالوباکتر سالکسیجنس یافت.^{۱۸}

مايكوسپورين - ۲ - گلیسین (M2G): یک اسید آمینه نسبتاً کمیاب و مهارکننده تشکیل AGE (محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته) است که می‌تواند یک ترکیب مهم در محصولات ضدپیری باشد. مطالعات نشان داده‌اند که نوستوک کامیونی، آتابنا واریابیلیس و آفانوتیس هالوفیتیکا می‌توانند مايكوسپورین - ۲ - گلیسین را سنتز کنند.^{۱۹}

فوکوسترون: یک جزء ساختاری غشای سلولی و یک ترکیب استرول طبیعی است که خاصیت آنتیاکسیدانی و ضدسرطانی دارد که می‌تواند در بیان MMPS کاهش و در تولید کلاژن افزایش یابد. اولیشوردیسکوز لوئوس حاوی ۳۱/۳ درصد از کل زیست توده فوکوسترون و ناتوکلروپیسیس سالینا نیز حاوی درصد بالایی از آن است.^{۲۰}

سیتونمین: یک رنگدانه کوچک چربی‌دوست، خارج سلولی و زرد - قهوه‌ای است که توسط سیانوباکتری‌ها و در غلاف آن‌ها سنتز می‌شود، تا زمانی که در معرض تابش زیاد خورشید قرار می‌گیرد از آن در برابر اشعه UVA با جذب تا ۹۰٪ محافظت کند. UVA ژن مسئول بیوسنتز سیتونمین را تحریک و شروع به تولید سیتونمین می‌کند و در ماتریکس خارج سلولی انباسته می‌شود. سیتونمین و مشتقات سیتونمین را می‌توان توسط آتابنا، کالوتیریکس، کلروگلؤنپیسیس، دیپلوكولون، گلؤوکاپسا، هاپالوسایفون، لینگبیا، نوستوک، فورمیدیوم، پلیوروکاپسا، ریویولاریا، اسکیزوتریکس، سیتونما و تولیپوتروکس تولید کرد.^{۲۱} لوتئین: از پوست در برابر آسیب‌های ناشی از اشعه

فیکوسیانوبیلین‌ها (رنگدانه آبی) و فیکواریتروبیلین‌ها: از اسپیرولینا و پورفیریدیوم به دست آمده و خاصیت آنتیساسکیدانی بالقوه‌ای دارند. این ترکیبات، رنگ‌های پروتئینی با سمیت کم و جایگزینی مناسب برای رنگ‌های مصنوعی هستند.^{۲۲}

β - کریپتوگزانتین: یک کاروتون موجود در دونالیلا سالینا است که علاوه‌بر خاصیت ضدالتهابی، قادر به القای سنتز اسید هیالورونیک - که یک گلیکوز‌آمینوگلیکان دخیل در آبرسانی پوست است - می‌باشد.^{۲۳}

کلروفیل: برخی از گونه‌های جنس کلرلا (عمدتاً کلرلا ولگاریس) برای به دست آوردن کلروفیل به منظور استفاده به عنوان رنگدانه در فورمولاسیون‌های آرایشی مورداستفاده قرار گرفته‌اند. کلروفیل‌ها در دئودورانت‌ها، به دلیل توانایی آن‌ها در پوشاندن بوها و همچنین در خمیردندان‌ها کاربرد دارند؛ اما خواص ضدسرطانی نیز به آن‌ها نسبت داده شده است.^{۲۴}

β-3-گلوکان: مهم‌ترین ترکیب تولیدشده توسط گونه‌های جنس کلرلا است که محرک سیستم ایمنی، پاک‌کننده رادیکال‌های آزاد و کاهش دهنده چربی خون می‌باشد.^{۲۵}

ویتامین E: ویتامین E یک آنتیاکسیدان مؤثر در نظر گرفته می‌شود و به طور گستردگی در فرمولاسیون‌های آرایشی استفاده می‌شود. دونالیلا ترتیولکتا و تتراسلمیس سویسیکا، غلظت نسبتاً بالایی از ویتامین‌ها را تولید می‌کنند که یکی از آن‌ها ویتامین E است. این ویتامین به عنوان یک سیستم وابسته به نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید هیدرات (NADH) از پوست پستانداران در برابر آسیب‌های ناشی از اشعه فرابنفش محافظت می‌کند. علاوه‌بر این، می‌تواند به طور ویژه‌ای در لایه شاخی که در بالای پوست قرار دارد و انتشار غیرفعال آب را کنترل می‌کند، جذب شود.^{۲۶}

اکتوئین (۱،۴،۵،۶ - تتراهیدرو - ۲ - متیل - ۴ - پیریمیدین کربو زایلیک اسید): اکتوئین مزایای

فعالیت پروتئازوم در پوست، عمق آن‌ها را کاهش می‌دهد^{۲۰}.

لوازم آرایشی مستخرج از جلبک‌ها و مؤثر در سلامت پوست

پوست که به عنوان سد اولیه در برابر ازبین‌رفتن مواد درون‌زا و هم‌چنین نفوذ عوامل خارجی به بدن عمل می‌کند و ازانجایی که در ارتباط مستقیم با محیط قرار دارد، هدف برخی عوامل برون‌زا مانند اشعه فرابنفش، عوامل بیماری‌زا، آلودگی و سایر ترکیبات سمی است. چنین عواملی معمولاً با تولید بیش از حد گونه‌های فعال اکسیژن و سایر رادیکال‌های آزاد مرتبط هستند و ممکن است اثرات مضر زیادی از جمله آسیب DNA، استرس اکسیداتیو، پیری نوری، و سرطان‌زاگی ایجاد کنند که نیاز به پیشگیری و یا درمان دارند.

اگرچه پوست مجهز به یک سیستم آنتی‌اکسیدانی بسیار پیچیده است که از آن در برابر عوامل درونی و بیرونی محافظت می‌کند، با این حال این سیستم آنتی‌اکسیدانی پوست ممکن است در اثر عوامل مختلف دچار آسیب شود. استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی در جهت پیشگیری از آسیب‌ها یا بهبود ساختار، مورفولوژی و ظاهر پوست یا دیگر قسمت‌های خارجی بدن که تحت تأثیر چنین عواملی قرار گرفته‌اند، یک راه حل در رفع این مشکل است. بخش بزرگی از این محصولات شامل فرمولاسیون‌های موضعی پوست است که از مواد کمکی و یک یا چند ماده فعال تشکیل شده و در بهبود آسیب‌های وارد به پوست یا پیشگیری از آن‌ها مؤثر هستند^{۲۱}.

علاوه‌بر این، عصاره‌های ریزجلبک‌ها دارای ترکیبات زیست‌فعال مختلفی هستند که روند بهبودی را تسريع و رطوبت پوست را حفظ می‌کنند و متابولیت‌های ثانویه موجود در آن‌ها مانند پرووتئین‌ها، کاروتونوئیدها، رنگدانه‌ها، اسیدهای چرب می‌توانند از ایجاد لک جلوگیری کرده، پوست آسیب‌دیده را ترمیم و رطوبت

UV محافظت می‌کند. از منابع آن می‌توان به کلرلا پروتوكویداز، سیندسموز المرينسيس، موريولوپسيس sp، نثوسپونجی کوکوس گلاتينوزوم، کلروکوکیوم سیتریفورم، کلرلا زوفینجينسیس، دونالیلا سالینا و گالدیریا سولفوراریا اشاره کرد^{۱۹}.

هورمون‌های گیاهی: جنس‌های مختلف سیانوباكتری‌ها و جلبک‌ها گروه متنوعی از هورمون‌های گیاهی را که در رشد و نمو گیاهان دخیل هستند، تولید و آزاد می‌کنند. فیتوهورمون‌ها، از جمله اکسین، اسید آبسیزیک، سیتوکینین، اتیلن (ET) و ژیبرلین‌ها، در طیف وسیعی از دودمان‌های ریزجلبکی یافت شده‌اند. فیتوهورمون‌های ریزجلبکی می‌توانند در مقابله با علائم پیری پوست نقش داشته باشند^{۱۹}.

پلی‌ساکاریدهای ریزجلبکی: کاربردهای بالقوه‌ای در محصولات آرایشی دارند. به‌طور مثال به عنوان عوامل ژل‌کننده و غلیظ‌کننده در فرمول‌های آرایشی مختلف یا مرتبط‌کننده کاربرد دارند. دارای خواص ضدویروسی، ضدالتهابی، تعديل‌کننده سیستم ایمنی و هم‌چنین روان‌کننده مفاصل هستند. محبوب‌ترین جنس‌ها و گونه‌های تولید‌کننده این پلی‌ساکاریدها شامل تراسللمیس sp، ایزوکراپسیس sp، پورفیریدیوم کروئنتم و پورفیریدیوم پورپوریوم و کلرلا و پدیستربیوم دیوپلکس هستند^{۱۹}.

عصاره‌های ریزجلبکی: برخی از عصاره‌های ریزجلبک‌ها را می‌توان در محصولات مراقبت از پوست استفاده کرد (به عنوان مثال، عصاره کلرلا ولگاریس سنتز کلائز را در پوست تحریک می‌کند و می‌تواند در محصولات حمایت‌کننده از بازسازی بافت و کاهش چین و چروک استفاده شود). برخی عصاره‌های ریزجلبکی می‌توانند از پوست در برابر آسیب‌های ناشی از آفتاب محافظت کنند (به‌طور مثال، عصاره فئوداکتیلیوم تریکورنوتوم از پوست در برابر اثرات مضر قرار گرفتن در معرض اشعه فرابنفش محافظت می‌کند، ایجاد چین و چروک را به تأخیر می‌اندازد و با تحریک

کاربرد دارند و استرولهای ریزجلبکی را می‌توان در کرم‌های مرطوب‌کننده استفاده کرد. رنگدانه‌های ریزجلبکی مانند کلروفیل، کتوکاروتینوئید، آستاگرانتین و بتاکاروتون در کرم‌های ضدپیری، لایه بردارهای ضدتحریک و محصولات مراقبت از پوست کاربرد دارند. برخی ترکیبات دیگر همچون آستاگرانتین‌های کتوکاروتینوئید و بتاکاروتون‌ها مولکول‌های پیش‌ساز ویتامین A هستند. گزارش شده که پلی‌ساقاریدهای ذخیره شده در سیتوپلاسم ریزجلبک‌ها می‌توانند تأثیر مهمی بر درمان‌های زیست‌پزشکی داشته باشند. از سوی دیگر این واقعیت که برخی از این پلی‌ساقاریدهای رادیکال‌های آزاد و حرک‌های ایمنی جمع‌کننده‌های رادیکال‌های خوبی برای استفاده فعال هستند، آن‌ها را کاندیدهای خوبی برای استفاده در لوازم آرایشی مراقبت از پوست، به‌ویژه در جلوگیری از پیری پوست (مرتبط با عوامل محیطی) و اکسیداسیون ناشی از رادیکال‌های آزاد می‌کند.^{۲۴}

بررسی پتانسیل ضدپیری ترکیبات زیست فعال

پیری پوست را می‌توان به دو دسته پیری درونی و بیرونی تقسیم کرد. پیری درونی ناشی از عوامل داخلی مانند اختلالات هورمونی، تغییرات ژنتیکی یا کمبود ویتامین است، در حالی که پیری بیرونی ناشی از عوامل خارجی مانند اشعه فرابنفش، سموم و عدم مراقبت از پوست است. درنتیجه پیری ذاتی، زوال پوست از نظر کاهش شفافیت، کیفیت و ازدستدادن خاصیت ارجاعی بهدلیل برجسته‌ترشدن عروق رخ می‌دهد.

عامل اصلی پیری پوست، قرارگرفتن در معرض اشعه فرابنفش است. بیش از ۳۰۰ نظریه در مورد فرآیند پیری وجود دارد و تشکیل محصولات نهایی گلیکاپسیون پیشرفت، اثرات ROS و متالوپروتئینازهای ماتریکس (MMPs)، مهم‌ترین فرآیندهای آن هستند. با وجود اینکه بهطور طبیعی عوامل آنتی‌اکسیدانی در

پوست را حفظ کنند. از دیگر ترکیبات ریزجلبکی می‌توان به پپتیدهای ضدمیکروبی اشاره کرد که نقش منحصر به‌فردی در رنگ پوست، هموستاز ماتریکس خارج سلولی، مدیریت آکنه، نوسازی سلولی، سفیدکردن پوست، کنترل التهاب، القای رگزایی و مدیریت استرس اکسیداتیو برعهده دارد.^{۲۵}

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های محصولات آرایشی و بهداشتی این است که باید ایمن باشند؛ زیرا مواد شیمیایی موجود در آن‌ها ممکن است عوارض جانبی مانند ایجاد واکنش‌های حساسیت مفرط، واکنش آنافیلاکتیک یا مسمومیت کشنده را نشان دهند. این قبیل اثرات باید قبل از استفاده، شناسایی و نظارت شوند تا از عوارض جانبی حاصل از آن‌ها اطمینان حاصل شود. برخی از آزمایشات مهم در این زمینه شامل تست سنجش سمیت ژنتیکی، سمیت نوری، سمیت فوتوزن، سوم سینتیک و سرطان‌زاوی است که برای شناسایی یک ترکیب به عنوان یک ماده آرایشی ایمن باید مورد بررسی قرار گیرند.

بدون شک محصولات آرایشی - بهداشتی مشتق شده از ترکیبات ریزجلبکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید در این زمینه‌ها مورد بررسی قرار گیرند. برای مثال در زمینه بررسی پتانسیل سرطان‌زاوی ترکیبات زیستی مشتق شده از ریزجلبک‌ها، می‌توان از آزمایش‌های سمیت ژنتیکی و یا سمیت نوری ترکیبات زیستی ریزجلبکی و تست فوتوهمولیز گلبول‌های قرمز استفاده کرد. رده سلولی سرطان کبد انسان (HepG2) و رده سلولی ملانوم موشی (B16F10)، دو رده سلولی مناسب برای ارزیابی در این زمینه هستند.^{۲۶}

در دهه‌های اخیر با افزایش علاقه به لوازم آرایشی، نیاز به منابع ایمن و پایدار برای تولید لوازم آرایشی و بهداشتی افزایش یافته است. عصاره‌های ریزجلبکی و یا ترکیبات زیست‌فعال آن‌ها معمولاً در محصولات مراقبت شخصی مانند لوسیون، کرم، شامپو، صابون

هر مولکول این رنگدانه دو مولکول ویتامین A (رتینول) تولید می‌کند. ویتامین A آسیب‌های اکسیداتیو نوری روی پوست را کاهش می‌دهد و از پوست در برابر آفت‌ابس‌سوختگی، پیری پوست و ایجاد چین و چروک محافظت می‌کند. محصول ریزجلبکی دیگر به نام اسکوالن و شکل هیدروژن آن اسکوالان توانایی حفظ اثرات ضدالکتریسیته ساکن و نرم‌کننده کرم‌های مرطوب‌کننده را داردند تا کیفیت پوست ایده‌آل را تضمین کنند. همچنین فعالیت آنتی‌اکسیدانی مهمی برای آبرسانی به پوست و کاهش لکه‌های پیری و هایپرپیگمانتسیون به دلیل خواص غیرسمی، غیرحساس و غیرتحریک‌کننده از خود نشان می‌دهند. منبع اصلی اسکوالن کبد کوسه است؛ اما ریزجلبک‌ها را می‌توان به عنوان کاندیدای خوبی برای تولید اسکوالن ارزیابی کرد. درنتیجه چندین آزمایش، بوتریکوکوس برایونی، اسکیزوکیتریوم مانگرووی و تراستوکیتریوم sp. به عنوان تولیدکنندگان اسکوالن تعیین شده‌اند. در جدول یک برخی از ترکیبات با فعالیت ضدپیری و ریزجلبک‌های تولیدکننده آن‌ها به همراه خاصیت آن‌ها آورده شده است.^{۲۶}

پتانسیل ضدآفتاب ترکیبات زیست‌فعال مشتق از ریزجلبک‌ها

UVB تشعشع اصلی از تابش‌های خورشیدی است و اثرات بسیار خطرناسکی مانند شکستن رشته‌های DNA، اختلال در غشاء، غیرفعال شدن آنزیم، تشکیل ضایعات DNA سیتوتوکسیک بر موجوداتی که در معرض نور خورشید قرار دارند، دارد. اشعه UVA به طور غیرمستقیم با تشکیل گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) به DNA آسیب می‌زند. درنتیجه این اثرات، UVA و UVB اثرات سرطان زا و جهش زا را بر بدن انسان نشان می‌دهند و پیری پوست و بیماری‌های پوستی را تسريع می‌کنند.

پوست وجود دارد که موجب جلوگیری از بی‌ثباتی سلولی ناشی از تشکیل و تجمع ROS هستند، این مکانیسم حفاظت طبیعی با افزایش سن دچار اشکالاتی می‌شود و سطح آنتی‌اکسیدانی آن کاهش می‌یابد. در این شرایط، عصاره ریزجلبک‌ها و کلروفیل، کاروتونئیدها، فوکوسترون، اسکوالن، آمینواسیدهای شبهمایکوسپورین و غیره که از چندین ریزجلبک مشتق شده‌اند، می‌توانند به عنوان عامل آنتی‌اکسیدانی برای مهار پراکسیداسیون لیپیدی، پراکسید، سوپراکسید و فرمولاسیون هیدروکسیلیون‌ها برای محافظت از آسیب‌های پوستی استفاده شوند بنابراین، سطح آنتی‌اکسیدان حفظ می‌شود و از آسیب پوست توسط ROS جلوگیری می‌شود.

آزمایشات نشان داده‌اند که استرس اکسیژن اجزای آنتی‌اکسیدانی اسپیرولینا پلاتنسیس را تا ۲/۳ برابر افزایش می‌دهد. MMP‌ها آنزیم‌های اصلی ماتریکس خارج سلولی هستند و باعث تخریب کلاژن، کاهش خاصیت ارتجاعی پوست، ایجاد چین و چروک و افزایش پیری پوست می‌شوند.^{۲۵}

اگرولی ساکاریدها (EPS) تولیدشده توسط ریزجلبک‌ها را می‌توان به عنوان یک محصول مرتبط‌کننده قابل توجه در نظر گرفت. EPS شامل چندین بیوپلیمر قابل توجه است که وزن مولکولی بالایی دارند. ریزجلبک‌ها این بیوپلیمرها را تولید می‌کنند و در حین کشت آن‌ها را به محیط کشت ترشح می‌کنند. گلوكورونیک اسید یکی از آن‌هاست که می‌توان از آن برای جلوگیری از خشکی پوست و تنظیم محتوای آب در پوست استفاده کرد. کلرلا پیرنونیدوسا-9 FACHB-9، کلروکوکیوم sp.، پورفیریدیوم کروئنتم، اسپیرولینا پلاتنسیس و سیندسموز sp. به عنوان تولیدکنندگان EPS شناخته می‌شوند. دونالیلا سالینا، سیندسموز sp. و اسپیرولینا sp. مقدار بالایی از بتاکلروتن با فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالا تولید می‌کند.

جدول ۱: ترکیبات ریزجلبکی موثر با اثرات ضدپیری^{۲۷}.

ترکیب	ریزجلبک	اثر آرایشی
فوکوستروول	اولیستودیسکوز لوئوس و ناتوکلروپسیس سالینا	مهار نهایی محصولات گلیکاسیون پیشرفته کاهش بیان متالوپروتینازهای ماتریکس و افزایش تولید کلاژن
هیدروکسی اسید	پدیستریوم دیوپلکس، کلامیدوموناس، رینهاردتی، کلرلا، پیرنوئیدوز، سیانیدیوم، کالداریوم، آناندا واریابیلیس، آناسیستیس نیدولانس، اوسیلاتوریا اسپسیس، فورمیدیوم و فووئولا ریوم	رطوبت رسانی به پوست
رتینول	دونالیلا سالینا، سیندسموز Sp. و اسپیرولینا Sp.	کاهش آسیب‌های اکسیداتیو روی پوست و محافظت از پوست در برابر آتاب سوختگی، پیری پوست و ایجاد چین و چروک
اسکوالان	اورانتیوکیتریوم sp. و تراستوکیتریوم sp.	بوتری کوکوس برایونی، اسکیزوکیتریوم، منگرووی، آبرسانی به پوست، کاهش لکه‌های پیری و هایپرپیگماتانتاسیون

زیست، بهویژه موجودات دریایی آسیب بزنند. مشخص شده است که اکسی بنزون، یک جاذب شیمیایی، برای موجودات دریایی سمی است بنابراین، جذب کننده‌های بیولوژیکی بهدلیل سازگاری با محیط زیست محبوبیت بیشتری پیدا کرند و در این راستا ریزجلبک‌ها بهدلیل محتوای بالای مولکول‌های فیلتر UV بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. از این مولکول‌ها می‌توان به اسپوروپولنین، سیتونمین، اسیدهای آمینه شبهمایکوسپورین، کاروتونئیدها و سایر ترکیبات مانند گلوکوزید بیوپترین، لیکوپن به عنوان مولکول فیلتر UV و اکتوئین برای محافظت در برابر اشعه فرابنفش و فوتواجینگ (پیری پوست) اشاره کرد.^{۲۸}

اسیدهای آمینه مانند سیتونمین و مایکوسپورین مهم‌ترین و مورد مطالعه‌ترین مولکول‌های ریزجلبکی مورداستفاده در ضدآفاتاب‌ها هستند. بیش از ۲۲ آمینواسید شبهمایکوسپورین (MMA) توسط ارگانیسم‌های دریایی مانند سیانوبکتری‌ها، ریزجلبک‌ها، جلبک‌های ماکرو، قارچ‌ها و غیره تولید می‌شود که با محافظت از سلول‌ها در برابر اشعه‌های UV و UVA و جذب تشعشع و پخش انرژی حرارتی اضافی به سلول و محیط اطراف، به عنوان محافظت عمل

ریزجلبک‌ها مکانیسم‌های مختلفی را برای محافظت از خود در برابر اشعه فرابنفش توسعه دادند: ۱) بیان آنزیم‌های ترمیم DNA، ۲) تولید آنزیم‌های آنتی‌اسیدانی، ۳) اجتناب از UV و ۴) تولید و تجمع متابولیت‌های فیلتر UV. این مکانیسم‌ها برای زنده‌ماندن ریزجلبک‌ها در شرایط سخت بسیار مهم هستند و همچنین بیوسنتر این متابولیت‌های فیلترکننده UV، که «ضدآفاتاب‌های میکروبی» نیز نامیده می‌شود، ریزجلبک‌ها را کاندیدای بالقوه‌ای برای صنایع آرایشی و بهداشتی می‌کند تا در ضدآفاتاب‌های مشتق شده از طبیعت استفاده شوند. دو راه برای محافظت در برابر اشعه فرابنفش وجود دارد: جذب یا بازتاب اشعه.

فیلترهای فیزیکی تابش خورشید را منعکس می‌کنند تا از نفوذ آن به پوست جلوگیری کنند. جاذب‌های شیمیایی اشعه فرابنفش را جذب می‌کنند تا از رسیدن آن به DNA جلوگیری کنند. اکثر کرم‌های ضدآفاتاب در فرمولاسیون خود، جاذب و بازتابنده هستند، با این حال، کرم‌های ضدآفاتاب ممکن است از پوست در برابر اشعه فرابنفش با طول موج‌های مختلف محافظت نکنند و در عین حال به محیط

یکنواختی از بین می‌رود، که حتی اگر مضر نباشد، می‌تواند باعث مشکلات جدی مانند ملانوما شود. رنگدانه ملانین دلیل رنگدانه شدن مو، پوست و چشم است و برای محافظت از پوست در برابر آسیب اشعه فرابنفش سنتز می‌شود؛ اما تولید بیش از حد ملانین باعث ایجاد رنگ متفاوت پوست می‌شود. هنگامی که پوست در معرض آفتاب قرار می‌گیرد، سنتز تیروزیناز و ملانوزوم افزایش می‌باید.^{۳۰}

مانوزوم‌ها چهار مرحله برای تشکیل ملانین دارند: تولید ملانوزوم، توسعه فیبرهای داخلی، پیشرفت و رسوب بالای ملانین. تیروزیناز آنزیمی کلیدی است که سنتز ملانین را آغاز می‌کند. با استفاده از مهارکننده‌های تیروزیناز می‌توان از تولید ملانین در پوست جلوگیری کرد. مهارکننده‌های لخته‌کننده فلز هستند که از آن‌ها می‌توان به هیدروکینون، آربوتین، آسید کوجیک، آسید آزلائیک، آسید ال- آسکوربیک، آسید ال‌اژیک،

می‌کنند. همچنین با جلوگیری از آسیب DNA ناشی از گونه‌های اکسیژن فعال (ROS) به عنوان یک آنتی‌اکسیدان عمل می‌کند. استفاده از MAA‌ها به عنوان فیلتر UV در ضدآفتاب‌ها بسیار مهم است؛ زیرا می‌تواند اشعه فرابنفش ۳۶۲-۳۰۹ نانومتر را به شدت جذب کند. آن‌ها همچنین در برابر نور، گرما، تغییرات pH و حلال‌های مختلف بسیار مقاوم هستند. مشخص شده است که نوستوک کامیونی، نوستوک اسفریکوم و نوستوک MAA، R76DM sp. می‌کنند که دارای خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتاهی در شرایط آزمایشگاهی و پتانسیل مهار گونه‌های اکسیژن فعال در داخل بدن هستند^{۳۱} (جدول ۲).

پتانسیل سفیدکنندگی ترکیبات زیست‌فعال مشتق از ریزجلبک‌ها

پوست در برخی از قسمت‌ها به دلیل اشعه فرابنفش، پیری و بارداری دچار تیرگی شده و

جدول ۲: ترکیبات ریزجلبکی دارای اثرات ضدآفتاب.^{۲۹}

ریزجلبک	ترکیب/عصاره	اثر آرایشی
کلروپسیس spp.	عصاره آبی چین و چروک و افتادگی پوست	جلوگیری از پیری نوری، ایجاد ضدآفتاب
نانوکلروپسیس	زیست توده	جلوگیری از تشکیل رنگدانه پوست، القای سفیدشدن
نانوکلروپسیس آکیولا	عصاره	محافظت از پوست در برابر اشعه UV و کاهش ایجاد چین و چروک
فئوداکتیلیوم تریکورنوتوم	عصره اتانولی	محافظت از پوست در برابر اشعه UV
کلرلا پروتونکوئیدیس، سیندسموز، المرینسیس، دونالیلا سالینا، موریلوبسیس sp., نئوسپوتیوکوکوس، ژلاتینوزوم، کلروکوک سیتریفورم، کلرلا زوفینجینسیس و گالدیریا سولفوراریا	لوتئین	تقویت ظاهر سالم پوست
کلرلا پروتونکوئیدیس (UTEX 31) و پاراکلرلا آنابنا spp., کالوتریکس spp., کلروگلاؤپسیس spp., دیبلوکولون spp., گلئوکپسا spp., هاپالوسایفون spp., لینگبیا spp., نوستوک spp., فورمیدیوم spp., پلوروکپسا spp., ریولاریا spp., اسکیزوتریکس spp., سیتونما spp. و تولیپوتربیکس spp.	ترکیب عصاره‌ها	ضدآفتاب
نوستوک کامیونی، نوستوک اسفریکوم R76DM sp. و لینگبیا spp.	MAAs	ضدآفتاب و محافظت از پوست

کشت را می‌توان در دو سیستم مختلف یعنی سیستم باز و سیستم بسته انجام داد؛ سیستم‌های باز شامل مخازن، حوضچه‌های همزدنه شده، حوضچه‌های با جوی آب و حوضچه‌های مدور است. سیستم بسته را می‌توان به عنوان صفحه تخت، ستون حباب، ستون حمل و نقل هوایی، پلیت‌ها، فتوبیوراکتورهای لوله‌ای و مخزن همزده طبقه‌بندی کرد. اگر کشت در فضای باز انجام شود، سویه باید تحمل بالایی در شرایط محیطی سخت نشان دهد تا از آلودگی جلوگیری کند. هم‌چنین در صورتی که در سیستم بسته اجرا شود، سویه باید توانایی زنده ماندن در تنفس بالا را داشته باشد. فتوبیوراکتور صحیح باید با توجه به گونه‌های ریزجلبک انتخاب شود.

به عنوان مثال، مشخص است که دونالیلا sp. و دونالیلا تریتیولکتا سازگاری بالایی با تغییرات دما نشان می‌دهند و در طول کشت نیاز به نور زیاد دارند بنابراین، هنگام کار با این دو گونه ریزجلبک، فتوبیوراکتورها مفیدتر خواهد بود. با توجه به مقایسه سیستم باز و بسته، گزارش شده است که در سیستم باز، خطر آلودگی و تبخیر آب بیشتر از سیستم بسته و استفاده از نور، کیفیت محصول و قابلیت کنترل کمتر از سیستم بسته است. هزینه بهره‌برداری از سیستم باز، که در آن فقط تعداد کمی از گونه‌ها می‌توانند کشت شوند، ارزان‌تر از سیستم بسته است. در حالی که هزینه‌ها به دلیل محتوای بالای آب بیشتر است، میزان تولید زیست توده ریزجلبکی در سیستم بسته کمتر از سیستم باز است.^{۳۲}

شرایط کشت ریزجلبک مانند مواد مغذی، دما، سطح pH، هوادهای، اختلاط، شدت نور، حالت رشد (اتوتروف، فوتواتوتروف، هتروتروف، فوتوفوتروفیک، میکسوفوتروفیک) با توجه به نیاز گونه ریزجلبک مورد استفاده تغییر می‌کند. این شرایط بر روش‌های متابولیک تأثیر می‌گذارد و با تغییر حالت کشت، همان

ترانکسامیک اسید اشاره کرد. متأسفانه آزمایشات نشان داده که این مهارکننده‌ها، اثرات مضری مانند تحریک پوست، جهش‌زایی برای سلول‌های پستانداران، ایجاد آسیب DNA و درماتیت آرژیک هستند.

با توجه به سمیت بالا، پایداری کم، فعالیت ناکافی و نفوذ ضعیف به پوست، یافتن جایگزین‌های طبیعی مناسب برای این مهارکننده‌های تیروزیناز مصنوعی ضروری است و ریزجلبک‌ها می‌توانند یک کاندیدای امیدوارکننده باشند. در همین زمینه مطالعات نشان می‌دهد که عصاره اسپیروولینا پلاتنسیس را می‌توان به عنوان مهارکننده تیروزیناز استفاده کرد. اوسلایلپتین G از اوسلایلوریا آگاردی، آستاگرانتین از هماتوکوکوس پلوبویالیس و زاگرانتین از نانوکلروپسیس آکیولاتا فعالیت مهاری تیروزیناز را نشان دادند. علاوه بر مهار آنزیم تیروزیناز، با استفاده از ویتامین‌های C و E می‌توان از تشکیل ملانوزوم در پوست جلوگیری کرد. گزارش شده است که مقادیر تراکم جمعیت ملانوسیت در موش‌های تحت درمان با ویتامین C و E در مقایسه با موش‌های درمان نشده به میزان ۳۵ درصد کاهش می‌یابد. با توجه به تحقیقات انجام‌شده بر روی گونه‌های ریزجلبک به عنوان تولیدکنندگان بالقوه ویتامین‌ها، می‌توان پیشنهاد کرد که پدیستربیوم کروئنتم به دلیل محتوای بالای ویتامین‌های C و E می‌تواند کاندید مناسبی به عنوان یک ماده آرایشی در پیشگیری از ملانوما باشد.^{۳۱}

کشت ریزجلبک‌ها و خالص‌سازی ترکیبات بالقوه برای لوازم آرایشی

فرآیند کشت ریزجلبک‌ها شامل چندین مرحله مهم برای تولید مقدار مطلوب محصول هدف می‌باشد. انتخاب ریزجلبک مناسب برای تولید بسیار مهم است؛ زیرا طراحی فرآیند، شرایط کشت، روش‌های برداشت و استخراج بر این اساس تغییر می‌کند که در نهایت بر راندمان تولید، عملکرد و کیفیت محصول تأثیر می‌گذارد.

۱. پروتولین: محصولی از اسید گاما لینولئیک مشتق شده از اسپیرولینا و غنی شده با پروتئین است که از ایجاد چین و چروک جلوگیری می‌کند و با ایجاد اثر سفت‌کنندگی، از پیری پوست جلوگیری می‌کند.^{۳۵}
۲. آلجنیست: محصولی که از اسید آلگورونیک مشتق شده از آناسیسایس نیدولانس به دست می‌آید و ایمنی پوست را تقویت می‌کند.
۳. آلگارد: محصولی که از پلی‌ساقارید سولفاته مشتق شده از پورفیریدیوم در جهت محافظت از پوست در برابر پیری نوری و میکروارگانیسم‌ها با خواص ضد میکروبی خود ساخته شده است.^{۳۶}
۴. درموکلرلا: محصولی مشتق شده از کاروتونوئیدهای کلرلا ولگاریس می‌باشد. اسیدهای آمینه کلرلا ولگاریس بسیار شبیه به فیبرهای کلژن در پوست بوده و سنتز کلژن را دوباره فعال می‌کند و هم‌چنین از آن محافظت می‌کند.^{۳۷}
۵. فیکواریترین (رنگ قرمز): از پورفیرا spp. و پورفیریدیوم spp. به دست می‌آید که به عنوان یک عامل رنگی در محصولات آرایشی و بهداشتی و یک محصول ضد پیری مشتق از عصاره آبی سیندسموز رو بیسنس است.^{۳۸}
۶. سیلیدین: محصولی حاوی عصاره پورفیریدیوم کروئنتم است که برای بهبود ظاهر پوست کاربرد دارد.^{۳۹}
۷. BIO1659 و BIO1631: دو محصول حاوی عصاره اتیل استات به عنوان برنزه‌کننده پوست و عصاره متانولی به عنوان تقویت رشد مو هستند.^{۴۰}
۸. ریویل: تشکیل شده از عصاره‌های دونالیلا سالینا و هماتوکوموس پلوبیالیس که در جهت یکدست‌شدن رنگ پوست استفاده می‌شود.^{۴۱}
۹. رتینول آبی TM: حاوی عصاره جلبک دونالیلا سالینا است که رشد و تکثیر سلول‌های پوست را تحریک می‌کند.^{۴۲}

گونه‌ها در نتیجه جابه‌جایی متابولیک محصولات مختلفی تولید می‌کنند. در طول کشت، میزان رشد ریزجلبک‌ها را می‌توان به روش‌های مختلفی از جمله شمارش کل سلول‌ها، استفاده از تحلیلگر ذرات، اندازه‌گیری زمان دوبرابر شدن زیست توده تعیین کرد. هنگامی که مقدار مطلوب نهایی هدف تولید می‌شود، لازم است مقدار زیادی آب از محیط کشت از طریق فرآیند برداشت حذف شود. این مرحله مهم را می‌توان با سانتریفیوژ، فیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، تهنشینی، انعقاد، لخته‌سازی شیمیایی، فلوتاسیون فوم، روش‌های الکتریکی، اولتراسوند و گاهی اوقات در ترکیب با یکدیگر انجام داد. از طرفی گاهی اوقات، فرآیندهای استخراج برای دستیابی به برخی مولکول‌ها مانند رنگدانه‌ها ضروری است.

به طور کلی، تکنیک‌های استخراج با حلال آلی مانند نفوذ، خیساندن، استخراج مایع تحت فشار، استخراج سوکسله، استخراج با فشار فوق العاده بالا بستگی به خواص بیوشیمیایی مولکول‌ها، زمان استخراج حلال‌ها (مانند متانول، ایزوپروپانول، کلروفرم، هگزان، اتانول و غیره) و بازده، تکرار پذیری، اثرات منفی بر مولکول و هزینه دارد. برخی از فرآیندها برای افزایش راندمان استخراج شامل تکنیک‌های اضافی مانند همگنسازی با فشار بالا و سرعت بالا، آسیاب مهره، فراصوت، کاربرد میدان الکتریکی پالسی، کاربرد مایکروویو، کاربرد آنژیمی است. پس از تمام این فرآیندها، خشک کردن حرارتی و خشک کردن انجمادی برای حذف رطوبت از عصاره ریزجلبک‌ها انجام می‌شود. برای تعیین بهترین شرایط و تکنیک‌های کشت باید مقیاس آزمایشگاهی و فوتوبیوراکتورها انجام شود.^{۴۳}

محصولات میکروجلبک فعلی در بازار جهانی لوازم آرایشی

از محصولات ریزجلبکی موجود در بازار جهانی می‌توان به برخی محصولات زیر اشاره کرد (جدول ۳):

جدول ۳: برخی محصولات میکروجلبک فعلی در بازار جهانی لوازم آرایشی ۳۴ و ۴۲.

نام شرکت	محصول	گونه‌های ریزجلبک	ادعای محصول
اوپتیموم درما اسیدیتیت	ماسک سفت‌کننده جلبک اسپیرولینا	آرتروسپیرا ماکسیما و اسپیرولینا پلاتنسیس	بهبود رطوبت پوست، تقویت اینمی پوست
فرنس کاسموتیکز	ماسک سفت‌کننده جلبک اسپیرولینا	اسپیرولینا پلاتنسیس	کاهش چین و چروک و بهبود رنگ چهره و پوست
فیتومر	-	کلرلا ولگاریس	ضدالتهاب و بهبود پوست و حفاظت طبیعی
اسکینایزر	-	اسپیرولینا پلاتنسیس	قویت و بازسازی پوست
پنتافارم	Pepha-Tight	نانوکلروپسیس آکیولات	soft-کننده عالی پوست
پنتافارم	Pepta-Ctive	دونالیلا سالینا	تحریک تکثیر سلولی
باپودرم	رتینول آبی	دونالیلا سالینا	تحریک تکثیر سلولی
اکسیمول	پروتولین‌ها	اسپیرولینا پلاتنسیس	جلوگیری از ایجاد چین و چروک و ایجاد اثر سفت‌کننده و در نتیجه جلوگیری از پیری پوست
سولاژایم	آلجنیست	اناکسیتیس نیدولانس	تقویت اینمی پوست
فروتارم	آلگارد	پورفیریدیوم spp.	محافظت از پوست در برابر پیری نوری و فعالیت ضد میکروبی
کدیف ریشرشی و نیچر	درموکلرلا	کلرلا ولگاریس	تقویت کلائز سازی در پوست و محافظت از پوست
داینیپون Ink و کمیکالز Inc.		اسپیرولینا، پورفیرا spp. و پورفیریدیوم spp.	عامل رنگ در سایه چشم

توجه به محدودیت‌های فیزیکوشیمیایی و چالش‌های تکنولوژیکی گزارش شده برای استفاده از ترکیبات زیست‌فعال در محصولات مختلف، سیستم‌های کپسولاسیون به عنوان ابزاری نوظهور برای غلبه بر چنین مسائلی کاربردی به نظر می‌رسند. در حال حاضر، تنها چند نمونه از محصولات تجاری وجود دارد که ادعای می‌کنند حاوی ترکیبات زیست‌فعال ریزجلبکی کپسوله شده هستند، عمدهاً محصولاتی مبتنی بر آستاگزانتین از پلولوپالیس و کاروتونوئیدها از ریزجلبک سالینا. با این حال، انتظار می‌رود که با مطالعاتی که در مورد افزایش مقیاس فرآیندهای کپسولاسیون و ارزیابی کارایی و پیشرفت اینمی در داخل بدن انجام می‌شود، شرکت‌های بیشتری شروع به عرضه محصولات جدید مبتنی بر ترکیبات زیست‌فعال ریزجلبکی کنند.

۱۰. سیلیدین®: محصولی ساخته شده از جلبک قرمز - بنفش پورفیریدیوم کروئنتم که عروق و ظاهر پوست را بهبود می‌بخشد و موجب یکنواختی و درخشندگی چهره می‌شود.^{۱۷}

در پایان نتیجه می‌گیریم که امروزه ریزجلبک‌ها به طور خاص در مقیاس صنعتی برای تولید مقادیر زیادی از ترکیبات مختلف یا مولکول‌های فعال زیستی خاص کشت داده می‌شوند. علاقه به ریزجلبک‌ها برای کاربردهای صنعتی در دهه گذشته به دلیل مجموعه وسیعی از ترکیبات فعال بیولوژیکی با ارزش تولید شده توسط این گروه رو به افزایش بوده است. این ترکیبات با خواص دارویی متعددی مرتبط هستند که بررسی‌ها نشان داده که اثرات مفیدی برای سلامت انسان دارند. علاوه‌بر این، ریزجلبک‌ها منابع پایدار و طبیعی برای ترکیبات زیست‌فعال هستند. از سوی دیگر با

References

1. Vieira M, Pastrana L, Fuciños P. Microalgae encapsulation systems for food, pharmaceutical and cosmetics applications. *Marine Drugs* 2020; 18: 644.
2. Panico A, Serio F, Bagordo F, et al. Skin safety and health prevention: An overview of chemicals in cosmetic products. *J Prev Med Hyg* 2019; 60: 50-7.
3. Anvar SA, Nowruzi B. A review of phycobiliproteins of cyanobacteria: Structure, function and industrial applications in food and pharmaceutical industries. *J Res Innov Food Sci Technol* 2021; 10: 181-98.
4. Berthon JY, Nachat-Kappes R, Bey M, et al. Marine algae as attractive source to skin care. *Free Radic Res* 2017; 51: 555-67.
5. Nowruzi B, Sarvari G, Blanco S. The cosmetic application of cyanobacterial secondary metabolites. *Algal Res* 2020; 49: 101959.
6. Derikvand P, Llewellyn CA, Purton S. Cyanobacterial metabolites as a source of sunscreens and moisturizers: A comparison with current synthetic compounds. *Eur J Phycol* 2017; 52: 43-56.
7. Dwivedi S, Ahmad IZ. A review of the emerging role of cyanobacteria-based nanoformulations for skin care: Opportunities and challenges. *J appl biol* 2022; 10: 21-31.
8. Fuentes-Tristan S, Parra-Saldivar R, Iqbal HM, et al. Bioinspired biomolecules: Mycosporinelike amino acids and scytonemin from lyngbya sp. with UV-protection potentialities. *J Photochem Photobiol Biol* 2019; 201: 111684.
9. Gao X, Jing X, Liu X, et al. Biotechnological production of the sunscreen pigment scytonemin in cyanobacteria: Progress and strategy. *Mar Drugs* 2021; 19: 129-39.
10. Mishra A, Tandon R, Kesarwani S, et al. Emerging applications of cyanobacterial ultraviolet protecting compound scytonemin. *J Appl Phycol* 2015; 27: 1045-051.
11. Santhosh A, Sravani A, Resshma V, et al. Formulation and evalution of herbal acne gel. *World J Pharm Res* 2015; 4: 2324-330.
12. Rafferty DW, Dupin L, Zellia J, et al. Predicting lipstick sensory properties with laboratory tests, *Int J Cosmet Sci* 2018; 40: 451-60.
13. Morocho-Jácome AL, Ruscinc N, Martinez RM, et al. Technological aspects of microalgae pigments for cosmetics. *Appl Microbiol Biotechnol* 2020; 104: 9513-522.
14. Ragusa I, Nardone GN, Zanatta S, et al. Spirulina for skin care: A bright blue future. *Cosmetics* 2021; 8: 7.
15. Suksaeree J, Chuchote C. Formulation and characterization of topical anti-acne spot gel containing herbal extracts. *MATEC Web Conf* 2018; 237: 1-6.
16. Ingle A, Meshram MB. Formulation and evaluation of ayurvedic face wash. *Int J Phytopharm* 2018; 8: 26-30.
17. Nowruzi B. A review of bioactive compounds of cyanobacteria and microalgae as cosmetically useful supplements. *J Dermatol Cosmet* 2022; 12: 256-69.
18. Safavi M, Nowruzi B, Estalaki S, et al. Biological activity of methanol extract from *Nostoc* sp. N42 and *Fischerella* sp. S29 isolated from aquatic and terrestrial ecosystems. *Int J Algae* 2019; 21: 373-91.

19. Nowruzi B, Haghigat S, Fahimi H, et al. Nostoc cyanobacteria species: A new and rich source of novel bioactive compounds with pharmaceutical potential. *J Pharm Health Serv Res* 2018; 9: 5-12.
20. Nowruzi B, Fahimi H, Lorenzi AS. Recovery of pure c-phycoerythrin from a limestone drought tolerant cyanobacterium Nostoc sp. and evaluation of its biological activity. In *Anales de Biología* 2020; 42: 115-28.
21. Juma'at N, Rahmat NA, Hamidi SA, et al. The production and stability evaluation of natural lipstick, multidisciplinary. *App Res In* 2021; 2: 220-25.
22. Poomanee W, Kongin K, Sriputorn K, et al. Application of factorial experimental design for optimization and development of color lipstick containing antioxidant-rich Sacha inchi oil. *Pak J Pharm Sci* 2021; 34: 1437-448.
23. Yadav N, Maury SH, Yadav P, et al. Formulation and development of face wash. *J Emerg Tech In Res* 2021; 8: 2349-362
24. Panda S, Dalapati N, Kar PK. Preparation and evaluation of herbal lipstick. *En J Pharm Ad Re* 2018; 7: 245-49.
25. Rastogi RP, Sonani RR, Madamwar D. Cyanobacterial sunscreen scytonemin: Role in photoprotection and biomedical research. *Appl Biochem Biotechnol* 2015; 176: 1551-563.
26. Sen S, Mallick N. Mycosporine-like amino acids: Algal metabolites shaping the safety and sustainability profiles of commercial sunscreens. *Algal Res* 2021; 58: 102-25.
27. Nowruzi B, Sarvari G, Blanco S. Applications of cyanobacteria in biomedicine in handbook of Algal science. *Technol Med* 2020; 11: 441-53.
28. Ariede MB, Candido TM, Jacome AL, et al. Cosmetic attributes of algae-A review. *Algal Res* 2017; 25: 483-87.
29. Kusuma SA, Abdassah M, Valas BE. Formulation and evaluation of anti-acne gel containing citrus aurantifolia fruit juice using carbopol as gelling agent. *Int J Appl Pharm* 2018; 10: 147-52.
30. Acharya SB, Ghosh S, Yadav G, et al. Formulation, evaluation and antibacterial efficiency of water-based herbal hand sanitizer gel. *Bio Rxiv* 2018; 11: 1-16.
31. Joshi S, Kumari R, Upasani VN. Applications of algae in cosmetics: An overview. *Int J Innov Res Sci Eng Technol* 2018; 7: 1269.
32. Nowruzi B. A review of sunscreens and moisturizers compounds drived from cyanobacteria. *J Dermatol Cosmet* 2022; 13: 119-32.
33. Sindhu RK, Chitkara M, Kaur G, et al. Formulation development and antimicrobial evaluation of polyherbal soap. *Plant Arch* 2019; 19: 1342-346.
34. Mir-Naiman A, Nour G, Sowfer A, et al. Evaluation of laboratory formulated hand sanitizing gel in riyadh municipality central area labs. *Saudi J Med Pharm Sci* 2020; 6: 548-58.
35. Sumiyani R, Diatmika IK, Muslimah NH, et al. Analysis of red colorants and heavy metals in lipstick at traditional market in Surabaya. *IOP Conf Ser Mater* 2021; 1053: 012083.
36. Morone J, Alfeus A, Vasconcelos V, et al. Revealing the potential of cyanobacteria in cosmetics and cosmeceuticals -A new bioactive approach. *Algal Res* 2019; 41: 101541.
37. Setyawaty R, Pratama MR. The usage of jati leaves extract (*Tectona grandis Lf*) as color of lipstick. *Maj Obat Tradis* 2018; 23: 16-22.
38. Koli DS, Mane AN, Kumbhar VB, et al. Formulation & evaluation of herbal anti-acne face wash. *World J Pharm Pharm Sci* 2016; 5: 2001-200.

39. Singh HP, Samnhotra N, Gullaiya S, et al. Anti-acne synergistic herbal face wash gel: Formulation, evaluation and stability studies. World J Pharm Res 2015; 4: 1261-273.
40. Mahanthesh MC, Manjappa AS, Shinde MV, et al. Design development and assessment of herbal lipstick from natural pigments. Int J Pharm Sci Rev Res 2020; 61: 59-64.
41. Mourelle ML, Gómez CP, Legido JL. The potential use of marine microalgae and cyanobacteria in cosmetics and thalassotherapy. Cosmetics 2017; 4: 46.
42. Kamble M, Selwate T, Dhabarde D, et al. Formulation and evaluation of anti-acne face wash gel using guava seed extract. J drug deliv ther 2019; 9: 5-7.

A review of the use of microalgae in the production of cosmetics

Bahareh Nowruzi, PhD^{1*}

Mahsa Fattahi, PhD²

Mohammadamin Jahangirzadeh,
MSc¹

1. Department of Biotechnology, School of Converging Sciences and Technologies, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2. Immunology, Asthma and Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Received: Jun 19, 2023

Accepted: Sep 01, 2023

Pages: 114-129

Microalgae are a diverse group of photosynthetic eukaryotic and prokaryotic microorganisms in different shapes and sizes that have evolved by being in stressful conditions and have devised mechanisms to maintain their survival. The production of unique biochemical compounds called bioactive compounds is one of these mechanisms. These compounds restore and heal the skin and protect the skin from damage caused by various factors, and in many cases these products are used in the treatment of diseases and cosmetic formulations. Today, cosmetic products derived from microalgae, which are environmentally friendly and safe, replaced the products in the market. In this review article, the potential of many species of microalgae and their derived bioactive molecules in the production of cosmetics is discussed. In addition to that, by presenting the current microalgae products in the global cosmetics market, it highlights the importance of these organisms in the use of microalgae in the production of quality cosmetics, and finally by providing suggestions such as encapsulating pigments to increase resistance and the stability of pigments envisages their greater use in the cosmetic industry in the future.

Corresponding Author:

Bahareh Nowruzi, PhD

Shohaday-e- Hesarak Blvd., Daneshgah Sq., End of Sattari Highway, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
Email: bahareh.nowruzi@srbiau.ac.ir

Conflict of interest: None to declare

Keywords: microalgae, cosmetic-sanitary products, bioactive compounds