

ارزیابی اثر ضد میکروبی اولئوروپین بر مخمرهای کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گلابراتا مقاوم به فلوكونازول و باکتری اشريشیاکلی

زمینه و هدف: عوارض جانبی مرتبط با داروهای ضد میکروبی و همچنین هزینه بالای آنها، جستجو برای ماده مؤثره گیاهان دارویی با قیمت مناسب و عوارض جانبی کمتر را برانگیخته است. از این مواد می‌توان به عنوان مکمل دارویی یا برای افزایش اثرات ضد میکروبی و ضدقارچی داروها استفاده کرد. هدف این مطالعه بررسی میزان اثر مهارکنندگی اولئوروپین بر عوامل بیماری‌زای قارچی و باکتریایی جدا شده از عفونت ناخن در شرایط آزمایشگاهی است.

روش اجرا: خواص ضدقارچی و ضد باکتریایی اولئوروپین با تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی Minimum Inhibition Concentration (MIC) و حداقل غلظت کشنندگی Minimum Fungicidal Concentration (MFC) و Minimum Bactericidal Concentration (MBC) این ماده، بر مخمرهای کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گلابراتا و باکتری اشريشیاکلی با روش میکروب راث دایلوشن ارزیابی شد.

یافته‌ها: آزمایشات نشان دادند که حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) اولئوروپین علیه هر سه میکرووارگانیسم مورد مطالعه برابر با ۶۵ و حداقل غلظت کشنندگی (MBC/MFC) برابر با ۱۳۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به فعالیت ضدقارچی و ضد باکتریایی زیاد اولئوروپین، این مطالعه این ماده را به عنوان یک داروی مکمل ضد میکروبی طبیعی معرفی می‌کند. همچنین می‌توان از این ماده برای افزایش قدرت ضد میکروبی آنتی‌بیوتیک‌های موجود کمک گرفت.

کلیدواژه‌ها: اولئوروپین، ضد میکروبی، کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گلابراتا، اشريشیاکلی

دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ پذیرش مقاله: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

پوست و زیبایی؛ زمستان ۱۴۰۲، دوره ۱۴ (۴): ۲۰۸-۱۹۹.

محمدعلی اسفندیاری^۱

علیرضا خسروی^{*}^۱

سپیده اسدی^۱

دانياک آیین^۱

جلال حسن^۲

۱. گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی،
دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران،
تهران، ایران

۲. گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی،
دانشگاه تهران، تهران، ایران

نویسنده مسئول:
علیرضا خسروی

تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قربانی،
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
پست الکترونیک:

khosravi@ut.ac.ir

تعارض منافع: اعلام نشده است.

مقدمه

انسان می‌دانند. همچنین مقاومت گونه‌های مختلف کاندیدا به داروهای ضدقارچی با گذشت زمان افزایش یافته است، تا آنجایی که باعث ایجاد پیامدهایی از جمله عدم رضایت به درمان‌های مختلف و حتی مرگ شده است.^۱

اشريشیاکلی یکی از مهم‌ترین باکتری‌هایی است که در فلور طبیعی روده یافت می‌شود و در سطح جهان مسئول شیوع بیماری‌های مختلف است.^۲ مطالعات مختلف افزایش روزافزون مقاومت این باکتری به

قارچ کاندیدا از مهم‌ترین عوامل عفونت‌های قارچی در انسان و حیوان است. این عفونتها در افراد با بیماری‌های زمینه‌ای رایج‌تر هستند. انواع این عفونتها از کلینیک‌اسیون مخاطی تا عفونتها مهاجم و کشنده متغیر است. قارچ‌های کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گلابراتا از شایع‌ترین عوامل این عفونتها محسوب می‌شوند که از سطح بدن، پوست و ادرار قابل جداسازی هستند. این گونه‌ها را به عنوان یکی از عوامل فرصت‌طلب بیماری‌های قارچی سطحی و احشایی

محققین اولئوروپین را یک مکمل طبیعی، دارای فواید دارویی مهم از جمله در بالابردن انرژی بیماران و کمک به بهبود زونه، تبخال، سرماخوردگی، عفونت‌های قارچی، کوفتگی مزمن و ضدآلرژی می‌شناسند. طبق بررسی‌ها، ترکیب کلسیم النولات که از اولئوروپین مشتق شده است، بر اکثر میکروارگانیسم‌ها از جمله ویروس‌ها مؤثر است و آن‌ها را از بین می‌برد. همچنین در خنثی‌کردن آنزیم پروتئاز مفید است. محققان معتقدند که اولئوروپین از طریق تأثیر بر غشای باکتری‌ها، آن‌ها را غیرفعال می‌کند.^{۱۰}

اولئوروپین دارای خواص ضدミکروبی، ضدآکسیدانی، ضدتوموری، ضدالتهابی است و همچنین از اندام‌های داخلی مانند کبد و سیستم عصبی محافظت می‌کند. اولئوروپین بیشتر به صورت پودر کریستالی جامد مورداستفاده قرار می‌گیرد که باید در حالاتی آلی مانند اتانول، دی‌متیل‌سولفوكساید (DMSO) و دی‌متیل‌فرمamید (DMF) حل شود. حلالیت اولئوروپین در اتانول و دی‌متیل‌سولفوكساید تقریباً ۳۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر و در دی‌متیل فرمamید تقریباً ۵۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر است. رقت‌های بیشتری از محلول موجود در بافرهای آبی یا سالین ایزوتونیک باید قبل از انجام آزمایشات بیولوژیکی ساخته شود. محلول اولئوروپین را می‌توان با حل مستقیم جامد کریستالی در بافرهای آبی تهیه کرد. حلالیت اولئوروپین در بافرسفات با اسیدیته ۷/۲ تقریباً ۰/۲۵ میلی‌گرم در میلی‌لیتر است.^{۱۱}

سالیان زیادی است که از گیاهان دارویی به منظور جایگزینی برای انواع داروها و ضدغوفنی کننده‌های شیمیایی استفاده می‌گردد؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان تأثیر اولئوروپین بر کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گلابراتای مقاوم به فلوكونازول و نیز باکتری اشريشياکلی جدا شده از عفونت ناخن بود.

داروهای ضدمیکروبی را گزارش کرده‌اند^{۱۲}. تجمع‌های بیوفیلم مانند اشريشياکلی، این باکتری را از درمان آنتی‌بیوتیکی و سیستم ایمنی محافظت می‌کنند. همچنین آنها می‌توانند ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از باکتری‌های پلانکتون در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت داشته باشند.^{۱۳}

اونیکومایکوزیس نوعی از عفونت قارچی ناخن با شیوع روزافزون است^{۱۴}. درمان اونیکومایکوزیس یک چالش مداوم است که اغلب به درمان چند ماهه نیاز دارد و خطر عود بالایی دارد؛ مخصوصاً اگر با عفونت‌های ثانویه همراه باشد. ۲۰ تا ۲۵ درصد بیماران به درمان پاسخ نمی‌دهند و ۱۰ تا ۵۰ درصد عود می‌کنند.^{۱۵}

از منابع سرشار اولئوروپین، میوه زیتون می‌باشد که از حوزه دریای مدیترانه، شمال آفریقا، جنوب شرقی آسیا، شمال تا جنوب چین، اسکاتلند و شرق استرالیا پراکنده شده است. زیتون بynam علمی *Olea europaea* شامل تقریباً ۳۵ تا ۴۰ گونه از خانواده اولئاسه بوده و وجود اولئوروپین در میوه زیتون توسط *Vintilesco Bourquelot* در سال ۱۹۰۸ شناخته شد. عملده خواص زیتون از جمله تلخی میوه زیتون به خاطر اولئوروپین می‌باشد. این ماده از جمله ترکیب‌های فتلی بسیار مهم و فراوان در میوه و برگ‌های زیتون می‌باشد. اولئوروپین از گروه خاصی از ترکیبات شبکه‌کومارینی به‌نام سکویریدوئیدها است که به‌فراوانی در خانواده گیاهان *Oleaceas*، *Gentianales* و *Cornales* بسیاری از گیاهان دیگر یافت می‌شود.

یریدوئیدها و سکویریدوئیدها ترکیباتی هستند که عمولاً با پیوند گلیکوزیدی به‌هم متصل می‌شوند. اولئوروپین یک استر $-{\text{C}}_4\text{-}(\text{C}_3\text{-})_2\text{-D}-\text{هیدروکسی فیل}$ اتانول (هیدروکسی تیروزول) است که اسکلت *Oleaceae* اولئوزیدی در گلوکوزیدهای سکویریدوئید مشترک دارد. اولئوروپین به‌مقدار ۶۰ تا ۹۰ میلی‌گرم در هر گرم از برگ خشک زیتون وجود دارد، اگرچه در سراسر درخت یافت شده است.^{۱۶}

روش اجرا

سویه‌های میکروبی

همچنین برای تست حساسیت دارویی مخمر کاندیدا، رقت‌های دو برابر از $۰/۲$ تا ۲۶۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر اولئوروپین و $۰/۵$ تا ۲۵۶ میکروگرم در میلی‌لیتر فلوکونازول در محیط RPMI-1640 (گیکو، بزریل) همراه با $۱/۱$ درصد دی‌متیل‌سولفوکسید تهیه شد. همچنین برای آزمایش حساسیت دارویی باکتری اشريشیاکلی از محیط کشت مولرهینتون براث (مرک، آلمان) استفاده شد. سوش‌های کاندیدا پاراپسیلوزیس با ATCC ۶۲۵۸ و کاندیدا کروزهای با ATCC ۲۲۰۱۹ برای کنترل اعتبار روش تست حساسیت فلوکونازول براساس استاندارد CLSI M60 استفاده شد.

تعداد نهایی سوسپانسیون مخمر ($CFU/ml \times ۱۰^۳$) و سوسپانسیون باکتریایی ($CFU/ml \times ۱۰^۵$) با استفاده از لام هموسیتومتر تهیه شد. سپس آن‌ها به همه چاهک‌ها، به‌جز چاهکی که به عنوان کنترل منفی تعیین شده بود، در هر ردیف اضافه شدند. یک چاهک هم به عنوان کنترل مثبت تعیین شد که فقط حاوی محیط کشت و سوسپانسیون تلقیحی بود. پلیت‌ها کمی مخلوط شدند، سپس به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. کمترین غلظت اولئوروپین در چاهکی که هیچ دورتی در آن مشاهده نشد، به عنوان مقدار MIC درنظر گرفته شد.

برای تعیین حداقل غلظت کشنده (MBC/MFC) مقدار ۱۰ میکرولیتر از چاهک‌هایی که رشد قابل مشاهده‌ای نداشتند، روی محیط کشت تریپتیک سوی براث (مرک، آلمان) و محیط کشت سابورو دکستروز آگار (مرک، آلمان) کشت داده شدند. حداقل غلظت کشنده (MBC/MFC) به عنوان حداقل غلظت دارو در جایی تعريف شد که رشدی مشاهده نشده بود. همه آزمایشات سه مرتبه تکرار شدند.

در این مطالعه از قارچ‌های کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گلابراتا جداشده از بیماران مبتلا به اونیکومایکوزیس و همچنین باکتری اشريشیاکلی جدشده از یک مورد عفونت ناخن میکس کاندیدایی - باکتریایی با سابقه عود مکرر استفاده شده است. مخمرهای کاندیدا روی محیط سابورو دکستروز آگار (مرک، آلمان) و باکتری اشريشیاکلی در محیط کشت مولرهینتون براث (مرک، آلمان) در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۶ تا ۱۸ ساعت کشت داده شدند.

تهیه اولئوروپین و دارو

فلوکونازول با خلوص ۹۸% (سیگما آلدريچ، بریتانیا) استفاده شد. اولئوروپین با خلوص ۹۸% از گروه سم‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه شد. اولئوروپین استفاده شده، از عصاره هیدروالکلی تهیه شده از برگ زیتون به‌روش استخراج مایع - مایع به‌دست‌آمد که به‌وسیله ستون کروماتوگرافی خالص‌سازی شد. سپس خلوص ترکیب با کمک استاندارد اولئوروپین توسط دستگاه HPLC به میزان ۹۸% تعیین گردید و ساختار ترکیب استخراج شده با استفاده از دستگاه NMR تایید شد.^۹

تعیین حداقل غلظت مهارکننده رشد (MIC) و حداقل غلظت کشنده (MBC/MFC)

در این مطالعه حداقل غلظت مهارکننده رشد (MFC) و حداقل غلظت کشنده (MIC) مخمر کاندیدا برای اولئوروپین و فلوکونازول با استفاده از روش میکروب‌براث دایلوشن مطابق با استاندارد CLSI M60-Ed1 تعیین شد.^{۱۰} همچنین حداقل غلظت مهارکننده رشد (MIC) و حداقل غلظت کشنده (MBC) باکتری اشريشیاکلی برای اولئوروپین با استفاده از روش میکروب‌براث دایلوشن مطابق با استاندارد CLSI M100-Ed31 تعیین شده است.^{۱۱}

یافته‌ها

بحث

از جمله باکتری‌هایی که به دلیل افزایش مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها بیشترین تهدید را برای سلامتی انسان ایجاد می‌کنند، اعضای خانواده انتروباکتریا سه به‌ویژه باکتری اشريشياکلی هستند. در میان مکانیسم‌های مختلف مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌ها، قوی‌ترین و متنوع‌ترین سیستم مربوط به باکتری اشريشياکلی است^{۱۴}. همچنین به‌طورکلی بروز عفونت‌های ناشی از گونه‌های کاندیدا به‌میزان قابل توجهی در طول دهه‌های گذشته افزایش یافته است که عمدتاً به‌دلیل افزایش اپیدمی ایدز، جمعیت فزاینده سالمند و افزایش بیماران نقص ایمنی می‌باشد. از طرفی جامعه بشری با مشکل حادتری به‌نام افزایش روزافزون مقاومت نسبت به داروهای ضدقارچی نیز روبرو است.

کاندیدا آلبیکنس عامل اصلی انواع عفونت‌های ناشی از کاندیدا محسوب می‌گردد و در ضمن به‌دلیل بروز همین مقاومت‌ها، شیوع انواع گونه‌های کاندیدای غیرآلبیکنس مخصوصاً گونه کاندیدا گلابراتا در طول سالیان گذشته جایگزین کاندیدا آلبیکنس شده‌اند. به‌علاوه وجود عوارض متعدد داروهای ضدقارچی نوظهور و همچنین هزینه‌های بالای آن‌ها، راه را برای استفاده از مواد دارویی گیاهی با عوارض و هزینه‌های پایین‌تر باز می‌کند تا از این مواد به‌عنوان کمک یا جایگزین داروهای موجود استفاده گردد^{۱۵, ۱۶}.

گیاهان دارویی از زمان‌های قدیم برای درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند و از خواص ضدمیکروبی آن‌ها به اشکال مختلف به‌عنوان نگهدارنده برای حفظ کیفیت غذا، افزایش ماندگاری و ضدغونی کردن محیط استفاده شده‌است^{۱۷, ۱۸}.

به‌دلیل افزایش مقاومت میکروبی به داروهای رایج باید جایگزین‌های ایمن‌تر با عوارض جانبی کمتر در نظر گرفته شود^{۱۹}. اولئوروپین موجود در روغن زیتون

تعیین MBC/MFC و MIC

نتایج آزمون حساسیت فلوکونازول برای قارچ‌ها نشان داد که هر دو مخمر کاندیدا آلبیکنس (با MIC برابر با ۸ میکروگرم بر میلی‌لیتر) و کاندیدا گلابراتا (با MIC برابر با ۶۴ میکروگرم در میلی‌لیتر) به فلوکونازول مقاوم بودند. نتایج آزمایش رقت‌سازی میکروب‌راست کاندیدا پاراپسیلوزیس با MIC برابر با ۲۰۱۹ ATCC (با MIC برابر با ۲ میکروگرم در میلی‌لیتر) و کاندیدا کروزه‌ای با ۶۲۵۸ ATCC (با MIC برابر با ۱۶ میکروگرم در میلی‌لیتر) اعتبار این تست را تأیید کرد. آزمایش‌ها سه‌بار تکرار شد و میانگین MIC و MBC/MFC ثبت شد.

نتایج حاصل از تست‌های میکروب‌راست دایلوشن اولئوروپین بر هر سه میکرووارگانیسم مورد مطالعه در جدول ۱ آمده است که اعداد برابر با ۶۵ میلی‌گرم در میلی‌لیتر حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و ۱۳۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر حداقل غلظت کشندگی اولئوروپین را نشان می‌دهند. با درنظر گرفتن اینکه اگر نسبت اعداد MBC/MFC به MIC به دست آمده کمتر از ۴ باشد یک ماده کشندگی میکروبی تعریف می‌شود^{۱۰}، با توجه به نتایج این تحقیق ماده اولئوروپین را می‌توان یک ماده کشندگی برای میکرووارگانیسم‌های مورد مطالعه معرفی کرد.

جدول ۱: حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی اولئوروپین و نسبت آن‌ها.

نام میکرووارگانیسم	میکروگرم در میلی‌لیتر	حداقل غلظت کشندگی	نام میکروگرم در میلی‌لیتر	حداقل غلظت کشندگی	نسبت حداقل
کاندیدا آلبیکنس	۲	۰±۱۳۰	۰±۱۳۰	۰±۶۵	۰±۱۳۰
کاندیدا گلابراتا	۲	۰±۱۳۰	۰±۱۳۰	۰±۶۵	۰±۱۳۰
اشريشياکلی	۲	۰±۱۳۰	۰±۱۳۰	۰±۶۵	۰±۱۳۰

نتایج به صورت انحراف معیار ± میانگین آورده شده است.

کاندیدا دابلینسیس، به مقدار MIC برابر ۴۶/۸۷ میلی گرم در میلی لیتر برای کاندیدا آلبیکنس و MIC برابر با ۶۲/۵ میلی گرم در میلی لیتر برای کاندیدا دابلینسیس دست یافت که نتایج حاصل از این تحقیق همسو با نتایج مطالعه حاضر می باشد.^{۲۸} Ghaffaripour و همکاران در سال ۲۰۱۹، به روش سریال دایلوشن اثر عصاره برگ زیتون بر کاندیدا آلبیکنس را بررسی و بیان کردند که اگرچه تمام غلظت‌های مساوی یا بیشتر از ۴ میلی گرم در میلی لیتر عصاره با تعداد کلی‌های کنترل مثبت تفاوت معنی‌داری داشتند؛ اما MIC و MFC، به ترتیب غلظت‌های ۸ و ۳۲ میلی گرم در میلی لیتر را نشان می‌دهند که درنهایت آن را به عنوان یک داروی مکمل مناسب در درمان کاندیدا معرفی کرده است.^{۲۹}

Khan و همکاران در سال ۲۰۱۹ با مطالعه سه عصاره مختلف برگ زیتون (آبی، اتانولی و اتیل استات) از لحاظ ترکیبات فیتوشیمیایی، فعالیت‌های ضداسیدانی و ضدمیکروبی، مشاهده کردند که عصاره اتانولی دارای بالاترین محتوای آلکالوئیدها، فلاونوئیدها و فنل می‌باشد که این عامل باعث افزایش اثر عصاره اتانولی در برابر بیشتر باکتری‌های بیماری‌زا می‌شود. در حالی که عصاره‌های آبی و اتیل استاتی در برابر بیشتر سویه‌های قارچی (گونه‌های آسپرژیلوس، کاندیدا و فوزاریوم) قوی‌تر بودند.^{۳۰}

مطالعاتی نیز اثر مهاری اولئوروپین بر چندین میکروب بیماری‌زا از جمله کاندیدا آلبیکنس و اشريشياکلى را سنجیده‌اند. Sahoury و همکاران در سال ۲۰۲۱ با مقایسه اثر مهاری اولئوروپین و عصاره آویشن بر تعدادی از میکروب‌های پاتوژن از جمله کاندیدا آلبیکنس گزارش دادند که بهترین غلظت اولئوروپین موردنیاز ۰/۱۶ درصد می‌باشد. همچنین استفاده از این ترکیب را به عنوان نگهدارنده طبیعی ضدمیکروبی در محصولات غذایی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و درمان بیماری‌های عفونی مانند عفونت‌های

بکر، فراهمی زیستی بالایی دارد. این ترکیب خواص ضداسیدانی، ضدالتهابی، ضدآتروژنیک، ضدسرطان، ضدمیکروبی و ضدویروسی دارد. این ماده به عنوان مکمل غذایی در کشورهای مدیرانه‌ای به صورت تجاری در دسترس است.^{۲۰-۲۱}

نشان داده شده است که اولئوروپین تمایل ترکیبی بالایی برای چسبیدن به غشای پلاسمایی دارد^{۳۲} و با تأثیرگذاری بر تعامل بین مولکولی بین اولئوروپین و فسفولیپیدهای آئیونی در غشاها، تأثیر منفی بر غشاها فسفولیپیدی باردار دارد. این فعل و انفعالات می‌تواند منجر به تغییراتی در نفوذ پذیری غشای سلولی شود که برخی از محققان آن را به ساختار ارتودیفنول اولئوروپین نسبت می‌دهند.^{۳۳}

در این مطالعه، میزان MIC و MFC عوامل بیماری‌زای میکروبی جداسده از عفونت ناخن در مجاورت با ماده اولئوروپین از طریق میکروب‌راث دایلوشن مطابق با استاندارد CLSI بررسی شد.

مطالعات محدودی روی اثر ضدمیکروبی ماده اولئوروپین خالص در جهان انجام شده است و بیشتر مطالعات اثر ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون را سنجیده‌اند که نتایج این مطالعات اثر ضدمیکروبی بالای این ماده را گزارش کرده‌اند.^{۳۴-۳۶} نصراللهی و همکاران در سال ۲۰۱۵، اثر کلی عصاره برگ زیتون را روی کاندیدا آلبیکنس نشان داده‌اند. در این مطالعه فعالیت ضدقارچی این عصاره با اندازه‌گیری MIC و MFC، با استفاده از آزمون میکروب‌راث دایلوشن و روش دیسک دیفیوژن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. عصاره‌های آبی برگ زیتون دارای MIC برابر ۲۴ میلی گرم در میلی لیتر و MFC برابر ۴۸ میلی گرم در میلی لیتر و قطر ناحیه بازدارندگی ۲۱ میلی‌متر است. نتایج حاصل از این مطالعه حساسیت کاندیدا آلبیکنس مذکور به عصاره آبی برگ زیتون را نشان می‌دهد.^{۳۷}

Zoric و همکاران در سال ۲۰۱۶ با بررسی اثر مهاری عصاره برگ زیتون بر کاندیدا آلبیکنس و

نتایج مطالعه حاضر همسو نبود.^{۳۸} Topuz و همکاران در سال ۲۰۲۲ نشان دادند که در بین میکروارگانیسم‌ها، استافیلوکوکوس اورئوس حساس‌ترین باکتری به عصاره اولئوروپین است، در حالی که باکتری اشريشياکلى با طیفی از مقادیر MIC برابر با $12/5$ میلی‌گرم در میلی‌لیتر تا 50 میلی‌گرم در میلی‌لیتر، مقاوم‌ترین آن‌ها بود.^{۳۹}

Liu و همکاران در سال ۲۰۱۷ مشخص کردند که اولئوروپین، رشد لیستریا مونوسیتوژن، اشريشياکلى و سالمونلا انتریتیدیس را با غلظت 25 میلی‌گرم در میلی‌لیتر به ترتیب با 94 ، 58 و 36 درصد مهار می‌کند.^{۴۰} در مطالعه دیگری، MIC عصاره برگ زیتون در برابر لیستریا مونوسیتوژن، $62/5$ میلی‌گرم در میلی‌لیتر تعیین شد در حالی که MIC اولئوروپین خالص 25 میلی‌گرم در میلی‌لیتر بود.^{۴۱} لازم به ذکر است که تفاوت مشاهده شده در نتایج MIC این مطالعه و سایر مطالعات را می‌توان به دلیل تفاوت در روش استخراج، خالص‌سازی اولئوروپین و همچنین تفاوت در میزان مقاومت ذاتی یا اکتسابی جدایه‌های مورد مطالعه توضیح داد.

نتایج این مطالعات نشان می‌دهند که اولئوروپین خواص ضدمیکروبی در برابر انواع مختلف باکتری‌ها و قارچ‌ها دارد. در این مطالعه اثر مهارکنندگی اولئوروپین بر مخمرهای کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گلابراتا و باکتری اشريشياکلى جداسده از ناخن بررسی شد که نتایج نشان می‌دهند اولئوروپین خواص ضدمیکروبی دارد بنابراین، این ماده را می‌توان به عنوان یک داروی مکمل ضدمیکروبی با منشأ طبیعی معرفی کرد.

نتایج این مطالعه در شرایط برون‌تنی نشان داد که اولئوروپین خواص ضدقارچی و ضدباکتریایی بالای دارد. این خواص می‌تواند از رشد قارچی و باکتریایی جلوگیری کرده و حتی آن‌ها را از بین ببرد. با توجه به این نتایج، اولئوروپین را می‌توان به عنوان یک داروی گیاهی ضدقارچ و ضدباکتری برای استفاده موضعی،

سطحی پوست ناشی از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا بسیار امیدوارکننده دانستند.^{۳۱}

در این مطالعه به بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی اولئوروپین علیه کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گلابراتا و اشريشياکلى پرداخته شد. با توجه به استفاده روزافزون از فلوکونازول به عنوان درمان یا پیشگیری برای انواع بیماری‌ها، بهویژه سلطان خون، دریافت کنندگان پیوند مغز استخوان، نوزادان و حتی مبتلایان به ولوکونازول کاندیدایی، شیوع گونه‌های کاندیدای مقاوم به فلوکونازول در سراسر جهان در حال افزایش است^{۳۲-۳۵} بنابراین، سویه‌های مورداستفاده در این مطالعه، گونه‌هایی بودند که مقاومت بالایی به فلوکونازول نشان دادند.

نتایج آزمون حساسیت فلوکونازول برای قارچ‌ها نشان داد که هر دو گونه کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گلابراتا به فلوکونازول مقاوم هستند و مقدار MIC و MFC برای اولئوروپین به ترتیب برابر با 65 میلی‌گرم در میلی‌لیتر و 130 میلی‌گرم در میلی‌لیتر بود. در حالی که بیشتر مطالعات روی اثر ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون مرکز شده‌اند، مطالعاتی که به‌طور خاص بر اولئوروپین مرکز شده باشند محدود هستند. در تحقیقات گذشته، اثر مهاری اولئوروپین بر کاندیدا آلبیکنس با مقدار MIC برابر با $12/5$ میلی‌گرم در میلی‌لیتر را نشان دادند و همچنین بیان کردند که این ماده فاکتورهای حدت ضروری عفونت قارچی را مورد هدف قرار می‌دهد.^{۳۶}

Andrea Pirković و همکاران در سال ۲۰۲۳ با آزمایش اثر مهاری اولئوروپین بر مخمر کاندیدا تروپیکالیس، میزان MIC را 25 میلی‌گرم در میلی‌لیتر گزارش کردند.^{۳۷} در مطالعه دیگری، Dominicano و همکاران در سال ۲۰۱۶ نشان دادند زمانی که اولئوروپین به‌نهایی مورد استفاده قرار گرفت، فعالیت ضدمیکروبی خفیفی در برابر سلول‌های پلانکتون استافیلوکوکوس اورئوس و اشريشياکلى با MIC برابر با 4 میلی‌گرم در میلی‌لیتر داشت که نتایج این بررسی، با

توصیه می‌گردد.

تقدیر و تشکر

نویسنده‌گان مقاله بر خود لازم می‌دانند از معاونت محترم پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برای تأمین اعتبار موردنیاز این مطالعه تشکر و قدردانی کنند.

خوارکی و یک ضدغونی کننده محیطی معرفی کرد. البته برای استفاده درمانی، مطالعات بیشتری در مورد عوارض احتمالی و سایر جنبه‌های ایمنی این ترکیب موردنیاز است.

برای مطالعات آتی، سنجش تأثیر اولئوروپین علیه دیگر میکروب‌های بیماری‌زا و همچنین بررسی این ماده روی تشکیل بیوفیلم میکروب‌های مهم و نیز میزان سمیت این ماده در مجاورت سلول‌های انسانی

References

1. Anassie E, Mc Ginnis M, Pfaller M. Clinical Mycology. 2003. Churchill livingstone.
2. Fatima R, Aziz M. Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC). StatPearls [Internet]. 2020.
3. Bhardwaj DK, Taneja NK, Shivaprasad D, et al. Phenotypic and genotypic characterization of biofilm forming, antimicrobial resistant, pathogenic Escherichia coli isolated from Indian dairy and meat products. Int J Food Microbiol 2021; 336: 108899.
4. Karigoudar RM, Karigoudar MH, Wavare SM, et al. Detection of biofilm among uropathogenic Escherichia coli and its correlation with antibiotic resistance pattern. J Lab Physic 2019;11:17-22.
5. Høiby N, Bjarnsholt T, Givskov M, et al. Antibiotic resistance of bacterial biofilms. Int J Antimicrob Agents 2010;35:322-32.
6. Bodman MA, Krishnamurthy K. Onychomycosis. StatPearls [Internet]: StatPearls Publishing; 2022.
7. Zaraa I, Dehavay F, Richert B. Onychomycosis. Hand Surg Rehabil 2024:101638.
8. Soler-Rivas C, Espín JC, Wichers HJ. Oleuropein and related compounds. J Sci Food Agric 2000; 80: 1013-23.
9. Khalil AA, Rahman MM, Rauf A, et al. Oleuropein: Chemistry, extraction techniques and nutraceutical perspectives-An update. Crit Rev Food Sci Nutr 2023:1-22.
10. Lee-Huang S, Zhang L, Huang PL, et al. Anti-HIV activity of olive leaf extract (OLE) and modulation of host cell gene expression by HIV-1 infection and OLE treatment. Mol Cell Biol Res Commun 2003; 307: 1029-37.
11. Otero DM, Oliveira FM, Lorini A, et al. Oleuropein: Methods for extraction, purifying and applying. Rev Ceres 2020;67:315-29.
12. CLSI. Performance standards for antifungal susceptibility testing of fungi, M60, 1st ed. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA 2020.
13. CLSI. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing, M100, 31st ed. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA 2021.
14. Galindo-Méndez M. Antimicrobial resistance in Escherichia coli. E. coli Infections- Importance of Early Diagnosis and Efficient Treatment 2020: 1-20.
15. Denning DW. Antifungal drug resistance: An update. Eur J Hosp Pharm 2022;29:109-12.
16. Vitiello A, Ferrara F, Boccellino M, et al. Antifungal Drug Resistance: An emergent health threat. Biomedicin 2023;11:1063.

17. Jamshidi-Kia F, Lorigooini Z, Amini-Khoei H. Medicinal plants: Past history and future perspective. *J Herbmed Pharmacol* 2017;7:1-7.
18. Vaou N, Stavropoulou E, Voidarou C, et al. Towards advances in medicinal plant antimicrobial activity: A review study on challenges and future perspectives. *Microorganisms* 2021;9:2041.
19. Nimer NA. Nosocomial infection and antibiotic-resistant threat in the middle east. *Infect Drug Resist* 2022;631-9.
20. Du GH, Zhang X, Du LD, et al. Oleuropein. *Natural Small Molecule Drugs from Plants*. 2018;713-7.
21. Rey AI, De Cara A, Segura JF, et al. Dietary oleuropein extract supplementation and its combination with α -tocopheryl acetate and selenium modifies the free fatty acid profile of pork and improves its stability. *J Sci Food Agric* 2021;101:2337-44.
22. Caturla N, Pérez-Fons L, Estepa A, et al. Differential effects of oleuropein, a biophenol from *Olea europaea*, on anionic and zwiterionic phospholipid model membranes. *Chem Phys* 2005;137:2-17.
23. Caturla N, Estepa A, Micol V. The relationship between oleuropein antimicrobial activity and its effects on biological membranes. *Olives and olive oil in health and disease prevention*: Elsevier 2010. 1345-54.
24. El-Sohaimy SA, Mansour HM, Zeitoun A, et al. ANTIOXIDANT, ANTIMICROBIAL AND ANTI-INFLAMMATORY POTENTIAL OF OLIVE LEAVES. *ZJAR*. 2021;48(1):161-72.
25. Aissaoui Y, Boukhari Y. Antioxidant, antibacterial and antifungal effects of phenolic extracts of extra virgin olive oil from two western regions of algeria: A comparative study. *Phytotherapie* 2021; 19: 93-9.
26. Martín-García B, De Montijo-Prieto S, Jiménez-Valera M, et al. Comparative extraction of phenolic compounds from Olive leaves using a sonotrode and an ultrasonic bath and the evaluation of both antioxidant and antimicrobial activity. *Antioxidants* 2022;11: 558.
27. Nasrollahi Z, Abolhasannezhad M. Evaluation of the antifungal activity of Olive leaf aqueous extracts against *Candida albicans* PTCC-5027. *Curr Med Mycol* 2015;1:37.
28. Zorić N, Kopjar N, Kraljić K, et al. Olive leaf extract activity against *Candida albicans* and *C. dubliniensis*—the in vitro viability study. *Acta Pharmaceutica* 2016;66:411-31.
29. Ghaffaripour R, Samsamipour M, Eslamifar Z, et al. Inhibitory effect of hydroalcoholic extract of olive leaf (*Olea europaea*) on growth of *Candida albicans*. *Int J Biol Pharm Sci* 2019;28:1-8.
30. Khan H, Ahmad W, Hussain I, et al. Phytochemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of leaves of *Olea europaea* wild variety. *J Food Meas Charact* 2020; 14: 640-8.
31. Sahoury Y, Naseef H, Farraj M, et al. Antimicrobial activity of oleuropein and thyme extracts against selected pathogenic microorganisms and their potential uses as natural preservatives. *Int J Pharm Res* 2021; 13: 1088-98.
32. Van Burik J, Leisenring W, Myerson D, et al. The effect of prophylactic fluconazole on the clinical spectrum of fungal diseases in bone marrow transplant recipients with special attention to hepatic candidiasis. An autopsy study of 355 patients. *Medicine* 1998; 77: 246-54.
33. Long SS, Stevenson DK. Reducing *Candida* infections during neonatal intensive care: management choices, infection control, and fluconazole prophylaxis. *J Pediatr* 2005;147:135-41.

34. Story K, Sobel R. Fluconazole prophylaxis in prevention of symptomatic candida vaginitis. *Curr Infect Dis Rep* 2020;22:1-4.
35. Berkow EL, Lockhart SR. Fluconazole resistance in Candida species: A current perspective. *Infect Drug Resist* 2017;237-45.
36. Zorić N, Kopjar N, Bobnjaric I, et al. Antifungal activity of oleuropein against Candida albicans-the in vitro study. *Mol* 2016;21:1631.
37. Bayram M, Topuz S, Karabiyikli S, et al. Isolation of oleuropein from olive leaf by effective method and investigation of its antimicrobial properties. *Indian J Tradit Knowl* 2022;21:215-223.
38. Dominciano LC, Lee SH, Santello JM, et al. Effect of oleuropein and peracetic acid on suspended cells and mono-species biofilms formed by *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*. *Integr Food Nutr Metab* 2016;3:314-7.
39. Topuz S, Bayram M. Oleuropein extraction from leaves of three olive varieties (*Olea europaea L.*): Antioxidant and antimicrobial properties of purified oleuropein and oleuropein extracts. *J Food Process Preserv* 2022; 46: e15697.
40. Liu Y, McKeever LC, Malik NS. Assessment of the antimicrobial activity of olive leaf extract against foodborne bacterial pathogens. *Front Microbiol* 2017; 8: 113.
41. Liu Y, McKeever LC, Suo Y, et al. Antimicrobial activities of olive leaf extract and its potential use in food industry. *Natural and Bio-Based Antimicrobials for Food Applications: Am Chem Soc* 2018; 119-32.

Evaluation of the antimicrobial effect of oleuropein on *Candida albicans* and *Candida glabrata* isolates resistant to fluconazole and *Escherichia coli*

Mohammadali Esfandiar¹

Alireza Khosravi, PhD^{1*}

Sepideh Asadi, PhD¹

Donya Nikaein, PhD¹

Jalal Hassan, PhD²

1. Department of Microbiology and Immunology, School of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran

2. Department of Basic Sciences, School of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran

Received: Mar 04, 2024

Accepted: Mar 09, 2024

Pages: 199-208

Corresponding Author:

Alireza Khosravi, PhD

School of Veterinary Medicine, Qarib St., Azadi St., University of Tehran, Tehran, Iran

Email: khosravi@ut.ac.ir

Conflict of interest: None to declare

Background and Aim: Side effects associated with antimicrobial drugs, as well as their high cost, have stimulated the search for inexpensive herbal medicinals with fewer side effects. These substances can be used as a medicinal supplement or to increase the antimicrobial and antifungal effects of drugs. The aim of this study is to investigate the inhibitory effect of oleuropein on fungal and bacterial pathogens isolated from nail infection in laboratory condition.

Methods: Antifungal and antibacterial properties of oleuropein by determining the Minimum Inhibitory Concentration (MIC), Minimum Bactericidal Concentration (MBC) and Minimum Fungicidal Concentration (MFC) of this substance on yeasts *Candida albicans*, *Candida glabrata* and *Escherichia coli* by microbroth dilution method using CLSI protocols were evaluated.

Results: The results showed that the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) against all three studied microorganisms was equal to 65 mg/ml and the Minimum Bactericidal Concentration (MBC) and Minimum Fungicidal Concentration (MFC) of oleuropein was equal to 130 mg/ml.

Conclusion: due to the high antifungal and antibacterial activity of oleuropein, the present study introduces oleuropein as a natural antimicrobial drug. This substance can also be used to increase the antimicrobial power of existing antibiotics.

Keywords: oleuropein, antimicrobial, candida albicans, candida glabrata, escherichia coli