

علائم پوستی ناشی از گزارش دو مورد

مقدمه: رتیل‌ها (Camel spiders) یا شترزنک‌ها، راسته‌ای از رده عنکبوتیان (Arachnida) و شاخه بندپایان (Arthropoda) هستند و می‌توانند گزش دردناکی در انسان ایجاد کنند.

گزارش مورد: در این گزارش دو مرد ۳۴ و ۴۰ ساله معرفی می‌شوند که با شکایت واکنش‌های پوستی در پا به درمانگاه مراجعه کردند. پزشک در معاينات اولیه اين علائم را به عنوان واکنش پوستی ناشی از نیش برخی از حشرات مزاحم تشخيص داد. بعد از گذشت یك روز، ضایعه‌ای که شامل دو نقطه قرمزرنگ بود در پای بیماران ظاهر شد. ضایعات پوستی بعد از چند ساعت در هر دو فرد مشاهده شد که با شستشوی آب و صابون بعد از گذشت ۷ روز، علائم به کلی از بین رفته و محل گزش بمبود یافت.

نتیجه گیری: افزایش آکاهی پزشکان از علائم این بندپایان مزاحم به عنوان درمانگر، می‌تواند در تسریع روند درمان کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها: واکنش پوستی، رتیل، گزارش مورد

دريافت مقاله: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ پذيرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

پوست و زیبایی؛ زمستان ۱۴۰۱، دوره ۱۳ (۴): ۳۰۵-۳۰۰

- ۱. اسماعیل علیزاده^۱
- ۲. محمدامین گروهی^۱
- ۳. لیلا شیرانی بیدآبادی^۱
- ۴. عباس آقایی افشار^{*۲}
- ۵. محدثه اردونی^۴
- ۶. فائزه روحانی^۴
- ۷. حنانه ملکی آزارکی^۴
- ۸. یاسمن شفیعی^۴

۱. گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

۲. مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرسنگی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

۳. مرکز تحقیقات لیشمانیوز، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

۴. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

نويسنده مسئول:
 Abbas Aqayi Afshar

کرمان، بزرگراه هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، کرمان، ایران

پست الکترونیک:
abassaghiaeafshar@gmail.com

تعارض منافع: اعلام نشده است.

مقدمه

کنند. بدن آن‌ها از دو بخش شکم و سر - سینه تشکیل شده و کلیسرهای بزرگ و قدرتمندی نیز دارند که از آن‌ها برای تولید صدا نیز استفاده می‌کنند. بیشتر شترزنک‌ها ساکن نواحی بیابانی هستند و از بندپایان و مهره‌داران کوچک تغذیه می‌کنند. علت نام‌گذاری آن‌ها این است که نوعی کوهان یا برآمدگی در قسمت پشت خود دارند و بنابر برخی باورهای غلط، از شکم شتر

رتیل‌ها (Camel spiders) یا شترزنک‌ها، راسته‌ای از رده عنکبوتیان (Arachnida) و شاخه بندپایان (Arthropoda) هستند. این راسته شامل ۱۲ خانواده، ۱۴۴ جنس و بیش از ۱۲۰۰ گونه است، ساکن مناطق خشک و نیمه خشک هستند و عمدها در آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و شمالی یافته می‌شوند.^۱ بزرگترین آن‌ها می‌تواند تا ۱۹ سانتی‌متر رشد

ناحیه ساق پای سمت راست خود شد (شکل ۲-۱). فرد بیمار سوزش و درد شدید در ناحیه ساق پا داشت. مورد ۲: بیمار یک مرد ۴۰ ساله بود که همسفر شخص مورد اول در بالا بوده است. مشابه مورد قبل، چند ساعت بعد از گرشن دچار واکنش پوستی در ساق پای سمت چپ شد (شکل ۲-۲). بیمار دوم نیز سوزش و درد شدید در ناحیه ساق پا داشت.

این دو فرد به درمانگاه مراجعه کردند که پزشک در معاینات اولیه این علائم را به عنوان واکنش پوستی ناشی از نیش برخی از حشرات مژاحم تشخیص داد. به طور کلی گرشن بندپایی مورد نظر در ابتداء هیچ علائمی ظاهری بر روی پای بیماران نداشت و تنها سوزش خفیف و درد شدید وجود داشت و بعد از گذشت چند ساعت، محل گرشن قرمز شد. یافته های بالینی در این مطالعه نشان داد که بعد از گذشت یک روز، ضایعه ای شامل دو نقطه قرمز رنگ به فاصله چند میلی متر از هم در پای بیماران ظاهر شد.

طبق شکل ۱، علائم گرشن بر روی بدن هر ۲ بیمار، علامت های مشابه داشت که شامل دو نقطه دایره ای شکل قرمز رنگ در حدود ۰/۵ میلی متر به

تغذیه می کنند و به همین خاطر است که اکثر آن ها را عنکبوت های شتری می خوانند. عنکبوت های شتری هم چون عنکبوت های تارانتولا، یک جفت فک دارند که هر کدام از آن ها شکلی شبیه به قیچی با دو تیغه دندانه دار است و ماهیچه هایی قدرتمند، انرژی لازم برای حرکت شان را تأمین می کنند؛ اما آرواره های این بندهای چندان هم قدرتمند نیستند و در عوض مانور پذیری خوبی دارند. آن ها قادر غدد تولید زهر بوده و تنها در هنگام احساس خطر می توانند گرشن در دنای انجام دهند که خطرناک نیست.^۲

در این مقاله موردی، برای اولین بار از ایران، دو مورد واکنش های پوستی ناشی از گرشن رتیل (Galeodes sp.) را از بهرامجرد واقع در اطراف شهر کرمان گزارش می کنیم.

گزارش مورد

مورد ۱: بیمار یک مرد ۳۴ ساله بود که شب هنگام استراحت در روستای بهرامجرد واقع در ۵۰ کیلومتری شهر کرمان در تابستان ۱۴۰۱ دچار گرشن (شکل ۱) و چند ساعت بعد از گرشن، دچار واکنش پوستی در



شکل ۱: موقعیت روستای بهرامجرد در اطراف شهر کرمان. تصویر ارائه شده از برنامه Google Earth Professional. (https://www.google.com/earth/vendors/#download-pro)



شکل ۲: واکنش‌های پوستی ناشی از گزش عنکبوت شتری؛ (۱) مورد اول (۲) مورد دوم.

استفاده از استریومیکروسکوپ شناسایی شوند. همچنین جهت شناسایی از فرد متخصص در زمینه عنکبوت‌شناسی کمک گرفته شد. پس از شناسایی‌های صورت‌گرفته از نمونه جمع‌آوری شده، گونه رتیل (*Galeodes sp.*) تشخیص داده شد (شکل ۳).

رتیل در اصل یک شکارچی ساده است و سلاح آن تنها سرعت و قطعات دهانی (انبر قدرتمند) آن است. اگرچه نیش آن‌ها دردناک است ولی برای انسان کشنده نیست. در این مقاله موردی، واکنش‌های

فاصله ۱ میلی‌متر از هم به‌طور منظم قرار گرفته بودند. ضایعات پوستی بعد از چند ساعت در هر دو فرد مشاهده شد که با شستشوی آب و صابون بعد از گذشت ۷ روز، علائم به‌کلی از بین رفته و محل گزش بهبود یافت. بیماران بعد از گزش محل استراحت خود را چک کردند و گونه‌ای از بندپا را در اطراف محل استراحت مشاهده کردند. سپس نمونه به گروه بیولوژی و کنترل ناقلين بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان آورده شد تا با کمک کلید تشخیص معتبر و با



شکل ۳: (۱) گونه عنکبوت شتری مشاهده شده در محل استراحت افراد مورد مطالعه و (۲) قطعات دهانی.

گزارش می‌کند.

مهردی بلالی‌مود و همکاران در سال ۲۰۰۰، مرگ ۳ نفر را در پی گزش عنکبوت بیوه سیاه از استان خراسان گزارش کردند. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶، تعداد ۱۹۵ بیمار در پی گزش عنکبوت بیوه سیاه در بیمارستان امام رضا بستری شده‌اند^۴.

شاهی و همکاران در سال ۲۰۱۴ گزش عنکبوت گوشه‌گیر از جنس *Loxosceles* را بر روی پهلوی راست زنی ۴۶ ساله از شهر بندرعباس گزارش کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که علائم نکروز شدید حاصل از گزش عنکبوت گوشه‌گیر بعد از گزش بر روی بدن فرد ایجاد شده است^۵.

دهقانی و همکاران در سال ۲۰۱۷ گزش عنکبوت بیوه قهوه‌ای را در قسمت داخلی آرنج راست زنی ۴۸ ساله از شهر کاشان گزارش کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که فرد مورد گزش دچار درد، تورم، خارش و قرمزی در بدن خود شده است^۶.

Abdelazeem و همکاران در سال ۲۰۲۱، گزش عنکبوت گوشه‌گیر قهوه‌ای را در پشت پای چپ زنی ۵۹ ساله از کشور آمریکا گزارش کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که نیش این عنکبوت با یک تاول کوچک مرکزی که توسط لکه‌های قرمز تا بنفش ملتهب شده احاطه شده بود، شروع شده و در عرض ۷۲-۴۸ ساعت، یک زخم نکروزه با اسکار مرکزی ایجاد شد^۷.

نتایج این گزارش موردمی نشان می‌دهد که رتیل‌ها زهر ندارند؛ ولی در عوض گزش آن‌ها درد و واکنش‌های پوستی به همراه دارد. با توجه به اینکه این گروه از آفات مهم پزشکی در کشور ایران وجود دارند، جهت پیشگیری و کنترل آسودگی این بندپای خطرناک، به افزایش آگاهی و دانش عمومی در افراد معرض خطر در جامعه بهمنظور کاهش ارتباط انسان با آن‌ها نیاز داریم. علاوه‌بر این، افزایش آگاهی بین پزشکان به‌ویژه جامعه

پوستی ناشی از گزش رتیل را از بهرامجرد واقع در اطراف شهر کرمان گزارش کردیم. یافته‌های بالینی در این مطالعه نشان داد که گزش رتیل در ابتدا هیچ علائمی ظاهری بر روی پای بیماران نداشت و تنها سوزش خفیف و درد شدید وجود داشت، سپس بعد از گذشت یک روز، ضایعه‌ای شامل دو نقطه قرمزرنگ به فواصل چندمیلی‌متر از هم در پای بیماران ظاهر شد و بعد از گذشت ۷ روز، علائم به کلی از بین رفته و محل گزش بهبود یافت.

این گونه از بندپایان شکارچی هستند. این صحرانشینان سرسخت، آرواره‌های بزرگ و قدرتمندی دارند که از آن‌ها برای گرفتن قربانیان خود استفاده و آن‌ها را با یک حرکت خردکردن یا اره کردن به خمیر تبدیل می‌کنند. رتیل‌ها زهرآگین نیستند؛ اما از مایعات گوارشی برای مایع کردن گوشت قربانیان خود استفاده می‌کنند و مکیدن بقایای آن را به معده‌شان آسان می‌کنند. این عناصر مانند اکثر عنکبوتیان دیگر عمل می‌کنند.

شترزنک‌ها می‌توانند پوست و استخوان‌های نازک مانند پرندگان کوچک را برش دهند. برای سال‌های متمادی، شایعاتی در خاورمیانه، رتیل‌ها را شکارچیانی بزرگ و سمی، با اشتهاهی هولناک برای پستانداران بزرگ نشان می‌دادند. این موجودات در واقع شکم شتر یا سربازان خوابیده را نمی‌خورند و آن قدر هم بزرگ نیستند^۸.

گزش ناشی از رتیل‌ها علاوه‌بر علائم پوستی مثل خارش و قرمزی است. تا به حال گزارش‌های زیادی مبنی بر ایجاد علائم پوستی ناشی از گونه‌های مختلف عنکبوتیان از جمله بیوه سیاه، عنکبوت گوشه‌گیر و عنکبوت بیوه قهوه در دنیا و ایران ثبت شده است. طبق جستجوی‌های صورت گرفته، تا به حال گزیدگی از رتیل‌های جنس (*Galeodes sp.*) در ایران در مقالات علمی گزارش نشده است و این مطالعه برای اولین بار در ایران و دنیا گزش این گونه رتیل را

علیرضا زمانی پژوهشگر در زمینه رده‌بندی عنکبوت‌ها در دانشگاه تورکو فنلاند، جهت شناسایی نوع رتیل و ارائه نظرات مفید در مورد پیش‌نویس مقاله تشکر و قدردانی کنند.

درماتولوژیست‌ها از علائم این بندپای خطرناک به عنوان متخصصان درمانگر، می‌توانند در تسريع روند درمان کمک‌کننده باشد.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان بر خود لازم می‌دانند از آقای دکتر

References

1. Naumova M, Pulev A, Manolev G. New data on the taxonomy, ecology and distribution of *galeodes graecus* cl koch, 1842 (Arachnida: Solifugae: Galeodidae). *Acta Zool Bulg* 2021; 73: 339-47.
2. Punzo F. The biology of camel-spiders: Arachnida, solifugae: 1st ed, NY; springer science & business media, 1998.
3. Pechenik J. Biology of the invertebrates. 4th ed. Boston; Brown Publishers 1996.
4. Rafinezhad J, Tirkani S, Balali M. A study on distribution of poisonous species of genus *latrodectus* spp. In Khorasan province with on emphasis on medical importance (araneae; theridiidae). *Daneshmed* 2000; 7: 31-8. (Persian)
5. Shahi M, Shahi A, Khademi Z, et al. Loxoscelism: A case report from bandar abbas in south of Iran. *HMJ* 2015; 18: 465-71.
6. Rouhollah D, Rezvan T, Javad R, et al. Brown widow spider bite (*Loxosceles* sp., Araneae, Sicariidae): A case report from Kashan, Iran. *Iran J Dermatol* 2017; 20: 32-5.
7. Abdelazeem B, Eurick-Bering K, Ayad S, et al. A case report of brown recluse spider bite. *Cureus* 2021; 13: 1-4.

Cutaneous reaction due to Tarantula bites on human leg: a report of two cases

Esmaeil Alizadeh, Msc^{1,2}
Mohammadamin Gorouhi, PhD^{1,2}
Leila shirani Bidabadi, PhD^{1,2}
Abbas Aghaei Afshar, PhD^{2,3*}
Mohadese Ordouni, BSc⁴
Faezeh Rohani, BSc⁴
Hanane Maleki Azaraki, BSc⁴
Yasaman Shafiee, BSc⁴

1. Department of Vector Biology and Control, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2. Research Center of Tropical and Infectious Diseases, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3. Leishmaniasis Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
4. Student Research Committee, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

Received: Oct 10, 2022

Accepted: Nov 12, 2022

Pages: 300-305

Corresponding Author:

Abbas Aghaei Afshar, PhD

Haftbagh Alavi Highway, Medical University Campus, Kerman, Iran
Email: abassaghaeiafshar@gmail.com

Conflict of interest: None to declare

Background: Tarantulas (Camel spiders) are order that belong to classes of arachnida and phylum of arthropoda. They can make a painful bite in human.

Case Report: This paper presents 34 and 40-year-old men with skin reactions in their left legs. After initial examinations, the symptoms were recognized as skin reaction caused by the bite of some nuisance insects. After one day, a lesion including 2 red dots appeared on the patient's leg. After a few hours, skin lesions were observed in both patient, and by washing with soap and water after 7 days, the symptoms completely disappeared and the bite improved.

Conclusion: Increasing awareness among physicians, about the symptoms of this nuisance insects can help to accelerate treatment process.

Keywords: cutaneous reactions, tarantula, case report