

## سطح C-reactive protein در سرم بیماران مبتلا به پسوریازیس قبل و بعد از درمان با narrow-band ultraviolet B

**زمینه و هدف:** یک بیومارکر التهابی است که سطح آن در بیماری پسوریازیس بالا می‌رود. همچنین میزان آن با نمرهٔ Psoriasis Area and Severity Index (PASI) ارتباط مستقیم دارد.

**روش اجرا:** سطح سرمی CRP قبل و بعد از درمان با فتوترایی با narrow-band ultraviolet B (NB-UVB) اندازه‌گیری و نتایج با توجه به بهبودی در نمرهٔ PASI تحلیل شد.

**یافته‌ها:** سطح CRP اولیه در بیماران مبتلا به پسوریازیس بالا بود و این مقدار به طور معنی‌داری بعد از درمان کاهش یافت. بیمارانی که در ابتدای مطالعه CRP بالایی داشتند، درگیری وسیع‌تر و شدیدتر پوستی داشتند. بیشترین کاهش مقدار CRP نیز در افرادی دیده شد که پاسخ بهتری به درمان دادند و ۷۵٪ PASI بالاتری دارند. یک همراهی بین نمرهٔ PASI اولیه و CRP پایه نیز وجود داشت.

**نتیجه‌گیری:** بیمارانی که مبتلا به پسوریازیس پلاکی متوسط تا شدید بودند التهاب سیستمیک نیز داشتند که این التهاب با سطح بالای CRP آنها نشان داده شد. فعالیت بیماری پوستی، همراهی معنی‌داری با بالارفتن CRP داشت. فتوترایی که باعث بهبود ضایعات پوستی پسوریازیسی می‌شد سبب کاهش التهاب و در نتیجه پایین آمدن سطح CRP می‌شد.

**کلیدواژه‌ها:** پسوریازیس، فتوترایی، درمان، C-reactive protein

دربافت مقاله: ۹۰/۰۹/۰۶ پذیرش مقاله: ۹۰/۱۲/۱۷

پوست و زیبایی؛ بهار ۱۳۹۱، دوره‌ی ۳ (۱): ۳۹-۴۳

دکتر اکرم انصار<sup>۱</sup>

دکتر ولی‌الله حسین‌پور<sup>۱</sup>

دکتر عباس زمانیان<sup>۱</sup>

دکتر محمود فرشچیان<sup>۱</sup>

۱. گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

نویسنده‌ی مسئول:

دکتر ولی‌الله حسین‌پور

همدان، بیمارستان فرشچیان، بخش پوست،

پست الکترونیک:

asndr46162@yahoo.com

تعارض منافع: اعلام نشده است.

مانند IL<sub>23</sub>, IL<sub>22</sub>, IL<sub>20</sub>, IL<sub>19</sub>, IL<sub>17</sub>, IL<sub>8</sub>, IL<sub>12</sub>, IL<sub>6</sub>, IL<sub>2</sub> و TNF $\alpha$  نشان داده شده است.<sup>۲</sup> مطالعات IL<sub>24</sub> و IFN $\gamma$  را نشان داده شده است.<sup>۳</sup>

بیانگر این است که TNF $\alpha$  سبب ترشح IL<sub>6</sub> می‌شود که آن نیز سبب تحریک کبد و تولید واکنش‌دهنده‌های فاز حاد مثل CRP (C-reactive protein) که به عنوان یک بیومارکر التهابی می‌باشد می‌گردد.<sup>۳</sup> استفاده از یک بیومارکر التهابی می‌باشد می‌گردد. این ا نوع مختلف فتوترایی به عنوان یک گزینه‌ی درمانی اصلی برای پسوریازیس و لکاریس در نظر گرفته می‌شود. فتوترایی با پرتو فرابنفش نوار باریک (narrow band Ultraviolet B [NB-UVB]) با طول موج ۳۱۱ نانومتر در پاک‌شدن ضایعات پسوریازیسی

### مقدمه

پسوریازیس نوع پلاکی یک بیماری التهابی، مزمن و شایع پوست است که شیوع آن در آسیا بر حسب آمار بین ۰/۴٪ تا ۰/۷٪ گزارش شده ولی در دنیا این بیماری ۰/۲٪ تا ۰/۵٪ جمعیت را مبتلا می‌کند. پسوریازیس با تکثیر بیش از حد و اختلال در تکامل کراتینوسیت‌ها مشخص می‌گردد. از آنجایی که پسوریازیس یک رفتار عودکننده دارد سبب اختلال در کیفیت زندگی بیماران می‌شود.<sup>۱</sup> طبیعت التهابی پسوریازیس توسط ظاهرشدن بالای سیتوکین‌های پیش‌التهابی سیستمیک جلدی

همچنین میانگین سطح تغییرات CRP در قبل و بعد از درمان و مقدار عددی ۷۵٪ PASI می‌شد.

بر این اساس برای بیمارانی که در طرح وارد شده بودند یک پرسشنامه شامل سن بیمار، جنس بیمار، درگیری نواحی آناتومیک مختلف و همچنین سطح درگیری آن‌ها، وجود اریتم، ضخامت و CRP پوسته‌ریزی در نواحی درگیر به همراه میزان سرم اولیه و همچنین CRP بعد از درمان، نمره‌ی PASI قبل و بعد از درمان، تعداد جلسات فتوترایی و دوز تجمعی اشعه تابیده شده به فرد جهت پاکشدن ۷۵درصدی ضایعات تکمیل می‌شد.

میزان CRP سرم را از نمونه‌ی خونی بیماران که قبل از درمان و همچنین بعد از ۲۵ جلسه درمان یا هر زمانی که بیمار اظهار می‌داشت که ضایعات پوستی او بهبود یافته است، اندازه‌گیری می‌شد. در این روش توسط سانتریفوژ سرم را از نمونه خونی جدا نموده در فریزر تحت برودت  $18^{\circ}\text{C}$ - نگهداری می‌کردیم و سپس بررسی و آنالیز سطوح CRP فقط بر روی نمونه‌های دوگانه‌ای که قبل از درمان و بعد از درمان گرفته شده CRP بود انجام می‌شد. که سطح اولیه CRP و سطح در انتهای درمان و تغییرات آن محاسبه و در پرسشنامه‌ی مربوطه ثبت می‌شد. ما برای سنجش میزان CRP در سرم از کیت آزمایشگاهی Minineph<sup>TM</sup> Human C-Reactive Protein Kit) Product Code: ZK044. L. R

را نرمال گزارش می‌کرد استفاده نمودیم. در این تحقیق ما شدت پسوریازیس را براساس نمره‌ی PASI محاسبه نمودیم و نمره‌ی PASI را قبل و بعد از درمان به دست آوردیم. در نهایت اختلاف بین نمره PASI اولیه و نهایی را مشخص نموده و براساس فرمول ۱ میزان ۷۵٪ PASI را حساب نمودیم.

فرمول ۱: چگونگی محاسبه‌ی میزان بهبودی ضایعات  
 $\text{PASI \%} = (\text{PASI}_1 - \text{PASI}_2) / \text{PASI}_1 \times 100$

بسیار مؤثر می‌باشد. NB-UVB به‌طور معنی‌داری نسبت به BB(broad band)-UVB در مدت زمان کوتاهی سبب پاکشدن ضایعات پسوریازیسی می‌شود و فقط در ۱۰٪ موارد منجر به ایجاد سوختگی می‌شود.<sup>۴</sup> هدف از این مطالعه بررسی میزان CRP در سرم بیماران مبتلا به پسوریازیس با نوع پوستی ۳، قبل و بعد از درمان با NB-UVB بود تا بدین طریق بتوانیم حداقل جلساتی که منجر به کاهش نمره‌ی Psoriasis Area and Severity Index (PASI) بیماران می‌گردد مشخص نموده و از عوارض فتوترایی بکاهیم. از آنجایی که CRP یک مارکر پروتئینی واکنش فاز حاد بوده که در عرض ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از آسیب بافت یا عفونت در سرم قابل شناسایی است و دارای نیمه عمر ۶ تا ۸ ساعت بوده، همچنین طیف پویایی وسیعی داشته و به عنوان یک مارکر مهم در مطالعات بالینی استفاده می‌شود، به‌طوری که بعد از یک درمان موفق سطح آن افت کرده و برای پایش روز به روز مناسب بوده و هر زمانی که میزان آن اندازه‌گیری شود تصویری از حوادث ۱۲ ساعت قبل را ارائه می‌کند، ما جهت بررسی پاسخ به درمان، میزان سرمی این بیومارکر را بررسی نمودیم.

## روش اجرا

این مطالعه بر روی بیماران مبتلا به پسوریازیس نوع پلاکی که در سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۸ به بیمارستان فرشچیان همدان مراجعه نموده‌اند انجام شد. ۳۰ بیمار مبتلا به پسوریازیس نوع پلاکی که برای آن‌ها اندیکاسیون درمان با NB-UVB گذاشته شده بود وارد این مطالعه شدند، که در نهایت مطالعه با ۲۵ بیمار ادامه یافت. این افراد شامل ۱۸ مرد و ۷ زن بودند که متوسط سن آن‌ها ۴۱،۰۸ سال و در محدوده‌ی ۲۱ تا ۶۷ سال بود. متغیرهای مورد بررسی ما در این مطالعه شامل مقدار CRP در سرم بیماران قبل و بعد از درمان با فتوترایی، نمره PASI قبل و بعد از درمان، و

جدول ۱: پروتکل درمانی فتوترایپی با NB-UVB در بیماران مبتلا به پسوریازیس.

نقشه‌ی پایانی درمان	بعد از جلسه‌ی ۲۵ یا هر زمانی که نمره‌ی PASI به میزان ۷۵٪ بهبود یافته باشد.	دوز شروع	دفاتر درمان در هفته، یک روز در میان	میزان افزایش دوز
		$0.4 \text{ J/cm}^2$	اگر هیچ‌گونه اریتمی وجود نداشت ۳۰٪ به دوز اشعه افزوده می‌شود، اگر اریتم خفیف باشد ۲۰٪ به دوز کلی اضافه می‌شود، اگر اریتم متوسط باشد فقط دوز قبلی اشعه تکرار می‌شود و پس از از بین رفتن اریتم مجددًا دوز را اضافه می‌کنیم، اگر اریتم شدید باشد درمان را تا برگشتن کامل رنگ پوست به حالت طبیعی متوقف می‌کنیم و پس از آن با ۵۰٪ آخرین دوز درمان را شروع کرده و سپس ۱۰٪ افزایش می‌یابد.	سه جلسه درمان در هفته، یک روز در میان

جدول ۲: میزان CRP و PASI در ۲۵ بیمار مبتلا به پسوریازیس قبل و بعد از درمان با NB-UVB

تعداد بیماران	۲۵
CRP 1	۵/۷۹۷۴۴
CRP 2	۳/۳۰۱۳۲
ΔCRP	۲/۵۳۶۱۲
PASI 1	۲۲/۲۰۰
PASI 2	۵/۲۷۲۰
% PASI	۷۴/۹۰۴۰
میانگین جلسات درمانی	۲۲/۲۴
میانگین دوز تجمعی اشعه	۴۲/۵۸۰۴

نمره‌ی PASI بعد از درمان ۰ (صفر) و بیشترین مقدار آن برابر عدد ۱۵ بود در حالی که میانگین PASI بعد از درمان ۵/۲۷ بود.

مقدار و میزان تغییرات مشاهده شده بین CRP قبل و بعد از درمان در شکل ۱ نشان داده شده است. مقدار نمره‌ی PASI قبل و بعد از درمان در شکل ۲ نشان داده شده است. ارتباط بین CRP بعد از درمان با نمره‌ی PASI در شکل ۳ نشان داده شده است.

### بحث


نتایج گزارش شده در این مطالعه بیان کننده‌ی این است که در بیماران مبتلا به پسوریازیس سطوح CRP در سرم، بالا می‌رود که این مقدار افزایش به درجه‌ی فعالیت بیماری پوستی بستگی دارد. که فعالیت بیماری پوستی نیز توسط نمره‌ی PASI سنجیده می‌شود.

برای درمان ضایعات پسوریازیسی بیماران از فتوترایپی با NB-UVB با طول موج ۳۱۱ نانومتر به تعداد سه جلسه در هفته استفاده شد که اولین دوز آن  $0.4 \text{ J/cm}^2$  بود و میزان افزایش آن بر طبق پروتکل پیش‌بینی شده‌ی بخش پوست بود که این پروتکل در جدول ۱ آمده است.


تحلیل‌های آماری بر اساس مقادیر اولیه و نهایی CRP سرم و مقدار تغییرات آن در ابتدا و انتهای درمان، هم‌چنین با استفاده از معیارهای بالینی جهت تعیین نمره‌ی PASI در ابتدا و انتهای درمان انجام شد. سپس از آزمون  $t$  جفتی و ضریب همبستگی Spearman جهت مقایسه‌ی میانگین‌ها و تعیین ارتباط بین متغیرها و هم‌چنین از روش‌های توصیف داده‌ها جهت نشان دادن فراوانی‌ها استفاده نمودیم.

### یافته‌ها


نتایج به دست آمده از بررسی ۲۵ بیمار که مطالعه را کامل نمودند در جدول ۲ خلاصه شده است. تعداد ۱۶ نفر از افراد مورد مطالعه دارای PASI ۷۵٪ و بالاتر بودند. بیشترین مقدار سطح CRP سرم در ابتدای درمان  $18/580 \text{ mg/l}$  و کمترین آن  $2/10 \text{ mg/l}$  و میانگین آن  $5/79$  بود، بیشترین نمره‌ی PASI قبل از درمان  $53/10$  و کمترین آن  $9/10$  و میانگین آن  $22/20$ ، و بعد از درمان کمترین مقدار سطح CRP برابر  $1/80 \text{ mg/l}$  و بیشترین مقدار آن برابر  $6/88 \text{ mg/l}$  و میانگین آن  $3/30$  بود هم‌چنین کمترین



شکل ۱: مقایسه‌ی سطح سرمی CRP در ۲۵ بیمار مبتلا به پسوریاژیس قبل و بعد از درمان با NB-UVB.



شکل ۲: مقایسه‌ی مقادیر نمره‌ی PASI در ۲۵ بیمار مبتلا به پسوریاژیس قبل و بعد از درمان با NB-UVB.



شکل ۳: ارتباط بین سطح سرمی CRP در ۲۵ بیمار مبتلا به پسوریازیس بعد از درمان با NB-UVB و٪ ۷۵.

ارتباط دارد و همچنین درمان با NB-UVB کاهش سطح CRP در سرم بیماران می‌شود. در نتیجه پیشنهاد شد که CRP سرم به عنوان یک مارکر مفیدی برای تشخیص شدت پسوریازیس می‌باشد و از آن برای پایش فعالیت بیماری یا پاسخ به درمان استفاده کرد.<sup>۶</sup> مطالعه‌ی دیگری که توسط Chodorowska بر روی ۱۷۵ بیمار مرد مبتلا به پسوریازیس انجام شد و فعالیت بالینی بیماری پسوریازیس بر طبق نمره‌ی CRP محاسبه شده بود، نشان داد که سطح سرم در فاز حاد بیماری افزایش داشت ( $P<0.001$ ).<sup>۷</sup> مطالعه‌ای که توسط Strober و همکارانش روی بیماران مبتلا به پسوریازیس جهت بررسی تأثیر اتانرستپت (Etanercept) در سطح CRP سرم انجام گردید مشخص شد که بیماران مبتلا به پسوریازیس نوع پلاکی متوسط تا شدید دارای التهاب سیستمیک می‌باشند. و این التهاب توسط افزایش سطح CRP سرم نشان داده می‌شود. در بیماران فوق فعالیت بیماری

CRP یک پروتئین واکنشی فاز حاد است و به عنوان یک بیومارکر التهاب سیستمیک شناخته می‌شود. در این مطالعه سطح CRP سرم بعد از درمان با فتوترالپی به طور معنی‌داری کاهش یافت ( $P<0.001$ ).

در مطالعه‌ای که توسط Biljan و همکاران روی ۷۰ بیمار مبتلا به پسوریازیس انجام شد، مشاهده شد که پارامترهای التهابی مثل CRP سرم به طور معنی‌داری با تظاهرات بالینی بیماری پسوریازیس ارتباط دارد ( $P<0.005$ ) و نتایج بیان‌کننده‌ی این بود که پسوریازیس یک بیماری التهابی است که بالارفتن سطح پاسخ‌های التهابی با شدت بیماری رابطه دارد و از سنجهش سطح CRP سرم به عنوان یک مارکر مهم پیش‌آگهی برای تشدييد پسوریازیس می‌شود استفاده کرد.<sup>۸</sup>

در یک مطالعه‌ی مقطعی که روی ۷۳ بیمار مبتلا به پسوریازیس توسط Coimbra و همکارانش انجام گرفت، مشاهده شد که سطح CRP با نمره‌ی PASI

بررسی‌های ما مشخص شد که سطح CRP در سرم بیماران با پسوریازیس پلاکی متوسط تا شدید بالا می‌باشد و این نشان‌دهنده‌ی این است که پسوریازیس یک بیماری التهابی سیستمیک بوده و درمان با فتوترایپی با طول موج ۳۱۱ نانومتر منجر به بهبودی ضایعات پسوریازیسی می‌گردد و همچنین سطح CRP سرم را کاهش می‌دهد که مطالب فوق توسط بررسی‌های آماری انجام شده بین ارتباط سطح CRP سرم و نمره‌ی PASI سنجیده شده، بر اساس مشاهدات و معاینات بالینی بیماران مبتلا به پسوریازیس مشخص می‌گردد. جهت بررسی عوارض جانبی مزمن فتوترایپی با NB-UVB، مطالعات بیشتر و همچنین پیگیری طولانی‌مدت بیماران لازم است.

پوستی با بالارفتن سطح CRP سرم به‌طور معنی‌داری همراه می‌باشد.<sup>۸</sup>

در مطالعه‌ای که توسط Kanelleas و همکاران با عنوان نقش مارکرهای التهابی در ارزیابی شدت بیماری و پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به پسوریازیس انجام شد، نشان داده شد که بعد از درمان مارکرهای التهابی مثل CRP سرم کاهش می‌یابد ( $P < 0.001$ ) و نمره‌ی hs-CRP با PASI ارتباط داشت و نتیجه‌گیری شد که از مارکرهای التهابی مخصوصاً hs-CRP برای بررسی شدت پسوریازیس و پاسخ به درمان می‌شود استفاده نمود. و ترکیبی از مارکرهای التهابی مثل CRP به همراه نمره‌ی PASI ممکن است نشان‌دهنده‌ی وضعیت التهابی در پسوریازیس باشد.<sup>۹</sup>

با توجه به مطالعات فوق و نتایج حاصل از

## References

1. Serwin A B, Wasowics W, Gromadzinska J, Chodyncka B. Selenium status in psoriasis and its relations to the duration and severity of the disease. Nutrition 2003; 19: 301-4.
2. Lowes MA, Bowcock AM, Krueger JG. Pathogenesis and therapy of psoriasis. Nature 2007; 445: 866-73.
3. Vandevenne V, Haegeman G, Fiers W. TNF- mediated IL6 gene expression and cytotoxicity are co-inducible in TNF- resistant L929 cells. FBES Lett 1992; 302: 235-8.
4. Khalaf AT et al. Narrow-band ultraviolet B and convention UVB phototherapy in psoriasis: a randomised controlled trial. Am J App Sc 2008 5: 905-8.
5. Biljan D, Situm M, Kostović K, et al. Acute phase proteins in psoriasis. Coll Antropol 2009; 33: 83-6.
6. Coimbra S, Oliveira H, Reis F, et al. C-reactive protein and leucocyte activation in psoriasis vulgaris according to severity and therapy. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010; 24: 789-96.
7. Chodorowska G, Wojnowska D, Juszakiewicz-Borowiec M. C-reactive protein and alpha2-macroglobulin plasma activity in medium-severe and severe psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2004; 18: 180-3.
8. Strober B, Teller C, Yamauchi P, et al. Effects of etanercept on C-reactive protein levels in psoriasis and psoriatic arthritis. Br J Dermatol 2008; 159: 322-30.
9. Kanelleas A, Liapi C, Katoulis A, et al. The role of inflammatory markers in assessing disease severity and response to treatment in patients with psoriasis treated with etanercept. Clin Exp Dermatol 2011; 36: 845-50.

## CRP serum level in patients with psoriasis before and after treatment with narrow-band ultraviolet B

Akram Ansar, MD<sup>1</sup>  
Vali-o-allah Hosseinpoor, MD<sup>1</sup>  
Abbas Zamani, MD<sup>1</sup>  
Mahmood Farshchian, MD<sup>1</sup>

1. Department of Dermatology, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.

**Background and Aim:** C-reactive protein (CRP) is an inflammatory biomarker and its level increases in serum of psoriatic patients. Its level is also associated with Psoriasis Area and Severity Index (PASI) score.

**Methods:** CRP serum levels in patients with psoriasis were measured before and after treatment with narrow-band ultraviolet B (NB-UVB) and the data were analyzed in relation the PASI score improvement.

**Results:** Baseline CRP levels among psoriatic patients were higher than normal. These levels decreased significantly after treatment. At the beginning of the study, patients with higher levels of CRP also had more extensive and severe skin involvement. Highest decrease in CRP was observed in patients who responded better to the treatment and achieved higher PASI 75%. There was an association between baseline PASI scores and CRP levels.

**Conclusion:** Patients with moderate to severe plaque-type psoriasis had systemic inflammation too, which was demonstrated by having higher levels of CRP. Skin disease activity also was associated with higher levels of CRP. Phototherapy healed the psoriatic skin lesions and also reduced inflammation and decreased CRP levels.

**Keywords:** psoriasis, phototherapy, treatment, C-reactive protein

Received: Nov 27, 2011      Accepted: Mar 7, 2012

Dermatology and Cosmetic 2012; 3 (1): 33-39

**Corresponding Author:**

Vali-o-allah Hosseinpoor, MD

Mirzadeh Eshghi St., Farshchian hospital,  
Department of dermatology, Hamedan,  
Iran.

Email: asndr46162@yahoo.com

**Conflict of interest:** None to declare