

مقایسه میزان پاکسازی سه نوع سیستم، Rotary، Reciprocal و Vertical در آماده‌سازی کانال ریشه

دکتر محمد سعید شیخ‌رضایی*[†]- دکتر نصرت‌الله عشقیار**- دکتر بابک فرزانه***- دکتر کاظم آشفته یزدی*

*استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

**استادیار گروه آموزشی آسیب‌شناسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

***اندودنتیست

Title: An in-vitro comparison of canal debridement efficiency between three systems of Rotary, Reciprocal and Vertical

Authors: Sheykherzaee MS. Assistant Professor*, Eshghyar N. Assistant Professor**, Farzaneh B. Endodontist, Ashofteh Yazdi K. Assistant Professor*

Address: *Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

**Department of Oral Pathology, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

Statement of Problem: Total removal of tissues and remnant microorganisms as well as canal shaping are the essential objectives of endodontic therapy. A successful endodontic treatment is obtained through Shilder's principals, however; complete observation of this technique using stainless steel files manually is problematic and time-consuming. Modern technology, in order to eliminate such problems, has presented new facilities such as Nickel-Titanium (NiTi) files and engine driven instruments.

Purpose: The aim of this in-vitro study was to compare the canal debridement efficiency of three engine driven instruments: Rotary, Reciprocal and Vertical.

Materials and Methods: In this experimental study, 60 mesial roots of human first and second mandibular molars were divided into three groups randomly. In each sample, one canal was considered as case, the other one as control. Files used in Reciprocal and vertical groups were of handy Ni-Ti type and in rotary group, rotary Ni-Ti files were used. After debridement, the roots were sectioned at 3mm and 5mm from anatomic apex, stained and examined under light microscope. Comparison criteria between case and control groups were based on residual debris and predentin and the level of root canal preparation and shaping after debridement. Data were subjected to kruskal-Wallis non-parametric test.

Results: There was no significant difference between the efficiency of debridement at 3mm and 5mm sections between all groups. But difference in time consumption was significant ranked from the shortest to the longest as rotary, reciprocal and vertical.

Conclusion: The efficiency of debridement between the three automated instruments was approximately equal, however; the instrumentation time was different between three groups. Rotary system was the fastest one, as compared with reciprocal (second) and vertical (last). It may be concluded that rotary system has a superiority over the other two groups in conventional root canal therapies.

Key Words: Cleaning and shaping; Ni-Ti files; Rotary instrument; Vertical instruments; Reciprocal instruments

[†] مؤلف مسئول: دکتر محمد سعید شیخ‌رضایی؛ آدرس: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده دندانپزشکی - گروه آموزشی اندودنتیکس
تلفن: ۰۱۱۲۷۳۲

چکیده

بیان مسئله: در درمان ریشه، تمیز کردن و شکل دادن کanal از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جهت موفقیت در آن رعایت اصول Shilder الزامی است. از سوی دیگر رعایت این اصول توسط فایل‌های Stainless Steel و به روش دستی مشکل و وقت‌گیر است، در فناوری نوین برای رفع این مشکلات تسهیلات جدیدی از جمله فایل‌های Nickel-Titanium (NiTi) و وسایل موتوری عرضه شده است.

هدف: مطالعه حاضر با مقایسه میزان پاکسازی کanal ریشه بین سه وسیله ماشینی Rotary، Reciprocal و Vertical در شرایط In-vitro انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی، از ۶۰ ریشه مزیال دندانهای مولر اول و دوم فک پایین انسان استفاده شد. نمونه‌ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. در هر نمونه یک کanal به عنوان شاهد و دیگری به عنوان نمونه مورد آزمایش منظور گردید. در گروههای Vertical Reciprocal و Rotary از فایل‌های NiTi دستی و درگروه Kruskal-Wallis از فایل‌های Rotary چرخشی استفاده شد. پس از اتمام پاکسازی کanal، مقاطع با فواصل ۳ و ۵ میلیمتری از آپکس آناتومیک تهیه شد؛ سپس مقاطع توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. معیار ارزیابی براساس مقدار دربری باقیمانده در کanal کار شده، پرهدنتیں باقیمانده و میزان صاف شدن دیوارهای کanal کارشده نسبت به کanal شاهد بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون غیرپارامتری Kruskal-Wallis تحلیل گردید.

یافته‌ها: بین میزان پاکسازی در مقاطع ۳ و ۵ میلیمتری تمام گروهها، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت، اما تفاوت سرعت کارکرد، بین تمام گروهها معنی‌دار و برتری به ترتیب مربوط به Reciprocal و Vertical بود.

نتیجه‌گیری: از نظر توانایی پاکسازی با یکدیگر تفاوتی ندارند اما سرعت از Vertical و Reciprocal از Rotary بیشتر است. بر همین اساس می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که نسبت به دو وسیله دیگر، در درمانهای معمول کanal ریشه برتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: تمیز کردن و شکل دهنی؛ فایل‌های NiTi؛ وسایل Reciprocal و Vertical؛ Rotary.

مقدمه

یکی از مهمترین اهداف درمانهای ریشه، تمیز کردن و شکل دادن کanal است که به وسیله Instrumentation صحیح انجام می‌شود؛ چنانچه این عمل به طور صحیح انجام شود، بافت‌های زنده و نکروتیک و میکرووارگانیسم‌ها از محیط کanal حذف می‌شوند یا به حداقل می‌رسند.

هدف از دربیدمنت به طور خلاصه عبارت است از:

حذف مواد آلی و غیرآلی حاصل از تجزیه بافت‌ها و همچنین باکتری‌ها و فراورده‌های آنها و آماده‌سازی کanal برای پرکردن (۱). رسیدن به اهداف ذکر شده با فایل‌های

۲۵ تمیز و به اندازه ۳ شماره Flairing فایل انجام گردید. نمونه‌های گروه سوم با وسیله Vertical فایل به همراه Crown-Down فایل‌های NiTi دستی (H-File) به روش (H-File) به روش آماده شدند. طریقه فایلینگ شبیه گروه دوم بود.

در تمام گروهها از سرم فیزیولوژی به مقدار ۱ سی سی بین هر شماره فایل استفاده شد. به همراه هر فایل در تمامی گروهها از RC-Prep به عنوان Lubricant استفاده گردید.

زمان کارکرد هر فایل در کanal و همچنین کل زمان کارکرد در هر روش محاسبه و ثبت گردید. پس از فایلینگ، دهانه کanal‌ها با گالاس آینومر خودسخت‌شونده (Self Cure) مسدود شد. نمونه‌ها به مدت ۷۲ ساعت در اسید کلریدریک ۱۰٪ قرار داده شدند تا دکلسفیفه شوند. قبل از تهیه مقاطع ۳ و ۵ میلیمتری از آپکس آناتومیک، نمونه‌ها به مدت ۵ دقیقه در کربنات لیتیم قرار داده شدند.

از هر نمونه ۵-۷ عدد مقطع به قطر ۶-۵ میکرون تهیه شد. مقاطع به روش هماتوکسیلین اثوزین (H&E) رنگ‌آمیزی شدند. لامها توسط یک متخصص آسیب‌شناسی که از گروه‌بندی مورد نظر مطلع نبود، با استفاده از میکروسکوپ نوری مشاهده گردید.

متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از: مقدار دبری باقیمانده در کanal کار شده، مقدار پره‌دنتین باقیمانده در کanal کار شده نسبت به کanal شاهد و مقدار صاف‌شدگی دیواره‌های کanal کار شده نسبت به کanal شاهد. به منظور تعیین شاخصهای مورد ارزیابی با استفاده از میکروسکوپ، سطح مقطع هر کanal، به چهار ربع دایره فرضی تقسیم و هر شاخص ارزیابی گردید. در ثبت میزان هر متغیر به جای درصد از درجه‌های اندازه‌گیری ۱ تا ۴ استفاده شد؛ بدین ترتیب که به $1=25\%$ ، $2=50\%$ ، $3=75\%$ و $4=76\%$ تا 100% نیز عدد ۴ داده شد.

به منظور تجزیه و تحلیل آماری، ابتدا خمیدگی ریشه‌های سه گروه با استفاده از آزمون یک‌طرفه ANOVA با یکدیگر

مختلف برای پاکسازی کanal استفاده می‌شود.

با توجه به متنوع بودن نوع و مشخصات تجاری این ماشینها و نامشخص بودن کیفیت کار هر یک و برتری احتمالی یکی بر دیگری، در مطالعه حاضر کیفیت پاکسازی Rotary و Vertical Reciprocal سه نوع سیستم ماشینی (Rotary, Reciprocal و Vertical) که هر سه ساخت کارخانه NSK می‌باشند، در شرایط In-vitro مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی ۶۰ دندان مولر اول و دوم کشیده شده فک پایین انسان که حداقل به مدت ۲۴ ساعت در محلول فرمالین ۱۰٪ در درجه حرارت اتاق نگهداری شده بودند، مورد استفاده قرار گرفتند. ریشه مزیال نمونه‌ها از کل دندان به گونه‌ای جدا گردید که طول ریشه باقیمانده ۱۲ میلیمتر باشد. ریشه‌ها بر حسب درجه خمیدگی آنها در سه گروه تقریباً یکسان قرار داده شدند. درجه خمیدگی ریشه‌ها با استفاده از روش Schneider تعیین گردید. از میان کanal‌های مزیال یک دندان، یک کanal به عنوان شاهد و دیگری به عنوان مورد انتخاب شد. از یک فایل (SS K-File) برای تعیین طول و ارزیابی باز یا بسته بودن کanal استفاده گردید. پس از مشاهده نوک فایل از انتهای کanal، به منظور محاسبه طول کارکرد، ۱ میلیمتر از طول آن کم شد. قبل از کار فایلینگ، برای مشابه‌سازی فضای PDL و عدم مشاهده ریشه‌ها در حین آماده‌سازی، نمونه‌ها به موم آگشته و سپس به بلوك گچی از قبل آماده شده، منتقل شدند.

نمونه‌های گروه اول با وسیله Rotary به همراه فایل‌های NiTi چرخشی (Profile) طبق دستور کارخانه آماده شدند. ناحیه اپیکال کanal تا فایل شماره ۲۵ با تباعد 0.04 mm آماده گردید. نمونه‌های گروه دوم با وسیله Reciprocal به همراه فایل‌های NiTi دستی (K-File) به روشن Crown-Down آماده شدند. ناحیه اپیکال تا شماره

مقایسه شدن؛ سپس هر یک از متغیرهای پاکسازی کanal (دبری) و پره دنتین باقیمانده در کanal و صاف شدن دیواره ها در سه گروه با استفاده از آزمون غیر پارامتری Kruskal Wallis مورد مقایسه قرار گرفتند.

بحث و نتیجه گیری

برای رسیدن به موفقیت در درمان ریشه باید بتوان حتی الامکان اصول Sheilder را در آماده سازی کanal اجرا نمود؛ این اصول به ترتیب زیر می باشد (۱):

۱- ایجاد فضای مخروطی و یکنواخت از مدخل تا انتهای

کanal

۲- حفظ کمترین قطر کanal در اپیکال

۳- انجام آماده سازی کanal در سطوح مختلف

۴- حفظ موقعیت سوراخ اپیکال در محل اولیه

۵- کوچک نگهداشتن سوراخ اپیکال تا حد ممکن

برای نزدیک تر شدن به این اهداف، در فناوری نوین، وسائل جدیدی عرضه شده است که از جمله آنها می توان به Automated Instruments اشاره کرد.

در این تحقیق میزان پاکسازی سه وسیله از این گروه (NSK; Japan) (Reciprocal و Vertical Rorary) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای یکسان سازی گروه ها، خمیدگی ریشه ها توسط سیستم Shneider مورد ارزیابی قرار گرفت و تا خمیدگی ۲۵ درجه در مطالعه قرار گرفت (جدول ۲).

جدول ۱- مجموع زمان کار کرد وسائل در کanal بر حسب ثانیه

حدود اطمینان ۹۵٪ میانگین		انحراف معیار	میانگین	تعداد	نوع روش
حد بالا	حد پایین				
۴۳۳/۶۳۳۴	۴۱۷/۶۶۶۶	۱۷/۰۵۸۰۳	۴۲۵/۶۵۰۰	۲۰	Reciprocal
۱۷۷/۵۸۱۳	۱۶۶/۲۱۸۷	۱۲/۱۳۹۱۱	۱۷۱/۹۰۰۰	۲۰	Rotary
۵۲۵/۸۶۸۷	۵۰۴/۵۳۱۳	۲۲/۷۹۵۶۶	۵۱۵/۲۰۰۰	۲۰	Vertical
۴۰.۹/۰۶۴۵	۳۳۲/۷۶۸۸	۱۴۷/۶۷۲۴۸	۳۷۰/۹۱۶۷	۶۰	جمع

(P = ۰/۰۰۰)

جدول ۲- میزان خمیدگی ریشه ها

حدود اطمینان ۹۵٪ میانگین		انحراف معیار	میانگین	تعداد	نوع روش
حد بالا	حد پایین				
۲۳/۶۲۶۳	۲۱/۹۹۳۷	۱/۷۴۴۱۳	۲۲/۸۱۰۰	۲۰	Reciprocal
۲۲/۷۵۵۴	۲۱/۲۶۴۶	۱/۵۹۲۷۱	۲۲/۰۱۰۰	۲۰	Rotary
۲۲/۷۰۳۳	۲۰/۸۷۶۷	۱/۹۵۱۴۹	۲۱/۷۹۰۰	۲۰	Vertical
۲۲/۶۶۶۸	۲۱/۷۳۹۹	۱/۷۹۳۹۶	۲۲/۲۰۳۳	۶۰	جمع

(P = 0/168)

می باشد. معمولاً دری به دیوارهای کanal می چسبد و در غالب موارد عفونی است (۴).

با توجه به این که یکی از اهداف آماده سازی کanal حذف میکروارگانیسم های داخل کanal است باید تا حد ممکن در بیهای داخل کanal حذف گردد تا متعاقب آن امکان حذف میکروارگانیسم ها نیز ممکن باشد.

تفاوت مقدار دری باقیمانده در مقاطع ۳ و ۵ میلیمتری بین تمام گروهها معنی دار نبود.

میزان Tapering ایجاد شده در بین سه گروه تقریباً یکسان است؛ زیرا در گروه Rotary همراه با فایل Profile با توجه به این که اپیکال تا شماره ۲۵ با تبعaud ۰/۰۴ آماده شده است، در مقطع ۳ و ۵ میلیمتری حداقل قطر کanal آماده شده به ترتیب ۰/۳۳ و ۰/۴۱ میلیمتر است. در گروههای Vertical و Reciprocal با فایل های NiTi دستی و Flaring نیز اپیکال تا شماره ۲۵ آماده شد. Flaring نیز به اندازه ۳ شماره فایل (۴۰، ۳۵۳۰) بود که به ترتیب ۱ میلیمتر از طول WL کاسته می شد؛ به عبارت دیگر حداقل Tapering در مقطع ۳ و ۵ میلیمتری به ترتیب ۰/۳۵ و ۰/۴۲ میلیمتر است. پس می توان گفت با توجه به مقدار برداشت تقریباً مشابه عاج و گشادی یکسان سطح مقطع و روش کار (Crown-Down) که در تمام گروهها شبیه به هم بود، عدم تفاوت معنی دار باقیمانده قابل توجیه است.

متغیر دیگر پرهدتین باقیمانده در کanal شاهد است. پرهدتین که عاج غیر مینرالیزه است دارای ضخامت های متفاوت (۴۷-۱۰ میکرون) می باشد (۴).

این که پرهدتین، آلوود به میکروارگانیسم است یا خیر و آیا میکروارگانیسم می تواند به توبول عاجی وارد شود یا خیر مورد بحث است.

گزارش شده است که میکروارگانیسم ها به صورت یک لایه بیوفیلم پیچیده در سطح عاج جمع می شوند؛ همچنین میزان نفوذ میکروارگانیسم ها به داخل توبول عاجی مشخص

برای این که شرایط مطالعه به شرایط In-vivo نزدیک باشد، پس از موم اندود شدن قسمت خارجی ریشه، نمونه به بلوك گچی از قبل تهیه شده منتقل شد. با این کار دید مستقیم و در نتیجه دخالت احتمالی عمل کننده حذف گردید. با توجه به اینکه تمیز کردن $\frac{1}{3}$ اپیکال حائز اهمیت است، مقاطع از همین ناحیه تهیه شدند. طول ریشه ها ۱۲ میلیمتر بود؛ بنابر این $\frac{1}{3}$ اپیکال، ۴ میلیمتر آخر کanal بود؛ با تهیه مقاطع ۳ و ۵ میلیمتری، ناحیه اپیکال و ابتدای ناحیه میانی از نظر میزان پاکسازی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این مطالعه از مقطع ۱ میلیمتر صرف نظر گردید. زیرا طول کارکرد ۱ میلیمتر کوتاهتر از طول آپکس انتخاب شد. بعداز عمل پاکسازی و شکل دهی، دهانه کanal کار شده، به مراتب بزرگتر از کanal شاهد شده بود؛ به همین دلیل احتمال نفوذ اسید که برای دکلسفیکاسیون نمونه ها بکار می رفت، به داخل کanal کارشده بالاتر بود و احتمال می رفت محتویات داخل کanal کارشده در اثر این اسید دستخوش تغییر شود.

برای گشاد کردن فضای $\frac{2}{3}$ تاجی ریشه معمولاً از فرزهای Gates Gliden (GG) استفاده می شود. با توجه به اhhhای ملایم ریشه ها، احتمال ورود GG به ناحیه ۵ میلیمتری وجود داشت؛ بنابر این برای بررسی قدرت پاکسازی تکنیک مورد نظر، از این دریل استفاده نشد.

فایل های مورد استفاده در سیستم NiTi Rotary چرخشی است. در این مطالعه نیز از نوع Profile استفاده شد. برای تکنیک مورد استفاده نیز Crown-Down بود. برای یکسان سازی هر چه بیشتر شرایط گروهها در گروههای Vertical و Reciprocal با فایل های NiTi دستی و به صورت Crown- Down استفاده شد (طبق توصیه کارخانه).

تعريف دری در این مطالعه مشابه سایر مطالعات بود که شامل خرد های عاجی ناشی از عمل فایلینگ و بقاوی پالپ

همین نتیجه حاصل شد.
در مورد این که سرعت وسایل Automated از دستی بیشتر است یا نه نظرات متفاوتی وجود دارد؛ از جمله (۵)؛
معتقدند وسایل دستی سرعت

کمتری دارد.

Brayton و Harty معتقدند سرعت هر دو برابر است.
Lechmen بر این باور است که سرعت وسایل دستی بیشتر است.

Thompson، Dummer و Glosson سرعت Rotary بیشتر از دستی می‌باشد.

در این مطالعه اختلاف بین زمان کارکرد گروهها معنی‌دار بود (جدول ۱). گروه Rotary به مقدار بسیار زیادی از دو وسیله دیگر سریعتر بود. اختلاف دو وسیله دیگر با Rotary شاید به دلیل استفاده از فایل‌های NiTi دستی است که به NiTi روش Crown-Down از آنها استفاده شد. فایل‌های NiTi دستی با اندک فشاری خم می‌شند و عملاً از قدرت برنندگی آنها کاسته می‌شد.

شاید اگر از فایل‌های دستی استنلس استیل در این دو روش استفاده می‌شد، بر سرعت عمل آنها اضافه می‌شد. اختلاف زمان کارکرد بین Vertical و Reciprocal نیز معنی‌دار بود. در تکنیک Reciprocal فایل‌ها به دفعات در کanal گیر می‌کردند و همین امر زمان دبریدمان را طولانی‌تر می‌کرد.

با توجه به نتایج مطالعه حاضر، میزان پاکسازی سه وسیله ماشینی Reciprocal و Rotary و Vertical با هم تفاوت نداشتند و عملکرد هر سه سیستم ماشینی قابل قبول بود، اما سرعت کارکرد این وسایل متفاوت و به ترتیب عبارت بود از: Vertical، Reciprocal و Rotary؛ بنابراین شاید بتوان نتیجه‌گیری نمود که در آماده‌سازی کanal در حین درمان کanal ریشه معمولی، سیستم چرخشی عملکرد بهتری نسبت به دو سیستم Reciprocal و Vertical دارد.

نمی‌باشد؛ ولی نتیجه برخی از مطالعات نشان داده است که میکرووارگانیسم‌ها تا عمق ۳۰۰ میکرون به داخل توبول‌ها وارد می‌شوند (۳). با توجه به این یافته‌ها توصیه می‌شود پره‌دنتین از کanal حذف شود.

Tucker در بررسی خود، در هیچ یک از نواحی کanal پره‌دنتین مشاهده نکرد. از عواملی که در عدم مشاهده یا حذف پره‌دنتین از داخل کanal مؤثر است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد (۴)：

۱- بروز نکروز میانی در داخل کanal که همراه با ایجاد کلارناز است و می‌تواند پره‌دنتین را حذف نماید.

۲- وجود تحلیل داخلی

۳- حذف پره‌دنتین هنگام پاکسازی کanal

۴- در اثر مشکلات تکنیکی در هنگام تهیه مقطع و یا رنگ‌آمیزی با توجه به نکات اشاره شده متغیر پره‌دنتین به تنها می‌نمی‌تواند دلیل مؤثر بودن یا نبودن پاکسازی در کanal باشد.

در مقایسه این متغیر نیز، در هیچ یک از گروهها اختلاف معنی‌داری بین مقاطع ۳ و ۵ میلیمتری مشاهده نشد. آخرین متغیر بررسی شده در راستای میزان پاکسازی کanal، مقدار صاف شدن دیواره کanal بود. یکی از اصول Schieler دبریدمان در تمام سطوح کanal است. به عبارتی باید تمام محیط دایره مشاهده شده در زیر لام، صاف شده باشد.

بررسی این متغیر نیز اختلاف معنی‌داری بین مقاطع ۳ و ۵ میلیمتری بین تمام گروهها نشان نداد.

با توجه به استفاده از فایل‌های NiTi در تمامی گروهها و این که قابلیت ارتفاع فایل‌ها در تمام گروهها یکسان است و همچنین روش انتخابی یکسان دبریدمان در تمام گروهها (Crown-Down) به نظر می‌رسد نباید تفاوتی بین صاف‌شدنی دیواره‌ها به وجود آید که در این مطالعه هم

منابع:

- 1- Schilder H: Cleaning and shaping the root canal. Dent Clin North Am 1974;18: 269-96.
- 2- نکوفر، محمد حسین؛ اسلامی، محمد؛ نیکنام، فرزانه. مقایسه میزان پاکسازی و تمیزکنندگی سیستم کanal ریشه با فایلهای Rotary Ni Ti و روش دستی با فایلهای K-Type از نوع Stainless Steel. پایاننامه شماره ۳۷۵۷. رشته دندانپزشکی. دانشکده دندانپزشکی. دانشگاه علومپزشکی تهران. ۱۳۷۷-۷۸.
- 3- نکوفر، محمد حسین؛ اسلامی، محمد؛ نیکنام، سمانه. مقایسه میزان پاکسازی و تمیزکنندگی کanal ریشه با سیستم چرخشی Protaper و روش دستی با فایلهای K-Type از نوع Stainless Steel. پایاننامه شماره ۴۰۳۰. رشته دندانپزشکی. دانشکده دندانپزشکی. دانشگاه علومپزشکی تهران. ۱۳۸۰-۸۱.
- 4- Schafer E, Zapek KC. A comparative scanning electron microscopic investigation of efficacy of manual and automated instrumentation of root canals. J Endod 2000; 26: 640-60.
- 5- Hulsmann M, Rummelin C, Schafer F. Root canal cleanliness after preparation with different endodontic handpiece and hand instrument. J Endod 1997; 23:304-6.
- 6- Ten Cate AR. Oral Histology. 5th ed. St. Louis: Mosby; 1998:152.
- 7- Spyropoulos S, Eldeeb ME. The effect of Giromatic files on the preparation shape of severly curved canals. Int Endod J 1987; 20:133-42.