

بررسی زمان رویش دندانهای ۳، ۴ و ۵ در دانش آموزان ۱۴-۸ ساله شهر اصفهان

دکتر ژاله محمودیان- دکتر علی کوثری**- دکتر شهرزاد جوادی نژاد***

*دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

*استاد بار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

**استاد بار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان

Title: Evaluation of the eruption time of canine, first and second premolar between eight to fourteen years old Isfahanian students.

Authors: Mahmodian J*. Associate professor; Kowsary A.* Assistant professor, Javadi-nejad Sh.** Assistant professor

Address: *Dept. of Pediatric dentistry, Tehran university of Medical sciences & Health services

**Dept. of Pediatric dentistry, Hamadan university of Medical sciences & Health services

Abstract: Eruption is a kind of development move of tooth from the place of its formation to its functional position in the mouth.

Time and sequence of permanent's teeth eruption from the point of health diagnosis and orthodontic treatments is very important.

Because of this, we decided to evaluate and determine the mean eruption time of canine and premolars from gum penetrations toward occlusion and also their sequence of eruption.

The average time of eruptions in this study was higher than other similar studies.

Our findings showed that the mean eruption time of canine and premolars in girls is earlier than boys lower canines erupt earlier than upper ones and maxillary premolars erupt before mandibular premolars in boys.

Key words :Eruption- Permanent teeth- Canine and premolars.

چکیده

رویشن حرکت تکاملی دندان در جهت محوری از محل تشکیل خود تا وضعیت فانکشنال آن در حفره دهان می باشد. مسأله زمان و ترتیب رویشن دندانهای دائمی در معاینات دندانپزشکی از نظر تشخیص سلامتی یا بیماری و درمانهای ارتدنسی اهمیت زیادی دارد و مطالعه آن جزو الوبتهای موجود است.

هدف از انجام این تحقیق تعیین متوسط زمان رویشن دندانهای کانین و پرمولر و دامنه تغییرات سن رویشن برای هر دندان و متوسط زمان رویشن مراحل مختلف دندان تا رسیدن به اکلوزن و ترتیب رویشن دندانهای دائمی می باشد.

متوسط زمان رویشن به دست آمده در تحقیق حاضر در مقایسه با سایر تحقیقات بیشتر است.

یافته های این تحقیق نشان داد که متوسط زمان رویشن دندانهای کانین و پرمولر در دختران کمتر از پسران است.

کلید واژگان: رویشن- دندانهای دائمی- کانین و پرمولرها

مقدمه

بنابراین رویشن فقط به بخشی از الگوی کلی حرکت فیزیولوژیک دندان اطلاق می شود؛ چون دندانها برای نگهداری موقعیت خود در فکین در حال رشد و جبران سایش ناشی از عمل مضخ حرکات پیچیده ای را انجام می دهند.

بین تزادهای سفید و سیاه پوست مطالعه‌ای را انجام و نشان داد که رویش دندان در دختران و پسران نزد سیاه زودتر انجام می‌شود (۵).

Garcia-Goday در بررسی روی کودکان دومینیکن متوجه شد که به استثنای کائین و پرمولر اول پایین، زمان رویش دندانهای دائمی در دختران جلوتر از پسران است (۶).

در سال ۱۹۸۵ مطالعه‌ای که در سوئد انجام شد، نشان داد که از نظر زمان رویش دندان، دختران بر پسران مقدم هستند. در دندانهای دائمی اختلاف زمان رویش در دو جنس از ۳ تا ۱۱ ماه است (۶).

در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۱ در فنلاند انجام شد، رویش هر دندان به ۴ مرحله به شرح زیر تقسیم‌بندی شد:

- ۱- دندان در دهان قابل رؤیت نیست.
- ۲- حداقل یک کاسپ دیده می‌شود.

۳- تمام سطح اکلوزال یا تمام سطح مزیودیستال دندان قابل رؤیت است.

۴- دندان در اکلوزن قرار دارد.

نتایج این تحقیق نشان داد که زمان رویش دندان در دختران زودتر از پسران است که اختلاف آن بین ۲ تا ۱۰ ماه است (۱۰).

در سال ۱۹۹۱ جهت بررسی زمان رویش دندانهای مولر و انسیزور در آفریقا پژوهشی صورت گرفت که نشان داد عوامل ژنتیکی، اقتصادی، فلوراید و ناحیه جغرافیایی می‌تواند بر زمان رویش دندان تأثیر گذارد (۲).

در ایران اولین تحقیق در این خصوص در سال ۱۳۶۷ توسط دکتر شهین بنکار در مورد زمان رویش دندانهای ۱ و ۶ در تهران بر روی ۳۱۷۴ کودک انجام گرفت و میانگین زمان رویش این دندانها تعیین شد و مشخص گردید که رویش دندانها با وزن و قد همبستگی دارد (۱۱).

دکتر سرباز، زمان و ترتیب رویش ۲۸ دندان دائمی را در ۱۰۰۶ نفر مورد بررسی قرار داد و میانگین زمان رویش این دندانها را با احتساب ۲ انحراف معیار تعیین کرد (۱۲).

مطالعه دیگری در سال ۱۳۷۰ توسط دکتر چوپانی برروی ۲۲۰ نفر از مراجعین به بخش دندانپزشکی کودکان

با وجودی که در بیشتر زمینه‌های علم دندانپزشکی برای هماهنگی تحقیقات انجام‌شده شاخصهای از طرف سازمانهای بین‌المللی معرفی شده است ولی متأسفانه روش مشخصی برای تعیین مراحل تکامل دندانهای دائمی از لحاظ کلینیکی وجود ندارد.

گزارشات در مورد رویش دندانهای دائمی معمولاً بر اساس معیار سوراخ شدن لثه توسط دندان مورد نظر است؛ در صورتی که اطلاعات ناچیزی در مورد زمان سایر مراحل رویشی تا رسیدن به اکلوزن وجود دارد.

نظر به این که تاکنون در ایران تحقیقات محدودی در مورد رویش دندانها صورت گرفته است، برای تعیین زمان رویش دندانها در کودکان ایرانی ساکن در مناطق مختلف جغرافیایی و مقایسه آن با سایر نژادها نیاز به تحقیقات بیشتری وجود دارد.

مروری بر مقالات

اولین تحقیق انجام‌شده در مورد رویش دندانها در سال ۱۹۱۴ توسط Bean صورت گرفت که وضعیت رویشی دندانهای کودکان آمریکایی با فلیپینی مورد مقایسه قرار گرفت (۱).

در سال ۱۹۳۵ در آمریکا مطالعه جامعی توسط Logan و Kronfeld به صورت طولی انجام شد و برای تعیین زمان رویش دندانها از رادیوگرافی استفاده شد؛ نتایج این تحقیق پس از اصلاحات بعدی به صورت جدول ارائه شد که امروزه نیز مورد قبول است (۸).

Hurme نیز با مطالعه ۹۳۰۰ کودک در فیلادلفیا میانگین و میانه زمان رویش دندانها را محاسبه کرد. Nanda در مطالعه خود نتیجه گرفت که تفاوت بین تعداد دندانهای موجود و میانگین زمان رویش دندان در دختران و پسران معنی‌دار نیست و رابطه ضعیفی بین تکامل سیستم دندانی دائمی با رشد صورت و رشد قد مشاهده می‌شود؛ وی معتقد است که در مورد رویش دندانهای دائمی، تفاوت‌های نژادی تأثیر بیشتری از تفاوت‌های اقتصادی و تغذیه‌را دارا هستند (۹).

در سال ۱۹۷۳ Garn جهت مقایسه زمان رویش دندانها

افراد نمونه ۲۱۰۰ نفر تعیین شد.

روش نمونه‌گیری روش چند مرحله‌ای بود که ابتدا مدارس را بر حسب جنس تقسیم و بر اساس نسبت هر گروه جنسی، تعداد لازم محاسبه شد؛ سپس تعداد نمونه مربوط به هرجنس بر اساس نسبت دانش‌آموزان پنج ناحیه شهر اصفهان در هر ناحیه تعیین شد و مورد مطالعه قرار گرفت.

جهت دقت بیشتر در نمونه‌گیری و احتمال حذف شدن تعدادی از نمونه‌ها در هر ناحیه تعداد بیشتری از دانش‌آموزان مورد مطالعه قرار گرفتند؛ در نهایت نمونه‌های واجد شرایط شامل تعداد ۲۲۳۴ نفر دانش‌آموز (۱۱۲۲ نفر دختر و ۱۱۱۲ نفر پسر) بود.

متغیرهای پژوهش عبارتند از:

- وضعیت رویش دندهای کائین و پرمولر: که طبق کدهای موجود در پرسشنامه یادداشت گردید.
 - سن: در این پژوهش به علت حساسیت موضوع، سن بر حسب ماه محاسبه شد.
 - جنس: وضعیت رویش دندهای در جنس مذکور و مؤنث مقایسه شد.
- تحویل معاینه بدین شکل بود که با مراجعت به کلاسها با معاینه توسط آینه دندانپزشکی میزان رویش دندهای (برحسب کدهای تعیین شده در پرسشنامه) ثبت می‌شد؛ سایر اطلاعات از پروندهای موجود در مدارس به دست آمد؛ سن کودکان از روی تاریخ تولد شناسنامه در روز معاینه برحسب ماه توسط رایانه محاسبه شد.

نتایج

پس از تکمیل پرسشنامه‌ها برای این که بتوانیم تغییرات زمان رویش را با دقت در حد ماه تعیین نماییم، کودکان مورد مطالعه را به ۱۵ گروه سنی با فواصل ۵ ماه تقسیم نمودیم.

به منظور تعیین میانگین زمان رویش و دیگر پارامترهای مربوط به آن می‌بایست حداقل و حداکثر زمان رویش مشخص می‌شد؛ بنابراین برای هر یک از دندهای مورد مطالعه توزیع فراوانی تعداد دندهای رویش یافته در گروه

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفت و ترتیب و سن رویش دندها تعیین شد (۱۲).

در سال ۱۳۷۳ بررسی ایدمیولوژیک زمان رویش دندهای دائمی بر روی ۳۷۶۹ نفر توسط دکتر مسلمی در تهران انجام شد و متوسط زمان رویش ۲۸ دنده دائمی با احتساب ۲ انحراف معیار بر حسب سال و به تفکیک جنس مشخص گردید. متوسط زمان رویش دندها در دختران زودتر از پسران بود و رابطه مستقیم بین رویش دندها، وزن و قد وجود داشت (۱۴).

روش بررسی

هدف کلی از این تحقیق تعیین میانگین زمان رویش دندهای کائین و پرمولر فک بالا و پایین در کودکان ۱۳۷۳-۷۴ تا ۱۴ ساله شهر اصفهان در سال تحصیلی ۱۴۰۸ می‌باشد.

اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

- ۱- مقایسه میانگین زمان رویش دندهای مورد مطالعه بین فک بالا و پایین
- ۲- مقایسه میانگین زمان رویش دندهای مورد مطالعه در دو جنس مذکور و مؤنث نسبت به سن آنها
- ۳- بررسی میانگین زمانی مراحل مختلف رویش دندهای مورد نظر تا رسیدن به اکلوژن کامل
- ۴- مقایسه وضعیت رویش دندها مورد مطالعه با استانداردهای مختلف این مطالعه با توجه به ماهیت موضوع بر اساس روش توصیفی - مقطعی صورت گرفت.

جامعه مورد پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان ۱۴-۸ ساله دبستانها و مدارس راهنمایی واقع در محدوده شهر اصفهان می‌باشد.

چارچوب نمونه‌گیری فهرست مدارس ابتدایی و راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر اصفهان در پنج ناحیه آموزش و پرورش بر اساس آمار سال ۱۳۷۳ می‌باشد.

تعداد نمونه براساس نمونه‌گیری تصادفی ساده ۱۴۰۰ نفر بود که چون روش نمونه‌گیری خوشای در این تحقیق اتخاذ گردید، ضریب ۱/۵ در اندازه نمونه ضرب و تعداد کل

یا ۱۲ سال و ۸ ماهگی است؛ در نهایت دندانهای کائین بالا و پرمولر دوم فک پایین بطور همزمان رویش می‌یابند که متوسط زمان رویش دندانهای $\frac{۳}{۳}$ و $\frac{۵}{۵}$ برابر $\frac{۱۵۴}{۱۵۴}$ ماهگی یا ۱۲ سال و ۱۰ ماهگی است.

دامنه تغییرات، فاصله بین حداقل و حداکثر زمان رویش می‌باشد که در مورد دندانهای کائین بالا و پرمولرهای مقدار آن ۷۰ ماه یا ۵ سال و ۸ ماه می‌باشد؛ یعنی در فاصله زمانی بین ۱۰۶ تا ۱۷۶ ماهگی انتظار می‌رود که این دندان در دهان بچه‌ها دیده شود.

در مورد کائین پایین دامنه تغییرات ۵۷ ماه یا $\frac{۴}{۷۵}$ سال است یعنی در فاصله زمانی بین ۱۰۶ تا ۱۶۲ ماه انتظار داریم که این دندان در دهان رویش یابد.

در جدولهای شماره ۳ و ۴ براساس کدهای موجود در پرسشنامه برای مراحل مختلف رویش دندان (یعنی از زمان ظهور آن در دهان تا رسیدن به اکلوژن) و برای هر مرحله رویشی، شاخصهای میانگین انحراف معیار و خطای معیار مشخص شده است.

ترتیب رویش دندانهای مورد مطالعه در دختران به صورت:

$$\begin{array}{r} ۴ \quad ۵۲ \\ \hline ۲ \quad ۴ \quad ۵ \end{array}$$

و در پسران به صورت:

$$\begin{array}{r} ۲ \quad ۵ \quad ۲ \\ \hline ۳ \quad ۴ \quad ۵ \end{array}$$

می‌باشد.

ترتیب رسیدن دندانهای مورد مطالعه به اکلوژن در دختران به صورت:

$$\begin{array}{r} ۲ \quad ۵۲ \\ \hline ۲ \quad ۴ \quad ۵ \end{array}$$

و در پسران به صورت:

$$\begin{array}{r} ۲ \quad ۵ \quad ۲ \\ \hline ۳ \quad ۴ \quad ۵ \end{array}$$

می‌باشد که مشابه با توالی رویش این دندانها است. جدولهای شماره ۱-۴ نتایج تحقیقات را به تفضیل نشان می‌دهد. لازم به ذکر است جدولهای شماره ۳ و ۴ در سه قسمت الف، ب، و ج ارائه گردیده است.

سنی تعیین شد؛ به عنوان مثال جدول شماره ۱ توزیع فراوانی زمان رویش دندان $\frac{۳}{۳}$ را بر حسب سن (ماه) و به تفکیک جنس نشان می‌دهد.

همان‌گونه که در جدول مشاهده می‌شود در گروه اول (۱۰۲-۱۰۶ ماهه) این دندان در دهان هیچ‌یک از افراد معاینه شده، ظاهر نشده بود ولی درصد ظهور دندان بترتیب افزایش می‌یابد، به طوری که در گروه سنی ۱۷۶-۱۷۲ ماهه به 100% می‌رسد؛ بنابراین حداقل و حداکثر زمان رویش برای دندان $\frac{۳}{۳}$ ، $\frac{۱۱۴}{۱۱۴}$ و $\frac{۱۷۶}{۱۷۶}$ ماهگی گزارش می‌شود.

پس از تعیین این محدوده طبق برنامه‌نویسی خاصی میانگین انحراف معیار و دامنه تغییرات زمان رویش دندانهای مورد مطالعه مشخص شد که در جدول شماره ۲ به آن اشاره شده است.

این جدول نشان می‌دهد که از بین دندانهای کائین و پرمولر در دختران، کائین‌های پایین زودتر از بقیه رویش می‌یابند که متوسط زمان رویش دندانهای $\frac{۳}{۳}$ برابر ۱۳۹ ماهگی یا ۱۱ سال و ۷ ماهگی است؛ پس از آن در دختران پرمولرهای اول فک بالا و پایین همزمان رویش می‌یابند که متوسط زمان رویش دندانهای $\frac{۴}{۴}$ و $\frac{۴}{۴}$ برابر ۱۴۶ ماهگی یا ۱۲ سال و دو ماهگی است. در دختران پرمولرهای دوم فک بالا و پایین و کائین‌های فک بالا در مرحله بعد بطور همزمان رویش می‌یابند که متوسط زمان رویش دندانهای $\frac{۳}{۳}$ و $\frac{۵}{۵}$ برابر ۱۵۱ ماهگی یا ۱۲ سال و ۷ ماهگی است.

در پسران ابتدا دندانهای کائین پایین رویش می‌یابند که متوسط زمان رویش دندانهای $\frac{۳}{۳}$ برابر ۱۴۵ ماهگی یا ۱۲ سال و یک ماهگی است؛ پس از آن دندانهای پرمولر اول فک بالا رویش می‌یابند که متوسط زمان رویش دندانهای $\frac{۴}{۴}$ برابر ۱۴۷ ماهگی یا ۱۲ سال و ۲ ماهگی است؛ پس از آن دندانهای پرمولر اول فک پایین رویش می‌یابند که متوسط زمان رویش دندانهای $\frac{۴}{۴}$ برابر ۱۴۹ ماهگی یا ۱۲ سال و ۵ ماهگی است؛ پس از آن پرمولرهای دوم فک بالا رویش می‌یابند که متوسط زمان رویش دندانهای $\frac{۵}{۵}$ برابر ۱۵۲ ماهگی

جدول شماره ۱ - توزیع فراوانی و درصد وضعیت رویشی دندان ۳ بر حسب سن و جنس در جامعه مورد مطالعه

		پسر		دختر		جنس	
		وضعیت رویشی				سن	
جمع	رویش نیافته	رویش نیافته	جمع	رویش نیافته	رویش نیافته	(بر حسب ماه)	
۶۳	۰	۶۳	۷۶	۱	۷۵	فراآنی	۱۰۲-۱۰۶
۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱/۳	۹۸/۷	درصد	
۷۲	۰	۷۲	۹۲	۱۰	۸۹	فراآنی	
۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۲/۳	۹۶/۷	درصد	۱۱۱-۱۱۷
۲۳	۱	۲۲	۴۹	۷	۴۲	فراآنی	
۱۰۰	۴/۳	۹۵/۷	۱۰۰	۱۴/۳	۸۵/۷	درصد	۱۱۶-۱۱۲
۱۱۶	۸	۱۰۸	۱۰۷	۱۸	۸۹	فراآنی	
۱۰۰	۶/۹	۹۳/۱	۱۰۰	۱۶/۸	۸۳/۲	درصد	۱۲۱-۱۱۷
۶۶	۱۰	۵۶	۵۷	۱۳	۴۴	فراآنی	
۱۰۰	۴۵/۲	۵۴/۸	۱۰۰	۲۲/۸	۷۷/۲	درصد	۱۲۶-۱۲۲
۱۰۰	۲۶	۷۴	۱۰۴	۴۱	۶۳	فراآنی	
۱۰۰	۲۶	۷۴	۱۰۰	۳۹/۴	۶۰/۶	درصد	۱۳۱-۱۲۷
۶۹	۲۵	۴۴	۶۸	۴۳	۲۵	فراآنی	
۱۰۰	۳۶/۲	۶۳/۸	۱۰۰	۶۲/۲	۳۶/۸	درصد	۱۳۶-۱۳۲
۸۴	۳۸	۴۶	۶۹	۵۱	۱۸	فراآنی	
۱۰۰	۴۵/۲	۵۴/۸	۱۰۰	۷۳/۹	۲۶/۱	درصد	۱۴۱-۱۳۷
۱۰۱	۶۶	۳۵	۸۹	۷۰	۱۹	فراآنی	
۱۰۰	۶۵/۳	۳۴/۷	۱۰۰	۷۸/۷	۲۱/۳	درصد	۱۴۶-۱۴۲
۵۳	۴۳	۱۰	۶۷	۵۵	۱۲	فراآنی	
۱۰۰	۸۱/۱	۱۸/۹	۱۰۰	۸۲/۱	۱۷/۹	درصد	۱۰۱-۱۴۷
۸۴	۶۹	۱۵	۸۴	۷۵	۹	فراآنی	
۱۰۰	۸۲/۱	۱۷/۹	۱۰۰	۸۹/۳	۱۰/۷	درصد	۱۰۶-۱۰۲
۷۲	۶۰	۱۲	۷۹	۷۴	۵	فراآنی	
۱۰۰	۸۳/۳	۱۶/۷	۱۰۰	۹۳/۷	۶/۳	درصد	۱۶۱-۱۰۷
۷۰	۶۵	۵	۶۵	۶۴	۱	فراآنی	
۱۰۰	۹۲/۹	۷/۱	۱۰۰	۹۸/۵	۱/۵	درصد	۱۶۶-۱۶۲
۱۰۵	۱۰۲	۳	۷۵	۷۲	۳	فراآنی	
۱۰۰	۹۷/۱	۲/۹	۱۰۰	۹۶	۴	درصد	۱۷۱-۱۶۷
۳۴	۳۴	۰	۴۱	۴۱	۰	فراآنی	
۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	درصد	۱۷۶-۱۷۲
۰۱	دختر	۰.۴۷	۰۴۰	۱۱۲۲	۶۲۸	۴۹۴	جمع
۰۰۴	پسر	۴۹/۲	۰۰۱۸	۱۰۰	۵۶	۴۴	

جدول شماره ۲- میانگین، انحراف معیار، خطای معیار، حداقل، حداکثر و حدود اطمینان ۹۵٪ زمان رویش دندانهای مورد مطالعه

زمان رویش						جنس	شماره دندان
حدود اطمینان ۹۵٪	حداکثر	حداقل	خطای معیار	انحراف معیار	میانگین		
۱۵۲-۱۵۰	۱۷۶	۱۰۶	۰/۶	۱۵	۱۵۱	دختر	۳
۱۵۶-۱۵۳	۱۷۵	۱۱۴	۰/۶	۱۴	۱۵۴/۵	پسر	
۱۴۷-۱۴۴	۱۷۶	۱۰۵	۰/۶	۱۸	۱۴۶	دختر	۴
۱۴۸-۱۴۶	۱۷۵	۱۰۵	۰/۶	۱۸	۱۴۷	پسر	
۱۵۲-۱۴۹	۱۷۶	۱۰۵	۰/۶	۱۶	۱۵۰/۵	دختر	۵
۱۵۴-۱۵۱	۱۷۵	۱۰۶	۰/۶	۱۶	۱۵۲	پسر	
۱۵۲-۱۴۹	۱۷۶	۱۰۷	۰/۶	۱۶	۱۵۱	دختر	۳
۱۵۶-۱۵۳	۱۷۵	۱۰۵	۰/۶	۱۴	۱۵۴/۵	پسر	
۱۴۷-۱۴۴	۱۷۶	۱۰۵	۰/۶	۱۸	۱۴۶	دختر	۴
۱۴۸-۱۴۶	۱۷۵	۱۰۴	۰/۶	۱۸	۱۴۷	پسر	
۱۵۲-۱۴۹	۱۷۶	۱۰۵	۰/۶	۱۶	۱۵۱	دختر	۵
۱۵۳-۱۵۱	۱۷۵	۱۰۹	۰/۶	۱۵	۱۵۲	پسر	
۱۴۰-۱۳۸	۱۶۲	۱۰۵	۰/۶	۱۵	۱۳۹	دختر	۳
۱۴۷-۱۴۵	۱۶۷	۱۰۵	۰/۶	۱۴	۱۴۵	پسر	
۱۴۷-۱۴۵	۱۷۶	۱۰۵	۰/۶	۱۸	۱۴۶	دختر	۴
۱۵۰-۱۴۸	۱۷۵	۱۰۵	۰/۶	۱۷	۱۴۹	پسر	
۱۵۲-۱۵۰	۱۷۶	۱۰۶	۰/۶	۱۶	۱۵۱	دختر	۵
۱۵۵-۱۵۳	۱۷۵	۱۰۶	۰/۶	۱۵	۱۵۴	پسر	
۱۴۰-۱۳۸	۱۶۲	۱۰۵	۰/۶	۱۵	۱۳۹	دختر	۳
۱۴۷-۱۴۴	۱۶۷	۱۰۶	۰/۶	۱۴	۱۴۶	پسر	
۱۴۷-۱۴۵	۱۷۶	۱۰۵	۰/۶	۱۸	۱۴۶	دختر	۴
۱۵۰-۱۴۸	۱۷۵	۱۰۴	۰/۶	۱۷	۱۴۹	پسر	
۱۵۳-۱۵۰	۱۷۶	۱۰۸	۰/۶	۱			
۱۵۵-۱۵۳	۱۷۵	۱۰۰	۰/۶				

جدول شماره ۳-(قسمت الف)- میانگین، انحراف معیار، خطای معیار، حداقل، حداکثر و حدود اطمینان ۹۵٪ مراحل مختلف رویش
دندانهای مورد مطالعه در پسروان

دندان	مراحل مختلف رویش	تعداد	میانگین	انحراف معیار	خطای معیار	حداکثر	حداقل	کد شماره ۱ رویش دندانهای مورد مطالعه*	
								حدود اطمینان ۹۵٪	حداکثر
	۳	۶۵	۱۳۶	۱۲	۱/۵	۱۱۴	۱۶۹	۱۳۹-۱۴۴	
	۴	۴۷	۱۲۶	۱۳	۱/۹	۱۰۵	۱۶۳	۱۳۰-۱۲۳	
	۵	۱۵	۱۴۲	۱۸	۴/۶	۱۱۷	۱۷۲	۱۵۲-۱۳۲	
	۳	۶۶	۱۴۰	۱۳	۱/۶	۱۰۵	۱۶۷	۱۴۳-۱۳۴	
	۴	۳۶	۱۲۶	۱۴	۲/۴	۱۰۷	۱۶۳	۱۳۱-۱۲۱	
	۵	۱۶	۱۳۴	۱۳	۳/۱	۱۱۷	۱۵۸	۱۴۱-۱۲۸	
	۳	۹۵	۱۳۵	۱۳	۱/۴	۱۰۵	۱۶۰	۱۳۷-۱۳۲	
	۴	۵۰	۱۳۲	۱۵	۲/۸	۱۰۶	۱۶۳	۱۳۶-۱۲۷	
	۵	۱۵	۱۳۸	۱۳	۳/۵	۱۲۲	۱۶۶	۱۴۶-۱۳۱	
	۳	۸۷	۱۳۵	۱۴	۱/۵	۱۰۶	۱۶۷	۱۳۸-۱۳۲	
	۴	۴۳	۱۳۲	۱۴	۲	۱۰۹	۱۵۹	۱۳۶-۱۲۸	
	۵	۲۰	۱۴۱	۱۶	۳/۶	۱۰۵	۱۶۶	۱۴۹-۱۳۳	

* حداقل یک کاسپ دندان یا یک میلی‌متر از نوک کائین دیده می‌شود.

جدول شماره ۳-(قسمت ب)

دندان	مراحل مختلف رویش	تعداد	میانگین	انحراف معیار	خطای معیار	حداکثر	حداقل	کد شماره ۲ رویش دندانهای مورد مطالعه*	
								حدود اطمینان ۹۵٪	حداکثر
	۳	۴۳	۱۴۶	۱۳	۲	۱۲۰	۱۷۴	۱۵۰-۱۴۲	
	۴	۹۵	۱۳۱	۱۵	۱/۵	۱۰۵	۱۶۴	۱۳۴-۱۲۸	
	۵	۴۷	۱۳۶	۱۳	۱/۷	۱۰۶	۱۶۳	۱۴۰-۱۳۳	
	۳	۴۵	۱۳۹	۱۲	۱/۸	۱۱۸	۱۶۶	۱۴۳-۱۳۶	
	۴	۹۵	۱۳۰	۴۷	۱/۵	۱۰۵	۱۶۷	۱۳۳-۱۲۷	
	۵	۳۸	۱۳۷	۱۶	۲/۶	۱۰۹	۱۷۱	۱۴۳-۱۳۲	
	۳	۶۴	۱۳۶	۱۳	۱/۶	۱۰۸	۱۶۷	۱۳۹-۱۳۲	
	۴	۸۳	۱۳۳	۱۳	۲/۱	۱۰۵	۱۶۹	۱۳۵-۱۳۰	
	۵	۵۹	۱۳۹	۱۶	۲	۱۰۶	۱۶۹	۱۴۳-۱۳۴	
	۳	۵۶	۱۳۳	۱۱	۱/۵	۱۰۸	۱۵۸	۱۳۶-۱۳۰	
	۴	۷۷	۱۳۲	۱۴	۱/۶	۱۰۴	۱۶۹	۱۳۵-۱۲۹	
	۵	۵۴	۱۳۹	۱۷	۲/۳	۱۰۶	۱۷۱	۱۴۴-۱۳۵	

* تمام سطح اکلوزال دندان یا تمام عرض مزبودیستال دندان دیده می‌شود.

جدول شماره ۳-۳ (قسمت ج)

دندان	مراحل مختلف رویش	تعداد	میانگین	انحراف معیار	خطای معیار	حداقل	حداکثر	حدود اطمینان ۹۵%	کد شماره ۳ رویش دندانهای مورد مطالعه*	
									حداکثر	حداقل
		۴۳۹	۱۵۸	۱۲	۰/۶	۱۲۷	۱۷۵	۱۵۷-۱۵۷		
		۶۴۳	۱۵۱	۱۶	۰/۶	۱۰۵	۱۷۵	۱۵۰-۱۵۰		
		۵۴۱	۱۵۴	۱۵	۰/۶	۱۰۶	۱۷۵	۱۵۳-۱۵۳		
		۴۴۴	۱۵۸	۱۲	۰/۶	۱۲۷	۱۷۵	۱۵۷-۱۵۷		
		۶۶۸	۱۵۰	۱۶	۰/۶	۱۰۴	۱۷۵	۱۴۹-۱۴۹		
		۵۵۷	۱۵۴	۱۵	۰/۶	۱۱۱	۱۷۵	۱۵۳-۱۵۳		
		۴۱۴	۱۴۹	۱۴	۰/۶	۱۰۶	۱۶۷	۱۴۸-۱۴۸		
		۵۹۴	۱۵۳	۱۵	۰/۶	۱۰۵	۱۷۵	۱۵۱-۱۵۱		
		۴۵۲	۱۵۶	۱۳	۰/۶	۱۰۸	۱۷۵	۱۵۵-۱۵۵		
		۴۲۱	۱۶۹	۱۲	۰/۶	۱۰۶	۱۶۷	۱۴۸-۱۴۸		
		۶۱۱	۱۵۲	۱۶	۰/۶	۱۰۶	۱۷۵	۱۵۱-۱۵۱		
		۴۵۵	۱۵۶	۱۳	۰/۶	۱۰۸	۱۷۵	۱۵۸-۱۵۵		

*** دندان در اکلوزن کامل قرار دارد؛ در صورت نبودن دندان مقابله دندان در پلان اکلوزال قرار دارد.

جدول شماره ۴- (قسمت الف)- میانگین، انحراف معیار، حداقل، حداکثر و حدود اطمینان ۹۵٪ مراحل مختلف رویش دندانهای مورد مطالعه در دختران

دندان	مراحل مختلف رویش	تعداد	میانگین	انحراف معیار	خطای معیار	حداقل	حداکثر	حدود اطمینان ۹۵٪	کد شماره ۱ رویش دندانهای مورد مطالعه*	
									حداکثر	حداقل
		۷۳	۱۳۷	۱۳	۱/۵	۱۰۶	۱۶۲	۱۳۴-۱۳۴		
		۴۴	۱۲۶	۱۴	۲/۱	۱۰۵	۱۵۵	۱۲۲-۱۲۰		
		۲۲	۱۲۸	۱۴	۲/۹	۱۰۵	۱۵۸	۱۲۲-۱۲۳		
		۷۲	۱۳۶	۱۳	۱/۵	۱۰۷	۱۷۲	۱۲۳-۱۲۹		
		۵۲	۱۲۶	۱۴	۱/۹	۱۰۵	۱۵۸	۱۲۲-۱۳۰		
		۱۵	۱۳۵	۱۴	۳/۷	۱۰۵	۱۵۹	۱۲۷-۱۴۳		
		۸۴	۱۲۴	۱۳	۱/۴	۱۰۵	۱۵۵	۱۲۱-۱۲۷		
		۴۴	۱۲۶	۱۳	۲	۱۰۶	۱۵۴	۱۲۳-۱۳۰		
		۱۴	۱۳۱	۱۴	۳/۸	۱۰۸	۱۶۰	۱۲۳-۱۴۹		
		۸۷	۱۲۵	۱۲	۱/۳	۱۰۵	۱۵۵	۱۲۲-۱۲۸		
		۵۴	۱۲۵	۱۳	۱/۷	۱۰۵	۱۵۵	۱۲۱-۱۲۸		
		۱۴	۱۳۳	۱۴	۳/۸	۱۰۷	۱۶۶	۱۲۵-۱۴۱		

* حداقل یک کاسپ دندان یا یک میلی متر از نوک کائین دیده می شود.

جدول شماره ۴-(قسمت ب)

کد شماره ۲ رویش دندانهای مورد مطالعه*							مراحل مختلف رویش دندان
حدود اطمینان ۹۵٪	حداکثر	حداقل	خطای معیار	انحراف معیار	میانگین	تعداد	
۱۳۹-۱۳۱	۱۷۰	۱۰۹	۲	۱۳	۱۳۵	۴۴	۳
۱۳۱-۱۲۴	۱۶۷	۱۰۵	۱/۵	۱۵	۱۲۸	۹۰	۴
۱۳۷-۱۲۶	۱۶۷	۱۰۵	۲/۵	۱۵	۱۳۲	۳۶	۵
۱۴۱-۱۳۳	۱۷۰	۱۰۹	۱/۹	۱۴	۱۳۷	۵۱	۳
۱۳۳-۱۲۷	۱۶۷	۱۰۵	۱/۵	۱۵	۱۳۰	۹۶	۴
۱۳۵-۱۲۵	۱۶۲	۱۰۵	۲/۶	۱۶	۱۳۰	۳۶	۵
۱۳۱-۱۲۵	۱۶۰	۱۰۶	۱/۵	۱۲	۱۲۸	۶۰	۳
۱۳۰-۱۲۴	۱۶۸	۱۰۵	۱/۵	۱۴	۱۲۷	۸۸	۴
۱۳۸-۱۲۹	۱۷۵	۱۰۶	۲/۱	۱۶	۱۳۴	۵۹	۵
۱۲۹-۱۲۳	۱۶۰	۱۰۷	۱/۶	۱۲	۱۲۶	۵۴	۳
۱۳۳-۱۲۶	۱۶۸	۱۰۵	۱/۹	۱۶	۱۲۹	۷۱	۴
۱۴۰-۱۳۱	۱۶۸	۱۱۲	۲/۳	۱۵	۱۳۶	۴۴	۵

* تمام سطح اکلوزال دندان یا تمام عرض مزبود استال دندان دیده می شود.

جدول شماره ۴-(قسمت ج)

کد شماره ۳ رویش دندانهای مورد مطالعه**							مراحل مختلف رویش دندان
حدود اطمینان ۹۵٪	حداکثر	حداقل	خطای معیار	انحراف معیار	میانگین	تعداد	
۱۵۶-۱۵۳	۱۷۶	۱۱۲	۰/۶	۱۴	۱۵۴	۵۱۱	۳
۱۵۱-۱۴۸	۱۷۶	۱۰۵	۰/۶	۱۶	۱۴۹	۶۷۱	۴
۱۵۴-۱۵۱	۱۷۶	۱۰۶	۰/۶	۱۵	۱۶۳	۵۷۰	۵
۱۵۵-۱۵۳	۱۷۶	۱۱۲	۰/۶	۱۴	۱۵۴	۵۱۹	۳
۱۵۱-۱۴۸	۱۷۶	۱۰۵	۰/۶	۱۷	۱۴۹	۶۶۳	۴
۱۵۴-۱۵۱	۱۶۲	۱۰۵	۰/۶	۱۵	۱۵۲	۵۶۵	۵
۱۴۳-۱۴۱	۱۷۶	۱۰۵	۰/۶	۱۳	۱۴۳	۵۱۹	۳
۱۵۱-۱۴۹	۱۷۶	۱۰۶	۰/۶	۱۶	۱۵۰	۶۵۵	۴
۱۵۴-۱۵۲	۱۷۶	۱۱۲	۰/۶	۱۵	۱۵۳	۵۱۹	۵
۱۴۳-۱۴۱	۱۶۲	۱۰۵	۰/۶	۱۳	۱۴۲	۵۲۷	۳
۱۵۱-۱۴۸	۱۷۶	۱۰۵	۰/۶	۱۶	۱۴۹	۶۷۵	۴
۱۵۴-۱۵۲	۱۷۶	۱۰۷	۰/۶	۱۵	۱۵۳	۵۲۹	۵

** دندان در اکلوزن کامل قرار دارد؛ در صورت نبودن دندان مقابله دندان در پلان اکلوزال قرار دارد.

بحث

در فک پایین زودتر و پرمولر اول و دوم دیرتر رویش می‌یابند. در دختران اختلاف زمان رویش در مورد کائین معنی دار بوده و در فک پایین زودتر رویش می‌یابد ولی متوسط رویش دندانهای پرمولر بین دو فک اختلاف معنی داری را نشان نمی‌دهد (جدول شماره ۶).

۳- مقایسه متوسط زمان رویش حاصل از این تحقیق و سایر تحقیقات: میانگین زمان رویش به دست آمده از این تحقیق در مقایسه با جداول استاندارد Kronfeld و Logan مشخص می‌سازد که میانگین در تحقیق حاضر بیشتر است.

مقایسه میانگین زمان رویش به دست آمده از تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده در آمریکا (۹)، استرالیا (۳)، سوئد (۴)، آفریقا (۲) و فنلاند (۱۰) مشخص می‌کند که زمان رویش در تحقیق حاضر دیرتر از نژادهای دیگر است. این مسأله با این حقیقت که زمان رویش در نژاد سفیدپوست (Caucasian) دیرتر از نژادهای دیگر است، مطابقت دارد.

میانگین زمان رویش به دست آمده از تحقیق حاضر با نتایج دکتر مسلمی (۱۴) درخصوص زمان رویش دندانهای کائین و پرمولر مقایسه شد. اختلاف میانگین زمان رویش بین دو تحقیق انجام شده در شهر تهران و اصفهان نشان می‌دهد که به جز در مورد دندانهای پرمولر دوم فک بالا و پایین در دختران، در سایر موارد تفاوت آماری معنی دار می‌باشد و میانگین زمان رویش در تحقیق حاضر بیشتر است.

۴- مقایسه ترتیب رویش دندانهای موردمطالعه با سایر تحقیقات: ترتیب رویش به دست آمده در این تحقیق با کلیه مطالعات قبلی تطابق دارد، از نظر اختلاف در همزمانی رویش کائین و پرمولر فک بالا (از لحظه تقدم و تأخیر) در مطالعات مختلف، نتایج مختلفی گزارش شده است. در ادامه جدولهای شماره ۵ و ۶ نیز نتایج مربوط به آزمونهای آماری را نشان می‌دهد.

جهت توصیف و تحلیل داده‌ها از جداول استخراج شده از رایانه و آزمونهای آماری آنالیز واریانس و شاخص F جهت تعیین معنی دار بودن مقایسه نتایج استفاده گردید.

بررسیهای انجام شده به قرار زیر هستند:

۱- مقایسه متوسط زمان رویش در دو جنس دختر و پسر: با توجه به جدول شماره ۵ مشخص می‌شود که میانگین زمان رویش در مورد تمام دندانهای مورد مطالعه در دختران کمتر از پسران می‌باشد؛ اختلاف زمان رویش در دو جنس از $\frac{7}{5}$ تا $\frac{4}{4}$ ماه می‌باشد که کمترین مقدار آن مربوط به دندانهای پرمولر اول فک بالا و بیشترین مقدار مربوط به دندانهای کائین فک پایین است. در بسیاری از مقالات به متوسط زمان رویش کمتر دندانهای دائمی در دختران اشاره شده است که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت دارد (۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶).

نتایج مطالعه دکتر مسلمی بیشترین اختلاف را در دندان کائین پایین و کمترین را در پرمولر فک بالا نشان می‌دهد (۱۴) و در تأیید نتایج این تحقیق است. با به عمل آوردن آزمون آماری برای کلیه دندانها مشخص شد که اختلاف متوسط زمان رویش در دو جنس به جز در مورد پرمولر اول فک بالا $\frac{4}{4}$ و پرمولر دوم چپ فک بالا $\frac{5}{5}$ در سایر موارد معنی دار است ولی در مطالعه دکتر مسلمی آزمونهای آماری عدم اختلاف را در مورد دندانهای $\frac{5}{5}$ ، $\frac{6}{6}$ و $\frac{7}{7}$ نشان می‌دهد.

۲- مقایسه متوسط زمان رویش در دو فک: اختلاف زمان رویش دندانهای کائین و پرمولر فک بالا و پایین بین $\frac{1}{1}$ تا $\frac{12}{12}$ ماه می‌باشد؛ بیشترین اختلاف زمان رویش بین دو فک مربوط به دندانهای کائین است. در مقایسه آماری متوسط زمان رویش دندانهای کائین و پرمولر بین فک بالا و پایین مشخص شد که در پسران میانگین زمان رویش دندانهای کائین و پرمولر اختلاف معنی دار دارند؛ به طوری که کائین

جدول شماره ۵-آزمونهای آماری جهت مقایسه زمان رویشن دندانهای دائمی مورد مطالعه در دختران و پسران

زمان رویشن						شاخص	
دندان	جنس	تعداد	میانگین	انحراف معیار	شاخص F	مقدار P آزمون	نتیجه آزمون
	دختر پسر	۶۴۲ ۵۵۵	۱۵۰/۷	۱۵/۶	۱۹/۴۱	P<۰/۰۰۱	S
	دختر پسر	۸۱۱ ۷۹۹	۱۴۵/۶ ۱۴۶	۱۸/۳ ۱۸	۱۰/۲	P>۰/۶۵	N.S
	دختر پسر	۶۱۶ ۶۱۱	۱۵۰/۸ ۱۵۲/۲	۱۶/۲ ۱۵/۵	۲/۲۹	P>۰/۱۲۲	N.S
	دختر پسر	۶۲۸ ۵۴۷	۱۵۱ ۱۵۴/۵	۱۵/۴ ۱۴	۱۶/۴۳	P<۰/۰۰۱	S
	دختر پسر	۸۰۵ ۷۸۵	۱۴۵/۸ ۱۴۷/۲	۱۸/۱ ۱۸	۲/۲۹	P>۰/۱۲	N.S
	دختر پسر	۶۲۸ ۶۰۳	۱۵۰/۵ ۱۵۲/۳	۱۶/۲ ۱۵/۶	۳/۹۴	P<۰/۰۵	S
	دختر پسر	۶۶۳ ۵۷۲	۱۳۸ ۱۴۵/۵	۱۴/۶ ۱۳/۹	۳۷/۸۱	P<۰/۰۰۱	S
	دختر پسر	۷۸۷ ۷۲۷	۱۴۶/۳ ۱۴۸/۹	۱۷/۹ ۱۷/۱	۸/۲۲	P<۰/۰۱	S
	دختر پسر	۵۹۲ ۵۲۶	۱۵۱ ۱۵۴	۱۶ ۱۵	۱۰/۴	P<۰/۰۱	S
	دختر پسر	۶۶۸ ۵۶۳	۱۳۸/۹ ۱۴۵/۶	۱۴/۶ ۱۳/۸	۳۷/۲۳	P<۰/۰۰۱	S
	دختر پسر	۸۰۰ ۷۳۱	۱۴۵ ۱۴۹	۱۸ ۱۷/۲	۱۹/۶۸	P<۰/۰۰۱	S
	دختر پسر	۵۸۷ ۵۲۹	۱۵۱/۵ ۱۵۴/۱	۱۵/۷ ۱۵/۱	۷/۹۱	P<۰/۰۱	S

جدول شماره ۶-آزمونهای آماری جهت مقایسه زمان رویش دندانهای مورد مطالعه در نیمه راست فک بالا و پایین

نتیجه آزمون	مقدار P آزمون	F	شاخص	اتحراف معیار	میانگین	تعداد	شاخص	
							جنس	دندان
S	$P<0.001$	۴۱/۱۳		۱۵/۴	۱۵۱	۶۲۸	۳	دختر
				۱۴/۶	۱۳۸/۹	۶۶۸	۳	
S	$P<0.001$	۲۰/۰۲		۱۴	۱۵۴/۵	۵۴۷	۳	پسر
				۱۳/۸	۱۴۵/۶	۵۶۳	۳	
N.S	$P=0.825$	۰/۰۵		۱۱۸/۱	۱۴۵/۸	۸۰۵	۴	دختر
				۱۸/۱	۱۴۶	۸۰۰	۴	
S	$P<0.05$	۳/۹۵		۱۸	۱۴۷/۲	۷۸۵	۴	پسر
				۱۷/۲	۱۴۹	۷۳۱	۴	
N.S	$P=0.275$	۱/۱۹		۱۶/۲	۱۵۰/۵	۶۲۸	۵	دختر
				۱۵/۷	۱۵۱/۵	۵۸۷	۵	
S	$P<0.05$	۳/۸۷		۱۵/۶	۱۵۲/۳	۶۰۳	۵	پسر
				۱۵/۱	۱۵۴/۱	۵۲۹	۵	

منابع:

- Bean RB. The stature and the eruption of the permanent teeth of American and Filipino children. Am J Anat 1914; 17: 113-116.
- Blankenstein R. The onset of eruption of the permanent dentition amongst South African black children. Arch Oral Biol; Vol 35, 1990; No 3: 225-228.
- Brown T. Tooth emergence in Australian aboriginal, Ann, Hum Biol 1978; Jan (1): 41-54.
- Garcia Goday F. Timing of permanent tooth emergence in a southeastern Dominican school children population sample, community. Dent Oral Epidemiol 1982; Feb 10(1): 43-46.
- Garn SM. Negro Caucasoid differences in permanent tooth emergence. Arch Oral Biol 1973; 18: 609-615.
- Hagg U. Dental development: dental age and tooth counts. Angle Orthod 1985, Apr; 55(2) 93-107.
- Hurme VO. Ranges of normalcy in the eruption of permanent teeth. J Dent Child 1949; 16 11 second quarter
- Mc call JO. Clinical dental roentgenology technique and interpretation including roentgen studies of the child and young adult. Philadelphia, WB Saunders 1940; 96-103.
- Nanda SK. Eruption of human teeth. Am J Orthod 1960; 46-63.
- Pahkola R, pahkola A. Eruption pattern of permanent teeth in a rural community in northeastern Finland. Acta Odont Scand 1991; 49:341-349.
- بنکار، شهین. «بررسی زمان رویش دندانهای ۱۰۶ در کودکان ۶-۹۹ ماهه» پایان نامه دکترا دندانپزشکی (شماره ت ۹۱) دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران
- چوبانی، مریم. «Zman Royesh Dandanehai Dami» ۱۳۷۰ دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی مشهد
- سریاز، امیرهمایون. «بررسی زمان و ترتیب رویش ۲۸ دندان دائمی در دانش آموزان ۱۳-۱۵ ساله تهرانی» پایان نامه دکترا دندانپزشکی (شماره ۲۰۱-۲) ۱۳۶۸ دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی
- مسلمی، معصومه. «بررسی ابیدمیولوژیک زمان رویش دندانهای دائمی در کودکان و نوجوانان ۱۵-۴ ساله شهر تهران» ۱۳۷۳ طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی