

بررسی دوساله شکستگی استخوانهای صورت در مراجعه کنندگان مرکز مبادر پزشکی همدان سال ۷۵-۷۶

* دکتر محمدحسین انصاری

چکیده

هدف از این مقاله بررسی فراوانی شکستگی استخوانهای صورت براساس سن، جنس، محل، کیفیت و علل بوجود آورند و عوارض بصورت گذشته نگر می باشد که می تواند در امر برنامه ریزی آموزشی و درمانی و دستیابی پزشکان و جراحان به ابزارها و روش‌های تازه کمک شایان ذکری بنماید.

بدین منظور طی یک دوره ۲ ساله (۱۳۷۵-۷۶) ۲۷۴ بیمار گرفتار شکستگی استخوانهای صورت قرار گرفته‌اند. نتایج این امر بررسی نشان می‌دهد که حادث رانندگی (۴۸/۹٪)، سقوط از بلندی (۲۷٪) و نزاع (۴/۲۰٪) سه عامل مهم بوجود آورند شکستگی‌های صورت بوده‌اند. در گروه مورد بررسی مردان به نسبت $\frac{3}{1}$ غلبه سنی داشته‌اند و غالب شکستگی‌ها در دهه سوم زندگانی با میانگین سنی ۲۵/۸ سال روی داده است. بیشترین موارد شکستگی ۵۲/۹٪ در فک پایین و کمترین آن در بینی (۵/۶٪) اتفاق افتاده است. مهمترین عوارض مرتبط با شکستگی استخوانهای صورت قبل و بعد از درمان مرگ ۱٪ و کوری (۱٪) بوده است.

کلیدواژه‌ها: تrama - شکستگی - استخوانهای صورت

مقدمه

طی دو سال از آغاز ۱۳۷۵ تا پایان ۱۳۷۶ ۷۷۶ بیمار توسط گروه سه‌نفری جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در بخش مربوطه و در مرکز پزشکی مبادر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان بستری و درمان شده‌اند. از این میان ۳۲۹ نفر (۴۲/۳٪) صدمات نسوج نرم و سخت ناحیه دهان و فک و صورت داشته‌اند. ۵۵ نفر (۷٪) صرفاً آسیب‌های نسوج نرم داشته‌اند که در این بررسی مورد توجه و ارزیابی قرار نگرفته‌اند و تنها ۲۷۴ نفر (۲۵/۳٪) که گرفتار شکستگی استخوانهای صورت بوده‌اند مدنظر قرار گرفته‌اند. بعلت متوجه بودن فعالیت گروه در مرکز پزشکی مزبور باید گفت که تقریباً تمامی موارد صدمات دهان و فک و صورت پذیرفته و درمان شده‌اند. از ۲۷۴ بیمار درمان شده ۱۴۵ نفر (۵۲/۹٪) شکستگی فک

به منظور برنامه ریزی آموزشی و درمانی داشتن آمار دقیق از نقاط مختلف کشور و بررسی آنها ضرورت دارد. با توسعه روزافزون علم پزشکی و دانش ضربه‌شناسی و دستیابی پزشکان و جراحان به ابزارها و روش‌های تازه تشخیص و درمان اهمیت تهیه و بررسی این گونه اطلاعات آماری روشن‌تر می‌شود. در یک بررسی آینده‌نگر که به مدت یک سال (۱۹۹۵) در ۱۶ بیمارستان شهر لیورپول انگلیس و بر روی ۱۰۸۸ بیمار به عمل آمده است و هدف آن ارزیابی نقش جراحی دهان و فک و صورت در تشخیص و درمان بیماران به‌شدت آسیب دیده بوده است معلوم شده است که حضور فعال این تخصص می‌تواند موجب کاهش چشمگیر معلومات و مرگ و میر و تشخیص نادرست شود.^{۱۱} هدف این مقاله بررسی فراوانی شکستگی استخوانهای صورت بر اساس سن، جنس، محل، کیفیت و علل بوجود آورند و عوارض به صورت گذشته نگر Retrospective است.

استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

داشته‌اند. جدول ۱ و ۲، ۶۳ نفر (۲۲٪) از بیماران زن و ۲۱ نفر (۷٪) مرد بوده‌اند. جوان‌ترین آنها یکسال و مسن‌ترین آنها ۷۶ سال و میانگین سنی برای زنان ۲۳ و برای مردان ۲۸/۶ و متوسط سن کلی ۲۵/۸ سال بوده است.(جدول ۳)

پائین، ۵۳ نفر (۱۹٪) شکستگی دندانی فکی Dento Alveolar، ۳۳ نفر (۱۲٪) شکستگی فک بالا (از لهفورت I تا III)، ۲۵ نفر (۹٪) شکستگی استخوان گونه و کمان آن و ۱۸ نفر (۶٪) شکستگی مجموعه بینی، پرویزنی، پیشانی

جدول ۱ - محل شکستگی استخوان‌های صورت را به تعداد بیمار و درصد آن نشان می‌دهد

ردیف	محل شکستگی	تعداد به نفر	درصد
۱	فک پائین	۱۴۵	۵۲/۹
۲	دنتوآلتوئلر	۵۳	۱۹/۳
۳	فک بالا	۳۳	۱۲
۴	گونه (الف)	۲۵	۹/۱
۵	بینی (ب)	۱۸	۶/۵
جمع	تمامی موارد	۲۷۴	۱۰۰

الف - مجموعه استخوان گونه و کمان آن

ب - مجموعه بینی، پرویزنی، پیشانی

جدول ۲ - محل شکستگی را به تعداد بیمار و درصد آن به تفکیک نشان می‌دهد

ردیف	محل	تعداد	درصد
۱	دنتوآلتوئلر	۵۳	۱۹/۳
۲	چانه	۴۳	۱۵/۶
۳	ته	۴۰	۱۴/۵
۴	مفصل	۳۸	۱۳/۸
۵	لهفورت	۲۶	۹/۵
۶	گونه	۲۵	۹/۱
۷	زاویه	۲۲	۸
۸	بینی	۱۸	۶/۵
۹	سازیتال، لهفورت	۷	۲/۵
۱۰	منقاری	۲	۰/۷
۱۱	شاخه بالارونده	۰	۰
جمع	---	۲۷۴	۱۰۰

جدول ۳ - فراوانی شکستگی استخوان‌های صورت در ۸ دهه سنی را به تفکیک و به نسبت مذکور و مؤنث نشان می‌دهد

ردیف	گروه سنی	مرد	زن	کل	درصد کل
۱	۰-۹	۲۵	۱۷	۴۲	۱۵/۳
۲	۱۰-۱۹	۴۷	۱۴	۶۱	۲۲/۲
۳	۲۰-۲۹	۵۱	۱۶	۶۷	۲۴/۴
۴	۳۰-۳۹	۴۷	۸	۵۵	۲۰
۵	۴۰-۴۹	۱۹	۳	۲۲	۸
۶	۵۰-۵۹	۸	۴	۱۲	۴/۳
۷	۶۰-۶۹	۱۳	۰	۱۳	۴/۷
۸	۷۰-۷۹	۱	۱	۲	۰/۷
	۸۰-۸۹	۲۱۱	۶۳	۲۷۴	۱۰۰

یک نفر لهفورت I (۰٪/۰٪) و ۲۷ نفر (۸۱/۸٪) لهفورت III داشته‌اند. در بین گرفتاران شکستگی لهفورت III ۷ نفر به‌طور مضاعف دچار شکستگی عمودی "Vertical" شده بودند. عوارض مرتبط با شکستگی‌های صورت - مرگ و میر ۳ نفر (۱٪)، کوری ۳ نفر (۱٪)، نشت مایع مغزی نخاعی ۲ نفر (۰٪)، تله کانتوس و هیپر تلوریسم ۱ نفر (۰٪)، Blow- Out- Fx یک نفر (۰٪/۰٪) و اشکریزش یک نفر (۰٪/۰٪)، کاهش تیزبینی ۲ نفر (۰٪/۰٪) و میدریاز یک طرفه و گذرا ۲ نفر (۰٪/۰٪) بوده است. (جدول ۳)

در بین عوامل بوجود آورنده ۱۳۴ نفر (۴۸/۹٪) به‌علت حوادث رانندگی یا به اختصار "RTA'S"، ۷۴ نفر (۲۷٪) به‌علت سقوط از ارتفاع "Falls"، ۵۶ نفر (۲۰/۴٪) به‌علت "ETC" نزاع "Fights"، ۷ نفر (۲/۵٪) به‌علت عوامل منفرقه و ۳ نفر (۱/۱٪) به‌علت حوادث ناشی از کار "Work" دچار شکستگی فک شده بودند. (جدول ۴)

نتایج

از ۳۳ نفر با شکستگی لهفورت ۵ نفر (۱۵/۱٪) لهفورت II

جدول ۴ - عوامل بوجود آورنده شکستگی استخوان‌های صورت را بر حسب تعداد و درصد جداول نشان می‌دهد

ردیف	عامل	تعداد	درصد
۱	حوادث رانندگی	۱۳۴	۴۸/۹
۲	سقوط از ارتفاع	۷۴	۲۷
۳	نزاع	۵۶	۲۰/۴
۴	منفرقه	۷	۲/۵
۵	کار	۳	۱/۱
	جمع	۲۷۴	۱۰۰

1- Road - Traffic - Accidents

۲- خوشبختانه به‌علت در دسترس بودن آتش‌بیوگاه‌های جدید و وسیع‌الطبیف و اقامت بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه و مراقبت‌های جراحی اعصاب موردی از متنزیت مشاهده نگردید.

جدول ۵ - عوارض مهم را بر حسب تعداد و درصد نشان می‌دهد

ردیف	نوع عارضه	تعداد	درصد
۱	مرگ و میر	۳	۱
۲	کوری	۳	۱
۳	Blow-Out-Fx	۱	.۳
۴	نشت مایع مغزی و نخاعی	۲	.۷
۵	ب - تله کاترنس و هیبرتلوریسم	۱	.۳
۶	میدریاز یک طرفه و گذرا	۲	.۷
۷	کاهش تیزبینی	۲	.۷
۸	اشک ریزش	۱	.۳
۹	منزیت	۰	۰
۱۰	دویینی	۰	۰
جمع	---	۱۵	۵

الف: شکستگی کف کاسه چشم و پاره شدن سپتم اوریتال و مختل شدن عمل عضلات مستقیم و مورب تحتانی

ب: دورافتادن دو گوشه داخلی چشم و دو مردمک از یکدیگر

جدول ۶ - عوارض مهم بر حسب نوع عارضه، دهه سنی، جنس و عامل بوجود آورنده نشان می‌دهد به غلبه حوادث رانندگی و دهه سنی چهارم و مرد توجه نمانید

ردیف	نوع عارضه	دهه سنی	جنس	عامل
۱	مرگ و میر	۱۰-۱۹	ملکر	حادثه رانندگی
۲	--	۳۰-۳۹	ملکر	حادثه رانندگی
۳	--	۷۰-۷۹	ملکر	سقوط
۴	کوری چپ	۲۰-۲۹	ملکر	حادثه رانندگی
۵	کوری چپ	۲۰-۲۹	ملکر	حادثه رانندگی
۶	کوری راست	۴۰-۴۹	مؤنث	کار
۷	کاهش تیزبینی در حد ۱۰	۱۰-۱۹	ملکر	حادثه رانندگی
۸	کاهش تیزبینی در حد ۱۰	۱۰-۳۹	ملکر	نزاع
۹	میدریاز راست	۱۰-۳۹	ملکر	حادثه رانندگی
۱۰	میدریاز چپ	۱۰-۳۹	مؤنث	کار
۱۱	B-O-Fx	۱۰-۳۹	مؤنث	کار
۱۲	اشک ریزش	۵۰-۵۹	مؤنث	حادثه رانندگی
۱۳	تله کاترنس و هیبرتلوریسم	۳۰-۳۹	ملکر	حادثه رانندگی
۱۴	نشت مایع مغزی نخاعی	۱۰-۱۹	ملکر	حادثه رانندگی
۱۵	نشت مایع مغزی نخاعی	۴۰-۴۹	مؤنث	کار

بحث

صورت در زنان در خانه اتفاق می‌افتد و با رعایت اصل

پنهان کاری اغلب به صورت حادثه جلوه داده می‌شود.^[۵]

در سه بررسی انجام شده در نروژ (۱۹۹۷)، ژاپن (۱۹۹۴) و انگلیس (۱۹۹۱) و جمماً روی ۲۳۷۱ بیمار معلوم شده است که نیمی از بیماران گرفتار شکستگی استخوان‌های صورت مردان جوانی بوده‌اند که ۱۵ تا ۳۰ سال داشته‌اند. افراد جوان ۲۰ تا ۳۰ ساله گاه ۷-۸ برابر جمعیت عادی نزاع می‌کنند و نتیجتاً گرفتار شکستگی استخوان‌های صورت می‌شوند.^[۶،۷]

استخوان‌بندی فک و صورت تشریح پیچیده‌ای دارد و در زمرة آسیب‌پذیرترین نواحی بدن انسان محسوب می‌شود.^[۷] و در صورت بروز حادثه و به علت مجاورت با اندام‌های حیاتی می‌تواند عوارض جدی و خطرناک برای بیمار ایجاد کند و این مزید بر مشکلات فیزیولوژیک، زیستی و روانی است، به طوری که در شکستگی‌های بخش میانی صورت امکان آسیب فقرات گردنی و نخاع در حد مهره‌های ۷-۵ و در شکستگی‌های فک پائین در سطح مهره‌های اول و دوم وجود دارد.^[۸]

۲۷۴ بیمار مورد بررسی این مقاله جمماً ۳۸۵ شکستگی Fracture-Site داشته‌اند. (۱/۴ شکستگی برای هر نفر) که نشان دهنده شدت ضربه واردہ به صورت در حوادث گوناگون است. مردان بیش از زنان گرفتار می‌شوند و غلبه سنی با دهه سوم زندگانی است.^[۹،۱۰،۱۱] عامل غالب در ایجاد شکستگی استخوان‌های صورت حوادث رانندگی و پس از آن به ترتیب نزاع و سقوط از ارتفاع قرار دارند.^[۱۲]

«در زنان و کودکان عامل غالب سقوط از ارتفاع است»^[۱۳] در بررسی‌های بزرگتری که ظرف ده سال (۱۹۸۴-۱۹۹۳) و بر روی ۱۲۴۷۵ نفر با شکستگی استخوان‌های صورت انجام شده است معلوم می‌شود در صورت جدی گرفتن مقررات راهنمایی و رانندگی موارد ضربه صورت می‌تواند تا ۱/۱ برابر کاهش یابد.^[۱۰] (جدول ۷)

در حوادث گوناگون فک پائین بیشتر از دیگر استخوان‌های صورت دچار شکستگی می‌شود. «با میانگین ۵۱٪». ضمن اینکه میزان درگیری زنان در حوادث گوناگون که منجر به شکستگی فک می‌شود در حال تزايد است.^[۱۵] شکستگی استخوان‌های

جدول ۷ - سه عامل مهم بوجود آورنده شکستگی استخوان‌های صورت در چند کشور نشان می‌دهد. ارقام ستون افقی آخر میانگین است

ردیف	مدت مطاله به سال	سال مطالعه	کشور	تعداد بیمار	نسبت مذکور به مؤنث	در صد		
						ارتفاع	نزاع	رانندگی
۱	۱۰	۱۹۹۷	اتریش	۷۱۲	۲/۵ ۱	۲۰/۸	--	۲۷/۲
۲	۲۰	۱۹۹۷	ایتالیا	۴۸۳	۳/۱ ۱	--	--	۴۸/۵
۳	۱۰	۱۹۹۶	ایتالیا	۱۲۴۷۵	۲/۲ ۱	--	--	۳۱/۲
۴	۱۳	۱۹۸۹	ژاپن	۶۹۵	۳/۲ ۱	۲۴/۸	۱۴/۹	۳۸/۴
۵	۷	۱۹۸۹	انگلیس	۴۳۹	۲/۸ ۱	۱۸/۷	۵۵/۱	۱۹/۶
۶	۹	۱۹۹۷	ایران	۱۲۰۹	۴/۵ ۱	۹/۳	۱۱/۵	۶۵/۹
۷	۲	۱۹۹۸	ایران	۲۷۴	۳/۲ ۱	۲۷	۲۰/۴	۴۸/۹
--	--	--	--	--	۳ ۱	۲۰/۱	۲۵/۴	۳۹/۹

Summary

The Present Study is an Analysis of 274 Patients with Facial Skeleton Fractures During Past 2 Years(1996-97). The Etiology Types-Patterns-Sites-Sex and Most Important Complications are Discussed Separately. The Highest Incidence was seen in the Third Decade (Mean 25.8). These Showed a High Male Female Ratio ($\frac{3.3}{1}$).

The Predominant Causative Factor in This Study was Road Traffic Accidents. (48.9%) Followed by Falls (27%) and Fights (20.4%).

Fractures of the Mandible (52.9%) and the Nasal Complex were the Most and Least Common Fractures in This Study. The Most Important Complications with Maxillofacial Fractures Either Post Injury or Post Operative Were Death (1%) and Loss of Vision (1%).

Key-Words:

Maxillofacial Fractures Retrospective Study
Trauma Epidemiology

به علت فراوانی آسیب‌های چشمی به ویژه در بیماران به شدت آسیب دیده «که گاه تا ۲۰٪ موارد شکستگی بخش میانی صورت گزارش شده است»^[۱] ضرورت دارد جراح فک و صورت از این احتمال جدی آگاه باشد و مراقبت‌های ضروری قبل و بعد از درمان را به کمک چشمپزشک انجام دهد. زیرا احتمال نروپاتی "Neuropathy" عصب زوج دوم مغزی به علت ایسکمی "Ischemia" ناشی از تحت فشار بودن عصب "Retro-Bulbar" (مانند خون‌ریزی در پشت کره چشم) کاهش تیزبینی "Visual-Acuity" و میدریاژ یک طرفه و گذرا وجود دارد.^[۲] ضمن اینکه ضربه غیرمستقیم چشم می‌تواند موجب تغییراتی در شبکیه "Retino-Pathy" شود.^[۳] امروزه معلوم شده است رعایت اصل ATLS^۱ و ارائه خدمات پیشرفته پزشکی و جراحی به بیماران به شدت آسیب دیده فک و صورت یک ضرورت است. در این استاندارد بالای خدمات رسانی پزشکی حضور جراح فک و صورت و بخش مربوطه که دقیقاً مرتبط و فعال با مراکز جراحی اعصاب کار کنندگانی است.^[۴-۱۲]

خلاصه و نتیجه

طی یک دوره ۲ ساله (۱۳۷۵-۷۶) ۲۷۴ بیمار گرفتار شکستگی استخوانهای صورت بر اساس عوامل بوجود آورنده، نوع، کیفیت، محل، جنس، سن و مهم‌ترین عوارض حاصله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند. حوادث رانندگی (۴۸/۹٪)، سقوط از بلندی (۲۷٪) و نزاع (۲۰/۴٪) سه عامل مهم بوجود آورنده شکستگی‌های صورت بوده‌اند. در گروه مورد بررسی مردان به نسبت $\frac{3}{2}$ غلبه سنی داشته‌اند و اغلب موارد شکستگی در دهه سوم زندگانی با میانگین سنی ۲۵/۸ سال روی داده است. بیشترین موارد شکستگی (۵۲/۹٪) در فک پائین و کمترین آن در بینی (۶/۵٪) اتفاق افتاده است. مهم‌ترین عوارض مرتبط با شکستگی استخوانهای صورت قبل و بعد از درمان مرگ (۱٪) و کوری (۱٪) بوده است.

REFERENCES

1. Acton C H, Nixon J W, Clark RC. Bicycle Riding and Oral/Maxillofacial Trauma in Young Children. *Med. J. Aust.* 1996; 165(5): 249-51.
2. Akhlaghi F, Aframian F F. Management of Maxillofacial Injuries in the Iran, Iraq War. *J. Oral Maxillofac. Surg.* 1997 Sep; 55(9): 927-30; Discussion 930-1.
3. Dimitroulis G, Eyre J. A 7 Year Review of Maxillofacial Trauma. *B. Dent. J.* 1991; 170: 300-302.
4. Down K E, Boot D A, Gorman D F. Maxillofacial and Associated Injuries in Severely Traumatized Patients. *Int. J. Oral Maxillofac. Surg.* 1995 Dec; 24(6): 409-12.
5. Elverjand H H, Voss R. Facial Fractures. A Life Style Disease Among Young Men? *Tidsskr. Nor.Lægeforen.* 1997 Sep 30; 117(23): 3354-8.
6. Emshoff R, Schoning H, Rothier G, Waldhart E. Trends in the Incidence and Cause of Sport-Related Mandibular Fractures. *J. Oral Maxillofac. Surg.* 1997 Jun; 55(6): 585-92.
7. Hermans R, Vander Goten A, Defoer B, Baert A L. Imaging of Maxillofacial Trauma. *J. Belge - Radiol.* 1997 Feb; 80(1): 25-9.
8. Laiani Z, Bonanthaya K M. Cervical Spine Injury in Maxillofacial Trauma. *Br. J. Oral. Maxillofac. Surg.* 1997 Aug; 35(4): 243-5.
9. Li K K, Meara JG, Joseph M P. Reversal of Blindness after Facial Fracture Repair by Prompt Optic Nerve Decompression. *J. Oral Maxillofac. Surg.* 1997 Jun; 55(6): 648-50.
10. Miotti A, Moroldo L, Salerno M, Larosa P. A Statistical Epidemiological Study of Crano-Maxillofacial Trauma. *Minerva Stomatol.* 1996 Apr; 45(4): 149-56.
11. Mezer E, Gelfand Y, Meyer E, Miller B. Purtscher's Retinopathy. *Harefuah.* (1995) Aug; 129(3-4): 109-11, 158.
12. Pilcher R. Management of Missile Wounds of the Maxillofacial Region During the 20th Century. *Injury.* 1996 Mar; 17(2): 81-8.
13. Russo A, Dell Aquila A, Casella A, Lavorgna G. A Statistical Contribution to Fractures of the Maxillofacial area. *Minerva Stomatol.* 1997 Apr; 46(4): 139-45.
14. Tanaka N et al. Etiology of Maxillofacial Fractures. *B.J. O.M.S.* 1994; 32: 19-23.