

مرور مطالعات انجام شده در مورد اثر استراحت مطلق بروی عملکرد سیستم عضلانی-اسکلتی اندام تحتانی و تنہ

رحیمه محمودی^۱، دکتر سید جواد موسوی^۲

^۱- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

^۲- استاد یار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

زمینه و هدف: تاکنون مطالعات بسیار متعددی در مورد اثر استراحت مطلق (BR) بروی سیستم‌های مختلف بدن از جمله عضلات، استخوانها، اعصاب، عروق، سیستم ادرارکی و شناخت (cognition)، در سراسر دنیا انجام شده است. هدف از این پژوهش، مرور نظام مند مقالات چاپ شده، حاصل از مطالعات انجام شده در برلین در زمینه تأثیر استراحت مطلق بروی سیستم عضلانی-اسکلتی است.

جامع ترین مطالعه‌ای که تاکنون در این زمینه انجام شده، مطالعه دوم برلین (Second Berlin Bedrest Study) با همکاری سازمان فضایی اروپا (European Space Agency or ESA) می‌باشد. در این مطالعه، ۲۴ مرد سالم به مدت ۵۶ روز در وضعیت خوابیده طاقباز قرار گرفتند. در این مدت، اثر استراحت مطلق بروی قدرت، تحمل، هماهنگی و کنترل عضلات و نیز دانسیته استخوان افاده مطالعه بررسی شد. در این سری مطالعات، اثر تمرین مقاومتی با لود بالا و ویراسیون نیز بررسی شد. چنین تحقیقاتی، فرصتی را برای مطالعه اثرات خاص بی حرکتی بدون مداخله بیماری‌های دیگر، فراهم می‌کند.

روش بررسی: جستجوی نظام مند بانک های اطلاعاتی مدلاین Pubmed و سایت ESA، برای شناسایی مقالات چاپ شده مطالعات انجام شده در برلین، بخصوص مطالعات مربوط به مطالعه‌ی دوم برلین در مورد اثر استراحت مطلق بروی عضلات تنہ و اندام تحتانی و استخوان ران و تیبیا انجام شد. به علاوه مقالات مربوط به اثربخشی مداخلات بصورت تمرین مقاومتی و ویراسیون کل بدن نیز جستجو و شناسایی شد.

یافته‌های: تعداد ۴۶ مقاله از مطالعات انجام شده در برلین بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ به چاپ رسیده است که تنها دو مقاله مربوط به سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ و بقیه مقالات مربوط به سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ می‌باشد. از تعداد کل مقالات، ۱۷ مقاله در رابطه با عضله و اثر مداخله بر آن، ۳ مقاله در مورد استخوان و نیز تأثیر مداخله بر آن و ۴ مقاله در رابطه با عضله و استخوان و نیز اثر مداخله بر هر دو سیستم بصورت تواأم، یافت شد. ۲۲ مقاله‌ی دیگر در مورد سیستم‌های دیگر همچون قلب، عروق، خواب و شناخت و ادراک بود.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعات، نشان داد که استراحت مطلق، اثرات منفی گستردگی بر روی سیستم عضلانی-اسکلتی به جا می‌گذارد. این اثرات، شامل تغییر فعالیت تونیک به فازیک عضلات، آتروفی عضلانی و پوکی استخوان که از روزهای اولیه پس از استراحت مطلق، شروع می‌شود و حتی تا ۱۸۰ روز پس از پایان دوره استراحت مطلق باقی می‌ماند، می‌باشد. با توجه به اینکه استراحت به عنوان یک روش درمانی در مورد بعضی از بیماری‌ها از جمله کمردرد به کار می‌رود، شناخت اثرات منفی استراحت می‌تواند در کاهش تجویز استراحت مطلق به عنوان یک روش درمانی، موثر باشد.

کلید واژه‌ها: مطالعه دوم برلین در مورد استراحت مطلق، آتروفی عضلانی، پوکی استخوان، تمرین مقاومتی، ویراسیون

(تاریخ ارسال مقاله ۹۰/۰۲/۱۸، پذیرش مقاله ۹۰/۰۸/۵)

نویسنده مسئول: تهران، خیابان انقلاب، پیج شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

E-mail: jmousavi@razi.tums.ac.ir

مقدمه

نشده است^(۱). یافته‌ها در مورد اثر استراحت مطلق بر سیستم عضلانی-اسکلتی، حاکی از آن است که کاهش رسوب مواد معدنی در استخوان‌های تحمل کننده وزن و آتروفی، بیشتر در ساختارهای عضلانی ضد جاذبه پا اتفاق می‌افتد^(۲). مطالعه‌ی تغییراتی که در عملکرد سیستم عضلانی-اسکلتی بدنبال حذف لود ایجاد می‌شود حاکی از تأثیر پذیری بیشتر اکستنسورهای زانو و مچ پا در طی دوره‌ی استراحت مطلق است که این تغییرات در عضلات پلانtar فلکسور مچ، بسیار معنی دار و در عضلات دورسی فلکسور، بسیار اندک است^(۳). در ضمن در گروههای عضلانی سینه‌زیست نیز، میزان آتروفی، متفاوت است^(۴). مثلاً آتروفی

افراد به دلایل مختلف، همچون شکستگی استخوان، اقامت در بخش مراقبت‌های ویژه، تقویض مفصل، بارداری^(۱)، ضایعات ورزشی و یا کمردرد حاد، مجبور به استراحت مطلق (BR) و بی حرکتی هستند. در بعضی از این موارد، نه تنها بعلت ضایعه، بلکه به دلیل اثرات بی حرکتی بر روی عضله، آتروفی، قابل پیش‌بینی است؛ اما مقالات علمی تا سال ۲۰۰۷، اطلاعات کمی را درباره اثر بی حرکتی بر الگوهای آتروفی عضله در اندام تحتانی، فراهم می‌کنند. از طرفی، ثابت شده است که استراحت در درمان کمردرد، حداقل فایده را دارد^(۲) و منجر به نتایج قابل توجهی در مقایسه با حفظ فعالیت‌های قابل تحمل،

سازمان‌های فضانوردی از جمله ESA انجام شده است. یکی از جامع ترین تحقیقات، مطالعاتی می‌باشد که بصورت بین‌المللی توسط ESA در برلین صورت گرفته است. مطالعه مقدماتی اولیه یا Berlin Bedrest Study در سال ۲۰۰۳-۲۰۰۴ و مطالعه اصلی Second Berlin Bedrest Study(2nd BBS) در طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ انجام شد. با توجه به اینکه نتایج این مطالعات، در افزایش دانش مربوط به اثر بی‌حرکتی بر روی سیستم عضلانی - اسکلتی و بویژه در کمردرد و پوکی استخوان اهمیت بسزایی دارد، نتایج حاصل از این مطالعات، بصورت نظام مند در این مقاله بصورت خلاصه ارائه شده است.

از آنجا که مشابه با تغییرات رخ داده در طی استراحت مطلق در بیماری نظیر کمردرد اتفاق می‌افتد، آشنایی با نتایج این مطالعات، بخصوص 2nd BBS برای گروههای مختلف پژوهشکی به ویژه فیزیوتراپیست‌ها مفید می‌باشد.

روش بررسی

در طی جستجوی مقالات چاپ شده در زمینه استراحت مطلق در برلین، از تعداد کل ۴۶ مقاله‌ی یافت شده، ۲۴ مقاله مرتبط با عضله و استخوان و اثر مداخله بر این دو سیستم و ۲۲ مقاله دیگر در رابطه با دیگر سیستم‌ها همچون قلب، عروق، ادرار و شناخت بود. از این ۲۴ مقاله، ۱۷ مقاله در رابطه با عضله و اثر مداخله برآن، ۳ مقاله در مورد استخوان و نیز تأثیر مداخله بر آن و ۴ مقاله در رابطه با عضله و استخوان و نیز اثر مداخله بر هر دو سیستم بصورت توأم، یافت شد. اما نکته قابل توجه آن است که از این ۲۴ مقاله، ۱۲ مقاله مربوط به مطالعه دوم برلین (۵۲) بود که در طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ انجام شد. در میان این ۱۲ مقاله، ۸ مقاله در رابطه با تأثیر استراحت مطلق و نیز مداخله بر عضله، ۲ مقاله در رابطه با اثر استراحت مطلق بر استخوان و ۲ مقاله در مورد تأثیر مداخله بصورت تمرین مقاومتی بر عضله و استخوان بصورت توأم بود.

بحث

یافته‌های به دست آمده از این سلسله مطالعات به صورت جدول ارائه شده است. قبل از ارائه این نتایج، توضیح کوتاهی در مورد مطالعه‌ی دوم برلین ارائه می‌شود. فراخوانی افراد از طریق گزارش رادیویی و تلویزیونی ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی، تبلیغات در روزنامه‌های محلی و منطقه‌ای، تبلیغات در وسائل حمل و نقل عمومی، پوسترها نصب شده در بیمارستانها

بیشتر سوئوس در مقایسه با گاستروکنیموس(۷) و واستوس، بیشتر از رکتوس فموریس(۸). اما متأسفانه در تمام مطالعات انجام شده، آزمونهای مستقیم در مورد مقایسه مقادیر نسبی آتروفی بین عضلات اندام تحتانی، نمایش مقدار و سرعت آتروفی عضلانی و تفاوت آنها، آنچنان که واقعاً وجود دارد، انجام نشده است (۹، ۵، ۱۹). در استراحت طولانی مدت (۴ هفته یا بیشتر) افزایش طول ستون فقرات، کاهش لوردوز کمری یا صاف شدن آن، افزایش سایز دیسک و افزایش ارتفاع دیسک، دیده شده است. ممکن است این تغییرات، علاوه بر استرس بر دیگر ساختارهای کمری، سبب افزایش احتمال صدمات بیومکانیکی کمر و در نهایت، تغییر فعالیت سیستم عضلانی در ناحیه‌ی کمر شود (۲۲) - (۲۰) این تغییرات، ممکن است علاوه بر استرس در دیگر ساختارهای کمری (۲۴، ۲۳) سبب افزایش احتمال صدمات بیومکانیکی کمر (۲۵) و در نهایت تغییر فعالیت سیستم عضلانی در ناحیه‌ی کمر (۲۶) شود. این تغییرات عضلانی در ناحیه‌ی کمری در اکستنسورهای فقرات (۱۴-۱۷) همچون مالتی فیدوس کمری (۳۳-۳۷) بیشتر از فلکسورهای ستون فقرات است (۱۴-۱۷) مطالعات حیوانی و انسانی در مورد حذف لود، نشان از کاهش فعالیت تونیک یا تغییر الگوی فعالیت تونیک به فازیک دارد (۳۸) - (۳۴) این تغییر فعالیت تونیک عضله، بعلت تغییرات بافتی شیمیایی در عضلات متأثر است (۳۸). از طرفی، در مطالعات انجام شده در مورد حذف لود، ناحیه‌ی کمری - لگنی که در عملکرد نرمال همچون انتقال نیرو بین قسمت فوقانی و تحتانی بدن نقش دارد، مورد غفلت واقع شده است (۳۹).

در ضمن، این تغییر فعالیت تونیک در ناحیه‌ی کمری مرتبط با کمردرد می‌باشد. (۴۱، ۴۰) اثر دیگر بی‌حرکتی، بر روی استخوان می‌باشد که بنظر می‌رسد علت اصلی پوکی استخوان، بی‌حرکتی و نه فقدان لود است (۴۲). در ضمن، در طی دوره استراحت، نشانگرهای بیوشیمیایی جذب استخوان، بیشتر و نشانگرهای بیوشیمیایی تشکیل استخوان، کمتر، متأثر می‌گردد (۴۳) - (۴۹) و بیشترین میزان پوکی در نواحی از اسکلت بدن که در فعالیت‌های پاسچرال نقش دارند (مثلاً ستون فقرات، پلوبس، ساق پاها) رخ می‌دهد (۵۱، ۵۰).

با توجه به اینکه فضانوردان در زمان طولانی در معرض نیروی جاذبه ناچیز و حذف لود قرار دارند و این موقعیت‌ها، اثر بسیار گسترده‌ای بر روی عملکرد آنها در فضا و پس از بازگشت به زمین به جا می‌گذارد، مطالعات وسیعی برای شناسایی اثر این موقعیت‌ها بر روی سیستم‌های مختلف همچون عضله، استخوان، قلب، عروق، اعصاب، ادرار و شناخت توسط

قرار گرفتند. قبل از مشارکت در تحقیق، تمام افراد اجازه‌ی موافقت نامه‌ی کتبی شان را ارائه دادند. نه روز قبل از شروع مطالعه، افراد وارد مرکزبررسی شدند. شیوه‌ی استراحت در طی ۶۰ روز، بصورت ۶ درجه تیلت قسمت فوقانی تخت بطرف پایین ۲۴ Head – Down Tilt (HDT) بود. افراد تحت نظارت پرستاری ۱۶ ساعته بودند. و یک دوره‌ی روز _ شب ساعتیه با بیداری، ساعت ۷ صبح و خواب، ساعت ۱۱ شب را دنبال می‌کردند.

مداخله بصورت تمرين و یا تمرين با ويبراسيون کل بدن، بصورت زير بود :

- ۱ - warm up (تمرين فلكشن دو طرفه زانو از ۹۰-۹۰ درجه با ۵۰٪ نيريوي حداكثربراي مدت ۶۴ ثانيه)
 - ۲ - bilateral squat (تمرين فلكشن دو طرفه زانو از ۹۰-۹۰ درجه با ۷۵٪ نيريوي حداكثر در روز اول مطالعه تا مرز خستگي)
 - ۳ - single leg heel rais (انجام حرکت از حداكثر پلانتر فلكسيون تا حداكثر دورسي فلكسيون برای هر دو پابا نيريوي معادل ۱/۵ برابر وزن بدن در روز اول)
 - ۴ - double leg heel raise (انجام حرکت حداكثر پلانتر فلكسيون تا حداكثر دورسي فلكسيون همزمان دو پابا نيريوي معادل ۱/۸ برابر وزن بدن)
 - ۵ - back and toe raise (تمرين اكستانيون ران ها و ستون فقرات کمری و دورسي فلكسيون مج ها با زانوي صاف) برای اعمال ويبراسيون و انجام تمرين، از وسیله‌ی ای با نام تجاري Space 2000 Galileo استفاده شد.
- آنچه در مطالعه‌ی دوم برلين و مطالعات تابع آن مشاهده شد در قالب چند محور قابل بررسی است :
- وضعيت استراحت مطلق و نحوه‌ی اعمال آن، نوع مداخله، نوع تمرينات و شدت تمرين، تأثير استراحت مطلق بر ساختار عضله و نيز تأثير آن بر استخوان، پيچيدگي مطالعات استراحت مطلق، نتائج مطالعات و کاستي های موجود در مطالعه. نتائج حاصل از اين مطالعه با ارزش و نيز نتائج حاصل از مطالعات ديگر، به اختصار در جدول ۱، گنجانده شده است.

و دانشگاهها و اينترنت، بعلاوه ارسال مستقيم ۳۰۰۰ نامه به مردان ۲۵ تا ۳۵ ساله در برلين بود.

معيارهای ورود به مطالعه دوم برلين، عبارت بودند از :
۲۰- ۴۵ سال، قد ۱۹۵- ۱۵۵ سانتي متر، دارای بيمه اجتماعي، در دسترس بودن بيش از يازده هفته و ادامه بررسی ها تا ۲ سال بعد از مطالعه.

معيارهای خروج از مطالعه، عبارت بودند از :
هر گونه اعتياد (الكل، در اروپا)، درمان پزشكی مرتب يا اقامت طولاني مدت در بيمارستان، سيگار(بيش از ۵ سيگار در روز) يا آماده برای ترك سيگار در دوره‌ی تحقیق، دریافت مرتب دارو، بيماریهای مزمن، هر نوع اختلال متابوليک يا هورموني، نياز به درمان به دليل مشكلات دندانی، تاریخچه بيماري روانی، تاریخچه‌ی هر نوع بيماري عروقی يا جراحی، بيماري قلبی-عروقی، اختلال در مكانيسم لخته شدن خون، هر نوع بيماري عضله واستخوان، ايميلنت فلزي يا تركيبي استخوان، هر بيماري التهابي حاد يا مزمن باكتريائي يا غيرباكتريائي، اختلالات دهليزي، ميگرن، اهداء خون بيش از ۳۵۰ ميلي ليتر در طی سه ماه از شروع شرکت در تحقیق، شرکت همزمان در مطالعه‌ی دیگر، مشكلات ارتواستاتيك، هر نوع آرژي، رفاقت های ورزشي فعال، كمدرد يا درد مزمن پشت نيازمند به درمان، هر نوع تاریخچه‌ی جراحی فقرات، اسکوليوز شديد، اختلال خواب (سحرخiz يا ديدن کابوس)، نياز به بيش از ۱۰ ساعت خواب يا کمتر از ۵ ساعت در روز، صرع، هر نوع اختلالات غضروفی مج، زانو و ران يا هر نوع بيماري مفصلي (حاد و يا مزمن)، جراحی قبلی زانو يا ضایعه ليگاماني، دانيسته کم استخوان و لزوم رژيم غذائي گياه خوارى. برای تكميل موقفيت آمييز تمام ابعاد اين مطالعه، افراد حق امتياز ۸۰۰۰ يوروسي را بطور كامل دریافت کردند. برای تكميل فقط بخشی از مطالعه، بريطبيک یک جدول مشخص، دستمزد کم می‌شد.

براساس داده‌های حاصل از اولين مطالعه‌ی برلين در سال ۲۰۰۴- ۲۰۰۳، برای مطالعه دوم برلين ۲۴ مرد، فراخوانی شدند که بصورت تصادفي در سه گروه کنترل (ctrl)، گروه تمرين مقاومتی (RE) و گروه تمرين مقاومتی با ويبراسيون (RVE) Resistive Vibration Exercise

جدول ۱ - خلاصه مطالعات انجام شده در مورد اثر استراحت مطلق بر عضله و استخوان و مداخله های انجام شده بر این دو ساختار در طی استراحت مطلق

نتایج	علت مداخله	نوع مداخله	جمعیت هدف، مدت و وضعیت استراحت مطلق (BR)	طرح مطالعه
<ul style="list-style-type: none"> - فرستی برای ارزیابی طرح های رایج استاندارد سازی مطالعات - انجام بیوپسی به روشن جراحی باز برای اولین بار، در مطالعات با پشتیبانی ESA - استفاده از tilt table با یک پروتکل تدریجی منطقی برای راه اندازی ایمن بیمار - دستیابی به یک شیوه‌ی مناسب موقتی آمیز برای تعدیل عدم تحمل ایستادن در حالت قائم برای تعامل افراد 	بررسی کارآئی ویبراسیون کل بدن همراه با تمرینات مقاومتی با لود بالا برای پیشگیری از پوکی استخوان	تمرینات مقاومتی با لود بالا همراه با ویبراسیون کل بدن	۲۴ مرد سالم ۳۵-۲۵ ساله، BR بصورت طاقیاز با ۶ درجه تیلت قسمت فوقانی تحت به پائین برای مدت ۶۰ روز	۱. مطالعه‌ی دوم برلین در مورد BR (۵۲)
<ul style="list-style-type: none"> - حداکثر آتروفی در گاستروکمیوس داخلي و سولئوس و واستوس و نیز متأثر شدن همسترینگ ها - سرعت متفاوت آتروفی در گروه های سینزی: مثلاً ادوکتور مانگوس، بیش از ادوکتور لانگوس؛ گاستروکمیوس داخلي بیشتر از گاستروکمیوس خارجی؛ و استوس بیش از رکتوس فموریس - ایمبالانس عضلانی بعلت سرعت متفاوت آتروفی - توصیه تمرینات مقاومتی زنجیره‌ی بسته با به چالش کشاندن بیشتر عضلات خد جاذبه اندام تحتانی 	بررسی سرعت آتروفی در عضلات اندام تحتانی	استفاده از Magnetic Resonance Imaging (MRI) برای عضلات اندام تحتانی در طی BR در فواصل دو هفته‌ای	۱۰ مرد سالم با میانگین سنی ۳۰-۳۴ سال، BR در وضعیت افقی برای مدت ۸ هفته	۲. آتروفی افتراقی ساختارهای عضلانی اندام تحتانی در طی BR طولانی (۶)
<ul style="list-style-type: none"> - حدکتر تغییر فعالیت تونیک در اکسپان کمری و بعد از تونیک تو را پس از افزایش فعالیت تونیک در الایاف تحتانی گلوکوتونیک مانگزیموس - تغییر فعالیت تونیک به فاز بیک در عرضه مایل شکمی داخلی، اما بدون تغییر پا تغییر اندک در طی مطالعه در مایل خارجی شکمی - تغییر در دقت حرکت و ویژگی‌های سیگنال فاز یک - تونیک EMG - کاهش دقت حرکت با افزایش سرعت (دقت سرعت حرکت در طی مطالعه، بهبود یافت)، دقت در مانگزیموس حرکت، بدون تغییر و کاهش دقت در حداقل حرکت در یک زمان خاص و غیر از آن، بدون تغییر 	شبیه سازی تغییر فعالیت تونیک عضلات کمری - لگنی در طی استراحت و بعد از آن	حرکت یکطرفه مکرر زانو در وضعیت خوابیده به شکم	۱۰ مرد، BR در وضعیت افقی برای مدت ۸ هفته	۳. تغییر فعالیت عضلات کمری - لگنی از تونیک به فاز یک در طی ۸ هفته استراحت مطلق و ۶ ماه پیشگیری (۵۳)
<ul style="list-style-type: none"> - افزایش حجم دیسک در طی استراحت و تفاوت حجم دیسک در سطوح مختلف - تغییر ارتفاع دیسک‌ها در سطوح مختلف و هم از بُعد قدامی و خلفی دیسک - تغییر میزان لوردوز در سطوح مختلف فقرات - تغییر نسبت مساحت دیسک به ارتفاع دیسک - تأثیرپذیری متفاوت عضلات در سطوح مختلف 	اندازه گیری حجم دیسک، طول بین مهره‌ای فقرات، زاویه‌ی لوردوزین مهره‌ای، ارتفاع دیسک و سطح مقطع عرضی مالی فیدوس، ارکتور اسپین، کوادراتوس لومباروم و پسوآس مائزور از L ₁ تا L ₅	استفاده از MRI بصورت آگزیال و نیز در صفحه‌ی سازیتال	۴ مرد، BR در وضعیت طاقیاز با ۶ درجه تیلت قسمت فوقانی تحت به پائین برای مدت ۶۰ روز	۴. آتروفی عضلانی و تغییرات شکل ستون فقرات: آسیب پذیر بودن ستون فقرات بعد از BR طولانی؟ (۵۴)

ناتج	علت مداخله	نوع مداخله	جمعیت هدف، مدت و وضعیت استراحت مطلق (BR)	طرح مطالعه
<p>- کاهش سطح مقطع عرضی فیزیولوژیک (CSA) Cross Sectional Area</p> <p>عضله مالتی فیدوس و عدم وجود شواهد آماری معنی دار در مورد کاهش CSA</p> <p>عضلات ارکتور اسپین و کودراتوس لومباروم</p> <p>- افزایش CSA در طی BR در عضلات قدمی طرفی شکمی، مستقیم شکمی و پسواس مازور. برگشت به CSA قبل از مطالعه در طی فاز راه اندازی مجدد، بعد از پایان BR در عضلات مالتی فیدوس، مستقیم شکمی و عضلات قدمی طرفی شکمی</p> <p>- آتروفی انتخابی عضله مالتی فیدوس در طی BR</p> <p>شبیه بودن این تغییرات با تغییرات موجود در افراد مبتلا به کمردرد</p>	<p>بررسی استفاده از MRI برای تعیین اثر BR بر ناحیه کمری - لگنی</p>	<p>استفاده از MRI در نواحی کمری - لگنی برای عضلات مالتی فیدوس، ارکتور اسپین، کودراتوس لومباروم پسواس مازور و عضلات قدمی شکمی و عضله ای مستقیم شکمی</p>	<p>۱۰ مرد سالمند ۴۵-۲۰ ساله، ۶ هفته BR در وضعیت افقی با ۶ ماه پیگیری مطالعه</p>	<p>۵. ارزیابی عضلات تنہ در طی BR طولانی با استفاده از MRI (۵۵)</p>
<p>- پذیرش و تحمل تمرينات RVE و مؤثر بودن آنها در طی استراحت برای افراد جوان سالم، دوبار در روز در طی BR، ۱/۵ روز در طی دوره ریکاوری</p> <p>- پیشرفت تمرين، عمدتاً با افزایش فرکانس ویبراسیون</p> <p>- افزایش زمان تمرين و لاکتات خون با پیشرفت تمرين</p> <p>- نادر بودن علائم تمرين پیش از حد و قابل درمان بودن علائم در صورت وجود</p>	<p>بررسی اثر تمرينات مقاومتی همراه با ویبراسیون بعنوان یک روش مداخله، آموزش مناسب در مقابل deconditioning سیستم عضلانی - اسکلتی</p>	<p>تمرينات مقاومتی با لود بالا شامل heel squat، kick ، toe raise ،raise</p>	<p>۲۴ مرد سالمند ۴۳-۲۴ ساله، BR در وضعیت افقی به مدت ۶ روز</p>	<p>۶. پذیرش و تحمل تمرينات مقاومتی با لود بالا همراه با ویبراسیون، توسط افراد در یک دوره ۵ استراحت سخت به مدت ۶ روز (۵۶)</p>
<p>- کاهش تعداد اندازه گیری CSA لازم برای تعیین تغیيرات حجم عضله تا ۶۰ درصد با کاربرد این روش</p> <p>- دست یابی به ابزار کارآمدتر برای تعیین تغیيرات حجم عضله در مطالعات مداخله ای</p>	<p>بررسی اندازه گیری CSA هفده عضله ای مختلف اندام تحتانی برای نشان دادن تغیيرات در حجم عضلات، در نتیجه یک مداخله همچون تمرين، بیماری یا ضایعه</p>	<p>استفاده از MRI در مورد ۱۷ عضله اندام تحتانی</p>	<p>۵۶ روز</p>	<p>۷. بررسی تغیيرات در حجم عضلات خاص اندام تحتانی با استفاده از MRI در طی BR (۵۷)</p>
<p>- کاهش آتروفی مالتی فیدوس در گروه مداخله و عدم ادامه آتروفی آن همانند گروه کنترل</p> <p>- افزایش مساحت دیسک و طول ستون فقرات، کاهش یافته وجود ارتباطات نسبتاً معنی دار بین شکل ستون فقرات و تغیيرات CSA عضلات</p>	<p>تعیین کارآیی تمرين مقاومتی همراه با ویبراسیون کل بدن در رابطه با تغیيرات عضلات کمری - لگنی و تغیيرات شکل ستون فقرات</p>	<p>کاربرد MRI همراه با تمرينات مقاومتی deconditioning</p>	<p>۲۰ مرد سالمند، BR در طی ۸ هفته و ۶ ماه پیگیری</p>	<p>۸. تمرينات مقاومی تحمل وزن شبیه سازی شده همراه با ویبراسیون برای کاهش ستون فقرات کمری در طی (۵۸) BR</p>
<p>- میزان کاهش CSA مالتی فیدوس کم شد. و افزایش CSA در عضلات ارکتور اسپین و کودراتوس لومباروم و به میزان بیشتر در پسواس مازور وجود داشت.</p> <p>- عدم وجود شواهد آماری معنی دار در مورد اثر ویبراسیون نسبت به تمرين مقاومتی با لود بالا بنتهایی</p> <p>- عدم تأثیر تمرين بر تغیير شکل ستون فقرات</p>	<p>بررسی اثر کوتاه مدت این نوع مداخله بر اندازه ای عضلات کمری، دیسک بین مهره ای و تغیيرات شکل ستون فقرات</p>	<p>تمرينات مقاومتی با لود بالا همراه و بدون ویبراسیون کل بدن</p>	<p>۲۴ مرد، BR در حالت ۶ درجه تیلت قسمت فوقانی تخت به پایین به مدت ۶۰ روز</p>	<p>۹. مداخله بصورت تمرين مقاومتی با ویبراسیون و بدون آن و اثراً بر deconditioning مهره های کمریدر طی BR طولانی (۵۹)</p>
<p>- کاهش میزان آتروفی در عضلات سه سر ساقی و استتوس با این نوع مداخله آتروفی کمتر پرونال ها و تیپیالیس خلفی و فلکسورهای انگشت در گروه مداخله - تشابه آتروفی همسرتینگ ها در گروه مداخله و کنترل (به دلیل نوع تمرين)</p>	<p>بررسی کارآیی مداخله بصورت RVE در طی طولانی در پیشگیری از آتروفی عضلات اندام تحتانی</p>	<p>تمرين مقاومتی toe raise , heel raise , squat explosive kick ،</p>	<p>۲۰ مرد BR در وضعیت افقی به مدت ۶ روز</p>	<p>۱۰. اثر تمرين مقاومتی با ویبراسیون، برکاهش آتروفی عضلانی اندام تحتانی در طی ۶۰ روز (۶۰)</p>

نحوه	جهت مطالعه	استراحت مطلق (BR)	جمعیت هدف، مدت و وضعیت	تایپ
علت مداخله	نوع مداخله	(BR)	مطالعه	علت
- تأثیر مثبت هر دو نوع تمرين بر اندازه‌ی عضله ما لتي فيديوس در طي BR ، اما تداوم افزایش اندازه‌ی پسواس مازور در گروه TFS تا ۱۴ روز بعد از BR. تناسب و برتری برنامه‌ی SMC نسبت به TFS بعد از پایان BR برای حفظ مالتی فيديوس بدليل عدم ايجاد نبروهای فشارنده‌ی زيانيار بالقوه بر فقرات - عدم تفاوت در شيعو كمردرد با اين دو نوع تمرين بعد از TFS - کاهش بيشتر حجم ديسك و ارتقان قدمي ديسك با تمرينات TFS	بررسی اثرات اين دو نوع تمرين بر عضلات و تغييرات شكل ستون فقرات و ديسك	استفاده از دو نوع تمرين: ۱. تمرينات تقويتي کلي و تمرينات فلکسوري تنه Trunk Flexor ۲. تمرينات کنترل حرکتی خاص Strength(TFS) Specific Motor Control (SMC) MRI وکاربرد	۲۴ مرد، در وضعيت طاقباز با ۶ درجه تيلت قسمت فوقاني تخت به پايين به مدت ۶۰ روز	۱۱. اثرات توابينخشى بر عضلات تنه بعد از طولاني (۶۱)
- آتروفي فيربراهای کند و تند واستوس خارچي و فيبربراهای کند سولتوس - افزایش immunostaining II در ميوفيربراهای نوع II واستوس خارچي و کاهش پروتئين NOS1 در استوس خارچي گروه مداخله - حفظ اندازه‌ی ميو فيبريل در گروه مداخله بعد از طولاني	تحقيق در مورد شكل سنتر سه ايزوفرم مهم اکسید نيتریک (NOS1-3) (NOS1-3) در اجزاي سلولی در طي طولاني بصورت HDT با مداخله‌ی تمرين مقاومتی و بدون آن	تمرين بالارگومتر flywheel و بيوپسي واستوس خارجي و سولتوس قبل از شروع BR و در روز ۸۴ مطالعه	۲۱ مرد سالم، BR بصورت ۶ درجه تيلت قسمت فوقاني تخت به پايين HDT به مدت ۹۰ روز	۱۲. شكل متفاوت سنتر اکسید نيتريک- (NOS1- 3) در عضله‌ی اسکلتی انسان بدنيا مداخله تمرين بعد از ۱۲ هفته BR (۶۲)
- تغيير شكل SERCA1a بعنوان نشانه‌ی هموستاز سيستولی تغيير يافته‌ی یون Ca - اثر تمرين در شكل خاص SERCA1a ميوفير - روش متفاوت اس- نيتروسيليشن در عضلات سولتوس و واستوس خارچي بدليل پاسخ متفاوت آنها به مداخله	بررسی و کنترل تغييرات در شكل خاص ايزوفرم SERCA و اس- نيتروسيليشن در بيوپسي ميوفيربراهای سولتوس و واستوس خارجي در اندازه‌تختاني قبل و بعد از طولاني BR	كاربرد يك نوع رژيم غذائي حاوي يك نوع اسييد آمينه و تمرين مقاومتی با ارگومتر flywheel او تمرين هوازي	۲۴ زن BR در حالت ۶ درجه تيلت قسمت فوقاني تخت به پايين به مدت ۶۰ روز	۱۳. پيشگيري از حالت غير متعارف سريع در ميوفيربراهای کند و اس- نيتروسيليشن متفاوت طي BR طولاني با تمرين (۶۳)
- عدم تغيير شكل پروتئين RyR1 - عمل مقابل RyR1 با اکسید نيتريک NO - افزایش نيتروسيليشن RyR1 در طي BR در گروه کنترل - حفظ شكل نرمال RyR1 و الکوي نيتروسيليشن لازم برای زوج تحريك- انقباض در کنترل عملکرد انسان با کاهش مداخله	مطالبه شكل و تغييرات عملکردي RyR1 بعد از طولاني با تمرين مقاومتی همراه با ويبراسيون و بدون آن	تمرين مقاومتی شامل: اسکات toe heel raise و ويبراسيون دو بار در روز و پنج روز در هفته و raise ويبراسيون قبل و بعد از BR	۲۰ مرد سالم ۵۶ روز BR در وضعیت افقی	۱۴. شکل گيرنده‌ی رايانودين نوع ۱ (RyR1) و الگوي پرو-ستين اس- نيتروسيليشن در ميوفيربراهای سولتوس انسان بعد از BR و مداخله‌ی تمرين (۶۴)
- عدم افزایش کارآيی تمرين مقاومتی برای حفظ عملکرد عصبی - عضلانی ران و پشت ساق calf با ويبراسيون - احتمال تأثير ويبراسيون بر اندازه‌ی عضله Maximal Voluntary - حفظ اندازه‌ی عضلات ران و قدرت (MVC)Contraction - بهبود سرعه انتقباض در عضلات calf - عدم حفظ اندازه‌ی عضلات calf و قدرت MVC بطور كامل با اين رژيم تمرين	بررسی کارآيی تمرين مقاومتی و ويبراسيون بر حفظ CSA عضلات ران و ساق و سرعه انتقباض ايزومتریک و فعالیت عصبی	تمرين مقاومتی همراه با ويبراسيون و بدون آن	۲۳ مرد، BR بصورت ۶ درجه تيلت قسمت فوقاني تخت به پايين به مدت ۶۰ روز	۱۵. اثر تمرين مقاومتی همراه با ويبراسيون بر ميزان قدرت و وبيگيهای سرعه انتقباضی اكستنسور زانو و پلانتر فلکسور بعد از ۶۰ روز (۶۵)BR

نتایج	علت مداخله	نوع مداخله	جمعیت هدف، مدت و وضعیت استراحت مطلق (BR)	طرح مطالعه
<ul style="list-style-type: none"> - حفظ بهتر توده‌ی استخوان در گروه ویراسیون همراه با تمرين مقاومتی نسبت به گروه تمرين مقاومتی، در دیافیز تیبا و پروگریمال فمور - حفظ اندازه‌ی عضله در هر دو گروه تمرين مقاومتی و تمرين مقاومتی همراه با ویراسیون - تاثیر تمرين در طی BR بر روی بازیافت استخوان تا ۳ ماه بعد 	<p>آزمون فرضیه‌ی افزودن ویراسیون کل بدن به تمرين مقاومتی بالود بالا در تأمین تحریک بهتر، برای کاهش پوکی استخوان در طی BR طولانی نسبت به تمرين مقاومتی با لود بالا به تنهایی با استفاده از (DXA) dual X-ray absorptiometry</p>	<p>اعمال ویراسیون کل بدن همراه با تمرين مقاومتی و تمرين مقاومتی به تنهایی</p>	<p>۲۴ مرد، BR بصورت ۶ درجه تیلت قسمت فوقانی تخت به پایین به مدت ۶۰ روز</p>	<p>۱۶. شواهدی مبتنی بر اثر دیگر ویراسیون کل بدن ویراسیون با تمرين مقاومتی نسبت به تمرين مقاومتی بتنهایی در پیشگیری از پوکی استخوان در طی BR طولانی (۶۶)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - افزایش جذب استخوان در گروه کنترل RVE - شدت کمتر افزایش جذب استخوان در گروه RVE - افزایش تشکیل استخوان در گروه RVE و کاهش آن در گروه کنترل - پوکی استخوان معنی دار در پایان مطالعه در گروه کنترل و عدم وجود این تغییر در گروه RVE - محدود شدن افزایش جذب استخوان و افزایش تشکیل استخوان و کاهش توده‌ی استخوان در طی BR با این نوع مداخله 	<p>بررسی اثر تمرين مقاومتی و ویراسیون بر جلوگیری از پوکی استخوان و محدود ساختن افزایش جذب استخوان</p>	<p>تمرين مقاومتی و ویراسیون و استفاده از نشانگرهای متابولیک استخوان در سرم با گرفتن نمونه‌های خون و DXA</p>	<p>۲۰ مرد سالم، BR به مدت ۸ هفته، همراه با ۱۲ ماه پیگیری</p>	<p>۱۷. تعدیل آتروفی استخوان و عضله با تمرين مقاومتی و ویراسیون در طی ۵۶ روز (۶۷)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - مفید بودن نسی‌های دو نوع مداخله در حفظ ماده‌ی معدنی استخوان Bone Mineral Content (BMC) - کارآیی نسی تمرينات مقاومتی flywheel در حفظ سطح مقطع فیزیولوژیک عضلات اندام تحتانی در طی BR 	<p>بررسی و مقایسه کارآیی اثر این دو نوع مداخله بر آتروفی عضلانی و پوکی استخوان</p>	<p>تمرينات مقاومتی با flywheel و کاربید پامیدرو نیت</p>	<p>۲۴ مرد سالم، BR بصورت ۶ درجه تیلت قسمت فوقانی تخت به پایین به مدت ۹۰ روز</p>	<p>۱۸. آتروفی عضلانی و پوکی استخوان بعد از ۹۰ روز BR و اثرات تمرينات مقاومتی با flywheel و پامیدرونیت (۶۸)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - آتروفی متمایز در عضلات خلفی - طرفی هیپ بعد از BR طولانی - اثر تمرينات مقاومتی کوتاه مدت با سود بالا در کاهش آتروفی عضلانی اکستنسورهای هیپ - عدم تأثیر اضافی ویراسیون بعلاوه‌ی تمرينات مقاومتی در حفظ جرم عضله. 	<p>بررسی حجم عضلات خلفی - طرفی هیپ و همسترینگ‌ها و سرعت آتروفی و اثر مداخله بصورت تمرين مقاومتی و ویراسیون بر این عضلات</p>	<p>تمرينات مقاومتی با لود بالا همراه با ویراسیون و نیز استفاده از MRI، قبل، حین و بعد از BR طولانی</p>	<p>۲۴ مرد سالم، استراحت بصورت ۶ درجه تیلت قسمت فوقانی تخت به پایین به مدت ۶۰ روز</p>	<p>۱۹. آتروفی افراطی ساختارهای عضلانی خلفی - طرفی ران در طی BR طولانی و اثر مداخله بصورت تمرين (۶۹)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - اثرات کارآمد تمرين مقاومتی و ویراسیون در جلوگیری از deconditioning - انجام تمرينات کوتاه مدت RVE بعنوان یک مداخله مؤثر در جلوگیری از آتروفی، ترجیحاً در عضلات پاسچرال پشت ساق (calf) در طی BR یا بی حرکتی 	<p>بررسی اثرات ویراسیون و تمرين عضلانی بر روی عضلات اسکلتی اندام تحتانی</p>	<p>ویراسیون و تمرين عضله در طی BR (یا نیروی حداکثر ایزومتر یک پلانتر فلکشن) در حالت طاقبازی Galileo space</p>	<p>۲۰ مرد سالم داوطلب، BR در وضعیت افقی به مدت ۵۶ روز</p>	<p>۲۰. حفظ ساختار و عملکرد عضلات اسکلتی انسان با ویراسیون و تمرين عضلانی بدنبال ۵۵ روز BR (۷۰)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - افزایش فرکانس متوسط ارکتور اسپین کمری، در اواخر BR و ادامه‌ی آن تا یک سال بعد از پایان دوره‌ی BR - کاهش فرکانس متوسط در عضلات شکمی و گلوتال بدلیل افزایش توده‌ی چربی تنه و دقت حرکت - عدم تغییر در زمان بندی فعالیت عضلات کمری - لگنی - اثر BR بر عضلات کوتاه ارکتور اسپین کمری و قدرت مند بودن نسبی زمان بندی فعالیت عضلات سطحی کمری - لگنی 	<p>بررسی فرکانس متوسط و زمان بندی فعالیت در ثبت های الکتروموگرافی پنج عضله‌ی سطحی کمری و توده‌ی چربی تنه و دقت حرکت</p>	<p>حرکت تکراری زانو</p>	<p>۳ مرد، BR در طی ۵ روز</p>	<p>۲۱. اثر BR طولانی بر کنترل حرکتی شاخصه‌های زمانی و طیف EMG ساختارهای عضلانی سطحی کمری - لگنی (۷۱)</p>

طرح مطالعه	جمعیت هدف، مدت و وضعیت استراحت مطلق (BR)	نوع مداخله	علت مداخله	نتایج
۲۲. نشانگرهای زیستی مولکولی برای کنترل فیرهای عضلات اسکلتی و سیستم مویرگی بدنبال BR با و بدون مداخله (۷۲)	۱۶ زن، BR بصورت ۶ درجه تیلت قسمت فوقانی تخت به پایین (HDT) به مدت ۶۰ روز	مداخله بصورت تمرین و استفاده از نشانگرهای زیستی مولکولی و بیوپسی	بررسی تعییرات مورفوЛОژیکی و بیو شیمیایی عضلات و استوس خارجی و سولوس در انداز تھتانی بعد از ۶۰ روز BR	- تأثیر مداخله بصورت تمرین، هم بر مخابره‌ی عالائم Nos/No و هم بر تجزیه‌ی پروتئین در عضلات اسکلتی زنان - اعمال تمرین به عنوان قدم موثر و ضروری برای حفظ مکانیسم‌های مخابره‌ی سیگنال No و برگرداندن روند تعییرات پروتئین به حالت طبیعی
۲۳. الگوهای پوکی استخوان در افراد سالم با استفاده از مطالعه تولوز (۷۳)	۲۵ مرد سالم ۲۳-۴۱ ساله بصورت ۶ درجه تیلت قسمت فوقانی تخت به پایین به مدت ۹۰ روز	مداخله بصورت تمرین مقاومتی fly-wheel و تزریق داخل وریدی ۶۰ میلیگرم پامیدرونیت (۱۵ روز قبل از (BR	برای آزمون اثر تمرین مقاومتی flywheel و پامیدرونیت بر پوکی استخوان و آتروفی عضلانی و عملکرد	- تأثیر نسبتا مشابه این دو نوع مداخله بر پیشگیری نسبی کاهش CSA - مشخص شدن شروع زمان پوکی استخوان بعد از ۴ هفته بیحرکتی - مشخص شدن یک راهنمای منظم قدرتمند در مورد الگوهای پوکی استخوان
۲۴. فعالیت بیش از حد و انقباض همزمان عضلات سطحی کمری- لگنی- لگنی بعد از ۸ هفته (۷۴)	۱۰ مرد، BR در طی ۸ هفته و یکسال پیگیری	حرکت تکراری زانو با چهار سرعت حرکت در حالت عدم تحمل وزن	بررسی فعالیت پنج عضله‌ی سطحی کمری- لگنی و انقباض همزمان فلکسور شکمی- استانسور کمری برای ثبات کمری- لگنی و قسم اثرات عدم فعالیت بر ثبات کمری- لگنی	- فعالیت عضلانی بیشتر و انقباض همزمان کمتر در طی BR و ادامه تغییرات تا یکسال بعد از BR - اختلال عملکرد سیستم عصبی مرکزی در کنترل ثبات کمری- لگنی و ثبات این تغییرات در کنترل حرکتی بدیل ادامه‌ی روند تغییرات حتی تا یکسال بعد از BR

*BR= Bed Rest

نتیجه گیری

و پوکی استخوان به علت بی حرکتی و نه فقدان لود، احتمال عدم توازن قدرت عضلانی (Imbalance)، و بنابراین تغییر بیومکانیک مفصل و افزایش روند سایش و فرسایش مفصل، درد، صدمه مفصلی بعد از برگشت به حالت تحمل وزن بعد از یک دوره استراحت وجود دارد. این امر مخصوصاً در عضلات اندام تحتانی که مسؤول پلانتار فلکشن و اکستنشن زانو و هیپ هستند، شایع است. بنابراین باید تمرینات خاصی برای عضلات پلانتار فلکسور و سپس عضلات اکستنسور زانو و ران طراحی و بکار برد شود. نکته آخر اینکه:

برای پیشگیری و یا کاهش اثرات سوء استراحت طولانی مدت بر عضلات و استخوان، گنجاندن تمرینات مقاومتی با لود بالا و نه تمرینات هوایی یا تحملی، برای فرد ضروری است؛ اگرچه هنوز نوع تمرین و فرکانس تمرین، مورد چالش است اما بنظر می رسد که تمرینات مقاومتی با لود بالا بین ۷۵ تا ۸۵ درصد یک تکرار حداقل فرد و تکرار ۲-۳ روز در هفته، مؤثرترین تمرینات باشند.

به دلیل پیچیدگی و هزینه های بسیار زیاد مطالعات استراحت مطلق و نیز غیرقابل پیش بینی بودن مؤلفه انسانی، بنظر می رسد که تمام مطالعات استراحت مطلق با چالش مواجه هستند. اما این مطالعات به دلیل ارائه داشت عمیق تری درباره ای بدن انسان، با ارزش هستند. نتایج یافته ها، حاکی از آن است که تغییرات در ناحیه کمری، مخصوصاً آتروفی مالتی فیدوس و افزایش ارتقای خلفی دیسک در مهره های تحتانی کمری، ابتلاء به کمردرد را بعد از استراحت طولانی مدت، افزایش می دهد. و شاید در پرتو همین مسئله، بتوان به علت شروع کمردرد در هنگام برخاستن از تخت در صبح، پی برد. از طرفی، به دلیل تغییر فعالیت تونیک به فازیک عضلات کمری - لگنی که در حفظ ثبات این ناحیه، اهمیت بسیار دارند و این امر سبب تغییر بیومکانیک این ناحیه می شود. باید تمریناتی بخصوص برای عضلات کوتاه عمیق ناحیه کمری، در نظر گرفته شود.

بر اساس نتایج این مطالعات، به دلیل آتروفی متمایز گروههای عضلانی خاص و نیز گروههای سینه‌زی (Differential)

REFERENCES

1. Gupton A, Heaman M, Ashcroft T. Bed rest from the perspective of the high-risk pregnant woman. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs* 1997; 26:423–4302.
2. Hagen KB, Hilde G, Jamtvedt G, Winnem M. Bed rest for acute low-back pain and sciatica. *Cochrane Database Syst Rev* 2004, 1
3. Malmivaara A, Hakkinen U, Aro T, Heinriches ML. The treatment of acute low back pain: bed rest, exercises, or ordinary activity? *N Engl J Med* 1995, 332: 351–5
4. Berry P, Berry I, Manelfe C. Magnetic- resonance- imaging evaluation of lower-limb muscles during bed rest: a microgravity simulation-model. *Aviat Space Environ Med* 1993, 64: 212–8
5. Akima H, Kubo K, Imai M, Kanehisa H. Inactivity and muscle: effect of resistance training during bed rest on muscle size in the lower limb. *Acta Physiol Scand* 2001, 172:269–278
6. Belavy DL, Miokovic T, Armbrecht G, Richardson CA. Differential atrophy of the lower-limb musculature during prolonged bed-rest. *Eur J Appl Physiol* 2009, 107: 489–499
7. Akima H, Kubo K, Kanehisa H, Suzuki Y. Leg-press resistance training during 20 days of 6 degrees head-down-tilt bed rest prevents muscle deconditioning. *Eur J Appl Physiol* 2000, 82:30–38
8. Alkner BA, Tesch PA. Efficacy of a gravity-independent atrophy during 29-day bed rest. *Acta Physiol Scand* 2004a, 181:345–357
9. Akima H, Kubo K, Kanehisa H, Suzuki Y. Leg-press resistance training during 20 days of 6 degrees head-down-tilt bed rest prevents muscle deconditioning. *Eur J Appl Physiol* 2000, 82:30–38
10. Akima H, Ushiyama J, Kubo J, Fukuoka H. Effect of unloading on muscle volume with and without resistance training. *Acta Astronaut.* 2007; 60 :728–736
11. Alkner BA, Tesch PA. Efficacy of a gravity-independent resistance exercise device as a countermeasure to muscle atrophy during 29-day bed rest . *Acta Physiol Scand* 2004a, 181:345–357
12. Alkner BA, Tesch PA . Knee extensor and plantar flexor muscle size and function following 90 days of bed rest with or without resistance exercise. *Eur J Appl Physiol.* 2004; 93: 294–305
13. Berry P, Berry I, Manelfe C. Magnetic-resonance-imaging evaluation of lower-limb muscles during bed rest a microgravity simulation-model. *Aviat Space Environ Med* 1993, 64:212–218
14. Cao P, Kimura S, Macias BR, Ueno T, Waterpaugh DE, Hargens AR . Exercise within lower body negative pressure partially counteracts lumbar spine deconditioning associated with 28-day bed rest. *J Appl Physiol* 2005, 99:39– 44

15. Kouzaki M, Masani K, Akima H, Shirasawa H. Effects of 20-day bed rest with and without strength training on postural sway during quiet standing. *Acta Physiol (Oxf)*. 2007, 189:279–292
16. Le Blanc A, Gogia P, Schneider V, Krebs J, Schonfeld E, Evans H . Calf muscle area and strength changes after five weeks of horizontal bed rest. *Am J Sports Med* 1988, 16:624–629
17. Le Blanc AD, Schneider VS, Evans HJ, Pientok C, Rowe R, Spector E . Regional changes in muscle mass following 17 weeks of bed rest. *J Appl Physiol* 1992, 73:2172–2178
18. Shackelford LC, LeBlanc AD, Driscoll TB, Evans HJ. Resistance exercise as a countermeasure to disuse-induced bone loss. *J Appl Physiol* 2004, 97:119–129
19. Zange J, Mester J, Heer M, Kluge G, Liphardt AM . 20-Hz whole body vibration training fails to counteract the decrease in leg muscle volume caused by 14 days of 6 degrees head down tilt bed rest . *Eur J Appl Physiol* 2009Jan,105(2):271-7
20. Boos N, Wallin Å, Gbedegbegnon T, Aebi M, Boesch C. Quantitative MR imaging of lumbar intervertebral disks and vertebral bodies: influence of diurnal water content variations . *Radiology* 1993,188:351–4.
21. Le Blanc AD, Evans HJ, Schneider VS, Wendt RE, Hedrick TD. Changes in intervertebral disc cross-sectional area with bed rest and space flight . *Spine* 1994,19:812–7.
22. Pavly-Le Traon A, Heer M, Narici MV, Rittewer J, Vernicos J. From space to Earth: advances in human physiology from 20 years of bed rest studies (1986–2006) . *Eur J Appl Physiol* 2007,101:143–94.
23. Natarajan RN, Andersson GB . The influence of lumbar disc height and cross-sectional area on the mechanical response of the disc to physiologic loading . *Spine* 1999,24:1873–81.
24. Adams MA, Dolan P, Hutton WC, Porter RW. Diurnal changes in spinal mechanics and their clinical significance . *J Bone Joint Surg Br* 1990,72:266–70.
25. Lu YM, Hutton WC, Gharpuray VM . Do bending, twisting, and diurnal fluid changes in the disc affect the propensity to prolapse? A viscoelastic finite element mode I . *Spine* 1996,21:2570–9.
26. McGill SM . Kinetic potential of the lumbar trunk musculature about three orthogonal orthopaedic axes in extreme postures . *Spine* 1991,16: 809–15.
27. Panjabi M, Abumi K, Duranceau J, et al . Spinal stability and Intersegmental muscle forces. A biomechanical model . *Spine* 1989,14:194–200.
28. Lucas DB, Bresler B. Stability of the Ligamentous Spine, Technical Report No. 40. San Fransisco, CA: Biomechanics Laboratory, University of California;1961
29. Kiefer A, Shirazi-Adl A, Parnianpour M . Synergy of the human spine in neutral postures. *Eur Spine J* 1998,7:471–9.
30. Wilke HJ, Wolf S, Claes LE, Aran M, Wiesend A. Stability increase of the lumbar spine with different muscle groups . a biomechanical in-vitro study. *Spine* 1995,20: 192–8.
31. Macintosh JE, Bogduk N . The biomechanics of the lumbar multifidus . *Clin Biomech* 1986,1:205–31.
32. Claus AP, Hides JA, Moseley GL, Hodges PW. Different ways to balance the spine: subtle changes in sagittal spinal curves affect regional muscle activity. *Spine* 2009,34(6)
33. Kiefer A, Shirazi-Adl A, Parnianpour M . Stability of the human spine in neutral postures. *J Eur Spine* 1997,6:45–53.
34. Alaimo MA, Smith JL, Roy RR, Edgerton VR . EMG activity of slow and fast ankle extensors following spinal cord transection. *J Appl Physiol* 1984, 56: 1608–1613,
35. Blewett C, Elder GC . Quantitative EMG analysis in soleus and plantaris during hindlimb suspension and recovery. *J Appl Physiol* 1993, 74: 2057–2066
36. Clément G, Gurfinkel VS, Lestienne F, Lipshits MI, Popov KE . Adaptation of postural control to weightlessness. *Exp Brain Res* 1984,57: 61–72
37. Clément G, Gurfinkel VS, Lestienne F, Lipshits MI, Popov KE . Changes of posture during transient perturbations in microgravity. *Aviat Space Environ Med* 1985 ,56: 666–671
38. Riley DA, Slocum GR, Bain JL, Sedlak FR, Sowa TE, Mellender JW. Rat hindlimb unloading: soleus histochemistry, ultrastructure, and electromyography. *J Appl Physiol* 1990, 69: 58–66,
39. Lovejoy CO. The natural history of human gait and posture. Part 1. Spine and pelvis. *Gait & Posture* 2005, 21: 95–112
40. Saunders SW, Coppieters MW, Magarey M, Hodges PW. Reduced tonic activity of the transversus abdominis muscle during locomotion in people with low back pain .5th World Congress on Low Back & Pelvic Pain, Melbourne, Australia, 2004
41. Saunders SW, Rath D, Hodges PW . Postural and respiratory activation of the trunk muscles changes with mode and speed of locomotion . *Gait &Posture* 2005,20: 280–290
42. Rittweger J and Felsenberg D. Patterns of bone loss in bed-ridden healthy young male subjects: Results from the Long Term Bed Rest Study in Toulouse . *J Musculoskel Neuron Interact* 2003, 3(4): 290-291
43. Le Blanc A, Schneider V, Spector E, Evans H, Rowe R, Lane H. Calcium absorption, endogenous secretion and endocrine changes during and after long-term bed rest . *Bone* 1995, 16:301S–304S
44. Le Blanc AD, Driscoll TB, Shackelford LC, Evans HJ, Rianon NJ, Smith SM. Alendronate as an effective countermeasure to disuse induced bone loss. *J Musculoskel Neuron Interact* 2002, 2:335–343
45. Miyamoto A, Shigematsu T, Fukunaga T, Kawakami K, Mukai C, Sekiguchi C. Medical baseline data collection on bone and muscle change with space flight. *Bone* 1998, 22:79S–82S

46. Smith SM, Davis-Street JE, Fesperman JV, Calkins DS, Bawa Maneesh, Macias Brandon R. Evaluation of treadmill exercise in a lower body negative pressure chamber as a countermeasure for weightlessness-induced bone loss: a bed rest study with identical twins. *J Bone Miner Res* 2003, 18:2223–2230
47. Smith SM, Wastney ME, O'Brien KO, Morukov BV, Larina LM, Abrams SD. Bone markers, calcium metabolism, and calcium kinetics during extended duration space flight on the Mir space station . *J Bone Miner Res* 2005, 20:208–218
48. Van der Wiel HE, Lips P, Nauta J, Kwakkel G, Hazenberg G, Netelenbos JC. Intranasal calcitonin suppresses increased bone resorption during short-term immobilization: a double-blind study of the effects of intranasal calcitonin on biochemical parameters of bone turnover. *J Bone Miner Res* 1993, 8:1459–1465
49. Zerwekh JE, Ruml LA, Gottschalk F, Pak Charles YC. The effects of twelve weeks of bed rest on bone histology, biochemical markers of bone turnover, and calcium homeostasis in eleven normal subjects. *J Bone Miner Res* (1998) 13:1594–1601
50. Le Blanc A, Schneider V, Shackelford L, West S, Oganov V, Bakulin A, Voronin L. Bone mineral and lean tissue loss after long duration space flight. *J Musculoskeletal Neuronal Interact* 2000, 1:157–160
51. Lang T, LeBlanc A, Evans H, Lu Y, Genant H, Yu A. Cortical and trabecular bone mineral loss from the spine and hip in long-duration spaceflight. *J Bone Miner Res* 2004, 19:1006–1012
52. Belavý DL, Bock O, Börst H, Armbrecht G, Gast U. The 2nd berlin bedrest study: protocol and implementation . *J Musculoskeletal Neuronal Interact* 2010, 10(3):207-219
53. Belavy Daniel L, Richardson Carolyn A, Wilson Stephen J, Felsenberg Dieter. Tonic-to-phasic shift of lumbo-pelvic muscle activity during 8 weeks of bed rest and 6-months follow up. *J Appl Physiol* 2007 , 103:48–5
54. Belavy Daniel L, Armbrecht Gabriele, Richardson Carolyn A, Fels enberg Dieter. Muscle atrophy and changes in spinal morphology: is the lumbar spine vulnerable after prolonged bed-rest? *Spine (Phila Pa 1976)* 2011, Jan 15, 36(2):137-45.
55. Hides Julie A, Belavy Daniel L, Stanton Warren, Wilson Stephen J, Rittweger Joern. Magnetic resonance imaging assessment of trunk muscles during prolonged bed rest. *SPINE* 2007, 32(15):1687–1692
56. Rittweger J, Belavy D, Hunek , Boerst U. Highly demanding resistive vibration exercise program is tolerated during 56 days of strict bed-rest. *Int J Sports Med* 2006, Jul 27(7):553-9
57. Belavy DL, MiokovicT, Rittweger J. Estimation of changes in volume of individual lower-limb muscles using magnetic resonance imaging (during bed-rest).*Physiol Meas* 2011, Jan 32(1):35-50.
58. Belavý, Daniel L, Hides, Julie A. Resistive simulated weightbearing exercise with whole body vibration reduces lumbar spine deconditioning in bed-rest . *Spine (Phila Pa 1976)* 2008,Mar 33(5):E121-131
59. Belavy DL, Armbrecht G, Gast U, Richardson CA, Hides JA, Felesenberg D. Countermeasures against lumbar spine deconditioning in prolonged bed rest: resistive exercise with and without whole body vibration. *J Appl Physiol* 2010, Dec 109(6):1801-11.
60. Belavý DL, Miokovic T, Armbrecht G, Rittweger J. Resistive vibration exercise reduces lower limb muscle atrophy during 56-day bed-rest . *J Musculoskeletal Neuronal Interact* (2009); 9(4):225-235
61. Hides Julie A, Lambrecht Gunda, Richardson Carolyn A, Stanton Warren R. The effects of rehabilitation on the muscles of the trunk following prolonged bed rest. *Eur Spine J* 2011, May 20(5):808-18
62. Rudnick J, Püttmann B, Tesch PA, Alkner B. Differential expression of nitric oxide synthases (NOS 1-3) in human skeletal muscle following exercise countermeasure during 12 weeks of bed rest. *FASEB J* 2004, Aug 18(11):1228-30
63. Michele S, Gudrun S and Dieter B. Atypical fast SERCA1a protein expression in slow myofibers and differential S-nitrosylation prevented by exercise during long term bed rest . *Histochem Cell Biol* 2009, Oct 132(4) 383-94.
64. Michele S, Gudrun S, Jorn R, Dieter F. Ryanodine receptor type-1 (RyR1) expression and protein S-nitrosylation pattern in human soleus myofibres following bed rest and exercise countermeasure. *Histochem Cell Biol* 2008, Jul 130(1):105-18
65. Muller ER, Horstman AM, Stegeman DF, deHaan A, Belavy DL, Miokovic T, Armbrecht G, Felesenberg, Gerrits KH. Influence of vibration resistance training on knee extensor and plantar flexor size, strength, and contractile speed characteristics after 60 days of bed rest . *J Appl Physiol* 2009,Dec 107(6):1789-98.
66. Belavý DL, Beller G, Armbrecht G, Perschel FH.Evidence for an additional effect of whole-body vibration above resistive exercise alone in preventing bone loss during prolonged bed rest .*Osteoporos Int* 2011 May 22(5):1581-91
67. Armbrecht G, Belavý DL, Gast U, Bongrazio M. Resistive vibration exercise attenuates bone and muscle atrophy in 56 days of bed rest: biochemical markers of bone metabolism . *Osteoporos Int* 2010,21:597–607
68. Rittweger J, Frost HM, Schiessl H, Ohshima H, Alkner B, Tesch P, Felesenberg D. Muscle atrophy and bone loss after 90 days' bed rest and the effects of flywheel resistive exercise and pamidronate: results from the LTBR study. *Bone* 2005, Jun;36(6):1019-29
69. Miokovic T, Armbrecht G, Felesenberg D, Belavy DL. Differential atrophy of the postero-lateral hip musculature during prolonged bed-rest and the influence of exercise countermeasures.*J Appl Physiol* 2011, April 10 (4):926-934
70. Blottner D, Salanova M, Puttmann B, Schiffel G, Felesenberg D, Buehring B, Rittweger J. Human skeletal muscle structure and function preserved by vibration muscle exercise following 55 days of bed rest . *EUR J Appl Physiol* 2006, Jun;97(3):261-71

71. Belavy DL, Ng JK, Wilson SJ, Armbrecht G, Stegeman DF, Rittweger J, Felesenberg D, Richardson CA . Influence of prolonged bed-rest on spectral and temporal electromyographic motor control characteristics of the superficial lumbo-pelvic musculature . *J Electromayogr Kinesiol* 2010;20(1): 170-9.
72. Salanova M, Schiffl G, Püttmann B, Schoser B G and Blottner D. Molecular biomarkers monitoring human skeletal muscle fibres and microvasculature following long-term bed rest with and without countermeasures . *J. Anat* 2008;212: 306-318
73. Rittweger J and Felsenberg D . Patterns of bone loss in bed-ridden healthy young male subjects: Results from the Long Term Bed Rest Study in Toulouse . *J Musculoskel Neuron Interact* 2003, (4): 290-291
74. Belavý DL, Richardson CA, Wilson SJ, Rittweger J, Felsenberg D. Superficial lumbopelvic muscle overactivity and decreased cocontraction after 8 weeks of bed Rest. *Spine (Phila Pa 1976)* 2007, Jan 32 (1): E 23-9.

Review Article

Systematic review article of Berlin Bedrest studies about prolonged bedrest effects on lower limb musculoskeletal system

Mahmoodi R¹, Mousavi SJ^{2*}

1.MSc Student of Physiotherapy

2. Assistant Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Tehran University of Medical Sciences

Abstract

Background and Aim: Many studies have been carried out about bedrest and its effects on different systems including musculoskeletal, neuromuscular, cognition and vascular systems throughout the world. The purpose of this paper is to review systematically all Berlin Bedrest Studies on musculoskeletal system. The focus of this review is mainly Second Berlin Bedrest Study (2nd BBRS) supported by European Space Agency(ESA). Such studies provide a chance to study the specific effects of immobilization without interference of other diseases.

Materials and Methods: A literature search was carried out using MEDLINE and ESA database to assess existing literature about the effect of bedrest on musculoskeletal system published by Berlin Bedrest Studies. It has been searched for efficacy of interventions as high load resistive exercise and whole body vibration, as well.

Results: Forty six articles have been found from 2000 to 2011 year: 2 articles in 2000 and 2003, the other ones between 2005 to 2011. Seventeen articles were related to muscle and intervention on it, three ones about bone and related intervention on it, four ones related to both bone and muscle and twenty two ones about the other systems such as heart, vessels, sleep and cognition.

Conclusion: According to study results, bedrest has widespread effects on musculoskeletal system specially in early bedrest. These effects remain up to 180 days after bedrest course. Thus, high load resistive exercise and vibration should be prescribed in early stage of bedrest to reduce the detrimental effects of prolonged bedrest.

Key words: Berlin Bedrest, Muscle Atrophy, Bone Loss, Resistive Exercise, Vibration

***Corresponding author:** Mousavi SJ; Faculty of Rehabilitation Science, Tehran University of Medical Sciences.

E-mail: jmousavi@razi.tums.ac.ir

This research was supported by Tehran University of Medical Sciences (TUMS)