

# تغییرات الگوی فلکشن ریلکسیشن بدنبال تکرار حرکت و خستگی در حین فلکشن گردن

دکتر سعید طالبیان<sup>۱</sup>، دکتر غلامرضا علیایی<sup>۲</sup>

۱- دانشیار گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲- استاد گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

**زمینه و هدف:** شناخت اثرات خستگی بر روی پاسخ حرکتی متعاقب آن می تواند به درک روشهای درمانی کمک کند. تعیین مکانیسمی (انقباض ارادی حداکثر و یا تکرار حرکت) که در طی آن سبب تغییر در پیامهای مرکزی و انتقال عصبی عضلانی شود می تواند از اهمیت ویژه ای در ارزیابی و یا درمان بیماران برخوردار باشد. اینکه متعاقب خستگی، پاسخ اجزای نورال یا استئولیگامنتال کدامیک مهم هستند امروزه جای بحث دارد. در عضلات پاراسپینال به دلیل اهمیت آن در حفظ پوسچر و راستای ستون فقرات رفتار عضلات به دنبال بروز خستگی بسیار مهم است. رفتار و الگوی حرکتی ستون فقرات کمری و یا گردنی بدنبال خستگی می تواند ناشی از بروز اختلال در پیوندگاه عصبی عضلانی و یا بوجود آمدن محدودیت در پاسخ رفلکسی این سیستم باشد. تأثیر رفلکس تنها مختص عضله خسته شده نیست بلکه در عضلات سینرژیک هم مشاهده می گردد همچنین مشخص شده که هم پروسه های تحریک و هم مهارتی نقش مهمی در این فرایند دارند.

**روش بررسی:** تعداد ۲۰ فرد سالم (۱۰ زن و ۱۰ مرد) پس از تکمیل پرسشنامه، توجیه و آموزش اولیه در این پژوهش شرکت کردند. آزمایشات شامل ۱- تمرین گرم کردن ۲- قرار دادن الکترودهای ثبات الکترومیوگرافی بر روی عضلات اکستانسور گردن در سمت غالب در محدوده مهره های دوم و چهارم. ۳- انجام پنج حرکت اصلی فلکشن گردن در حالت نشسته راحت روی صندلی در دامنه کامل بدون اعمال مقاومت خارجی ۴- آزمون خستگی شامل الف - حداکثر قدرت ایزومتریک در دامنه میانی حرکت به مدت حداکثر سه دقیقه با کنترل توسط داینامومتر تا رسیدن به مرز خستگی فرد (شروع کاهش فعالیت الکترومیوگرافی و نیروی انقباضی). ب- انجام ۵۰ تکرار فلکشن ریلکسیشن مکرر و مداوم در دامنه کامل. ۵- بلافاصله بعد از بروز خستگی مانند مرحله سوم شامل انجام پنج حرکت فلکشن اکستنشن گردن در دامنه کامل بدون اعمال مقاومت خارجی. از پنج تکرار، سه تکرار وسط جهت بررسی انتخاب می شدند. درجه بروز کاهش و عدم فعالیت عضلانی در حرکت فلکشن در قبل و بعد از دو نوع خستگی، در چه شروع فعالیت مجدد عضلانی در حرکت اکستنشن در قبل و بعد از دو نوع خستگی، مدت زمان بی فعالیتی در قبل و بعد از دو نوع خستگی و تغییرات میانگین فعالیت الکترومیوگرافی برحسب RMS در قبل و بعد از خستگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

**یافته ها:** مقایسه دو نوع خستگی نشان داد که تفاوت عمده ای بین دو نوع خستگی وجود دارد و تنها در دامنه حرکتی و همچنین فعالیت اکستنتریک این تفاوتها معنی دار نیست و در مجموع اختلافات در نوع ایزومتریک با کاهش بیشتری نسبت به سیکلیک یا حرکات تکراری همراه بوده است.

**نتیجه گیری:** در حرکات گردن پاسخ فلکشن ریلکسیشن اتفاق می افتد. تکرار حرکت و فعالیت ایزومتریک سبب بروز خستگی و اثر بر درجه عدم فعالیت شد. زمان سکوت دچار کاهش شد که به نظر می رسد زمان شروع مجدد فعالیت عضلات اکستانسور گردن زودتر اتفاق می افتد و به سمت زوایای میانی و خارجی حرکت می کند این امر نشان دهنده عدم مزیت مکانیکی عوامل غیر انقباضی در ناحیه گردن می باشد که سبب کاهش این زمان گردیده و به عبارتی عضلات اکستانسور بیشترین مسئولیت را در حفظ وضعیت و کنترل حرکت دارند. مقایسه دو نوع بروز خستگی نشان داد که فعالیت ایزومتریک خستگی بیشتری را سبب شده است و شاخص های طیف فرکانس نظیر میانه و متوسط کاهش بیشتری را نشان داده اند.

**کلیدواژه ها:** خستگی عضلانی، پاسخ فلکشن ریلکسیشن، حرکت گردن.

(وصول مقاله: ۱۳۸۸/۸/۱۶ پذیرش مقاله: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳)

**نویسنده مسئول:** تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه فیزیوتراپی

e-mail: talebian@sina.tums.ac.ir

## مقدمه

گیری برای برگشت تنه از حالت خم شده به جلو عضلات پاراسپینال فراخوانی شده و با انقباض کانسنتریک تنه را بر خلاف جاذبه بلند کرده و به حالت ایستاده برمی گرداند. به عبارت دیگر پس از یک محدوده زمانی خاموشی فعالیت، مجدداً فعال می شود. این پدیده سه فازی تحت عنوان فلکشن ریلکسیشن، موضوع بسیاری از تحقیقات در راستای ارزیابی کنترل حرکت است (۱-۱۱). برخلاف تحقیقات بر روی ستون فقرات کمری، ما شاهد تحقیقات محدودتری در این زمینه بر روی ستون فقرات گردنی هستیم. Carlsoo مطرح کرد که پدیده ریلکسیشن در

مطالعه بر روی رفتار کنترل حرکت در ستون فقرات کمری بسیار گسترده است. امروزه مطالعات زیادی بر روی رفتار الگوی حرکتی در بین افراد سالم و بیماران مبتلابه کمر درد انجام شده است. یکی از مهم ترین تحقیقات ارزیابی رفتار بکارگیری و زمانبندی فعالیت عضلات پاراسپینال است. در این راستا به دنبال فلکشن به سمت جلو فعالیت عضلات اکستانسور که در جهت کنترل تنه بصورت اکسنتریک فعال می شوند در محدوده ای از دامنه حرکتی از فعالیت آن کاسته شده و ادامه کنترل تنه به عوامل غیر انقباضی سپرده می شود. از طرفی به دنبال تصمیم

گردن وجود ندارد (۱۲). همچنین **Pauly** وجود ناکامل ریلکسیشن را در گردن ناشی از بعضی عوامل ثبات دهنده در گردن و لزوم فعالیت عضلات برای حمایت از سر در حین فلکشن گردن دانست (۱۳).


نکته قابل توجه در این دو گزارش عدم کنترل وضعیت تنه و سرعت حرکت سر و فلکشن گردن بود. در مطالعات ناحیه کمری مشخص شده است که سرعت حرکت آهسته سبب نمایان شدن بهتر پدیده ریلکسیشن است و وضعیت ران و لگن تاثیر زیادی بر آن دارد. **Meyer** و همکارانش بررسی دقیق تری برای ارزیابی پاسخ فلکشن ریلکسیشن داشتند که با کنترل تنه و سرعت آهسته حرکت توانستند با تکرار پذیری بالایی موفق به گزارش دامنه بروز ریلکسیشن و تعیین زمان سکوت و شروع مجدد فعالیت میوالکتریک عضلات پاراسپینال شوند (۱۴). بررسی روی اثر تکرار حرکت بر روی پاسخ فلکشن ریلکسیشن در ناحیه کمر انجام شده است که کاهش دامنه در خاتمه فعالیت و شروع مجدد آن گزارش شده است. این پاسخ با افزایش زمان سکوت همراه بوده است (۱۵ و ۱۰).

### روش بررسی

تعداد ۲۰ فرد سالم (۱۰ زن و ۱۰ مرد) در محدوده سنی ۲۰-۳۰ سال پس از تکمیل پرسشنامه، توجیه و آموزش

اولیه در این پژوهش شرکت کردند. مدت آزمون ۴۵ تا ۶۰ دقیقه بود و در دو جلسه انجام شد. آزمون شامل پنج مرحله بود: مرحله اول: شامل پر کردن بخش اول پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک و سؤالاتی در مورد وضعیت تندرستی آنها آشنایی با آزمایش و دستگاه و شرایط و نحوه آزمون و تمرین گرم کردن افراد بود. مرحله دوم: آماده سازی فرد و قرار دادن الکترودهای ثبات الکترومیوگرافی بر روی عضلات اکستانسور گردن در سمت غالب در محدوده مهره های دوم و چهارم حدود ۲ سانتیمتر خارج زوائد خاری مهره ها. مرحله سوم: انجام پنج حرکت اصلی فلکشن گردن در حالت نشسته راحت روی صندلی بطوریکه چانه نزدیک جناغ برسد در دامنه کامل بدون اعمال مقاومت خارجی (از پنج تکرار، سه تکرار وسطی جهت بررسی انتخاب می شد) (شکل ۱).

مرحله چهارم: آزمون خستگی شامل الف - حداکثر قدرت ایزومتریک در دامنه میانی حرکت به مدت حداکثر سه دقیقه با کنترل توسط داینامومتر تا رسیدن به مرز خستگی فرد (شروع کاهش سطح فعالیت الکترومیوگرافی و نیروی انقباضی).  
ب- در جلسه ای جداگانه انجام ۵۰ تکرار فلکشن ریلکسیشن مکرر و مداوم در دامنه کامل. مرحله پنجم: بلافاصله بعد از بروز خستگی مانند مرحله سوم شامل انجام پنج حرکت فلکشن اکستنشن گردن در دامنه کامل بدون اعمال مقاومت خارجی (از پنج تکرار، سه تکرار وسطی جهت بررسی انتخاب می شد) بود. سپس مراتب پاسخ فلکشن ریلکسیشن تعیین می گردید (شکل ۲).



شکل ۱- تکرار حرکات و ثبت پاسخ فلکشن ریلکسیشن در عضلات اکستانسور گردن



## شکل ۲- مراتب محاسبه پاسخ فلکشن ریلکسیشن در عضلات اکستانسور گردن

### نتایج

در این مطالعه افراد بین سنین ۲۰ تا ۳۰ سال، با متوسط سن ۶۵/۲۳ سال، وزن ۸۰/۶۳ کیلوگرم، قد ۱/۶۸ متر و شاخص جرم بدن ۲۲/۴۷ شرکت داشتند. میانه طیف فرکانس الکترومیوگرافی اکستانسور گردن در قبل و بعد از خستگی به دو روش ایزومتریک و دوره‌ای (سیکلیک) یا داینامیک محاسبه شد. نتایج نشان داد میانه طیف فرکانس از ۹۸/۴۰ به ۷۴/۰۴ هرتز در فعالیت ایزومتریک و از ۷۶/۹۹ به ۳۸/۵۰ در روش سیکلیک رسید ( $P < 0.005$ ). در زمان فلکشن گردن در دامنه‌ای از حرکت فعالیت عضلات اکستانسور گردن کاهش یافته و خاتمه می‌یابد. این دامنه در قبل و بعد از خستگی در جدول ۱ مقایسه شده‌اند. همچنین در برگشت از فلکشن که حرکت اکستنشن مهره‌های گردن می‌باشد مجدداً عضلات شروع به فعالیت کرده که میزان درجه‌ای که در آن حرکت فعالیت شروع شده‌است نیز در همین جدول آمده‌است.

در این تحقیق از دستگاه الکترومیوگرافی مدل **Data log**، کامپیوتر و سایر متعلقات این دستگاه استفاده گردید. از کلیه اطلاعات بدست آمده از این مراحل برای بررسی تغییرات قدرت عضله بصورت اکستریک و کانستریک، درجه بروز فلکشن ریلکسیشن و شروع مجدد فعالیت و همچنین زمان عدم فعالیت عضلانی استفاده شد (شکل ۲). متغیرهای این تحقیق شامل موارد زیر بودند: ۱- درجه بروز کاهش و عدم فعالیت عضلانی در حرکت رفت یا فلکشن در قبل و بعد از دو نوع خستگی ۲- در چه شروع فعالیت مجدد عضلانی در حرکت برگشت یا اکستنشن گردن در قبل و بعد از دو نوع خستگی. ۳- مدت زمانی که در بین حرکت فلکشن و اکستنشن گردن عضلات اکستانسور بدون فعالیت هستند در قبل و بعد از دو نوع خستگی. ۴- تغییرات میانگین فعالیت الکترومیوگرافی برحسب **RMS** در قبل و بعد از خستگی.

جدول ۱- مقایسه میانگین و انحراف معیار درجه خاتمه و شروع فعالیت الکترومیوگرافی در قبل و بعد از بروز خستگی

سطح معنا داری	شروع (درجه)		سطح معنا داری		خاتمه (درجه)		میانگین	انحراف معیار
	بعد از خستگی	قبل از خستگی	ایزومتریک	سیکلیک	بعد از خستگی	قبل از خستگی		
ایزومتریک	۴۷/۸۵	۳۴/۸۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱۶/۲۲	۲۳/۵۹	۳۱/۲۴	
سیکلیک	۰/۰۰۱	۱۵/۶۷	۱۱/۳۹	۱۲/۴۹	۶/۹۶	۱۰/۱۲	۱۰/۰۳	۰/۱۲

حالت فلکشن گردن بصورت اکستریک و در حالت اکستنشن آن بصورت کانستریک با شاخص **RMS** در قبل و بعد از خستگی به دو روش، مورد بررسی قرار گرفت که در جدول ۲ گزارش شده‌است.

دامنه حرکتی در گردن طی حرکت فلکشن و اکستنشن تفاوت معنی داری را در بعد از خستگی نشان ندادند. لذا بروز خستگی تنها بر مکانیزم کنترل حرکت بیشتر اثر داشته است. همچنین میزان فعالیت عضلات اکستانسور گردن در

### جدول ۲- مقایسه میانگین و انحراف معیار میزان فعالیت الکترومیوگرافی در قبل و بعد از بروز خستگی

سطح معنا داری	فعالیت کانستریک (میکروولت)			فعالیت اکستریک (میکروولت)			میانگین
	قبل از خستگی	بعد از خستگی	سیکلیک	قبل از خستگی	بعد از خستگی	سیکلیک	
سیکلیک	۱۶/۸۱	۱۲/۸۱	۹/۸۹	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۹/۹۳	۱۵/۳۲
ایزومتريک	۳/۲۷	۳/۳۸	۳/۲۱	۴/۷۶	۴/۰۷	۴/۴۴	۴/۴۴
سیکلیک	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱

تفاوت‌ها معنی دار نیست و در مجموع اختلافات در نوع ایزومتريک با کاهش بیشتری نسبت به سیکلیک یا حرکات تکراری همراه بوده‌است (جدول ۳).

مقایسه دو نوع خستگی نشان داد که تفاوت عمده‌ای بین دو نوع خستگی وجود دارد و تنها در زمان عدم فعالیت یا سکوت و دامنه حرکتی و همچنین فعالیت اکستریک این

### جدول ۳- مقایسه میانگین متغیرهای پاسخ فلکشن ریلکسیشن در بعد از خستگی ایزومتريک با دوره‌ای (سیکلیک)

Sig.(2-tailed)	df	t	Mean Difference	
۰/۰۱۱	۳۸	-۲/۶۸	-۷/۳۷	خاتمه فعالیت
۰/۰۰۵	۳۸	۳/۰۱	۱۳/۰۵	شروع فعالیت
۰/۲۹۶	۳۸	-۱/۰۵	-۱/۱۷	عدم فعالیت
۰/۱۴	۳۸	-۱/۴۹	-۱/۹۶	دامنه حرکتی
۰/۰۷۲	۳۸	-۱/۸۴	-۲/۳۸	فعالیت اکستریک
۰/۰۰۷	۳۸	-۲/۸۶	-۲/۹۲	فعالیت کانستریک
۰/۰۰۰	۳۸	-۶/۴۴	-۲۸/۷۷	فرکانس متوسط
۰/۰۰۰	۳۸	-۱۱/۱۸	-۳۵/۵۴	فرکانس میانه

### بحث

زمان گردیده و به عبارتی عضلات اکستانسور بیشترین مسئولیت را در حفظ وضعیت و کنترل حرکت دارند. مقایسه دو نوع بروز خستگی نشان داد که فعالیت ایزومتريک خستگی بیشتری را سبب شده‌است و شاخص‌های طیف فرکانس نظیر میانه و متوسط کاهش بیشتری را نشان داده‌اند. در حرکت ریتیمیک جابجایی درجه عدم فعالیت یا **Offset** به سمت زوایای کمتر و دامنه خارجی بیشتر از انقباض ایزومتريک است به عبارت دیگر در حرکات تکرار شونده نوعی تطابق بوجود می‌آید و عضلات بتدریج یاد می‌گیرند بصورت سوئیچی وارد شده و حرکت سر و گردن را کنترل نمایند و تغییر الگوی حرکتی بارزتری را نشان می‌دهند. از طرف دیگر در حرکات تکراری شروع مجدد عضلات زودتر از نوع دیگر خستگی اتفاق می‌افتد که می‌تواند سبب کاهش زمان سکوت شود. این زودتر فعال شدن عضلات ناشی از تاثیر حرکات تکراری بوده و همانطور که در زمان فلکشن گردن عضلات سریع تر خاموش شده در زمان اکستشن برعکس

این مطالعه نشان داد که در حرکات گردن پاسخ فلکشن ریلکسیشن اتفاق می‌افتد که با سایر مطالعات در این زمینه مطابقت دارد و پدیده سه فازی تحت عنوان پاسخ فلکشن ریلکسیشن دیده می‌شود (۱۱-۱). برخلاف نظر **Carlsoo** که مطرح کرد پدیده ریلکسیشن در گردن وجود ندارد و **Pauly** که آن را ناکامل می‌دانست ما این پدیده را مشاهده کردیم (۱۲،۱۳). یافته ما در این تحقیق با نتایج **Meyer** و همکارانش در خصوص ثبت پاسخ فلکشن ریلکسیشن همسو است (۱۴). تکرار حرکت و فعالیت ایزومتريک سبب بروز خستگی و اثر بر درجه عدم فعالیت شد که با نتایج مشابه در روی ستون فقرات کمری در یک راستا است (۱۵، ۱۰) ولی در مورد زمان سکوت تفاوت مهمی وجود دارد به نحوی که در نتایج ما کاهش این زمان مشاهده شد. به نظر می‌رسد زمان شروع مجدد فعالیت عضلات اکستانسور گردن زودتر اتفاق می‌افتد و به سمت زوایای میانی و خارجی حرکت می‌کند این امر نشان دهنده عدم مزیت مکانیکی عوامل غیر انقباضی در ناحیه گردن می‌باشد که سبب کاهش این

سریعتر فعال می‌شوند تا کنترل بیشتری را که ناشی از شتاب حرکت بر سر و سگردن است داشته باشند. لذا در حرکات تکراری احتمال بروز ضایعه و اختلال عملکرد وجود دارد و در مواردی که افراد مجبور هستند در محیط‌های کاری حرکات مداوم در ناحیه گردن داشته باشند باید مراقبت بیشتری را از نظر بروز ضایعات بعمل آورند.

### قدردانی

این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی تحت عنوان تغییرات الگوی فلکشن ریلکسیشن بدنبال تکرار حرکت و خستگی در حین فلکشن گردن با همکاری و حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۸۸-۱۳۸۷ با شماره ۶۸۴۸ انجام شده است و مؤلفین بدینوسیله مراتب قدرانی و تشکر خویش را اعلام می‌دارند.

**REFERENCES**

1. Panjabi MM. The stabilizing system of the spine, part I: function, dysfunction, adaptation, and enhancement. *J Spinal Disord.* 1992;5:383-389.
2. Panjabi MM. The stabilizing system of the spine, part II: neutral zone and instability hypothesis. *J Spinal Disord.* 1992;5:390-396.
3. Kaigle AM, Wessberg P, Hansson TH. Muscular and kinematic behavior of the lumbar spine during flexion-extension. *J Spinal Disord* 1998;11:163 - 74.
4. Floyd WF, Silver PHS, Function of the erector spinae muscles in flexion of the trunk. *Lancet*, 1951 Jan 20;1(6647):133-4.
5. Floyd WF, Silver PHS : The Function of the erector spinae in certain movements and postures in man .*J physiol.* 1955;129:184-203.
6. Colloca CJ, Hinrichs RN. The biomechanical and clinical significance of the lumbar erector spinae flexion-relaxation phenomenon: a review of literature. *J Manipulative Physiol Ther.* 2005;28(8):623-31.
7. Shin G, Shu Y, Li Z, Jiang Z, Mirka G. Influence of knee angle and individual flexibility on the flexion-relaxation response of the low back musculature. *J Electromyogr Kinesiol.* 2004;14(4):485-94.
8. Solomonow M, Baratta RV, Banks A, Freudenberger C, Zhou BH. Flexion-relaxation response to static lumbar flexion in males and females. *Clin Biomech (Bristol, Avon).* 2003;18(4):273-9.
9. Kippers V, Parker AW. Toe-touch test a measure of its validity. *Physical Therapy* 1987;67(11):1680-1685.
10. Olson MW, Li L, Solomonow M. Flexion-relaxation response to cyclic lumbar flexion. *Clin Biomech (Bristol, Avon).* 2004;19(8):769-76.
11. Holm S, Indahl A, Solomonow M. Sensorimotor control of the spine. *Journal of Electromyography and Kinesiology.* 2002; 12: 219-234.
12. Carlsoo S. The static muscle load in different work position. *Ergonomics.* 1961; 4:193-211,
13. Pauly JE. An electromyographic analysis of certain movements and exercises, *Anat. Rec.,* 1966;223-224
14. Meyer JJ, Berk RJ, Anderson AV. Recruitment patterns in the cervical paraspinal muscle during cervical forward flexion. *Electromyogr. Clin. Neurophysiol.* 1993;33: 217-223
15. Olson MW, Li L, Solomonow M. Interaction of viscoelastic tissue compliance with lumbar muscles during passive cyclic flexion-Extension. *J Electromyogr Kinesiol.* 2009 Feb;19(1):30-8.

# Changes of flexion relaxation pattern following rhythmic motion and fatigue during neck flexion

Talebian S<sup>1\*</sup>, Olyaei GR<sup>2</sup>

1-Associate Professor of Tehran University of Medical Sciences

2- Full Professor of Tehran University of Medical Sciences

## Abstract

**Background and aim:** Cognition of fatigue effects on motion response can improve treatment approaches. Determination of mechanism (maximal voluntary contraction and repetition of movement) that cause change of central responses and neuromuscular transmission have specific emphasis in evaluation and treatment of patients. Following fatigue it is arguable which is more important, neural or osteo-ligamental components. Behavior of para spinal muscles due to their roles in control of posture and spinal alignments are more importance. Gesture and motion pattern of neck and lumbar column following fatigue is due to accession of disorder in neuromuscular junction (NMJ) or limitation in reflex response at this system. Reflex influence is not just for muscle fatigue but also it appeared in synergic muscles. It is clear that stimuli and inhibitory ways have important role in this process.

**Materials and Methods:** Twenty normal subjects (10 female and 10 male) contributed in this study. Tests were including: 1- Training and warm up 2- Placement of recording electrodes on neck extensor muscles at second and forth spinal vertebra of dominant side. 3- Five motion of neck flexion and extension in sitting position at full range without external load. 4- Fatigue test, contain; A- Maximal isometric contraction at middle range about 3 minute, which were controlled by a dynamometer until onset of fatigue. B- Fifty dynamic and cyclic motions of neck flexion and extension in full range of it. 5- Perform five motions similar stage 3 immediately after muscle fatigue. Three middle cycles were chosen for evaluation. Degree of off activities in flexion, degree of onset of activities in extension, silent period and mean of muscles activities (RMS), before and after fatigue selected for analysis.

**Results:** Comparison of two type of fatigue indicated that there are significant differences between them. Range of motion and eccentric activity were similar for two conditions. Isometric fatigue showed more effect than cyclic condition.

**Conclusion:** In neck motions flexion relaxation occurred. Dynamic motion and isometric activities caused muscle fatigue and changed silent period. This period reduced and it means that onset of extensor muscle activities occurred very soon and moved to middle and outer ranges. In this manner, naught privilege mechanical of non contractile elements in neck region is cause of this reduction. On the other hand extensor muscles have more responsibility for control and preservation of posture. Comparison of two approaches indicated that isometric activity produce more fatigue and spectral indexes such as median and mean frequency reduced markedly.

**Key words:** Muscle fatigue, Flexion relaxation response, Neck movement.

**\*Corresponding author:**

**Dr. Saeed Talebian, Rehabilitation Faculty, Tehran University of Medical Sciences.**

**E-mail: talebian@sina.tums.ac.ir**

*This research was supported by Tehran University of Medical Sciences (TUMS)*