

شیوع ناقلين و نوع ميكروارگانيسمهای دست پرسنل بخش‌های مختلف مرکز طبی کودکان و ارتباط آن با نوع ماده شوینده

دکتر احمد خداداد، دکتر لادن لامع، دکتر مجید شکیبا (پژوهش عمومی)

مرکز طبی اطفال، بخش گوارش، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: بسیاری از عفونتهاي بيمارستانی که موجب مرگ و تحمل هزینه های زياد بر جامعه می‌شوند از راه تماس دست پرسنل منتقل می‌گردند. شیوع آنها با اقدامات پیشگیری کننده بهداشتی تا ۳۰٪ کاهش می‌یابد. در این مطالعه به بررسی شیوع ناقلين و نوع ميكروب‌های دست پرسنل و ارتباط میزان کاهش آنها با نوع ماده شوینده پرداخته شده است.

مواد و روشها: در این مطالعه نوع و میزان ميكروب‌های دست ۷۲ نفر از پرسنل، قبل و بعد روی چهار گروه که هر یک با یک نوع ماده شوینده دست خود را شستشوی داده بودند بررسی گردید (صابون جامد، صابون مایع و بتادین اسکراب هر کدام ۶۰ نفر و بتادین اسکراب به روش اتاق عمل ۲۶ نفر) و نتایج ميكروبيولوژیک نمونه‌گیری قبل و بعد شستشوی اين افراد با هم مقایسه شدند.

یافته‌ها: ۸۷/۵٪ افراد کشت مشبت داشتند. بیشترین ميكروب‌های بدست آمده از دست پرسنل عبارت بودند از استاف اپیدرمیدیس (۷۹/۴٪)، استاف اورئوس (۴۲/۹٪). نوع ميكروب‌ها با شغل رابطه‌ای نداشت. میزان کاهش کلی کانت یامنی شدن کشت دستها بعد از شستشو با بتادین اسکراب بخش و بتادین اسکراب اتاق عمل بیشتر بود (هریک حدود ۰.۵۳٪(0.05<)). همچنین در ۳۰ نفر از افراد بعد از شستشو با مواد شوینده (صابون جامد، صابون مایع و بتادین اسکراب به روش اتاق عمل) دستهای خود را خشک نموده و سپس نمونه گیری بعمل آمد که میزان منفی شدن در گروه اول ۴۰٪، گروه دوم ۵۰٪ و گروه سوم ۹۰٪ بود. ۱۱ نمونه کشت از شيرهای آب بخشهاي بعمل آمد که همگي مشبت بودند (عمدتاً با گرم منفی‌ها).

نتیجه گیری و توصیه ها: میزان آلودگی ميكروبی دست پرسنل ابا میزان ۷۹٪ رقم بالاني را نشان می‌دهد. نوع ماده شوینده در میزان کاهش عفونتها موثر هستند. (مواد حاوي بتادین مؤثرترند) خشک کردن دستها عامل مهمی در کاهش آلودگیهاست. همچنین شيرهای آب (با آلودگی ميكروبی بالاني در حدود ۱۰۰٪) می‌توانند موجب انتقال ميكروبها و آلودگی مجدد دست پس از شستشو شوند. بهمین دلایل تشویق و آموزش پرسنل به شستشوی صحیح و خشک کردن دستها قبلاً از هر تماس با بیمار و فراهم کردن امکانات لازم و استفاده از شيرهای آب بدون دخالت دست (پدالی یا سنسوری) می‌توانند نقش مهمی در کاهش آلودگی‌هاي بيمارستانی داشته باشند.

مقدمه

و براحتي باشستشو از پوست زدوده می شوند (۴). هدف از شستشوی دست از بين بردن اين فلور می باشد (۲). پرسنل بيمارستانی باید قبل و بعد از تماس با بيمار و بالا فاصله پس از درآوردن دستکش، دستهای خود را بشویند.

عوامل متعددی در نتیجه شستشوی دست مؤثّرند از آن جمله می توان به نوع ماده شوینده، کیفیت، نحوه و زمان شستشو و نحوه خشک کردن دستها بعد از شستشو اشاره کرد. چنانچه مواد شوینده حاوی مواد ضد عفونی کننده باکتریوسیدال باشند، کاهش بیشتری در فلور گذرای پوست بوجود می آید. از میان مواد آنتی باکتریال، ۵. دسته بیشتر از همه مورد استفاده واقع می شوند که عبارتند از:

۱- الکلها

۲- يدوفورها (مثل بتادين)

۳- گلوكونات كلر هگزیدين

۴- هگزاكلروفن

۵- بنزال كونيوم.

از میان اينها بتادين (شایع ترین يدوفور مورد استفاده) و كلر هگزیدين رايچ ترند. بر اساس مدارک بدست آمده از اکثر مطالعات، كلر هگزیدين موثر ترین عامل ضد عفونی کننده دستهای است و پس از آن بتادين در مقام دوم جای دارد (۶). علیرغم اين مسئله كلر هگزیدين بدليل عوارض جانبی چندان مورد استفاده واقع نمی شود و بهمین دليل شایع ترین آنتی باکتریال مورد استفاده بتادين است. شستشو با مواد شوینده اي مثل صابون ميكروارگانيسمهاي مقاوم به آنتى بيوتيك را بطور قابل اطمینان از بين نمي برد (۷،۸). اين روش غير قابل اعتماد ترین متod شستشو بوده و اير قابل توجهی بر مقدار کلي باکتریها ندارد (۷). همانگونه که گفته شد نحوه شستشوی دست در کاهش فلور گذرای پوست نقش ثابت شده اي دارد. نشان داده شده که شستشو به طریق اسکراب جراحی در کاهش ميكروبهای پوست نقش مهمتری دارد. همچنین نشان داده شده که خشک کردن دست پس از شستشو در کاهش ميكروبهای موثر تر است و بویژه در اين مورد خشک کردن با حوله کاغذی از خشک کردن با جريان هوای موثر تر است. بر اساس موارد گفته شده اين مقاله به بررسی و تعیین شیوع ناقلين و نوع ميكروارگانيسمهاي دست

(Nosocomial infections)

همواره يکی از خطرات تهدید کننده بيماران بستری در بيمارستانهاست و در واقع يک مشکل جهانی محسوب ميشود (۱،۲،۳،۴). اين عفونتها در ایالات متحده سالانه در مرگ ۸۷۰۰۰ بيمار دخیل آند و موجب تحمل هزینه سنگینی بالغ بر ۴/۵ ميليارد دلار بر جامعه می شوند (۱،۲). تخمین زده شده که اين عفونتها حداقل ۵٪ بيماران بستری را درگیر می کنند و مدت بستری بيماران را افزایش می دهند (۲). مرگ و میر اين عفونتها حدود ۱٪ است. اهمیت آنها با ايجاد سوشاهای مقاوم به آنتى بيوتيك واستفاده روز افرون از وسائل و اقدامات تهاجمی مثل وسائل لپاراسکوپیک یا اندوسکوپیک دو چندان شده است.

نشان داده شده تمہیداتی که به منظور کاهش اين عفونتها اندیشیده شده است می تواند شیوع آنها را ۳۲٪ کاهش دهد (۱،۲) و بهمین دليل کمیته های عفونت بيمارستانی در بيمارستان های کشور تأسیس شده اند. اغلب عفونت های بيمارستانی از طریق تماس منتقل می شوند (۳،۴) و در این مسئله عمدۀ ترین عامل انتقال، دست پرسنل بيمارستان است (۲،۳) بهمین دليل شستشوی صحيح دستها از مهمترین عوامل کاهش انتقال اين عفونتهاست (۲،۴). در ایالات متحده نشان داده شده که کمتر از ۵۰٪ پرسنل ICU دستهای خود را بطور مرتب و صحيح شستشو می دهند (۲). برخی از مطالعات حاکی از آنند که رعایت بهداشت و شستشو دستها موجب کاهش ۲۵ - ۵۰٪ در میزان اين عفونتها شده است (۲).

بطور کلي، ميكروارگانيسمهاي دست را می توان به دو دسته فلور گذرا و فلور دائم تقسيم کرد. فلور دائم مشتمل بر ميكروارگانيسمهاي از قبيل استافيلوكوك های کوآگولاز منفي، ميكروكوكها و كوريئه باكتريوم می باشد که عموماً ويرولانس کمي دارند و با شستشو های معمولی از بين نميروند. در مقابل فلور گذرا عامل مهم عفونت های بيمارستانی هستند که اتصال سستی با پوست برقرار می کنند

گروه ۵ نفری از پرسنل اتاق عمل به روش اسکراب جراحی دست خود را شستشو دادند همچنین تعدادی نمونه گیری از شیر آب بخش‌ها برای بررسی آلوودگی آنها انجام شد.

نحوه نمونه‌گیری

سواب آغشته به محلول ترانسپورت استریل به پولپ انگشتان مالیده شده سپس مجدداً در محیط ترانسپورت قرار گرفته به آزمایشگاه منتقل می‌شد. سپس سواب‌ها روی محیط‌های EMB, Blood agar مالیده می‌شدند و محیط‌ها داخل انکوپاتور قرار می‌گرفتند تا پس از ۴۸ ساعت، نتیجه کشت خوانده شود. نمونه گیری در روزهای مختلف انجام می‌شد.

افراد مورد بررسی تمام پرسنل موجود در بخشها بودند یعنی از همه پرسنل هر یک از بخش‌های مرکز طبی کودکان در فاصله زمانی تیر ماه تا آبان ماه سال ۷۷ نمونه گیری شد. در مورد کشتهای مثبت، کلنی کانت (شمارش کلنی) بر اساس مقیاس کم (کلنی کانت کمتر از ۱۰)، متوسط (کلنی کانت بین ۱۰ تا ۱۰۰) و زیاد (کلنی کانت بیشتر از ۱۰۰) گزارش شد.

آزمون‌های آماری مورد استفاده آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر و آزمون مک نمار بود و سطح معنی‌داری مساوی ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها


(الف) بخش توصیفی:

در این گروه ۷۲ نفر مورد بررسی واقع شدند که از این تعداد ۹ نفر (۱۲/۵٪) دارای کشت منفی و ۶۳ نفر (۸۷/۵٪) دارای کشت مثبت بودند. با استفاده از آزمونهای آماری معلوم شد که منفی یا مثبت شدن کشت به جنس و شغل افراد بستگی نداشت ($P.value > ۰/۰۵$). نوع و فراوانی میکروبی حاصل از نمونه گیریها در نمودار شماره یک آمده است.

پرسنل بخش‌های مختلف مرکز طبی کودکان پرداخته است همچنین اثر شوینده‌های مختلف شامل صابون جامد، صابون مایع و باتدین اسکراب را بر کاهش آلوودگی دست پرسنل بخش‌های مختلف مرکز طبی کودکان روشن نموده است.

مواد و روش‌ها

این بررسی در دو بخش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در بخش توصیفی هدف، دستیابی به شیوه ناقلین و نوع میکروباهای موجود روی دست پرسنل بخش‌های مختلف مرکز طبی کودکان بود. در بخش تحلیلی مطالعه از نوع مداخله‌ای before-after بود و هدف آن بررسی رابطه میان شستشوی دست با مواد شوینده مختلف و منفی شدن یا تغییر کشت نمونه‌های گرفته شده از دست پرسنل بوده است. جامعه مورد مطالعه شامل همه پرسنل بخش‌های مختلف مرکز طبی کودکان شامل هیئت علمی، رزیدنتها، پرستاران، بهیارها، کارگران و منشی بخشها بوده است. در بخش اول ۷۲ نفر از پرسنل وارد مطالعه شدند که فقط از آنها نمونه گیری از دست انجام شد و مثبت شدن نمونه‌ها و نوع میکروباهای دست این افراد مشخص گردید. در بخش دوم مطالعه ۴ گروه before-after از افراد مورد مداخله قرار گرفتند و یک مطالعه- after روی کشت‌های تهیه شده از دست پرسنل قبل و بعد از شستشوی دست با مواد شوینده انجام شد. ۴ گروه مورد بررسی شامل ۳ گروه ۶۰ نفری و یک گروه ۲۶ نفری بود. در گروه اول شستشو با صابون جامد در گروه دوم با صابون مایع در گروه سوم با بتادین اسکراب بخش و گروه چهارم با بتادین اسکراب به روش اتاق عمل انجام شد. همانگونه که گفته شد در مورد هر چهار گروه قبل و بعد از شستشو نمونه گیری از دست انجام شد و نتایج با هم مقایسه شدند. لازم به ذکر است که هیچ‌گونه آموزشی جهت نحوه شستشو به افراد داده نشد. همچنین افراد بعد از شستشو دستهای خود را خشک نکردند. مداخلات دیگری نیز در گروه‌های کوچکتر انجام شد از جمله آنکه سه گروه ۱۰ نفری پس از شستشو و خشک کردن دست تحت نمونه گیری دوم واقع شدند. یک



نمودار ۱- فراوانی های میکروب های حاصل از غونه گیری از دست ها قبل از شستشو

میزان مثبت شدن بعد از شستشو با جنس و شغل ارتباط معنی دار آماری نداشت (نمودار شماره ۳).

(III) گروه شستشو با بتادین اسکراب بخش: در این گروه ۶۰ نفر مورد بررسی واقع شدند که شامل ۵۶ زن (۵۶٪) و بقیه مرد بودند. قبل از شستشو ۴۹ نفر (۸۱٪) کشت مثبت و بقیه کشت منفي داشتند که این مسئله به شغل و جنس ارتباط نداشت. پس از شستشو ۵۰ نفر کشت مثبت (۸۲٪) داشتند. میزان مثبت شدن کشتها بعد از شستشو با جنس و شغل رابطه معنی دار آماری نداشت. (نمودار شماره ۴) در این مورد در کشت های بعد از شستشو ۲۳ مورد سودومونا، ۳ مورد کلیسیلا یک مورد پروتوس و یک مورد کاندیدا رشد کرد.


(IV) گروه شستشو با بتادین اسکراب به روش اتفاق عمل: در این گروه ۲۶ نفر بر اساس شک به تابع بدست آمده از شستشوی دستها با بتادین اسکراب موجود در بخش ها و برای مقایسه نتایج در نظر گرفته شدند. این گروه شامل ۱۴ زن (۵۳٪) و ۱۲ مرد (۴۶٪) بودند. قبل از شستشو ۲۴ نفر (۹۲٪) کشت مثبت و بقیه کشت منفي داشتند که این مسئله با جنس و شغل ارتباط معنی دار آماری نداشت. بعد از

بندرت باکتری های دیگری از جمله پروتوس، استرپتوكوک، باسیلوس میکروکوکوس، هموفیلوس و استافیلوکوک تراژنوس و از گونه های قارچی کاندیدا در کشتها مشاهده شد. نوع باکتری با جنسیت و شغل رابطه معنی دار آماری نداشت ($P.value > 0.05$).

ب) گروههای تجربی:

I) گروه شستشو با صابون: در این گروه ۶۰ نفر مورد بررسی واقع شدند که شامل ۳۲ مورد زن (۵۳٪) و ۲۸ مرد (۴۷٪) بودند. ۱۰٪ افراد قبل از شستن کشت منفي و بقیه کشت مثبت داشتند که این مسئله با جنس و نوع شغل رابطه معنی دار آماری نداشت. بعد از شستشو با صابون جامد نیز ۱۰٪ کشت منفي و بقیه کشت مثبت داشتند (نمودار شماره ۲).


II) گروه شستشو با صابون مایع: در این گروه ۶۰ مورد بررسی شدند که شامل ۳۶ زن (۶۰٪) و ۲۴ مرد (۴۰٪) بودند. قبل از شستشو ۵۷ نفر (۹۵٪) کشت مثبت و بقیه کشت منفي داشتند که با جنس و شغل ارتباط معنی داری نداشت. بعد از شستشو ۵۸ نفر (۹۶٪) کشت مثبت داشتند.




نمودار شماره ۲- فراوانی میکروب‌های حاصل از غونه‌گیری از دست‌ها بعد از شستشو با صابون جامد

نتایج ذکر شده در این جدول در مورد هر یک از مواد شوینده با جنس و شغل ارتباط معنی دار آماری نداشتند. همچنین ارتباط معنی داری میان نوع میکروب بعد از شستشو با جنس و شغل بدهت نیامد.


شستشو ۲۰ نفر (۷۶/۹٪) کشت مثبت و بقیه کشت منفی داشتند میزان مثبت شدن کشت بعد از شستشو با شغل ارتباط معنی داری نداشت (نمودار شماره ۵). در جدول شماره ۱، مقایسه نتایج کشت بعد از شستشو با نتایج قبل از شستشو ذکر شده است. لازم به ذکر است که



نمودار شماره ۳- فراوانی میکروب‌های حاصل از غونه‌گیری از دست‌ها بعد از شستشو با صابون مایع



نمودار ۴- فراوانی میکروب‌های حاصل از نمونه‌گیری از دست‌ها بعد از شستشو با بتادین اسکراب بخش



نمودار شماره ۵- فراوانی میکروب‌های حاصل از نمونه‌گیری از دست‌ها بعد از شستشو با بتادین اسکراب به روش اتاق عمل

جدول شماره ۱- جدول تغییر نتایج میکروبیولوژیک کشت بعد از شستشو با هریک از عوامل شوینده

کانت افزایش یافته	کشت بدون تغییر	کشت مثبت شده یا کلنسی	کانت کمتر شده	تعداد و درصد موارد	تعداد و درصد موارد	تعداد و درصد موارد	صابون جامد
۲۲	٪ ۳۶/۷	۱۳	٪ ۲۱/۷	۲۵	٪ ۴۱/۷	۲۰	صابون مایع
۲۳	٪ ۳۸/۳	۱۷	٪ ۲۸/۳	۲۰	٪ ۳۳/۳	۲۲	بتدین اسکراب بخش
۲۶	٪ ۴۳/۳	۲	٪ ۳/۳	۳۲	٪ ۵۳/۳	۱۴	بتدین اسکراب روش اتاق عمل
۸	٪ ۳۰/۸	۴	٪ ۱۵/۴				

همچین ۱۱ نمونه از شیرهای آب بخشها گرفته شد که همگی مثبت بودند. میکروب‌های عمده این نمونه‌ها عبارت بودند از پروتئوس، E-coli، کلبسیلا، استافیلوکوک اورثوس، دیفتروئید، استرپتوکوک بتا همولیتیک، سودوموناس و آسپرژیلوس.

همچنین ۵ نفر به طریق اسکراب جراحی اتاق عمل دست خود را شستشو دادند که در همه این افراد کشت بعد از شستشو منفی گزارش شد.

بحث

اصولاً پوست انسان در حالت نرمال توسط باکتریهای هوایی کلونیزه می‌شود که میزان کلنسی در مناطق مختلف بدن متفاوت است (۹).

شمارش کلی باکتری‌های روی پوست پرسنل پزشکی از $۳/۹ \times ۱۰^۴$ تا $۴/۶ \times ۱۰^۴$ عدد متغیر است (۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳). همانگونه که ذکر شد فلور میکروبی پوست بدوسته تقسیم می‌شوند (۱۰). باکتری‌های فلور گذراي پوست لایه سطحی را کلونیزه می‌کنند و توسط شستشو ازین می‌روند و عمدها مسئول عفوت‌های وابسته به مراقبتهاشان پزشکی هستند. دست پرسنل پزشکی ممکن است بطور دائم توسط یک گونه خاص اورثوس، گرم منفی‌ها یا قارچها کلونیزه باشد (۱۰، ۱۴، ۱۵).

در یک مطالعه مشخص شد که میکرووارگانیسمهای جدا شده از دست پرسنل پزشکی برتریب شیوع استاف

با مقایسه ۴ روش بالا میتوان دید: میزان منفی شدن در مورد بتدین اسکراب اتاق عمل $P < 0.05$ و بتدین بخش $P = 0.33/3$ در برابر $0.33/3$ برای صابون مایع و $0.37/5$ برای صابون جامد بود یعنی میزان کاهش کلنسی کانت یا منفی شدن در گروه بتدین اسکراب بخش و اتاق عمل معنی دار بود (در هر دو مورد $P < 0.05$). در حالیکه این مسئله در مورد صابون جامد و مایع دیده نشد. (در هر دو مورد $P > 0.05$) میزان کاهش میکرووارگانیسمها در مواد حاوی بتدین برای استافیلوکوک اپiderمیدیس ($P.value = 0.01$) کلبسیلا ($P.value = 0.01$) E-coli و ($P.value = 0.007$) واضح تر بود.

در مورد ۳۰ نفر از افراد پس از شستشو و خشک کردن دستها نمونه گیری بعمل آمده در مورد این افراد نتایج ذیل بدست آمد:

I- ۱۰ نفر از این افراد با صابون جامد شستشوی خود را انجام دادند که در ۴ نفر از اینها کشت مثبت به منفی تبدیل شد و در ۲ نفر افزایش کلنسی کانت یا رشد میکروب جدید دیده شد.

II- ۱۰ نفر دیگر از اینها با صابون مایع دست خود را شستند که در ۵ مورد از اینها کشت مثبت به منفی تبدیل شد و ۴ نفر افزایش کلنسی کانت یا رشد میکروب جدید را نشان دادند.

III- در ۱۰ نفر آخر که با بتدین اسکراب اتاق عمل شستشوی دست خود را انجام دادند، ۹ مورد از کشت‌های مثبت بعد از شستشو منفی شد.

و باشد کمتر آگزیلا، تنه و اندامها) (۱۶,۱۷,۱۸) در گذشته برخی از فعالیتهای مرتبط با بیمار را موجب آلودگی بیشتری در دست می دانستند ولی این تقسیم بندی‌ها هیچگاه با بررسی‌های کمی میزان آلودگی باکتریال تایید نشده است (۱۴). یک مطالعه نشان دهنده آن بوده است که تماس مستقیم با بیمار و مراقبتها سیستم تنفسی بالآلودگی بیشتری در انگشتان پرسنل همراه بوده است (۱۹). همچنین مدت زمان مراقبت از بیمار یک ارتباط قوی با شدت آلودگی دست پرسنل دارد. علاوه بر تماس مستقیم با بیمار، تماس با اشیاء اتاق بیمار نیز می‌تواند موجب انتقال میکروبها شود. مثلاً پرسنلی که فقط با اشیاء و محیط آلوده به ترشحات شیر خواران مبتلا به RSV تماس داشته‌اند، خود به RSV مبتلا شده‌اند (از طریق ورود میکروبها به دهان یا ملتحمه) (۲۰). نوع و میزان آلودگی می‌تواند با بخش

بیمارستانی مورد مطالعه در ارتباط باشد.

برخی مطالعات نشان دهنده آنند که انتقال میکروبها و آلودگی ایجاد شده با دست مرطوب و خیس بیشتر از دست خشک صورت می‌گیرد. در مطالعه حاضر نیز مشاهده شد که خشک کردن دستها پس از شستشو میزان مثبت شدن کشتها را کاهش داده است که با نتایج بالا هماهنگی دارد. اکثر مطالعات نشان‌دهنده کاهش آلودگی میکروبی دست و کاهش عفونتهای بیمارستانی مرتبط با آلودگی دست پرسنل پس از شستشوی دست هستند (۲۱,۲۲). شستشوی دست حتی به طریق جراحی نمی‌تواند تعداد باکتریهای پوست را به صفر برساند و بهمین دلیل جراحان می‌بایست از دستکش‌های استریل استفاده کنند. استفاده از دستکش نزد پرسنل بیمارستانی که در تماس با بیمار هستند نیز یکی از روش‌های بسیار موثر در کاهش آلودگی‌های بیمارستانی است ولی در این زمینه مشکلی که دیده می‌شود کمپلیانس پایین پرسنل در تعویض دستکش پس از هر تماس با بیمار می‌باشد. در واقع عدم تعویض دستکش خود می‌تواند موجب انتقال میکروبی مقاوم به درمان گردد.

شستشوی دست باید پس از هر تماسی با بیمارانجام گیرد ولی متأسفانه این مسئله در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود. بطور مثال محققین در شیکاگو دریافتند که

ایدرمیدیس (۳۹٪) استاف سایپروفیتیکوس (۱۹٪) استاف اورنوس، گرم منفی‌ها و قارچها و بویژه گونه‌های کاندیدا بوده است که تا حد زیادی با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. البته قابل ذکر است که فلور نرمال پوست عمدتاً شامل کوکسی‌های گرم مثبت و کوآگولاز منفی یعنی استاف اپیدرمیس، برخی استافیلوکوکهای دیگر و دیفتروییدهای هوازی و غیر هوازی است که با روش‌های معمول تمیز کردن بقدرت بطور کامل از بین میرونند چون در عمق پوست و مناطقی مثل فولیکولهای مو مستقرند در حالیکه میکروارگانیسمهای گذرا که مسئول غالب عفونتهای منتقل شده از راه دست هستند شامل استاف ارنوس، E.Coli، سودومونا، سالمونلاو رتروروپروس هستند و همانگونه که گفته شد با تمیز کردن براحتی و تادرصد بسیار بالا ازین می‌روند (۲).

بطور کلی مشخص شده که تعداد و نوع گونه فلور دانم و گذرا از فردی به فرد دیگر تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای دارند ولی برای هر فرد، نوع و تعداد کلی‌های فلور دانم و گذرا در اغلب اوقات نسبتاً ثابت است (۱۰,۱۵). نکته قابل توجه این مطالعه عدم ارتباط مثبت شدن و نوع میکروب‌های بدست آمده از کشت با شغل افراد است که شاید ناشی از آلودگی شدید محیط باشد. هفت انتقال پاتوزنها توسط دست پرسنل پزشکی از یک بیمار به بیمار دیگر شرایط زیر باید وجود داشته باشد (۴,۱۴):

اول آنکه میکروب روی پوست بیمار وجود داشته باشد یا از روی پوست وی به محیط مجاور ریزش کند(به تعداد کافی)

دوم آنکه میکروارگانیسم مربوطه بتواند چند دقیقه روی دست و محیط زنده بماند.

نکته بعدی آن است که شستشوی دستها ناکافی باشد و در آخر اینکه پوست آلوده پرسنل با پوست بیمار دیگر یا محیط مجاور وی تماس حاصل کند.

باید توجه داشت که پاتوزنها کسب شده از بیمار صرفاً از زخم‌های درنازکتنهای یا عفونی کسب نمی‌شوند بلکه می‌توانند از مناطق پوستی سالم که با پاتوزنها کلونیزه شده‌اند نیز کسب شوند (۱۶,۱۷,۱۸). (بویژه نواحی پرینه، اینگوینال

باکتریوستاتیک هستند که جلوی تکثیر میکروبی را می‌گیرد (۴). شستن دست با صابون می‌تواند میزان باکتریهای پوست را تا حد 10^{11} گاهش دهد. الكلها بدلیل خاصیت دنا توره کردن پروتئینها خاصیت آنتی میکروبیال دارند (در غلطنهای $95-90\%$ اموزتر عمل می‌کنند) (۲۵). الكلها میزان شمارش باکتریال دستها را بطور موثری کاهش می‌دهند (۲۴). میزان کاهش تعداد باکتریهای دست پس از ۳۰ ثانیه کاربرد الكل حدود $log_{10} 2/5$ می‌باشد (۲۳). الكلها می‌توانند مانع انتقال پاتوژنهای وابسته به مراقبتهای پزشکی شوند. مواد حاوی الكل جهت شستشوی استاندارد دست یا ضد عفونی کردن دست توسط پرسنل پزشکی موثرتر از صابون یا صابونهای آنتی باکتریال عمل می‌کنند و بهمین دلیل برای ضد عفونی کردن دست پرسنل جراحی مناسبند (۲۵). الكلها برای ضد عفونی مواد آغشته به محصولات پروتئینی نیز مناسبند. البته الكلها روی اسپورها موثر نیستند. تبخیر سریع الكلها یکی از مزایای آنهاست چون موجب خشک ماندن سطوح می‌شود (۴) ولی باید توجه داشت که مصرف طولانی مدت ترکیبات حاوی الكل می‌تواند موجب خشکی دست شود که برای اینکار باید از امولیتیها استفاده کرد. کلر هگزیدین هم آنتی باکتریال دیگری است که بواسطه انهدام غشاء سیتوپلاسمی باکتریها عمل می‌کند و بهترین اثرات را روی باکتریها گرم مثبت می‌گذارد در حالیکه روی گرم منفی‌ها اثرات کمتری دارد (۲۳). بیشترین ماده مورد مصرف در سطوح غیرزنده مواد حاوی کلر می‌باشد (۴). ترکیبات حاوی ید (بویژه بتادین) نیز از طریق الکیلاسیون موجب از کار افتادن آنزیمهای حیاتی و بویژه آنزیمهای مؤثر در تنفس باکتری عمل می‌کنند و از همین روش‌ها آنتی باکتریال دارند (۲۳). همانگونه که گفته شد مواد شوینده حاوی آنتی باکتریال‌ها بیشتر از مواد پاک کننده مثل صابون در کاهش باکتری‌های دست موثرند که در این مطالعه نیز همین مطلب دیده شد. اکثر آنتی سپتیک‌ها در حذف فلور گذرا از صابون‌های غیر پزشکی موثرند. وقتی که خطر انتقال عفونتها از راه دست بیشتر باشد (یعنی در بخش‌های نوزادان، بخش‌های ایزوله و ICU و هنگام شیوع

شستشوی پس از تماس با بیمار تها در ۷۱-۴۷٪ موارد نزد پرسنل رعایت می‌شود و در برخی از مراکز شلوغ تر مثل ICU این مسئله تنها در ۴۰٪ موارد دیده می‌شود (۱۴). بسیار دیده شده که تا یک سوم پرسنل پرستاری دستهای آلوده به میکروارگانیسمهای گذرا و عفونت را داشته‌اند که بویژه این مسئله حین شیوع عفونتهای بیمارستانی (Outbreaks) بدبیال تماس با سطوح عفونی و یا بدبیال غفلت از شستشو و ضد عفونی کردن دستها رخ داده است (۴).

نوع ماده شوینده با میزان کاهش کلی کانت و منفی شدن دستها مرتبط است. محققین روشهای متعددی را جهت بررسی کارآیی شستشوی دست با مواد شوینده آنتی باکتریال و پروتکلهای شستشوی دست به طریق اتاق عمل جراحی بکار برده اند. تفاوت این روشهای در آلودگی تعمدی دست قبل از شستشو و نحوه آلوده کردن دستها، میزان مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده و زمان تماس آنها با دست، متد نمونه گیری از دستها بعد از شستشو و نحوه گزارش تغییرات ایجاد شده (یعنی بیان تغییرات بصورت کاهش درصد باکتریهای بدست آمده یا لگاریتم کاهش باکتریهای ریزش شده از دست) بوده است (۱۴). هیچیکی از مطالعات توانسته‌اند نشان دهنده کاهش باکتریهای دست حداقل باید تا چه حدی باشد تا بتواند موجب کاهش انتقال عفونت گردد (۲۳). یعنی اینکه کاهش باکتریها باید به اندازه $log_{10} 1/90$ (۹۹٪ کاهش) و ... باشد معلوم نیست. علاوه بر این نشان داده شده که متدهای مورد استفاده در بررسی های انجام شده جهت بررسی کارآیی مواد شوینده و آنتی باکتریال در کاهش کشتهای میکروبی و آلودگی های بیمارستانی اغلب در شرایط عملی توسط پرسنل بکار گرفته نمی‌شوند (۱۴). بهمین دلیل مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است تا دید واقعی تری نسبت به کلونی‌زاسیون باکتریال و خطر انتقال باکتریها در شرایط واقعی بدست آید (۲۴). در خصوص مواد شوینده و ضد عفونی کننده باید توجه داشت که صابونها عمدها خاصیت پاک کنندگی (دتریزانت) دارند و اثر آنتی میکروبیال آنها بسیار ناچیز یا صفر است ولی می‌توانند فلور گذرا را که اتصال سستی با پوست برقرار کرده‌اند بزدایند. صابون‌های مایع معمولاً حاوی عوامل

اکنون نه بتادین جهت شستشوی دست پرسنل در همه بخشها وجود دارد و نه شستشوی دستها استاندارد شده است) هم چنین با توجه به تاثیر خشک کردن دست بویژه با حوله های کاغذی پس از شستشو پیشنهاد می شود امکانات این مسئله در بخش های بیمارستانی پیش بینی شود.

پیشنهادات

- بهتر است در کشور مانند بسیاری از کشورها هفته ای به نام هفته شستشوی دست در نظر گرفته شود تا جایگاه این مسئله مورد تأکید واقع شود.
- پیشنهاد می شود اهمیت شستشوی دست و نحوه صحیح انجام آن به همه پرسنل پزشکی آموزش داده شود (بطور دوره ای).
- بنظر می رسد روش صحیح شستشوی دست در کاهش آلودگی ها تا حد زیادی مؤثر است بهمین دلیل نحوه انجام آن آموزش داده شود.
- بهتر است امکانات شستشو با مواد شوینده مناسب و خشک کردن (با حوله) در بخش های بیمارستانی فراهم شود.
- پیشنهاد می شود در همه بخشها (یا لاقل در بخش های حساستری مثل نوزادان و ICU) از شیرهای آب پدالی یا دارای حسگرهای نوری بدون دخالت دست استفاده شود

اعقوتها (Outbreaks) یا برای اقداماتی که در آنها احتمال تماس با مایعات بدن بالاست) این عوامل ترجیح داده می شوند (۴). همانگونه که دیده می شود تنوع میکروبی بعد از شستشو با ترکیبات بتادینی بسیار کمتر از صابونها بوده است. اینکه چرا استافیلوکوک اپیدرمیدیس در مطالعه حاضر کمترین تاثیر را از مواد شوینده پذیرفته و بیشترین مقدار کلی را بعد از شستشوها نشان داده، جای بررسی دارد.

لازم به ذکر است که نمونه گیری از شیرهای آب نشان دهنده آلودگی آنها می باشد و می توان یکی از علل آلودگی دستها را همین مسئله یعنی تماس دست با شیر آب بعد از شستشو دانست (بیشترین سوشهای آلوده کننده شیرهای آب گرم منفی ها یعنی کلبسیلا، پروتوس و Ecoli بوده اند) یکی از موارد جالبی که در این بررسی دیده شد عدم کاهش درصد کشت های مثبت پس از شستشو با مواد شوینده و یا حتی مثبت شدن مواد منفی پس از شستشو بود که علت عدمه آن را میتوان در تماس دست با شیر آلوده دانست یعنی شاید علت آلوده ماندن دست برخی از پرسنل بعد از شستشو با بتادین شیرهای آب باشد. بهمین دلیل استفاده از شیرهای پدالی بدون دخالت دست (یا شیرهای هوشیار) منطقی بنظر می رسد. همچنین استفاده از بتادین (بجای صابون) در همه بخشها اقدام مناسب دیگری جهت کاهش بار میکروبی دست می باشد که البته می بایست با آموزش و تشویق صحیح در پرسنل، رقتار و فرنگ شستشوی صحیح دست را در آنها ایجاد کرد (متاسفانه هم

منابع

1. Weinstein R.A. Infection control in the Hospital. In: Braunwald E., Fauci A.S., Kasper L.H. et al. Principles of internal Medicine, 2001(15th edition) Mc Graw Hill, Philadelphia, PP.853-857.

2. Edmond M.B; Wenzel R.P., Organization for Infection Control. In; Mandell G.L. Bennett J.E. , Dolin R. Principles and Practice of infectious disease. 2000 (5th edition), Churchill Livingston, Philadelphia, PP.2988-2995.

3. Howard R.J; Surgical Infections. In: Schwartz S.I., Shires I., Spencer F.C. et al. Principles of surgery. 1999(7th edition) , Mc Graw Hill, Philadelphia, PP 123-155.

4. Ayliffe G A J, Babb J R , Taylor L. Hospital acquired infection,principles and prevention.3rd ed.1999.Butterworth-Hein.
5. Hang Y.,Oie S.,Kamiya A. Comparative effectiveness of hand cleaning agents for removing MSRA from experimentally contaminated fingertips. Am J infec control. 1994 Vol. 85. pp 789-796.
6. Meakins J L. Surgical infections: Diagnosis and Treatment.1994.
- 7- Feigin M. Text book of pediatric infectious disease.1998
8. American Society of Testing Materials (ASTM). 1987. Standard test methods for the evaluation of health care personnel hand wash formulations. American Society of Testing Materials. Philadelphia, PA.
9. Selwyn S. Microbiology and ecology of human skin.Practitioner,1980;224:1059-62.
10. Price PB. Bacteriology of normal skin: a new quantitative test applied to a study of the bacterial flora and the disinfectant action of mechanical cleansing. J Infect Dis 1938;63:301-18.
11. Larson E. Effects of handwashing agent, hand-washing frequency, and clinical area on hand flora. Am J Infect Control 1984;11:76-82.
12. Maki D. Control of colonization and transmission of pathogenic bacteria in the hospital. Ann Intern Med 1978;89 (Pt 2):777-80.
13. Larson EL, Norton Hughes CA, Pyrak JD, Sparks SM, Cagatay EU, Bartkus JM. Changes in bacterial flora associated with skin damage on hands of health care personnel. Am J Infect Control 1998;26:513-21.
14. Boyce JM, Pittet D. Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings; recommendations of the Healthcare Infection Control Practices (Advisory Committee and the HICPAC/ SHEA/ APIC/ IDSAHand Hygiene Task Force). Morbidity and Mortality Weekly Report CDC Recommendations and Reports; 2002: 51,RR-16.
15. Sprunt K, Redman W, Leidy G. Antibacterial effectiveness of routine hand washing. Pediatrics 1973;52:264--71.
16. McBride ME, Duncan WC, Bodey GP, McBride CM. Microbial skin flora of selected cancer patients and hospital personnel. J Clin Microbiol 1976;3:14-20
17. Ehrenkranz NJ, Alfonso BC. Failure of bland soap handwash to prevent hand transfer of patient bacteria to urethral catheters. Infect Control Hosp Epidemiol 1991;12:654--62.
18. Sanderson PJ, Weissler S. Recovery of coliforms from the hands of nurses and patients: activities leading to contamination. J Hosp Infect 1992;21:85-93.
19. Pittet D, Dharan S, Touveneau S, Sauvan V, Perneger TV. Bacterial contamination of the hands of hospital staff during routine patient care. Arch Intern Med 1999;159:821-6.
20. Boyce JM, Potter-Bynoe G, Chenevert C, King T. Environmental contamination due to methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*: possible infection control implications. Infect Control Hosp Epidemiol 1997;18:622-7.
21. Patrick DR, Findon G, Miller TE. Residual moisture determines the level of touch-contact-associated bacterial transfer following hand washing. Epidemiol Infect 1997;119:319-25
22. Larson E. Skin hygiene and infection prevention: more of the same or different approaches? Clin Infect Dis 1999;29:1287-94.
23. Rotter M. Hand washing and hand disinfection [Chapter 87]. In: Mayhall CG, ed. Hospital epidemiology and infection control. 2nd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 1999.
24. Pittet D, Dharan S, Touveneau S, Sauvan V, Perneger TV. Bacterial contamination of the hands of hospital staff during routine patient care. Arch Intern Med 1999;159:821-6.
25. Larson EL, Morton HE. Alcohols [Chapter 11]. In: Block SS, ed. Disinfection, sterilization and preservation. 4th ed. Philadelphia, PA: Lea and Febiger, 1991:642-54.