

کارآیی سونوگرافی اگزیلا قبل از عمل در تشخیص متاستاز غدد لنفاوی در سرطان پستان

(بیمارستان امام، انسستیتو کانسر، ۱۳۷۹-۸۰)

دکتر رامش عمران پور* (استادیار)، دکتر شفایق حق شناس (دستیار)، دکتر معصومه گیتی* (استادیار)

* گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

** گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: در حال حاضر با اینکه درمان جراحی سرطان پستان از رادیکال ماستکتومی به طرف درمانهای محافظه کارانه سوق کرده، اما درمان جراحی اگزیلا تغییر چندانی ننموده است. وضعیت غدد لنفاوی اگزیلا بهترین فاکتور برای تعیین پیش‌آگهی بیماران و بقاء آنهاست. اطلاع از وضعیت غدد لنفاوی اگزیلا، در طراحی روش درمان و نیز بررسی پرونوز سرطان پستان اهمیت زیادی دارد.

مواد و روشها: کلیه بیمارانی که از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا انتهای سال ۱۳۸۰ با تشخیص سرطان پستان قابل عمل (Stage I, II) بالینی، در بخش‌های انسستیتو کانسر بستری شدند و کاندید عمل جراحی Modified Radical Mastectomy یا Breast Conserving Surgery شدند، شامل ۱۰۱ نفر، وارد مطالعه گردیدند و سونوگرافی ناحیه اگزیلاری روی ایشان قبل از عمل جراحی دیسکسیون اگزیلا انجام گردید. (T₂, T₁ stage کلینیکی)

یافته‌ها: اغلب بیماران در stage II بیماری و تعداد قابل توجهی از آنان (۲۸ مورد) در stage III پاتولوژیک بودند. حساسیت سونوگرافی در تشخیص متاستاز بدخیم غدد لنفاوی، ۷۸٪ و Specificity ۷۹٪ و accuracy ۷۹٪ بوده است. P.P.V ۸۵٪ و N.P.V ۷۰٪ بوده است.

نتیجه گیری و توصیه ها: سونوگرافی قبل از عمل، به تنهایی، وسیله مناسبی برای تشخیص متاستاز به غدد لنفاوی نمی‌باشد.

وجود متاستاز غدد لنفاوی بخصوص در تومورهای کوچک، نیاز به درمان adjuvant را تعیین می‌کند و تعداد متاستاز بر نوع درمان Axillary LN dissection مؤثر است هرچند نقش نیست، و مورد اختلاف نظر است، اما نقش پرگنوستیک آن بسیار مهم می‌باشد. تلاش در جهت هر چه محدودتر کردن دیسکسیون اگزیلا، به منظور کاهش عوارض آن، منجر به

مقدمه

اگر چه درمان جراحی سرطان پستان از رادیکال ماستکتومی به طرف درمانهای محافظه کارانه سوق کرده، اما درمان جراحی اگزیلا تغییر چندانی نکرده است. وضعیت غدد لنفاوی اگزیلا بهترین فاکتور برای تعیین پیش‌آگهی بیماران و بقاء آنهاست.

ارجاع شدند و یا بیمارانی که در حضور متاستاز دور دست، جهت ماستکتومی **Paliative** بستری شدند و نیز بیمارانی که رضایت به انجام اولتراسونوگرافی آگریلا ندادند، وارد این مطالعه نگردیدند.

کلیه بیماران قبل از عمل تحت بررسی دقیق سونوگرافی ناحیه آگریلاری قرار گرفتند و این بررسی توسط یک رادیولوژیست مخبر صورت گرفت. در حین سونوگرافی وجود غدد لنفاوی متاستاتیک و خصوصیات آنها، اعم از اندازه، شکل، وجود ناف چربی و ... و محل تقریبی آنها مشخص گردید. سپس این بیماران تحت **Axillary LN Dissection** قرار گرفتند. در ضمن دیسکسیون سعی شد غدد لنفاوی مشخص شده در سونوگرافی پیدا شده و جداگانه جهت بررسی بافت‌شناسی ارسال شود. در پایان نتایج سونوگرافی با نتایج پاتولوژی **Permanent** مقایسه گردید.

برای آنالیز داده‌ها، از نرم‌افزار **Spss for Windows** (Ver. 10.05) استفاده شد.

جهت پی بردن به همبستگی بین متغیرهای کمی گستته از تست **correlation** (و ضریب همبستگی **pearson**) استفاده شد.

پسیدایش تکنیکهای لنفادنکتومی غده لنفاوی **sentinel LN dissection**¹ گشته است. غده پیشقوال اولین غده لنفاوی است که یک تومور خاص را درناز می‌کند و ممکنست بواسیله ایزوپولفان‌بلو **bluedye** یا ماده رادیو ایزووتوب یا هر دو مشخص گردد. اگر غده پیشقوال دارای متاستاز نباشد، شاید بتوان از دیسکسیون آگریلا، صرف نظر کرد و اگر غده لنفاوی پیشقوال دارای متاستاز باشد، **ALND²** کلاسیک بایستی انجام شود. اما در حال حاضر، با توجه به عدم امکان سنتی گرافی در مراکز درمانی مختلف، در سطح کشور و عدم امکان تهیه پروب (**Gamma Detector**) و سایر مشکلات اجرایی و تکنیکی موجود، این روش روتین نشده است و گاه بصورت محدود در بعضی مراکز و فقط با استفاده از **Blue dye** انجام می‌شود. به همین دلیل ما در این مطالعه در صدد برآمدیم تا وضعیت غدد لنفاوی آگریلاری را با تکنیک سونوگرافی که روشی غیر تهاجمی، در دسترس، ساده و ارزان می‌باشد ارزیابی کنیم.

در صورت اثبات کارایی سونوگرافی در تشخیص غدد لنفاوی متاستاتیک، در این مطالعه، می‌توان در روند تشخیصی درمانی بیمارانیکه فقط با آدنوپاتی آگریلاری (راکتیو یا درگیر) مراجعه می‌کنند، نیز به نتایج سونوگرافی اعتماد کرد.

یافته‌ها

اغلب بیماران در stage II بیماری و تعداد قابل توجهی از آنان (۲۸ مورد) در stage III پاتولوژیک بودند.

جدول ۱- بررسی **ging sta** پاتولوژیک در ۱۰۰ بیمار مبتلا به سرطان پستان در انتستیوکانسر بیمارستان امام خمینی (ره) در سالهای ۱۳۷۹-۸۰

%	Stage 0 (insitu Tumor)
%۳	Stage I
%۳۶	Stage IIA
%۲۸	Stage IIB
%۱۷	Stage IIIA
%۱۱	Stage IIIB

مواد و روش‌ها

کلیه بیمارانی که از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا انتهای سال ۱۳۸۰ با تشخیص سرطان پستان، Operable، (قابل عمل) (Stage I, II بالینی)، در بخش‌های انسیتو کنسر بستری شدند و **Modified Radical Mastectomy** یا **Breast Conserving Surgery** وارد مطالعه شدند. دامنه سنی بیماران بین ۲۹ تا ۷۶ سال (میانگین سن ۴۷/۹۶ سال) و اغلب آنها (۶۴٪) در stage II بالینی بودند.

بیمارانی که بدلیل Locally advanced Breast CA. بستری شدند و پس از انجام بیوپسی انسزیونال جهت درمان

¹ Sentinel Lymphnode Biopsy (SLNB)

² Axillary Lymphnode Dissection (ALND)

بیماری مبتلایان مؤثر دانسته‌اند. در یک مطالعه رتروسپکتیو (۹) بر روی ۱۸۷ بیمار با کارسینوم T_2 و T_1 مهاجم پستان، halo $\frac{h}{T}$ area و halo Ratio بر اساس سونوگرافی قبل از عمل بیماران محاسبه شد متوسط halo ratio 0.28 ± 0.13 بود و 0.42 به عنوان نقطه cut off point تعیین شد. افرادی که high halo ratio داشتند، پرتوگنوز بد و روی هم رفته، شانس بقای کمتری داشتند.

اختصاصی بودن high halo ratio در تومور T_1 برای پیشگویی متاستاز غده لنفاوی آگزیلا، 0.38 ± 0.11 و 0.87 ± 0.08 NPV بود و در تومورهای زیر 10 mm , 1.00 , 0.10 بدست آمد.

تعدادی از مؤلفان به بررسی سونوگرافیک غدد لنفاوی به طریق invitro پرداختند تا آنرا اساس و پایه مطالعات invivo قرار دهند. Feuj (۳) در مطالعه‌ای، 158 غده لنفاوی را در 40 بیمار مبتلا به سرطان پستان، پس از دیسکسیون آگزیلاری، در محیط Waterbath بررسی کرد. با توجه به علائم فقدان ناف چربی، Disruption ناحیه کورتیکال و نسبت محور بلند به کوتاه کمتر از $1/6$ L N های متاستاتیک به تعداد 38 مورد مشخص شد که قابل مقایسه با 45 مورد در بررسی پاتولوژیک می‌باشد. در این مطالعه اختصاصی ترین علامت متاستاز، فقدان hilus بوده و علامت مثبت سونوگرافیک در غدد لنفاوی با قطر بیشتر از 10 mm صحیح‌تر از غدد لنفاوی کوچکتر بود.

در مطالعه مشابهی توسط T Tateishi و همکارانش (۱۰)، 84 غده در 27 بیمار در محیط آب سونوگرافی شد. انکس‌های مورد بررسی سایز بزرگتر از 10 mm , شکل دایره‌ای (نسبت کوچکترین محور به بزرگترین محور بین $1/5$ تا 10 cm), حدود sharp و اکو داخلی هیپوکونیک با حذف ناف چربی بود.

از بین این انکس‌ها، شکل دایره‌ای (circular)، بهترین اندکس افتراقی نود متاستاتیک از غیر متاستاتیک بود. (non-correlated) محسوب می‌شود. sensitivity و specificity به ترتیب 0.76 و 0.73 , specificity و sensitivity به ترتیب 0.85 و 0.73 زمانی بوده که حداقل سه معیار فوق در کنار هم وجود داشتند. این مطالعه نشان داد که sensitivity و specificity سونوگرافی کمتر از 0.90 است و این تکنیک غیر تهاجمی نمی‌تواند برای غربالگری) متاستاز غدد لنفاوی optimal باشد. لذا وی در

جدول ۲- مقایسه نتایج سونوگرافی و پاتولوژی در بررسی غدد لنفاوی اگزیلا در 100 بیمار مبتلا به سرطان پستان در انتیتوکانسر بیمارستان

امام خمینی (ره) طی سالهای ۱۳۷۹-۸۰

منفی	ثبت	سونوگرافی	پاتولوژی
۱۳	۴۷	ثبت	منفی
۲۲	۸	منفی	ثبت

جدول ۳- مقایسه موارد مثبت یا منفی کاذب یا حقیقی نتایج

True Neg.	False Neg.	True Pos.	False Pos.
%۳۲	%۱۳	%۶۷	%۱

میزان sensitivity در تمام stage ها، 78% و میزان specificity در تمام stage ها، 79% بدست آمد. ارزش اخباری مثبت (PPV)، 85% و ارزش اخباری منفی (NPV)، 70% می‌باشد.

همانگونه که در جدول شماره ۱ ملاحظه شد با وجود حذف بیماران stage III کلینیکی، از مطالعه، حدود 28% بیماران، بر طبق بررسی پاتولوژیک در stage III فرار دارند، که اگر مجدداً این گروه از آمار کنار گذاشته شود، در های O و I و II sensitivity سونوگرافی 72% و specificity 74% می‌باشد. در stage ها فوق، PPV، 78% و NPV، 79% می‌باشد.

در بررسی مقایسه‌ای تعداد L N ها مثبت گزارش شده در سونوگرافی و پاتولوژی $R=0.4$ =pearson correlation coefficient (non-correlated) بدست آمد که عملاً بدون همبستگی محسوب می‌شود.

بحث

در تعدادی از مطالعات، سونوگرافی به عنوان یک روش تصویری دقیق برای تشخیص متاستاز غدد لنفاوی آگزیلا در کانسر پستان مطرح شده است ($5, 6, 9, 11, 16$) و حتی گاه نتایج سونوگرافی قبل از عمل را در تعیین پیش‌آگهی (بقا) بدون

این جمع‌بندی می‌رسیم که در صورت منفی گزارش شدن آگزیلا از نظر بدخیمی در سونوگرافی، تنها ۷۰٪ احتمال منفی بودن واقعی در پاتولوژی وجود دارد و با احتمال ۳۰٪، درگیری تومورآل در غدد لنفاوی از نظر دور می‌ماند که این می‌تواند به علت وجود میکرومتاستاز در غدد لنفاوی به ظاهر سالم باشد. لذا استفاده از سونوگرافی به تنهایی، نمی‌تواند در تصمیم‌گیری جهت عدم انجام دیسکسیون غدد لنفاوی آگزیلا، عاقلانه باشد و یا حداقل نیاز است که توسط راه تکمیلی دیگری این خلاء نسبتاً بزرگ، جبران گردد. یکی از راه‌های پیشنهادی، اضافه کردن FNA، تحت هدایت در ضمن انجام سونوگرافی تشخیصی آگزیلا، می‌باشد.

از طرفی در موارد مثبت سونوگرافیک با احتمال ۸۵٪ درگیری پاتولوژیک در غدد لنفاوی آگزیلا وجود دارد و ۱۰٪ احتمال دارد که این غدد درگیر نباشد.

در مطالعات مشابه انجام شده (۲۴) جهت کاستن موارد مثبت کاذب، انجام FNAC تحت هدایت سونوگرافی، توانسته است حساسیت و اختصاصی بودن سونوگرافی را به ۹۲٪ و ۹۵٪ افزایش دهد و PPV، NPV ۹۱٪ داشته است.

در مطالعه دیگری (۷)، FNAC specificity، sensitivity تحت تأیید سونوگرافی، ۱۰۰٪ گزارش شد.

انجام FNAC تحت هدایت سونوگرافی در سرطان‌های پستان بدون غده لنفاوی قابل لمس، می‌تواند از تعداد بیمارانی که کاندید SLNB هستند بکاهد.

در مطالعه decanter (۲)، ۱۸۵ بیمار مبتلا به سرطان پستان، مورد سونوگرافی آگزیلا، قبل از عمل قرار گرفتند و ۶۹ نفر که غده لنفاوی قابل رویت در سونوگرافی داشتند، FNAC شدند که از این تعداد ۳۱ مورد در بررسی سیتولوژیک بدخیم بوده و در پاتولوژی permanent ۸۷ نفر از ۱۸۵ نفر، غده لنفاوی مثبت داشتند. لذا بیوپسی نود نگهبان، در ۱۷٪ بیماران بعلت مثبت بودن پاسخ US+FNAC، کنار گذاشته شد. اضافه کردن FNAC به سونوگرافی قبل از عمل، specificity آنرا افزایش می‌دهد (۱)، اما برای بررسی Accuracy این تکنیک (US+FNAC) و یافتن مشکلات اجرایی آن در شرایط فعلی مملکت خود، نیازمند انجام مطالعات موردي بیشتری هستیم.

مطالعه دیگری (۱۱) به مقایسه U.S با آنالیز طیف سیگنالهای back-scattered sensitivity و specificity ۹۲٪ و ۹۲٪ accuracy را به دقت بیشتر بر سونوگرافی معمولی ترجیح داد. با استفاده از U.S در تعدادی از مطالعات بسیار بالا و قابل قبول می‌باشد. مطالعه Vaidya و همکارانش (۱۳) بر روی ۲۰۰ بیمار، specificity سونوگرافی را ۹۰٪ (در مقایسه با ۷۰٪ برای Lms) و PPV آنرا ۹۰٪ (در مقایسه با ۷۶٪ در Lms) نشان داد. مجموعه معاينه (Lms) و سونوگرافی، حساسیت بالاتر (۸۲٪) و NPV بالاتر (۷۶٪) داشتند.

(۱۵) Yang با انجام سونوگرافی قبل از عمل بر روی ۱۱۴ بیمار، specificity ۸۴٪ و sensitivity ۹۲٪ accuracy را نشان داد. PPV، NPV ۹۷٪ و ۹۰٪ بود.

در مطالعه Haid و همکاران (۵) در سال ۱۹۹۶، بررسی سونوگرافیک آگزیلا بر معاينه بالینی در تعیین وضعیت LN‌های آگزیلاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان ارجحیت داشت که البته این مسئله به دقت نظر معاينه‌گر، بستگی دارد. متاستازهای کوچکتر از ۳-۵mm در مطالعه Haid و A Hergan-K و همکاران (۴) کلاسیفیکاسیون Axillary status (به صورت مثبت یا منفی، از نظر متاستاز به لنف نود بود) در ۹۰٪ موارد در تمام T-Stage‌ها و در ۹۴٪ موارد در T₁-Stage میسر گردید.

اما در مطالعه ما و تعدادی مطالعات مشابه دیگر (۵،۸،۱۲)، specificity، sensitivity در حدود ۷۰٪ تا ۸۰٪ می‌باشد که برای توجیه آن دو علت را می‌توان ذکر کرد:

۱- مواردی از میکرومتاستازهای موجود در غدد لنفاوی که بدلیل عدم وجود کرایتریاهای LN غیر طبیعی، در سونوگرافی غیر قابل تشخیص بوده است.

۲- سونوگرافی انجام شده در این تحقیق، با پروب ۵MHZ انجام شده که حساسیت تشخیصی آن به مراتب کمتر از ۷/ پروب ۱۰-۱۶MHZ استفاده شده در سایر مطالعات خارجی می‌باشد.

در مجموع به عنوان نتیجه، با توجه به ارزش مثبت سونوگرافی (PPV)، ۸۵٪ و ارزش اخباری (NPV)، ۷۰٪ به

منابع

1. Alernevall. Imaging of axillary Lymphnode Acta oncologica, 39(3): 277-282, 2000.
2. De Kanter Ay et al. Multicenter study of ultrasonographically guided axillary node biopsy in patients with breast cancer. B.J Surg, 86(11): 1459-2, 1999.
3. Feuj, Tresserra-F et al. Metastatic breast carcinoma in axillary lymph nodes: invitro US detection Radiology 205(3): 831-5, 1997.
4. Hergan K, Haid A. Preoperative axillary ultrasonography in Breast CA. Value of the method in routine clinical practice. Ultra schall-Med 1996 Feb, 17(1): 2, 14-7.
5. Haid A. Value of Preoperative axilla ultrasonography in breast CA, Lingenbecks-Arch-Suppl-Kon gress bd 1996, 13: 98-100.
6. Hashimoto H, Suzuki M, Oshida M. et al. Quantitative Ultrasound as a predictor of node metastases and prognosis in patient with breast cancer, breast cancer, 7(3): 241-6, 2000.
7. Jaffers, Zakowski M, Fine needle aspiration biopsy of axillary lymph nods Diagn Cytopathol, 26(2): 64-74, 2002.
8. M Ohta, Y Suzuki, M Kutota et al. Comparative efficacy of positron emission Tomography and ultrasonography in preoperative evaluation of axillary lymphnode Metastases in breast cancer. Breast cancer Journal of Japanese breast cancer society 7(1): 99-103, 2000.
9. Stramss HG, Lampe D. Preoperative axilla sonography in breast tumors suspected of malignancy a diagnostic adventure?. Ultra schall-med indermedisin, 19(2): 70-77, 1998.
10. Tateishi T et al. Invitro B mode ultrasonographic criteria for diagnosing axillary lymphnode metastases of breast cancer. J ultra sound Med, 18(5): 349-50, 1999.
11. Tateishi T et al. Invitro diagnosis of axillary lymph node metastases in breast cancer by spectrum analysis of radio Frequency echo signals ultra sound Med hiol: 24(8): 1151-9, 1998.
12. Tenab. Preoperative Diagnosis of Carcinoma of the breast: IS a "Cost-Cutler" Algorithm chandawa Kor, R.Y. 64(2): 153-158, 1997.
13. Vaidya YS, Vyas YY et al. Roles of ultrasonography to detect axillary node involvement in operable breast cancer bur Eue j surg oncol: 22(2): 140-3, 1996.
14. Vervanch Y. Value of axillary ultrasonography and sonography guided puncture of axillary nodes: a prospective study in 144 consecutive patients y clinic ultrasound 25(2): 53-6, 1997.
15. Yang WT, et al. High resolution sonographic detection of axillary lymph node metastases in breast cancer J ultrasound med 15(3): 241-6, 1996.