

مقایسه اثربخشی متوكلوپروماید و لیدوکائین در کاهش میزان بروز و شدت درد هنگام تزریق پروپوفول

(بیمارستان شریعتی-۱۳۸۱)

دکتر علی موافق (استادیار)*، دکتر محمد میراسکندری (دستیار)*، دکتر پیام اقتصادی عراقی (متخصص بیهوشی)
* گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، بیمارستان شریعتی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: یکی از عوارض نامطلوب استفاده از پروپوفول، درد هنگام تزریق وریدی این دارو می‌باشد که میزان بروز آن در بیماران بین ۹۰٪ تا ۲۸٪ گزارش شده است. متوكلوپروماید دارویی است که بطور متدالوں جهت پیشگیری و درمان تهوع و استفراغ کاربرد بالینی دارد ولی دیده شده که از این دارو نیز می‌توان در کاهش درد پروپوفول استفاده نمود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تزریق متوكلوپروماید پیش از تزریق پروپوفول در میزان بروز و شدت درد ناشی از تزریق پروپوفول و مقایسه آن با لیدوکائین است.

مواد و روشها: در این مطالعه آینده نگر، دوسوکور، تصادفی شده همراه با کترول دارونما، ۱۵۰ بیمار ۱۸ تا ۴۰ سال به صورت تصادفی به یکی از سه گروه (هر گروه ۵۰ نفر) شاهد (۲ میلی لیتر نرمال سالین)، لیدوکائین (۲ میلی لیتر معادل ۴۰ میلی گرم لیدوکائین) و متوكلوپروماید (۲ میلی لیتر معادل ۱۰ میلی گرم متوكلوپروماید) تقسیم شدند. بلافضله ۲ میلی لیتر پروپوفول ۱۰ میلی گرم در میلی لیتر با سرعت ۰/۵ میلی لیتر در ثانیه (در ۴ ثانیه) از همان کاتتر وریدی که در بزرگترین ورید پشت دست قرار دارد، تزریق می‌گردید. شدت درد حین تزریق پروپوفول توسط روش Visual Analogue Pain Scale (VAS) (صفر بدون درد تا ۱۰۰ شدیدترین درد) که پیش از مطالعه به بیمار آموزش داده می‌شد، تعیین می‌گردید و هر مقدار VAS بیشتر از صفر بروز درد تلقی می‌گردید. در صورت مشاهده هر گونه علائم خواب آلودگی، بیمار از مطالعه حذف می‌گردید.

یافته‌ها: در این مطالعه نشان داده شد که شدت درد بیماران در سه گروه تفاوت معنی داری داشتند (نرمال سالین=۴۱/۱۸، گروه لیدوکائین = ۲۵/۴ و گروه متوكلوپرماید=۱۳/۱، $P=0/001$) و بیماران گروه متوكلوپرماید به میزان معنی داری درد کمتری را نسبت به گروههای دیگر تجربه نمودند ($P=0/001$). میزان بروز درد در گروه نرمال سالین ۷۷/۱٪ است و لیدوکائین و متوكلوپرماید هر دو موجب کاهش بروز درد در حین تزریق نسبت با گروه نرمال سالین شدند ($P=0/002$) ولی اختلاف معنی داری در بروز درد بین دو گروه لیدوکائین با متوكلوپرماید مشاهده نشد ($P=0/051$).

نتیجه گیری و توصیه‌ها: بدین ترتیب این مطالعه نشان داد که متوكلوپرماید نسبت به لیدوکائین درد ناشی از تزریق پروپوفول را بیشتر کاهش می‌دهد (برخلاف درد ناشی از دیازپام) ولی در کاهش میزان بروز درد با یکدیگر تفاوتی ندارند. در نهایت با توجه به دیگر اثرات سودمند متوكلوپرماید از جمله پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل و کاهش دوز پروپوفول مورد نیاز برای القاء، می‌توان از این روش بوجه در مواردی که منع مصرف لیدوکائین وجود دارد، قبل از تزریق پروپوفول استفاده نمود.

مقدمه

عمومی برای اعمال جراحی مختلف در بیمارستان دکتر شریعتی بودند، پس از توجیه کامل در مورد نحوه اجرای طرح و گرفتن رضایت نامه کتبی و نحوه اندازه گیری به روش VAS^۱، به یک کارآزمایی آینده نگر دوسوکور با کنترل توسط دارونما وارد شدند و مشخصات آنها مانند وزن ثبت می گردید. بیمارانی که سابقه مصرف مواد مخدر، سوه مصرف مواد دارویی یا باستگی الکلی، سابقه بیماریهای عصبی و یا روانپردازشکی (خصوصاً آنها که سابقه تشنج داشته‌اند)، سابقه ابتلاء به سندرمهای درد مزمن، وجود ترموبولیت یا وجود بیماریهای عروقی یا هر ضایعه در دنایک دیگر یا وریدیهای باریک در ناحیه پشت دست و نیز بیماریهای سیستمیک مثل دیابت، حساسیت به سویا، وجود هر گونه کترالدیکاسیون برای تزریق متوكلوپرومايد (مانند پارکینسون) یا سابقه حساسیت به آن یا به لیدوکائین و ترکیبات مشابه، یا مصرف هر نوع داروی ضد درد در ۲۴ ساعت قبل از عمل و اندیکاسیون برای القاء سریع بیهوشی^۲ داشته‌اند، از مطالعه حذف شدند. پس از ورود بیماران به اتاق عمل، یک کاتولایی شماره ۲۰، به بزرگترین ورید پشت دست غیرغالب بیمار (بدون تزریق لیدوکائین قبل از ورود) وارد می گردید و به سرم ترمال سالین متصل می گردید (بدون شروع انفوزیون) و هیچ دارویی دیگری (مانند آنتی بیوتیک) از این طریق برای بیماران تزریق نمی شد. از هیچ دارویی مسکن، ضد درد یا بیحس کننده‌ای قبل از تزریق داروهای مطالعه استفاده نمی شد. بیماران به سورت تصادفی به سه گروه (هر گروه ۵۰ نفر) شامل گروه نرمال سالین (تزریق ۲ میلی لیتر ترمال سالین به عنوان دارونما)، گروه لیدوکائین (تزریق ۲ میلی لیتر لیدوکائین بدون ماده نگهدارنده ۶٪ معادل ۴۰ میلی گرم) و گروه متوكلوپرومايد (تزریق ۲ میلی لیتر متوكلوپرومايد معادل ۱۰ میلی گرم) تقسیم شدند. برای این کار جدولی با اعداد تصادفی توسط رایانه ایجاد شد. پس از تزریق داروی مطالعه، بالافصله ۲ میلی لیتر پروپوفول ۱۰ میلی گرم در میلی لیتر (Pofol, Dongkook Pharm. Co) با

هم اکنون در سراسر جهان از پروپوفول برای القاء و نگهداری بیهوشی به صورت گسترده ای استفاده می شود (۱) و در برخی کشورها از آن به عنوان بهترین دارو برای این منظور یاد می شود (۲). یکی از خصوصیات نامطلوب استفاده از پروپوفول درد هنگام تزریق این دارو در وریدهای محیطی است که میزان بروز آن در بیماران بین ۷٪ تا ۹۰٪ گزارش شده است (۳) و در برخی موارد بسیار شدید و آزار دهنده است. تا کنون روشهای بسیاری در جهت کاهش شیوع و شدت درد هنگام تزریق پروپوفول به کار رفته‌اند که یکی از آنها مخلوط نمودن داروهایی همچون بیحس کننده‌ای موضعی (۱)، انواع مخدورها مانند مورفين، مپریدین (۴)، فنتانیل (۴,۵)، آلفافنتانیل (۶)، ترامادول (یک آگونیست ضعیف رسپتور م) (۷)، کورولاک (۸)، نافاموستات مزبلات^۱ (یک بازدارنده کالیکرین^۲) (۹) متوكلوپرومايد (۱۰) و ... می باشد. متوكلوپرومايد دارویی است که بطور متداول جهت پیشگیری و درمان تهوع و استفراغ کاربرد بالینی دارد (۱۱) و در برخی از مطالعات قبلی از متوكلوپرومايد در تخفیف درد حین تزریق پروپوفول و دیازپام مورد استفاده قرار گرفته است (۱۰,۱۱). هدف از طراحی این مطالعه که به روش آینده نگر و دوسوکور با کنترل دارونما صورت پذیرفته است، بررسی تاثیر تزریق متوكلوپرومايد قبل از تزریق پروپوفول، بر شیوع و شدت درد ناشی از تزریق پروپوفول و مقایسه آن با لیدوکائین است.

مواد و روشهای

پس از تأیید طرح توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۵۰ بیمار ۱۸ تا ۴۰ ساله بالغ با وضعیت فیزیکی معادل ASA^۳ یک و دو که در زمستان ۱۳۸۱ کالندید بیهوشی

1. Nafamostat mesilate (6-amino-2-naphthyl p-guanidinobenzoate dimethanesulphonate, FUT-175)
2. Kallikrein inhibitor
3. American Society of Anesthesia

4. Visual Analog Scale
5 Rapid sequence induction
6. Preservative-free

(جدول شماره ۱). همچنین میزان بروز درد ($P=0.50$) در زنان در مقابله 59.7% در مردان ($P=0.29$) و شدت درد تجربه شده توسط زنان و مردان در حین تزریق پروپوفول (محاسبه شده توسط VAS) تفاوت معنی داری نداشتند ($VAS = 25/4$ در زنان در مقابل $27/5$ در مردان ($P=0.69$)). تاثیر متوكلوپروماید به عنوان داروی کاهنده شدت و میزان بروز درد حاصل از تزریق پروپوفول با لیدوکائین و نرمال سالین مورد مقایسه قرار گرفته است. لیدوکائین و متوكلوپروماید هر دو به میزان معنی داری موجب کاهش شدت درد بیماران در حین تزریق پروپوفول در مقایسه با نرمال سالین شدند (Kruskal-Wallis ($P<0.001$)), ولی متوكلوپروماید در این امر موفقتر بود و شدت درد در حین تزریق، در گروه متوكلوپروماید به میزان معنی داری از گروه لیدوکائین کمتر بود (Mann-Whitney ($P<0.001$)). (نمودار شماره ۱). همچنین این مطالعه نشان داد که میزان بروز درد (VAS بالاتر از صفر) در حین تزریق پروپوفول در گروه نرمال سالین 77.1% است و لیدوکائین و متوكلوپروماید هر دو موجب کاهش بروز درد در حین تزریق نسبت با گروه نرمال سالین شدند (Chi-square ($P<0.002$)) ولی اختلاف معنی داری در بروز درد بین دو گروه لیدوکائین با متوكلوپروماید مشاهده نشد (Chi-square ($P=0.051$)). (نمودار شماره ۲).

جدول شماره ۱- مشخصات بیماران در سه گروه نرمال سالین، لیدوکائین و متوكلوپروماید. مقادیر به صورت تعداد و یا "انحراف معیار شیانگین" ذکر شده‌اند.

گروه	گروه نرمال	گروه لیدوکائین	گروه متوكلوپروماید	تعداد
سن(سال)	۴۸	۴۹	۴۹	
وزن(کیلوگرم)	۶۴.۷ \pm ۱۰.۴	۶۲.۲ \pm ۱۲.۴	۶۳.۲ \pm ۸.۹	
جنس (مرد/زن)	۲۲/۲۵	۲۲/۲۶	۲۲/۲۷	
وضعیت ASA (III)	۲۸/۱۰	۲۷/۱۲	۲۷/۱۲	

*: تفاوت معنی دار در مقایسه با گروه نرمال سالین (Mann-Whitney).


**: تفاوت معنی دار در مقایسه با گروه لیدوکائین (Whitney).

سرعت 0.05 میلی لیتر در ثانیه (در ۴ ثانیه) از همان کاتتر وریدی، از محل مخصوص، تزریق می‌گردید. کل داروها در درجه حرارت اطاق (23°C درجه سانتیگراد) نگهداری می‌شدند. پس از تکمیل تزریق، ناظری که از نوع داروی تزریق شده بی اطلاع بود، از بیماران درخواست می‌نمود که درد خود را روی خط کشی که از 0 (بدون درد) تا 100 (شدیدترین دردی که تا به حال تجربه نموده اند) علامت گذاری شده بود و قبل از آنها نشان داده شده بود، نشان دهن. (روش Visual Analogue Pain Scale (VAS)). هر مقدار VAS بیشتر از صفر، بروز درد تلقی می‌گردید. پیدایش نشانه‌های تسکین 7 و عدم توانایی در برقراری ارتباط کلامی موجب خروج بیمار از مطالعه می‌گردید. پس از انجام این مرحله القاء بیماران با 2.5 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن صورت می‌پذیرفت. اطلاعات بدست آمده، در طول مطالعه به صورت محترمانه باقی می‌ماند.

حجم نمونه براساس تخمین اختلاف میانگین حدود 22.2% در بروز درد حین تزریق محاسبه شده بود. خطای نوع α معادل 0.105 (Two-sided) و خطای نوع β معادل 0.1 در نظر گرفته شده بود و بدین ترتیب حجم نمونه محاسبه شده معادل 50 نفر در هر گروه بود. شدت درد توسط آزمونهای Kruskal-Wallis و Mann-Whitney و میزان بروز درد توسط آزمون SPSS for windows Chi-square Ver10.05 (SPSS Inc., Chicago, IL) گرفتند. مقدار عدد P کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج

دو بیمار در گروه نرمال سالین و ۱ بیمار در گروه لیدوکائین به علت پدیدار شدن نشانه‌های تسکین و ۱ بیمار از گروه متوكلوپروماید به علت سابقه مصرف مواد مخدر از مطالعه خارج شدند و اطلاعات حاصل از 146 بیمار مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مشخصات بیماران مانند سن ($P=0.29$), جنس ($P=0.66$) و وزن ($P=0.49$), تفاوت معنی داری نداشتند




نمودار شماره ۱- شدت درد در سه گروه نرمال سالین، لیدوکائین و متوكلوروماید. مقادیر به صورت میانگین \pm VAS† ذکر شده اند.

*: تفاوت معنی دار در مقایسه با گروه نرمال سالین ($P<0.05$, Mann-Whitney)

**: تفاوت معنی دار در مقایسه با گروه لیدوکائین ($P<0.05$, Mann-Whitney)

Visual Analogue Scale :VAS†



نمودار شماره ۲- فراوانی نسبی بیماران از نظر بروز در سه گروه نرمال سالین، لیدوکائین و متوكلوروماید. مقادیر به صورت درصد ذکر شده اند.

*: تفاوت معنی دار در مقایسه با گروه نرمال سالین ($P<0.05$, Chi-square)

**: تفاوت معنی دار در مقایسه با گروه لیدوکائین ($P<0.05$, Chi-square)

شباختهای ساختمانی و فیزیکوژیمیابی با لیدوکائین (۱۴)، پروکائین و پروکائین آمید (۱۵) دارد. تاکنون در چند مطالعه اثرات بیدردی متوكلوپروماید در حین تزریق وریدی (۱۰، ۱۱) یا وقتی که به مدت یک دقیقه در سیستم وریدی تجمع می‌یابد نشان داده شده است (۱۲). در مطالعه‌ای که توسط Ganta و همکارانش انجام گرفت، تزریق ۵ میلی گرم متوكلوپروماید قبل از تزریق پروپوفول مورد آزمون قرار گرفت و چنین نتیجه گرفته شده که اگرچه این دارو مانند لیدوکائین در کاهش بروز درد حین تزریق پروپوفول موثر است ولی در این مورد نسبت به آن تفاوت معنی داری ندارد (۱۰). نتیجه این مطالعه با نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر کاملاً همخوانی دارد. در این مطالعه نتایج نشان می‌دهند بروز درد در دو گروه لیدوکائین با متوكلوپروماید اختلاف معنی داری ندارند ولی شدت درد توسط تزریق متوكلوپروماید بیشتر از لیدوکائین کاهش می‌یابد و بدین ترتیب شاید بتوان نتیجه گرفت که بر خلاف نتایج قبلی که اثر متوكلوپروماید را در ابجاد بی دردی با لیدوکائین مساوی دانسته‌اند (۱۳) اثر آن بیشتر است. شاید علت این اختلاف را بتوان در نحوه سنجش درد دانست. در مطالعه حاضر از روش اندازه‌گیری VAS (متغیر کیفی-پیوسته) برای بررسی شدت درد استفاده شده در حالیکه در مطالعات قبلی عمدها از روشهای دیگر (متغیرهای کمی-ترتبی) استفاده شده (۱۰، ۱۱، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱). همچنین ما در این مطالعه از دوز ۱۰ میلی گرمی متوكلوپروماید استفاده نموده ایم و در مطالعات پیشین دوز ۵ میلی گرمی آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

در مطالعه‌ای که توسط دکتر ماجدی و همکارانش بر تزریق ۱۰ میلی گرم متوكلوپروماید پیش از تزریق دیازپام بر درد حین تزریق آن انجام شده است، نشان داده شده که اگرچه متوكلوپروماید در کاهش درد حین تزریق دیازپام موثر است ولی لیدوکائین در این مورد از آن موفقتر است (۱۱). شاید علت تفاوت در نتیجه این مطالعات را در مکانیسم ایجاد درد توسط این داروها باید جستجو نمود. درد حاصل از تزریق دیازپام به

هیچ موردی از عوارض ناحیه تزریق، ترومبوفیلیت یا عوارض عصبی (مانند عوارض اکستراپرامیدال) ناشی از تزریق متوكلوپروماید یا عوارض ناشی از لیدوکائین در هیچ یک از بیماران گزارش نشد.

بحث

در حین تزریق پروپوفول یکی از مشکلات عمدۀ در استفاده از آن به شمار می‌رود و مکانیسم آن هنوز به خوبی روش نشده است ولی حدس زده می‌شود که شاید یک اثر تحریکی مستقیم موجب احساس فوری درد شود و یا با یک اثر غیر مستقیم که وابسته به آزاد شدن مدیاتورهای منجر به پیدایش درد با شروع تاخیری گردد (۲۳). بدین ترتیب که حلال چربی آن موجب افزایش فعالیت سیستم کالیکرین-کینین^۸ پلاسمای می‌شود که خود به تولید برادی کینین^۹ منجر می‌شود. این فعل و اتفاعات موجب تغیراتی در وریدهای محیطی می‌شوند که باعث افزایش تماس فاز آبی^{۱۰} پروپوفول با اندوتلیوم عروق و انتهای آزاد اعصاب و ابران بین مدیا^{۱۱} و ایتیما^{۱۲} (۱۲) و افزایش درد می‌شود (۱).

در این مطالعه نشان داده شد هنگامی که از متوكلوپروماید به عنوان پیش درمانی^{۱۳} قبل از تزریق پروپوفول استفاده شود، در کاهش شدت و میزان بروز درد در حین تزریق پروپوفول موثر است و تاثیر آن در کاهش شدت درد حین تزریق از لیدوکائین بیشتر است. متوكلوپروماید^{۱۴} برای اولین بار به عنوان یک آنالوگ ساختمانی پروکائین آمید ساخته شد و بنابراین تا حدودی خاصیت بیحس کنتدگی موضعی و آتش آریتمیک بودن خود را از دست داده است (۱۰) ولی Pang و همکارانش نشان دادند که متوكلوپروماید خواص بیحس کنتدگی موضعی مشابه لیدوکائین به دنبال تزریق زیر پوستی دارد (۱۲). این ماده یک آنتاگونیست گیرنده دوپامین (D₂) و به نوعی یک بترازید به حساب می‌آید و

8. Kallikrein-kinin

9. Bradykinin

10. Aqueous phase

11. Media

12. Intima

13. Premedication

14. 2 methoxy-chloroprocainamide

اگرچه در این مطالعه از دوز ۴۰ میلی گرم که موجب ایجاد اثرات تسکینی نمی شود، استفاده شده و در صورت بروز هر گونه اثرات تسکینی بیمار از مطالعه خارج می شد، ولی به هر صورت احتمال اختلال در تفسیر نتایج وجود دارد. همچنین در این مطالعه برای بررسی شدت درد حین تزریق پروپوفول، از VAS استفاده شده است که با توجه به اینکه حساسیت بیماران نسبت به درد ناشی از تزریق پروپوفول متفاوت است شاید این نیز در تفسیر نتایج اختلال ایجاد کند.

در نهایت با توجه به دیگر اثرات سودمند متوكلوبپراماید از جمله پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل (۱۱) و کاهش دوز پروپوفول مورد نیاز برای القاء (۱۸)، می توان از این روش بویژه در مواردی که منع مصرف لیدوکائین وجود دارد، قبل از تزریق پروپوفول استفاده نمود.

تشکر و فدردانی

بدین وسیله بگذردگان این نکاله برای تشكیر و فدردانی خود را ازبین بد آفای دکتر راست - بنی خازن، استاد ممتاز گردد، بهره‌برداری بیماران مبتلی (رو) اعلام می‌کرد.

علت ماده پروپیلن گلیکول^{۱۵} است که در برخی فرمولاسیونهای این دارو به عنوان حامل کننده^{۱۶} آن به کار می‌رود (۱۱).

اگرچه مکانیسم دقیق متوكلوبپراماید در پیشگیری از درد همچنان روشن نشده است ولی برخی مولفین معتقدند که شاید این عمل را مشابه مورفين از طریق ایجاد اختلال در ورود یون کلسیم از خلال غشاء سلولی انجام می‌دهد (۱۰) از همین راه موجب افزایش اثرات مخدراها می‌شود (۱۶). از طرفی Rosenblatt و همکارانش با مشاهده کاهش نیاز بیماران به مورفين در افرادی که از متوكلوبپراماید داخل وریدی مصرف نموده بودند به این نتیجه رسیدند که شاید متوكلوبپراماید باعث کاهش "آسپاسم" در لوله‌های فالوب می‌گردد (۱۷) و شاید با مکانیسم مشابهی مربوط کاهش دردهای ناشی از کولیکهای بیرون (۱۰) می‌گردد و شاید از همین طریق مربوط کاهش درد از بین تزریقی وریدی گردد (۱۷).

آخر به همچنان تزریق دام براکی، جلوگیری از درد هرگام تزریق پروپوفول ناگاتیجه ماند، است و تا کنون هیچیک از دردهایی بیرون مذکور نیافرین (۱۸) یا بینی بروک (۱۹) که از درد ناشی از تزریق پروپوفول از طریق این بویژه اگر از تزریق که استفاده نمود (۱۰)) از موافقین روشها به حساب نمی‌آید (۱) ر شاید تزریق ۱۰ میلی گرم متوكلوبپراماید قبل از تزریق پروپوفول را بیز بتوان یکی از این روشها مضرب نمود.

15. Propylene glycol

16. Vehicle

17. Ureteric colic

منابع

1. Nakane M, Iwama H. A potential mechanism of propofol-induced pain on injection based on studies using nafamostat mesilate. *Br J Anaesth* 1999;83(3): 397-404.
2. Sadler PJ, Thompson HM, Maslowski P, Liddle A, Rowbotham DJ. Iontophoretically applied lidocaine reduces pain on propofol injection. *Br J Anaesth* 1999 Mar;82(3): 432-4.
3. Wong W H, Cheong K F. Role of Tramadol in Reducing Pain on Propofol Injection. *Singapore Med J* 2001 Vol 42(5) : 193-195
4. Pang WW, Mok MS, Huang S, Hwang MH. The analgesic effect of fentanyl, morphine, meperidine, and lidocaine in the peripheral veins: a comparative study. *Anesth Analg* 1998 Feb;86(2): 382-6.
5. Picard P, Tramer MR. Prevention of pain on injection with propofol: a quantitative systematic review. *Anesth Analg* 2000 Apr;90(4): 963-9.
6. Nathanson MH, Gajraj NM, Russell JA. Prevention of pain on injection of propofol. A comparison of lidocaine and alfentanil. *Anesth Analg* 1996; 82: 469-71.
7. Pang WW, Huang PY, Chang DP, Huang MH. The peripheral analgesic effect of tramadol in reducing propofol injection pain: a comparison with lidocaine. *Reg Anesth Pain Med* 1999 May-Jun;24(3): 246-9.
8. Huang YW, Buerkle H, Lee TH, Lu CY, Lin CR, Lin SH, Chou AK, Muhammad R, Yang LC. Effect of pretreatment with ketorolac on propofol injection pain. *Acta Anaesthesiol Scand* 2002 Sep;46(8): 1021-4.
9. Iwama H, Nakane M, Ohmori S, Kaneko T, Kato M, Watanabe K, Okuaki A. Nafamostat mesilate, a kallikrein inhibitor, prevents pain on injection with propofol. *Br J Anaesth* 1998 Dec;81(6): 963-4.
10. Ganta R, Fee JP. Pain on injection of propofol: comparison of lignocaine with metoclopramide. *Br J Anaesth* 1992 Sep;69(3):316-7.
11. Majedi H, Rabiee M, Hussain Khan Z, Hassannasab B A Comparison of Metoclopramide and Lidocaine for Preventing Pain on Injection of Diazepam. *Anesth Analg* 2002;95:1297-1299.
12. Klement W, Arndt JO. Pain on intravenous injection of some anaesthetic agents is evoked by the unphysiological osmolality or pH of their formulations. *Br J Anaesth* 1991; 66:189-5.
13. Pang WW, Huang PY, Chang DP, Huang MH. The peripheral analgesic effect of tramadol in reducing propofol injection pain: a comparison with lidocaine. *Reg Anesth Pain Med* 1999 May-Jun;24(3):246-9.
14. Meeklein DW. Propofol injection pain: comparing the addition of lignocaine or metoclopramide. *Anaesth Intensive Care* 1991 Oct;22(5):568-70.
15. Liaw WJ, Pang WW, Cheng DP, Huang MH. Pain On Injection Of Propofol: The Mitigating influence Of Metoclopramide Using Different Techniques. *Acta-Anesthesia-Scan* 1999; 43 (1) 24-7.
16. Vella L, Francis D, Houlton P, Reynolds F. Comparison of the antiemetics metoclopramide and promethazine in labour. *Br Med Journal* 1985; 290:1173-1175.
17. Rosenblatt WH, Cioffi A-M, Sinatra R, Saverski LR, Silverman DG. Metoclopramide: an analgesic adjunct to patient-controlled analgesia. *Anesth Analg* 1991; 73:553-555.
18. Page VJ, Chhipa JH. Metoclopramide reduces the induction dose of propofol. *Acta Anaesthesiol Scand* 1997 Feb;41(2):256-9.