

مقایسه اثر درمانی سفتریاکسون مونوتروپی و سفتازیدیم همراه با آمیکاسین بعنوان درمان تجربی اولیه در بیماران با تب و نوتروپنی

بیمارستان امام (۱۳۷۹-۸۰)

دکتر رمضانعلی شریفیان (استادیار)، دکتر سید محمد محمدی (دستیار)، دکتر داود قاسمی (دستیار)، دکتر سید رضا صفائی (استادیار)،

دکتر غلامرضا توگه (استادیار) دکتر امیر حسین امامی (استادیار)

گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: تب و نوتروپنی یکی از فوریت‌های طب داخلی محسوب می‌شود که در صورت عدم تجویز زودهنگام آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف مرگ و میر مبتلایان بطور قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد بود لذا توصیه شده است درمان آنتی‌بیوتیکی بلافضله پس از بررسی اولیه و گرفتن نمونه‌ها جهت کشت، شروع گردد. در مورد نوع رژیم آنتی‌بیوتیکی تجربی اولیه بصورت تک دارویی یا چند دارویی اختلاف نظر وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر رژیم سفتریاکسون با رژیم سفتازیدیم + آمیکاسین بر قطع تب در مبتلایان به تب و نوتروپنی بود.

مواد و روشها: در این مطالعه RCT (کارآزمایی بالینی تصادفی شده) که طی مدت یک سال در بخش خون بیمارستان امام خمینی (ره) انجام شد، افراد ۱۲ سال به بالای با نوتروپیل کمتر یا مساوی ۱۰۰۰ عدد در میکرولیتر با دمای بدن در یک نوبت بیش از ۳۸/۵ درجه سانتی‌گراد و یا دو نوبت به فاصله ۱۲ ساعت بیش از ۳۸ درجه سانتی‌گراد به شرط عدم مصرف آنتی‌بیوتیک در ۴۸ ساعت قبل و عدم نارسایی ارگانهای حیاتی یا منشأ عفونت مشخص، بصورت تصادفی Block Randomization در یک گروه با رژیم سفتریاکسون دو گرم روزانه به صورت داخل وریدی و یک گروه با رژیم سفتازیدیم دو گرم هر ۸ ساعت داخل وریدی به همراه آمیکاسین ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت داخل وریدی قرار گرفتند. و در صورت قطع تب، حداقل در مدت ۷۲ ساعت و تداوم قطع تب حداقل بمدت ۴۸ ساعت جواب به درمان مثبت در نظر گرفته می‌شد. در انتهای ۲۸ نفر تحت رژیم سفتریاکسون و ۲۹ نفر تحت رژیم سفتازیدیم + آمیکاسین قرار گرفتند.

یافته‌ها: توزیع جنسی، میانگین سنی و شدت نوتروپنی در دو گروه مشابه بوده در گروه با سفتریاکسون ۱۹ نفر (۶۷/۹٪) و در گروه تحت درمان با سفتازیدیم + آمیکاسین ۱۵ نفر (۵۱/۷٪) به درمان پاسخ مثبت دادند ($P=0/2$) میانگین \pm انحراف معیار طول مدت تب در افرادیکه به درمان پاسخ داده بودند در گروه با سفتریاکسون $17 \pm 37/9$ و در گروه با سفتازیدیم + آمیکاسین $20/6 \pm 40/1$ ساعت بود ($P=0/7$). نتیجه کشت خون در دو گروه مشابه بود. (نتایج کشت مثبت ادرار یا خون، ۲۵ درصد در گروه A و ۲۷/۶ درصد در گروه B).

نتیجه گیری و توصیه‌ها: پیشنهاد می‌شود با توجه به اثربخشی مشابه و انتظار کاهش عوارض دارویی و هزینه رژیم تک درمانی با رژیم ترکیبی، رژیم تک درمانی با استفاده از آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف بعنوان درمان ابتدایی تب و نوتروپنی انتخاب شود.

نوتروپنیک تبدار در شرایط خاص کشور ما می‌باشد.

مقدمه

مواد و روشها

این یک مطالعه مداخله‌ای از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده (RCT) بود که به روش parallel و بصورت single blind در بخش خون بیمارستان امام خمینی (ره) در طی سالهای ۱۳۷۹ تا نیمه اول ۱۳۸۰ انجام شد. تمام بیماران پیش از ۱۲ سال مبتلا به بدخيسي هاي خونی که در زمينه بيماري و يا بدن بال كاهش شدید تعداد نوتروفيلها در زمينه بيماري اوليه و يا بدن بال شيمى درمانی اتفاق می‌افتد. کاهش نوتروفيلها بعد احتلال دفاع فاگوسيتik زمينه‌ساز بروز عفونتهاي باكتريالي و قارچي می‌باشد (۱). با افت تعداد نوتروفيلها به کمتر از ۱۰۰۰ عدد در ميكروليتر خطر عفونت افزایش می‌يابد و در صورتی که اين تعداد به کمتر از ۵۰۰ در ميكروليتر برسد کتترل فلورميکروبی مختلف شده و بروز عفونتهاي شدید و راجعه به طور چشمگير افزایش می‌يابد (۲). معمولاً بدن بال بروز تب در بیماران با کاهش قابل ملاحظه نوتروفيل (کمتر از ۱۰۰۰ عدد در ميكروليتر) علرغم برسی دقیق، عامل ایجاد کننده تب در اکثر موارد مشخص نمی‌شود (۳). و از طرف دیگر در صورت تأخیر در درمان عفونت ميزان مرگ و میر در اين افراد بالا خواهد بود (۴). بطوریکه تأخیر در درمان می‌تواند باعث مرگ و میر تا حدود ۷۰ درصد در بین مبتلایان شود (۵). بنابراین تب در این بیماران بعنوان وجود عفونت تلقی شده و هر چه سریعتر باید تحت درمان با رژیمهای تجربی آنتی‌بیوتیکی قرار گیرند (۶). مطالعات متعدد نشان داده‌اند که با شروع زودهنگام آنتی‌بیوتیکهای وسیع الطیف به ميزان قابل ملاحظه‌ای از مرگ و میر آنها کاسته می‌شود (۷). با توجه به شیوع عفونتهاي ناشی از باكتريهای گرم مثبت و گرم منفی رژیم‌های متعددی پیشنهاد شده‌اند. اکثر این رژیم‌ها چند دارویی بوده تا احتمال پوشش عوامل عفونی افزایش يابد. اما به احتمال زياد رژیم‌های تركيبی با افزایش خطر بروز عوارض دارويی و نيز افزایش هزينه درمانی همراه می‌باشد. طی چندين مطالعه رژیمهای تک دارويی از جمله استفاده از سفالوسپورين‌های نسل سوم (سفتریاکسون) نيز به اندازه رژیم‌های تركيبی (سفتریاکسون به همراه يك آمينوگلیکوزيد يا رژیم‌های وانکومايسین) مؤثر بوده‌اند (۸). اما همچنان در مورد نوع رژیم اولیه آنتی‌بیوتیکی تجربی در این بیماران به صورت تک دارویی يا چند دارویی اختلاف نظر وجود دارد. هدف از انجام اين مطالعه مقایسه اثر رژیم تک دارویی سفتریاکسون با رژیم دو دارویی سفتازیديم به همراه آمیکاسین در درمان بیماران خارج می‌شند و اگر بعد از ۷۲ ساعت تب قطع نمی‌شد رژیم


یکی از علل شایع مرگ و میر در بیماران سرطانی بخصوص بدخيسي هاي خونی عفونتها می‌باشد که معمولاً به علت کاهش شدید تعداد نوتروفيلها در زمينه بيماري اوليه و يا بدن بال شيمى درمانی اتفاق می‌افتد. کاهش نوتروفيلها بعد احتلال دفاع فاگوسيتik زمينه‌ساز بروز عفونتهاي باكتريالي و قارچي می‌باشد (۱). با افت تعداد نوتروفيلها به کمتر از ۱۰۰۰ عدد در ميكروليتر خطر عفونت افزایش می‌يابد و در صورتی که اين تعداد به کمتر از ۵۰۰ در ميكروليتر برسد کتترل فلورميکروبی مختلف شده و بروز عفونتهاي شدید و راجعه به طور چشمگير افزایش می‌يابد (۲). معمولاً بدن بال بروز تب در بیماران با کاهش قابل ملاحظه نوتروفيل (کمتر از ۱۰۰۰ عدد در ميكروليتر) علرغم برسی دقیق، عامل ایجاد کننده تب در اکثر موارد مشخص نمی‌شود (۳). و از طرف دیگر در صورت تأخیر در درمان عفونت ميزان مرگ و میر در اين افراد بالا خواهد بود (۴). بطوریکه تأخیر در درمان می‌تواند باعث مرگ و میر تا حدود ۷۰ درصد در بین مبتلایان شود (۵). بنابراین تب در این بیماران بعنوان وجود عفونت تلقی شده و هر چه سریعتر باید تحت درمان با رژیمهای تجربی آنتی‌بیوتیکی قرار گیرند (۶). مطالعات متعدد نشان داده‌اند که با شروع زودهنگام آنتی‌بیوتیکهای وسیع الطیف به ميزان قابل ملاحظه‌ای از مرگ و میر آنها کاسته می‌شود (۷). با توجه به شیوع عفونتهاي ناشی از باكتريهای گرم مثبت و گرم منفی رژیم‌های متعددی پیشنهاد شده‌اند. اکثر این رژیم‌ها چند دارویی بوده تا احتمال پوشش عوامل عفونی افزایش يابد. اما به احتمال زياد رژیم‌های تركيبی با افزایش خطر بروز عوارض دارويی و نيز افزایش هزينه درمانی همراه می‌باشد. طی چندين مطالعه رژیمهای تک دارويی از جمله استفاده از سفالوسپورين‌های نسل سوم (سفتریاکسون) نيز به اندازه رژیم‌های تركيبی (سفتریاکسون به همراه يك آمينوگلیکوزيد يا رژیم‌های وانکومايسین) مؤثر بوده‌اند (۸). اما همچنان در مورد نوع رژیم اولیه آنتی‌بیوتیکی تجربی در این بیماران به صورت تک دارویی يا چند دارویی اختلاف نظر وجود دارد. هدف از انجام اين مطالعه مقایسه اثر رژیم تک دارویی سفتریاکسون با رژیم دو دارویی سفتازیديم به همراه آمیکاسين در درمان بیماران خارج می‌شند و اگر بعد از ۷۲ ساعت تب قطع نمی‌شد رژیم

۲۱ نفر مذکور و ۷ نفر مؤنث در گروه با سفتازیدیم + آمیکاسین ۱۹ نفر مذکور و ۱۰ نفر مؤنث قرار داشتند ($P=0/4$), میانگین $۷/۸ \pm ۱/۸$ سنی ± انحراف معیار در گروه A و $۳/۰ \pm ۰/۳$ در گروه B سنی ± انحراف معیار در گروه A ($P=0/۳$). در مقایسه بین دو گروه از نظر شدت نوتropیک در گروه A، $7/1$ درصد افراد دارای نوتropیل کمتر یا مساوی $۵/۰$ در میکرولیتر و در گروه B $۹/۰$ درصد چنین شرایطی داشتند ($P=0/۱۲$). در گروه تحت درمان با سفتربیاکسون ۱۹ نفر (۶۷/۹٪) و در گروه تحت درمان با سفتازیدیم + آمیکاسین ۱۵ نفر (۵۱/٪) به درمان پاسخ مثبت دادند ($P=0/۲$) بعبارت دیگر تب آنها در طی ۷۲ ساعت اول بعد داشت (نمودار ۱). متوسط طول مدت تب در افرادیکه به درمان B پاسخ داده بودند در گروه A $۳/۷ \pm ۰/۹$ و در گروه B $۴/۰ \pm ۰/۱$ ساعت بود ($P=0/۷$) (نمودار ۲). کشت خون و یا ادرار در گروه A در ۷ نفر (۲۵٪) و در گروه B در ۸ نفر (۲۷/٪) مثبت بود. در این افراد با کشت مثبت در گروه A سه مورد و در گروه B نیز سه مورد نتیجه رنگ آمیزی بصورت گرم مثبت بود.


دارویی تغییر می یافتد اما در صورت قطع تب قبل از ۷۲ ساعت رژیم دارویی ادامه می یافتد. اگر قطع تب ۴۸ ساعت ادامه داشت پاسخ مثبت نسبت به رژیم دارویی تلقی می شد. با توجه به سابقه مصرف این داروها در مطالعات قبلی و تغییر رژیم داروها با توجه به وضعیت بیمار ملاحظه اخلاقی عمدہ ای وجود نداشت. اطلاعات بدست آمده با کمک نرم افزار آماری spss با استفاده از آزمونهای آماری Chi square و در صورت لزوم T-Student و Fisher exact معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج

در انتهای این مطالعه ۷۲ بیمار مورد بررسی قرار گرفتند که ۱۵ نفر (گروه A) نفر و در گروه B ۶ نفر) به خاطر احراز معیارهای خروج از مطالعه یا تصمیم و نظر پزشک معالج از این بررسی خارج شدند و در نهایت ۲۸ نفر تحت رژیم سفتربیاکسون (گروه A) و ۲۹ نفر تحت رژیم سفتازیدیم + آمیکاسین (گروه B) قرار گرفتند. در گروه با رژیم سفتربیاکسون



نمودار ۱- توزیع فراوانی نسبی نتایج درمانی در بیماران تحت درمان با رژیمهای A,B
(A: Ceftriaxone; B:Ceftazidime +Amikacin)



نمودار ۲ - مقایسه مدت تپس از شروع آنتی بیوتیک در بیماران تحت درمان با رژیمهای A,B.
(A: Ceftriaxone; B:Ceftazidime +Amikacin)

سفترياكسون مونو تراپي ۷/۹ درصد و در گروه با رژيم سفتازيديم + آميڪاسين ۵۱/۷ درصد بود که از نظر آماري اين تفاوت معنی دار نبود. جايگزیني افراد در دو گروه درمانی کاملاً بصورت تصادفي صورت گرفته بود چون دو گروه از نظر توزيع جنسی، ميانگين سنی و شدت نوتروپينی اختلاف معنی دار نداشتند. بين دو گروه از نظر متوسط طول مدت تپ، نتایج کشت و رنگ آميزي گرم تفاوت معنی داري مشاهده نشد. اگر چه عوارض جانبی رژيم های دارونی در مطالعه ما مورد بررسی نبوده است اما حذف آمينو گلیکوزید و عوارض شناخته شده آن با حفظ كارآيسی درمان ، موضوع مهم و قابل توجه می باشد. از طرف ديگر با در نظر گرفتن قيمت های فعلی ميانگين هزينه درمان آنتي بيوتيك در يك بيمار تحت درمان با رژيم A به مدت ۱۵ روز ۲۱۰,۰۰۰ ریال در حال يك ميانگين هزينه درمانی در بيمار گروه B در مدت مشابه ۱/۸۹۰,۰۰۰ ریال می باشد. بر اساس نتایج مطالعات مشابه و اين مطالعه به نظر می رسد رژيم تک درمانی با سفترياكسون بعنوان رژيم ابتدائي در بیماران مبتلا به تپ و نوتروپينی به اندازه رژيم آنتي بيوتيكی با پوشش دوگانه مؤثر باشد و به اين ترتيب علاوه بر دستيابي به اهداف درمانی ، بروز عوارض دارويي و هزينه های درمانی كمتر خواهد بود البته برای تأييد يكشنر اين نظريره انجام مطالعات مشابهی يكشناد می شود.

بحث

انتخاب رژيم مناسب و موثر اوليه در بیماران مبتلا به نوتروپينی و تپ، موضوع مهمی در تدبیر اين بیماران می باشد که هنوز مورد اختلاف نظر است. رژيم های مختلف و متعددی پيشنهاد شده است جرم های شایع منطقه، و حساسیت آنها به داروهای مختلف، دسترسی به دارو، سهولت تجویز و قیمت و هزینه داروها از عوامل مهم و تعیین کننده محسوب می شوند. در مورد انتخاب يك دارو (پوشش تک دارویی) یا چند دارو (پوشش ترکیبی) نیز اختلاف نظر وجود دارد. تاکنون رژيم های آنتي بيوتيكي متعدد و متنوعی مورد بررسی قرار گرفته اند. در طی چندین بررسی انجام شده رژيم های تک دارویی به اندازه رژيم های چند دارویی مؤثر بوده اند. در يك مطالعه پاسخ به رژيم سفترياكسون به تنهائي مشابه پاسخ به رژيم سفترياكسون بهمراه آمينو گلیکوزيد و یا وانکومايسين بود (۸). در مطالعه دیگري که در طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۲ انجام شد به ۲۷۶ نفر مبتلا به تپ و نوتروپينی سفترياكسون به تنهائي و به ۵۲۸ نفر سفترياكسون بهمراه داروي دیگر تجویز شد که پاسخ درمانی در گروه تحت درمان با سفترياكسون ۷۰/۸ درصد و در گروه درمان ترکیبی ۵۶/۹ درصد بود (۷).

در بررسی که ما انجام دادیم پاسخ به درمان در گروه با رژيم

منابع

1. Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, et al. Harrison's principle of internal medicine 15th ed. New York: Mc Graw-Hill, 2001, PP: 547-557.
2. Braunwald E, Fauci As, Kasper DC, et al. Harrison's Principle of internal medicine 15th ed. New York: MC Graw-Hill, 2001, PP:361-373.
3. Pizzo, PA. Management of fever in patients with cancer and treatment induced neutropenia, N Engl J Med 1993; 328:1323.
4. Quadri TL, Brown AE. Infectionus Complications in the critically ill patient with cancer. Semin onco; 2000, 27:335-346

5. Schimpff, SC, Satterlee, W, Young, VM, Serpick, A. Empiric therapy with carbenicillin and gentamicin for febrile patients with cancer and granulocytopenia. N Engl J Med 1971; 284:1061.
6. Coldman L, Bennett JC. Cecil Text book of medicine 21 th ed. Philadelphia: W.B.Saunders, 200, PP: 1569-1580.
7. Karthaus M, wolf HH, et al. Ceftriaxon monotherapy in the treatment of low risk febrile neutropenia. Chemo therapy 1998, 44:343-54.
8. Karthaus M, Suahoff T, et al. Therapy of febril neutropenia spisodes in systemic hematologic illness with new once daily ceftriaxon administration. Wein-meel-wochenschr (German). 1998: 148:481-7.