

## بررسی میزان سرکوب آدرنال توسط باتامتازون در خانمهای با زایمان زودرس

دکتر لاله اسلامیان (استادیار)\*، دکتر شهین یاراحمدی (دکترای تخصصی غدد و متابولیسم)، دکتر ملیحه آدینه (دستیار)\*

\* گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان شریعتی

### چکیده

مقدمه: تجویز باتامتازون به خانمهای با زایمان زودرس در سرکوب آدرنال نقش دارد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به شیوه مداخله‌ای (Interventional study) روی ۲۵ زن باردار در معرض زایمان زودرس انجام شده است. در دو هفته متوالی دو کورس باتامتازون هر بار دوازده میلی گرم باتامتازون عضلانی و تکرار آن بیست و چهار ساعت بعد تزریق گردید. یک هفته بعد از هر تزریق، تست ACTH انجام شد که تست اول بین سن حاملگی ۳۰-۳۱ هفته و بعدی یک هفته بعد تکرار شد. سطح کورتیزول پایه قبل از تزریق دوز اول باتامتازون وسیس هفته آینده قبل و ۳۰ دقیقه بعد از انجام هر تست ACTH، اندازه گیری گردید.

نتایج: میه خانمهای شرکت کننده باردار، کورتیزول پایه نرمال داشتند. سطح کورتیزول با هر تزریق باتامتازون از  $\mu\text{g/dl}$   $24/32 \pm 0/77$  به  $1/73 \pm 7/22$  (یک هفته بعد از کورس دوم باتامتازون) رسید ( $p < 0.0001$ ). میانگین کورتیزول بعد از تست ACTH همچنین از  $\mu\text{g/dl}$   $1/44 \pm 1/44$  به  $22/93 \pm 2/69$   $\mu\text{g/dl}$  رسید ( $p < 0.007$ ) (یک هفته بعد از کورس دوم باتامتازون) ۳ خانم حامله یک هفته بعد از اولین کورس دچار ساپرس آدرنال شدند و ۱۵ مورد بعد از کورس دوم سرکوب آدرنال را تجربه کردند. کورتیزول کمتر از  $\mu\text{g/dl}$  ۶ هیچگونه علامتی دال بر حمله آدیسون در قبل از بارداری یا حوالی زایمان رخ نداد.

بحث و نتیجه‌گیری: تجویز باتامتازون قبل از زایمان به خانمهایی که در معرض زایمان زودرس هستند سرکوب قابل اندازه گیری آدرنال ایجاد می‌کند و تعداد خانمهایی که آدرنال آنها سرکوب شده است با تکرار باتامتازون هفتگی افزایش می‌یابد.

### مقدمه

استفاده هفتگی آن را پیشنهاد می‌کنند ولی دیده شده که درمان مادر با دوزهای مکرر، با آثار نامطلوب جنبی نوزادی و آثار طولانی مدت همراه است (۱). از جمله تکامل غیر طبیعی سایکوموتور (۲)، سپسیس زود هنگام نوزادان، کوریو آمینونیت و مرگ نوزادان (۳)، کاهش اندازه دور سر (۴) و کاهش قد و وزن هنگام تولد وابسته به دز (۴). یکی از اثرات کورتیکو استرونیدها در مادر اثر باتامتازون بر سرکوب محور هیپوپotalamus-هیپوفیز-آدرنال مادر بوده (۵) و دیده شده که استفاده هفتگی (حداقل طی ۲ هفته) اثر قوی بر محور فوق

استفاده از گلوکوکورتیکونیدها در حین حاملگی در خانمی باریسک زایمان قبل از موعد، از بروز دیسترنس تنفسی انترکولیست نکروزان، خونریزی داخل مغزی، مرگ و میر پره ناتال می‌کاهد (۱). دارونی که برای این منظور استفاده می‌شود بنا متازون بوده که یک گلوکوکورتیکونید طولانی اثر با قدرتی سه برابر هیدروکورتیزون می‌باشد (۶). چون حد اکثر قدرت این دارو ۲-۷ روز بعد از تزریق عضلانی آن می‌باشد

## یافته ها

از میان ۲۵ مادر باردار متوسط سن مادر باردار  $۳۷.۷ \pm ۰.۴$  سال و اکثریت (۷۱٪) با وزن بالاتر از حد نرمال ( $BMI > ۲۲$ ) که در سن متوسط حاملگی  $1w \pm 4d$  و ۲۹ هفته قرار داشتند. ریسک فاکتور های زایمان زودرس به ترتیب: سابقه زایمان زودرس (۱۸ مورد) کوتاه شدن طول سرویکس بدون ساقه زایمان زودرس (۴ مورد) و جفت سرراهی (۳ مورد). سطح کورتیزول پایه در همه در حد نرمال و یا هر تزریق بتا متازون به ترتیب از  $۰.۷۷ \mu\text{g}/\text{dl} \pm ۰.۳۲$  به  $۱.۰۹ \mu\text{g}/\text{dl} \pm ۱.۰۳$  در هفته اول و  $۱.۷۳ \mu\text{g}/\text{dl} \pm ۰.۳۳$  در هفته دوم رسیده که کاهش سطح کورتیزول در این سه زمان اختلاف معنی داری داشتند ( $P < 0.0001$ ). و سطح کورتیزول بعد از تست تحریکی از  $۰.۴۴ \mu\text{g}/\text{dl} \pm ۰.۹۳$  در هفته اول بعد از کورس اول بتاماتازون به  $۰.۷۹ \pm ۰.۵۳$  در هفته دوم رسید که اختلاف معنی دار بوده است ( $P < 0.007$ ). سطح کورتیزول سرم یک هفته بعد از تجویز بتاماتازون در ۳ خانم غیر طبیعی (زیر  $۰.۶ \mu\text{g}/\text{dl}$ ) و بعد از کورس دوم بتاماتازون در ۱۵ خانم غیر طبیعی بوده است و تعداد ۵ خانم پاسخ غیر طبیعی به اولین تست ACTH (۱ هفته بعد از تجویز بتاماتازون داشتند) (کورتیزول بعد از تست کمر از  $۰.۴ \mu\text{g}/\text{dl}$  و بعد از کورس دوم  $۰.۶ \mu\text{g}/\text{dl}$  پاسخ غیر طبیعی به تست ACTH داشتند. میزان قند ناشتا از  $۰.۷۱ \pm ۰.۷۱ \text{ mg}/\text{dl}$  به  $۰.۱ \pm ۰.۱ \text{ mg}/\text{dl}$  رسید ( $P < 0.05$ ).  $BMI = ۲۰.۰ \pm ۰.۰$  و  $\text{Kg}/\text{m}^2 = ۲۶.۲ \pm ۰.۲ \text{ Kg}/\text{m}^2$  فشار خون سیستولی از  $۱۰۲/۹۵$  به  $۱۰۷/۶۶ \pm ۰.۱/۰.۱$  رسید ( $P < 0.658$ ). و فشار خون دیاستولی از  $۶۳/۹۱$  به  $۶۱/۷۳ \pm ۰.۲/۰.۲ \text{ mmHg}$  رسید که ( $P < 0.454$ ). نوزادان ۶ مورد وزن زیر  $۲۰۰ \text{ gr}$  (LBW) و ۱۸ مورد وزن نرمال داشتند ۱۰ مورد زایمان ترم و ۱۴ مورد زایمان قبل از ۳۷ هفته یا پره ترم داشتیم آپگار نوزادان در حد مطلوب به غیر از ۲ نوزاد که با آپگار، ۶ متولد شدند و بعد از عملیات احیا آپگار، مناسب داشتند. مرگ و میر نوزادی نداشتیم (جدول ۱ و ۲).

داشته (۱) جنبه دیگر در ارتباط با استفاده از چند نوبته شامل احتمال سرکوب آدرنال جنین و محدود شدن رشد می باشد (۱)، از آنجا که میزان زایمان زودرس به علل مختلف از جمله روش های کمک باروری (ART) و فراهم شدن امکانات نگهداری نوزادان با سن پائین تر روزبه روز افزایش می یابد عملاً تمایل به استفاده از بتا متازون جهت بلوغ زودتر ریه ها و سایر فواید آن نیز افزایش یافته است لذا این تحقیق به منظور بررسی میزان پیشرفت نارسا ای آدرنال در افرادی که قبل از ساقه ای از بیماری آدرنال نداشته اند انجام شده که فقط دوره استفاده از بتا متازون توانسته است سرکوب قابل اندازه گیری آدرنال ایجاد کند.

## مواد و روشها

در این مطالعه که به شیوه مداخله ای "Interventional study" انجام شده است ۲۵ زن باردار در هفته های ۳۰ تا ۳۱ که در خطر زایمان قبل از موعد بودند (داشتن سابقه زایمان خودبخود قبل از ۳۷ هفته، باز شدن یا کوتاه شدن سرویکس بدون زایمان قبل از موعد، سرویکس نارسا، جفت سرراهی) و جهت مراقبت های دوره بارداری در سال ۱۳۸۰-۸۱ به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان دکتر شریعتی مراجعه کرده یا در بخش بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند به این ترتیب که در اولین مراجعته و هفته بعد ابتدا قند خون، فشار خون وزن و سطح کورتیزول پایه سرم چک شده و بتا متازون عضلانی (تزریق اولیه  $۱۲ \text{ mg}$  و پس تکرار آن ۲۴ ساعت بعد) تجویز می شد. اولین تست ACTH یک هفته بعد از تزریق بتا متازون و تست بعدی هفته آینده انجام شده است و سطح کورتیزول سرم قبل (سطح پایه) و ۳۰ دقیقه بعد از تجویز ACTH چک شده است. نتایج بر اساس میانگین  $\pm$  انحراف معیار ( $\text{mean} \pm \text{SD}$ ) بیان شده و داده ها توسط آزمون Repeated measure و کای دو بررسی شد. اختلاف معنی دار آماری بر اساس ( $P < 0.05$ ) تعریف شد.

جدول شماره ۱- توزیع خصوصیات مادری و نوزادی شرکت کننده در مطالعه (بیمارستان شریعتی سال ۱۳۸۰-۸۱)

متغیر	Mean $\pm$ SD	Range
سن مادر	۲۶/۷ $\pm$ ۰/۴	۲۱-۳۲
تعداد حاملگی	۱/۸ $\pm$ ۱/۱	۱-۵
تعداد زایمان	۰/۷ $\pm$ ۱	۰-۴
سن حاملگی	۲۹ W <sub>۱</sub> و ۴ d $\pm$ ۱ d و W <sub>۲</sub>	۲۹ W <sub>۱</sub> و ۴ d $\pm$ ۱ d و W <sub>۲</sub>
طول سرویکس (cm)	۳۰/۸ Mm	۲۵-۴۱ mm
سن حاملگی موقع تولد	۳۵ W <sub>۶</sub> D	۲۶ W <sub>۶</sub> D-۳۷ W <sub>۶</sub> D
وزن موقع تولد(گرم)	۲۵۰۰ $\pm$ ۱۲/۸۶	۲۲۰۰-۳۱۰۰
آپگار موقع تولد	۷ $\pm$ ۱	۶-۹
تعداد		درصد
طبیعی	۸	٪۳۲
سرارین	۱۶	٪۶۴
ترم	۱۰	٪۴۰
زودرس	۱۴	٪۰۶

جدول ۲- مقایسه خصوصیات بالینی و سطح کورتیزول پایه و بعد از تجویز باتامتاژون در دو هفته متوالی (براساس آزمون Repeated measure)

بیمارستان شریعتی ۸۱-۱۳۸۰

متغیر	پایه	بعد از کورس اول باتامتاژون	بعد از کورس دوم باتامتاژون	P.value
کورتیزول سرم (μg/dl)	۲۴/۳۲ $\pm$ ۰/۷۷	۱۱/۰۳ $\pm$ ۱/۰۹	۷/۸۳ $\pm$ ۱/۰۷	*P < 0.001
کورتیزول سرم بعد از تست (μg/dl)	۲۴/۳۲ $\pm$ ۰/۷۷	۲۳/۹۳ $\pm$ ۱/۴۴	۱۹/۰۳ $\pm$ ۲/۶۹	*P < 0.007
BMI (Kg/m <sup>2</sup> )	۲۶/۳۷ $\pm$ ۲/۰۳	۲۶/۶۶ $\pm$ ۲/۳۲	۲۶/۸۹ $\pm$ ۲/۲۶	*P < 0.001
FBS (mg/dl)	۸۰/۰۴ $\pm$ ۱۷/۰۱	۸۴/۵۰ $\pm$ ۸/۹۲	۸۵/۰۴ $\pm$ ۱۷/۰۱	*P < 0.05
فشار خون سیستولی (mmHg)	۱۰۲/۹۵ $\pm$ ۲۰/۸۱	۱۰۷/۰۸ $\pm$ ۸/۰۶	۱۰۶/۶۶ $\pm$ ۲۲/۱۹	P < 0.658
فشار خون دیاستولی mmHg	۶۱/۷۳ $\pm$ ۱۲/۳۲	۶۴/۷۸ $\pm$ ۸/۴۵	۶۳/۹۱ $\pm$ ۴/۹۹	P < 0.454

\* P &lt; 0.05

دوزهای تکراری تجویز کورتیکواسترونیدها در دوره قبل از زایمان فقط باید در بیماران مشارکت کننده در کارآزمائی‌های بالینی استفاده شود تا زمانی که اطلاعات حاصل نسبت مطلوب «نفع به خطر» را به اثبات برسانند (۱). McKenna و همکاران (۲۰۰۱) سرکوب محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال مادر پس از دریافت بیش از دو دز کورتون را نشان دادند (۶). مطالعه مشابه توسط Dorr (۲۰۰۱) بر روی ۱۰ زن حمله که در معرض زایمان قبلاً از موعد بودند انجام شد روش مطالعه همانند روش مطالعه ما بوده یعنی بعد از ۲ کورس کورتون و تزریق ACTH سطح کورتیزول سرم چک شد که در بین ۱۰

## بحث

کمیته طب زایمان کالج آمریکا (۱۹۹۸) نگرانیهایی را در مورد آثار نامطلوب جنینی و نیز آثار احتمالی بر وضعیت ایمنی مادر در موارد استفاده از دزهای هفتگی مکرر استروئنیدها ابراز کرده است به صورتی که دوزهای تکراری فقط در صورت نیاز تجویز شوند یعنی، «رهایی بخش، Rescue» هنگامی تجویز شود که مجدداً خطر زایمان زودرس وجود دارد. (۷) در آگوست ۲۰۰۰ یک موافقت انجام شده و اعلام گردید که

قرار دهد. مطالعه حاضر پیشنهاد می‌کند که پزشکان نسبت به علائم سرکوب آدرنال برای خانم‌هایی که دوزهای مکرر کورتون دریافت می‌کنند آگاهی لازمه را داشته باشد و تا زمانی که اطلاعات حاصل نسبت مطلوب «فعّه به خطر» ثابت نشده است از مصرف دوزهای تکراری پرهیز کنند.

#### پیشنهادات:

- ۱- علیرغم وجود مزایای اثبات شده کورتون در جلوگیری از سندروم دیسترس تنفسی و خونریزی داخل مغزی، حین مصرف کورتون مخصوصاً مصرف چند نوبت آن به خطرات احتمالی و ثابت نشده کورتون توجه داشته باشیم.
- ۲- تا وقتی علائم زایمان زودرس که نشان دهنده قریب الوقوع بودن زایمان است مشخص نشده است از تجویز دوزهای تکراری پرهیز کنیم.

خانم باردار ۴ نفر یک هفته بعد از تزریق اولین بتامتاژون پاسخ غیر نرمال داشتند و ۷ نفر بعد از دومین تزریق پاسخ غیر طبیعی داشتند متوسط کورتیزول در خانم‌هایی که بتامتاژون گرفته بودند  $363 \pm 1/4 \mu\text{g/dl}$  بود در مقایسه با  $16 \mu\text{g/dl} \pm 70/3$  در خانم‌هایی که استرونید دریافت نکردند. در مطالعه ما نیز نتایج مشابه بدست آمده بطوریکه کاهش سطح کورتیزول به طور معنی دار و قابل اندازه گیری کاهش یافته است ولی تغییرات قابل توجه در BMI، قند خون ناشتا و فشار خون سیستولی و دیاستولی ایجاد نشده ولی مختصراً افزایش در BMI مادران باردار مشاهده شده که از لحاظ بالینی قابل توجه نبوده است. این مطالعه از این بابت اهمیت دارد که پیشرفت نارسانی آدرنال در افرادی که قبل از نرمال بوده و سابقه نارسانی آدرنال نداشته‌اند بعد از ۲ دز استفاده از بتامتاژون نارسانی آدرنال نشان داده شد و دیده شد که استفاده مکرر می‌تواند به طور معنی دار و قابل اندازه گیری محور فوق را تحت تاثیر

## منابع

1. Cunningham-C; Mac Donald-F; et al. Test book of williams obstetrics; Appleton lange, USA, philadelphia; 21 Edition, 2001: 682-728.
2. Yeh T; Lin. Y; et al. Early dexamethason therapy in preterm infant : A follow up study pediatrics 1998; 101: 87-9.
3. Ghidini A; Minor VK. Repeated Courses of steroids in preterm membrane rupture do not increase the risk of histologic chorioamnionitis: Am J Obstet Gynecol 1997; 14 : 309-13.
4. Alen leuiton; et al. Antenatal Corticosteroids and cranial ultrasonographic abnormality: Am. J. Obstet Gynecol 1999; 181 : 7-17.
5. Mckenna DS; Wittber GM; et al. The effects of repeated doses of antenatal corticosteroids on maternal adrenal function [ abstract]. Am J Obstet Gynecol 1999; 180: 15.
6. Kenneth J. Helal. M; et al: Adrenal suppression induced by betamethasone in women at risk for premature delivery. Am J Obstet Gynecol 2000; 96: 287-90.
7. Door , Helal, Gordon; et al. Adrenal suppression induced by Betamethasone in women at Risk for premature Delivery Am J Obstet Gynecol 2000; 287-290.
8. Ballard PL. Scientific basis and therapeutic regimens for use of antenatal glucocorticoids. Am J obstet Gynecol 1995; 173 : 254-62.