

هیپرکلسيوري در کودکان دیابتی

مرکز طبی کودکان (۱۳۷۹)

دکتر فریدون مصطفوی، دکتر محمدجواد توکلی

بخش غدد مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

بیماری دیابت قندی شایع‌ترین بیماری متابولیک اندوکرین دوران کودکی و نوجوانی است که اثرات قابل توجه بر تکامل جسمی و روانی بیماران بر جای می‌گذارد. در مطالعات متعدد، مشخص شده که در بیماران دیابتی نوع یک، کاهش واضح توده استخوانی و نیز رشد قدی در دراز مدت ایجاد می‌شود. برای بررسی این مشکلات، تحقیقات وسیعی انجام گردیده و مشخص شده که در بسیاری از بیماران دیابتی، مقادیر مختلف کلسیم در ادرار دفع می‌گردد. ممکن است علت استثوابی و اختلال رشد قدی کودکان دیابتی نیز دفع بیش از حد کلسیم در ادرار باشد. در این مطالعه بر آن شدید تا با بررسی گروهی از بیماران دیابتی، میزان دفع کلسیم ادراری را در آنها بررسی کنیم و در مواردی که دفع کلسیم بیش از حد طبیعی بود، بینیم آیا بین میزان دفع کلسیم با میزان قند خون همزمان ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ لذا با بررسی ۵۰ کودک دیابتی که در شش ماهه دوم سال ۱۳۷۹ به بیمارستان مرکز طبی کودکان مراجعته کرده بودند، به این نتیجه رسیدیم که فراوانی هیپرکلسيوري در بیماران ۸۸٪ بود و ارتباط معنی داری با قند ادرار داشت و به طور معنی داری با افرادی که سالم هستند متفاوت بود. این تحقیق نشان دهنده تأثیر گلیکوزوری روی رشد بیماران است که می‌تواند مقداری از آن به علت دفع کالری باشد و مقداری به علت دفع کلسیم و نهایتاً با کنترل مناسب قند خون می‌توان از این دو به نحو چشمگیری کاست.

نمونه ادرار تصادفی نیز استفاده کرد (۳). مقدار طبیعی این

نسبت در کودکان (بعد از دوره شیرخوارگی) حداقل ۰/۲۵

است (۴). از سال‌ها قبل مشخص شده که وجود هیپرکلسيوري

بدون همراهی با هیپرکالسیمی در کودکانی که از همه جهات دیگر

سالم هستند، می‌تواند باعث استثوابی (۵) و نیز کاهش رشد قدی

در دراز مدت شود (۶). فراوانی هیپرکلسيوري در جوامع و

مطالعات مختلف تفاوت‌های ناچیز نشان می‌دهد. مثلاً در مطالعه

۲۷۳ کودک سالم توسط Moore و همکاران (۷)، هیپرکلسيوري

در ۲/۹٪ آنان کشف شد. و یا در مطالعه Kruse و همکاران (۸)

بر روی ۵۶۴ کودک سالم، فراوانی هیپرکلسيوري ۳/۸٪ گزارش

شد (البته این مطالعه بر اساس اندازه‌گیری در ادرار ۲۴ ساعته

بیماران بود). همچنین در بررسی فراوانی هیپرکلسيوري در

گروهی از دانش‌آموzan دبستانی تهران (۹) شد، نسبت Ca/Cr در

نمونه ادرار در ۲۵٪ موارد بالاتر از مقادیر طبیعی بود. با توجه به

اینکه در کودکان دیابتی، کاهش توده استخوانی و اختلال رشد

قدی دیده می‌شود (۱۰، ۱۱، ۱۲). مطالعه وسیعی توسط محققین

مختلف جهت کشف علت آن انجام شده است. در بررسی‌های

مقدمه

دیابت ملیتوس یک اختلال غدد درون‌ریز بدن است که مهم‌ترین مشخصه آن بالا بودن قند خون است. علت آن، اختلال در ترشح انسولین و یا اختلال در اثرات انسولین و یا هر دو می‌باشد. هیپرکلسيوري عبارتست از دفع بیش از ۴ mg/kg/day کلسیم در ادرار (۱). هیپرکلسيوري در بیماران دیابتی با ایجاد یک هیپرکلسيمي خفیف می‌تواند منجر به افزایش هورمون پاراتورمون شده و متعاقب آن جذب کلسیم از روده و برداشت کلسیم استخوان‌ها را تشديد نماید. همچنین علایمی نظیر سوزش ادرار، هماتوری، پروتئینوری، شب‌ادراری، عفونت‌های ادراری و سنگ‌های ادراری همگی ممکن است در زمنیه هیپرکلسيوري ایجاد گردد (۲).

اندازه‌گیری مقدار دفع ۲۴ ساعته کلسیم در ادرار، روش دقیقی جهت بررسی موارد هیپرکلسيوري است، ولی برای غربالگری (screening) می‌توان از اندازه‌گیری نسبت Ca/Cr در

دیابتی نباشد، در خواست آزمایش اندازه گیری کلسیم و کراتینین و گلوکز در نمونه ادرار راندم، و نیز کلسیم و فسفر و آلکالن فسفاتاز و میانگین قند خون ۲۴ ساعته می کردیم. آزمایشات فوق همگی در آزمایشگاه بیمارستان مرکز طبی کودکان انجام شد. SPSS سپس یافته ها وارد رایانه شده و با بهره گیری از برنامه t-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نوع تست آماری t-test غیر زوجی بود.

یافته ها

از بین ۵۰ کودک دیابتی تحت مطالعه ۲۶ نفر (۵۲٪) دختر و ۲۴ نفر (۴۸٪) پسر بودند. میانگین سنی بیماران ۸/۲۲ سال بود. حداقل سن بیماران ۴ سال و حداکثر آن ۱۲ سال بود. دفع بیش از ۰/۸۸ حد کلسیم در ادرار، بر اساس نسبت Ca/Cr ۲۵ درصد در بیماران یافت شد. میانگین نسبت Ca/Cr ادراری در گروه بیماران هیپرکلسوریک ۰/۳۱ ± ۰/۳۱ بود. بین میزان قند خون و میزان دفع کلسیم در ادرار، رابطه معنی داری کشف نشد. همچنین میزان دفع ادراری کلسیم با سطح آلکالین فسفاتاز سرم ارتباطی نداشت ولی بین میزان دفع ادراری کلسیم با میزان دفع ادراری گلوکز ارتباط معنی دار وجود داشت. یعنی در مقادیر بالاتری از دفع گلوکز در ادرار، میزان دفع کلسیم در ادرار نیز افزایش نشان می داد (گرچه این ارتباط خطی نیست)، به طوری که میانگین نسبت Glu/Cr ادراری در دیابتی های نرمولکلسوریک ۱۹/۲۴ ± ۱/۷۲ و در دیابتی های هیپرکلسوریک ۸۳/۴۵ ± ۲/۰۹ بود ($P=0.95$).

Marry F Witt (۱۳) بر روی ۲۶ کودک دیابتی، نسبت Ca/Cr در ادرار تصادفی طیف وسیعی داشت و از مقادیر نرمال تا مقادیر بسیار بیشتر از نرمال متفاوت بود، و نیز نسبت Ca/Cr ادرار ارتباطی با میزان قند خون این بیماران نداشت. همچنین در مطالعات انجام شده توسط Dominguez Tider (۱۴) چنین نتیجه گیری کردند که میانگین نسبت Ca/Cr ادراری در ادرار راندم آنها به طور واضح بالاتر از کودکان سالم بود. و یکی از علل ایجاد استثوپنی و اختلال رشد قدی در کودکان دیابتی را هیپرکلسوری دانستند. ما نیز در مطالعه پیش رو، نسبت Ca/Cr در نمونه ادرار راندم گروهی از کودکان دیابتی را بررسی کردیم، تا بینیم نسبت به جمعیت سالم، این مقادیر تفاوت های قابل ملاحظه ای را نشان خواهد داد یا خیر. البته به علت مشکلات جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته در کودکان خارج از بیمارستان مخصوصاً بچه های کوچکتر و احتمال اشتباه این کار انجام نشد، ضمناً نمونه گیری ادرار در حالت ناشتا و پس از تخلیه ادرار شب انجام شد و در بیماران بستری این کار انجام نگرفت زیرا کاملاً واضح است که بی حرکتی باعث هیپرکلسوری می شود.

مواد و روش ها

تعداد ۵۰ کودک مبتلا به دیابت ملیتوس که نیمه دوم سال ۱۳۷۹ به درمانگاه مرکز طبی کودکان مراجعه کرده بودند، تحت بررسی قرار گرفتند. برای هر بیمار، پس از اطمینان از آن که به جز دیابت مشکل دیگری نداشته و نیز در حالت کتواسیدوز

جدول شماره ۱- بررسی وضعیت دفع کلسیم ادراری در ۵۰ کودک همراه عکس به مرکز طبی کودکان در سال ۱۳۷۹

	میانگین نسبت SD ادراری Glu/Cr	میانگین نسبت SD ادراری Glu/Cr
هیپرکلسوریک	۰/۳۱ ± ۰/۳۱	۸۳/۴۵ ± ۲/۰۹
نرمولکلسوریک	۰/۰۴ ± ۰/۰۴	۱۹/۴۴ ± ۱/۷۲
مجموع	—	—

$P<0.05$

$P<0.05$

ادرار راندم، یک روش غربالگری جهت بررسی میزان دفع کلسیم ادرار است و برای یافتن موارد قطعی هیپرکلسوری می توان از اندازه گیری میزان کلسیم ادرار ۲۴ ساعته کمک گرفت. ولی با توجه به مطالعات قبلی برخی محققین در مورد فراوانی هیپرکلسوری در کودکان سالم ایرانی فراوانی بالا بودن نسبت Ca/Cr ادرار راندم ۲۵٪ بود، که پس از بررسی ادرار ۲۴ ساعته

بحث

هدف عمله ای که در این مطالعه به دنبال آن بودیم، برآورد فراوانی هیپرکلسوری در بین ۵۰ کودک مبتلا به دیابت بود. چون احتمال می دادیم این میزان در بین این بیماران به مقدار قابل توجه بالاتر از جمعیت سالم باشد. می دانیم که روش بررسی Ca/Cr

فراوانی قابل توجه هایپرکلسیوری در کودکان دیابتی، بجاست که در این بیماران، در کنار سایر توجهات و کنترل های روتین، میزان دفع ادراری کلسیم نیز اندازه گیری شود، و در صورت هایپرکلسیوریک بودن اقدامات درمانی کلی که در مورد بیماران هایپرکلسیوریک غیر دیابتی رعایت می شود (مثل مصرف مایعات کافی، اجتناب از مصرف بیش از حد نمک، اجتناب از مصرف غذاهای حاوی اگزالات بالا، پیگیری از نظر ایجاد سنگ های ادراری و ...) در مورد این بیماران نیز اعمال گردد تا عوارض دراز مدت هایپرکلسیوری (مثل استئوپنی، اختلال رشد قدی، تشکیل سنگ های ادراری و ...) نیز به حداقل برسد. البته در بیماران دیابتی تنظیم دقیق قند خون می تواند هایپرکلسیوری را به حداقل کاهش دهد و در واقع مهم ترین اقدام برای این بیماران محسوب می شود.

در اینها، هایپرکلسیوری در ۳/۵ تا ۵/۳ درصد این افراد، سالم تحت بررسی قطعیت یافت (۹). اگر مطالعه خودمان را با مطالعه مذکور مقایسه کنیم، مشخص می شود که نسبت Ca/Cr ادراری بالاتر از نرمال، در ۸۸٪ بیماران دیابتی تحت بررسی وجود داشته است، که ۳/۴ برابر بیشتر از جمعیت سالم است. در این مطالعه ما به این نتیجه رسیدیم که در بیماران تحت مطالعه نسبت Ca/Cr ادراری طیف وسیعی داشت و در برخی بیماران در محدوده طبیعی و در برخی دیگر بسیار بیشتر بود. و نیز اینکه بین قند خون و میزان دفع ادراری کلسیم ارتباطی به دست نیامد، که این یافته ها با نتایج بررسی های Mary F Witt و همکاران (۱۲) مطابقت دارد. همچنین در مطالعه ما مشخص شده، که نسبت Ca/Cr ادراری در کودکان دیابتی خیلی بالاتر از کودکان سالم است، که دقیقاً منطبق بر نتایج بررسی های John I Malon (۱۲) می باشد. با توجه به مجموع نتایج به دست آمده و با توجه به

منابع

1. Mark A. Sperling, diabetes mellitus in Nelson textbook of ped W.B Saunders Company 2000; 1077-1079.
2. Albright FP, et al. Idiopathic hypercalciuria. A preliminary report. Proc Royal Soc Med 1983; 46: 1077-1079.
3. Santos F, Saurez D. Idiopathic hypercalciuria in children. J Pediatrics 1987; 110: 238-243.
4. Tider M, et al. Hereditary hypophosphatemic rickets, with hypercalciuria. N Eng J Med 1985; 312: 611-617.
5. Rasmussen H. Familial hypophosphatemic rickets, and vit D dependent rickets. New York. Mc Grawhill 1978; 1537.
6. Coc FL, Moore ES. Familial idiopathic hypercalciuria. N Eng J Med 1979; 300: 337-340.
7. Kruse K. Reference value for urinary calcium excretion and screening for hypercalcemia. Eur J Ped 1984; 25: 143-146.

-۸- پایان نامه تحصصی کودکان: دکتر سید طاهر اصفهانی، دکتر عباس مدنی، دکتر اشرف سیادتی، سید علی، دکر محمد نبوی. بررسی فراوانی هایپرکلسیوری و علایم و نشانه های بالینی ناشی از آن در بین کودکان منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران

۱۳۷۸

9. Santiago JV. Decreased cortical thickness and osteopenia in children with diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab 1977; 45: 845-848.
10. Bloom R, et al. Diminution of bone mass in childhood diabetes 1997; 26: 1052-1055.
11. John I Moio. Hypercalciuria, hyperphosphaturia and growth retardation in children with diabetes mellitus 1086; 78: 298-304.
12. Mary F Witt. Use of oral calcium loading to characterize the hypercalciuria of young IDDM. J Clin Endocrinol Metab 1983; 57: 94-100.
13. Dominguez JH, Gray RW. Dietary phosphate deprivation. J Clin Endocrinol Metab 1976; 43: 10-14.