

گزارش لنفادنوباتی گردنی به عنوان تنها تظاهر سارکوئیدوز

دکتر مسعود مقدم، استادیار گوش و حلق و بینی، پیارستان امیراعلم

دکتر امیر آروین سازگار، استادیار گوش و حلق و بینی، پیارستان امام خمینی

Cervical Lymphadenopathy as the Only Manifestation of Sarcoidosis ABSTRACT

Sarcoidosis is a chronic multisystem disorder of unknown etiology. All parts of the body can be affected but the organ most frequently affected is the lung. Otolaryngologic manifestations occur in 20% to 40% of cases of Sarcoidosis and the spectrum of lesions that may come under the purview of Otolaryngologist is broad.

In this case report a patient is presented with large cervical lymphadenopathy and without other manifestation of disorder.

Key Words: Sarcoidosis Cervical; lymphadenopathy

چکیده

زیبایی برایش مشکلی را بوجود نیاورده بود. بعلت سیر بطنی آن بیمار مراجعات پزشکی متعددی نداشته است. بیمار هیچ شکایت دیگری چون تنگی نفس حتی در هنگام فعالیت نداشته و از درد یا ناراحتی در هیچ عضو دیگری از بدنش شاکی نبوده است.

مورد مشابهی را در فامیل یا اطرافیان ذکر نمی‌کند. بجز مصرف گاهگاهی رنگ مو با ماده شیمیایی دیگری در تماس نبوده و هیچ دارویی را استفاده نمی‌کرده است. قبل و بعد از پیدایش علائم فوق بیماری تبدار، تعریق، عرق شبانه، اختلال خلقی، ... نداشته است.

سارکوئیدوز یک بیمار مولتی سیستم مزمن با اتیولوژی ناشناخته می‌باشد. تمامی قسمتهای بدن می‌توانند درگیر شود، ولی ریه ارگانی است که بیش از همه مبتلا می‌گردد. تظاهرات اوتولارنیگولوژیک در ۲۰ تا ۴۰٪ موارد سارکوئیدوز اتفاق افتاده و متخصص گوش و گلو و بینی ممکن است با طیف وسیعی از ضایعات مواجه شود.^(۱، ۲، ۳)

در این مقاله بیماری معرفی می‌شود که با لنفادنوباتی‌های بزرگ گردنی و بدون سایر تظاهرات سارکوئیدوز مراجعه نموده است.

گزارش بیمار

خانم ف. ش، ۵۶ ساله اهل و ساکن تهران، شغل منشی

علت مراجعه: توده‌های متعدد تحت فکی و گردنی

تاریخ مراجعه: آذرماه ۱۳۷۷

تاریخچه بیماری: از حدود ۵ سال قبل بیمار متوجه رشد تدریجی توده‌های غیر حساس و بدون درد در نواحی زیر چانه و تحت فکی دو طرف شده‌است که در این مدت بجز از لحاظ

معاینه

بیمار خانم میانسالی با حال عمومی خوب و همکاری مناسب می‌باشد. در راه رفتن و بالارفتن از پله‌ها هیچ محدودیتی ندارد و در معاینه عمومی از نظر تب، فشار خون و سایر علائم حیاتی، سمع قلب و ریه، معاینه کامل سینه و شکم

از یکی از بزرگترین عدد لنفاوی تحت فکی بیمار گرفته شد.
آسیب شناسی

از لحاظ آسیب شناسی غدد لنفاوی در گیر گرانولوم های غیر کازارفیه (noncaseating granolomas) کلاسیک را نشان می دهدند. این گرانولوم ها از تجمع متراکم سلول های اپی تلوئید غالباً همراه با سلول های ژانت تیپ لانگهانس Foreign body تشکیل شده اند. در بیماری مزمن گرانولوم ها همگن است در یک حاشیه قیروز احاطه نشده یا نهایتاً بوسیله اسکارهای قیروز هیالین جایگزین شوند. دو مشخصه میکروسکوپیک دیگر موجود در گرانولوم ها عبارتند از:

۱- اجسام لامینای مشکل از کلسیم و پروتئین به نام Schaumann bodies

۲- انکلوز برنهای ستاره ای به نام astreloid bodies در سلول های ژانت که در ۶۰٪ گرانولوما وجود دارد.

شرح میکروسکوپی

نمونه ارسالی شامل یک توده بیضی شکل کپسول دار کرم رنگ نسبتاً سفت به ابعاد $2/5 \times 3 \times 0.5$ که در برش دارای سطح مقطع توپر سفت و یکنواخت می باشد. (تصویر ۴،۳).

در مطالعه بر شهای متعدد تهیه شده از این نمونه ساختمانهای غدد لنفاوی بطور کامل محو شده و بوسیله ساختمان گرانولومی فراوان کروی یا بیضی که از سلول های هیستیو سیت تشکیل شده اند جایگزین شده است.

سلول های یونیفرم بوده، دارای سپتوپلاسم زیاد و هسته کوچک می باشد و در بعضی مناطق با سلول های ژانت چند هسته ای نوع لانگهانس با هسته های محیطی می باشد اما نکروز مرکزی در این گرانولومها مشاهده نمی شود. این واحد های گرانولومی از اطراف بوسیله بافت لنفاوی محصور شده اند، کاتونهای هیالینیزه به رنگ صورت ای جایجا دیده می شود که همراه با افزایش سلول های فیبروپلاستیک می باشد.

تشخیص

هیچ یافته پاراکلینیکی برای سارکوئیدوز اختصاصی نیست. به هر حال چه تظاهرات بیماری کلاسیک باشد یا نباشد مدرک بیوپسی فرآیند التهابی گرانولوماتوز سلول های تک هسته ای برای فراهم آمدن یک تشخیص قطعی سارکوئیدوز اجباری

نکته پاتولوژیک یافت نشد. در معاینه شکم ارگانومگالی قابل تشخیص بود.

در معاینه سر و گردن، معاینه صورت، سر، گوشها، بینی و سینوسها، حفره دهان، حلق (اروفارنکس؛ نازوفارنکس و هیپوفارنکس)، لارنکس به جز وجود چند دندان مختصر خراب مشکلی وجود نداشت. در معاینه گردن توode های متعددی در نواحی ساب مثال، ساب مندیبولا ر و زنجیره های ژوگول ر دو طرف وجود داشته که بزرگترین آنها قطری حدود ۱۰ سانتی متر و کوچکترین آنها حدود ۲-۳ سانتی متر بوده و توode ساب مندیبولا از همه بزرگتر بود. پوست روی توode ها کاملاً طبیعی و غیر حساس، متحرک با قوام لاستیکی، غیر چسبنده و مجزا بودند. (تصویر ۱).


یافته های پاراکلینیکی

فرمول شمارش خون محیطی (جز گرانولوسیتوتی مختصر WBC ۳۶۰۰/cc)، تست های انعقادی و کبدی در حد طبیعی بودند. در آزمایشات بیوشیمیایی خون، قند، اوره، کراتینین، اسیداوریک، کلیم (10mg/dl) و فسفر ($3/1\text{mg/dl}$) در حد طبیعی بودند سنجش کلسیم و فسفر در ادرار ۲۴ ساعته به ترتیب $465\text{mg}/108\text{mg}$ گزارش شد که غیر طبیعی نمی باشد. همچنین ESR ساعت اول 15 mm و ساعت دوم 35 mm VDRL، PPD، RF، ANA، CRP همگی منفی بودند. در بیمار نیز یافته غیر طبیعی وجود نداشت. آنتی بادی ضد توکسوبلاسموز منفی گزارش شد.

برای بیمار در دو نوبت Angiotensin Converting enzyme (ACE) اندازه گیری شده که در هر دو بار بالا بود. ($74\text{U/L}, 85\text{U/L}$)

در رادیوگرافی ریه و سونوگرافی کبد، طحال، کلیت نیز نکته پاتولوژیکی وجود نداشت (تصویر ۲) FNA بجز تأیید عدم وجود سلولها بد خیم نکته دیگری به همراه نداشت.


در گزارش سی تی اسکن نسوج نرم گردن، تصاویر هیپردانس نسبتاً گردی در نسوج نرم گردن دو طرف مشاهده شد که مربوط به تورم غدد تحت فکی بوده و چسبندگی به اطراف نداشته و در طرف راست بزرگتر از طرف چپ است. با توجه به شرح حال، معاینه و آزمایشات فوق تصمیم به بیوپسی



شکل ۳- خارج کردن توذه



شکل ۱- نمای ظاهری توذه



شکل ۲- تصویر رادیوگرافیک بیمار

است. در کل تشخیص قطعی سارکوئیدوز بر پایه بیوپسی در زمینه وجود تاریخچه معاینات بالینی، تستهای خونی X-ray و در صورت امکان اسکن گالیوم ۶۷ ولاژیرونکو الومولار داده می‌شود(۸,۷).

در انتها لازم به ذکر است که تا اواخر سال ۱۳۷۹ بیمار تحت پی‌گیری قرار گرفته است، مشکلی را ذکر نمی‌کند و تراکمی گردشی نیز بدون درمان دارویی کوچکتر شده‌اند.

بحث

با توجه به اینکه هیچ تست اختصاصی برای رد یا تأیید سارکوئیدوز بطور خاص وجود ندارد و این بیماری را از روی مجموعه شکایات و علائم بالینی و آزمایشگاهی حدس می‌زنند و با کمک تابع آسیب شناسی به یک جمع‌بندی در مورد امکان اثبات تشخیص بیماری نائل می‌گردند، این مورد نمونه‌ای از تظاهرات غیر معمول سارکوئیدوز در مراجعه به متخصصین گوش و گلو و بینی می‌باشد(۸,۷).



۳

شکل ۴- تصویر نمونه ارسالی

منابع

- 1- Carlse W. Cummings, Otolaryngology, Head and neck surgery Third edition 1998, p 486-48t.
- 2- John Jacob Ballenger, Otorhinolaryngology, Head and Neck surgery sixth edition 1995. p. 394.
- 3- Paparella Otolaryngology head and neck surgery third Edition 1991. p. 2092. .
- 4- Robbins Pathologic basis of Disease philadelphia W Saunders, 4th Edition 1989 p. 427.
- 5- Juan Rosai, Acker mans Surgical Pathology 8th edition, 1996, p. 1677-1679.
- 6- John M Kissane Andersons pathology 9th edition 1990 p 91, p1436.
- 7- Fauci Harrisons principles of internal medicine 14th. edition, 1998 p 1922-1925.
- 8- Kelley-Harris - Ruddy + SL EDGE Textbook of Rheumatology Second Edition 1985 p 1488-89.