

نتایج عمل برای درمان نزدیک‌بینی زیاد در کلینیک نور تهران

دکتر سید حسن هاشمی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، پهارستان فارابی،
دکتر فرهاد فاعنی، دانشگاه شهید صدوقی پرورد

Results of Photorefractive Keratectomy for High Myopia in Noor Clinic of Tehran

ABSTRACT

Many studies have shown the effectiveness of photorefractive keratectomy(PRK) in correction of vision in low and moderate myopia. To evaluate the results of 193-nm eximer laser photorefractive keratectomy for highly myopic eyes, we reviewed refractive outcome of 43 eyes of 30 patients. Most eyes were treated with 1-step operation, using a 6mm optical zone. Forty three eyes were treated for myopia, which were between -6.40 and -16.90 diopters. The mean preoperative refraction was -9.50 D. All eyes were followed for at least 12 months.

At 12th month visit, 30.2% and 60.5% of eyes achieved correction within 1 and 2 D of attempted correction, respectively. At this time, 62.7% of eyes obtained 20/40 visual acuity or better uncorrected. At 1 year, 13% and 8% of eyes lost 3 and 4 lines of best-corrected visual acuity, respectively. also 13% of eyes lost 2 lines. 12 months after PRK, 5 eyes developed corneal haze grade 2 and 2 eyes, grade 3 (0-5 scale). There was much undercorrection seen in this group compared with patients undergoing PRK for low and moderate myopia.

Photorefractive keratectomy for high myopia, though effective, is not a safe and accurate procedure and is less predictable and stable than performing it for low and moderate myopia.

Key Words : Photorefractive keratectomy, High myopia, Complications

چکیده

نزدیک‌بینی زیاد، تحت عمل PRK قرار گرفته بودند و حداقل مدت پنجگیری پس از عمل آنها ۱۱ ماه بود، مورد بازبینی قرار گرفت. میانگین خطای معادل کروی بیماران قبل از عمل، ۴/۹-۶ دیوپتر بود که یک سال پس از عمل، این میزان به ۱/۶۱-۱ دیوپتر رسیده بود. در این زمان خطای معادل کروی

مطالعات متعددی مؤثر بودن PRK را در درمان نزدیک‌بینی کم و متوسط نشان داده‌اند. جهت ارزیابی نتایج بالینی و عوارض این عمل برای تصحیح نزدیک‌بینی زیاد (بیش از ۶- دیوپتر)، اطلاعات مربوط به ۴۳ چشم از ۳۰ بیمار که از اسفند ۷۳ تا تیر ۷۴ در کلینیک نور تهران به علت

مواد و روش‌ها

چهل و سه چشم از سی بیمار که برای درمان نزدیکی‌بینی زیاد، در فاصله اسفندماه ۷۳ تا تیرماه ۷۴، تحت عمل PRK قرار گرفته بودند، بررسی شد. قبل از عمل معاینات کامل چشم پزشکی از جمله تعیین قدرت شکست قرنیه و توبوگرافی قرنیه برای تمام بیماران انجام شد. میانگین سن بیماران ۲۷/۷ سال با دامنه ۲۱ تا ۴۰ سال بود و تمام بیماران دید اصلاح نشده کمتر از ۲۰/۰ داشتند.

معاینات قبل از عمل شامل تعیین قدرت دید با و بدون عینک یا لنز تماسی، ریفرکشن بدون قطره و با استفاده از قطره سیکلولیزیک، فشار داخل چشمی، کراتومتری، توبوگرافی قرنیه، فوندوسکوپی و در صورت نیاز مشاوره رتین و پاکی‌متری و پریمتری بود. در مرحله مشاوره قبل از عمل، عوارض و فواید عمل و اینکه ممکن است بعد از عمل هم احتیاج به عینک داشته باشند، برای بیماران شرح داده شده از آنها رضایت‌نامه‌کتبی اخذ می‌شد.

تمام عملها توسط یک جراح و با استفاده از دستگاه لیزر Summit OmniMed انجام شد. با استفاده از یک اسپکولوم سیمی پلکها از یکدیگر دور نگه داشته شده بی‌حسی موضعی با استفاده از قطره تراکائین ۵/۰٪ انجام می‌شد. سپس منطقه‌ای از مرکز قرنیه به قطر 7mm علامت‌گذاری شده ابی‌تیلوم آنبوسله یک کاردک برداشته می‌شد. آنگاه چشم بیمار براساس ریفرکشن سیکلولیزیک، که به دستگاه داده شده بود، تحت تابش پرتوهای لیزر با تواتر ۱۰ و توان ۱۸۰ mJ/cm² قرار می‌گرفت.

۳۰٪ بیماران در محدوده ۱ ± دیوپتر قرار داشت. یک‌سال پس از عمل، ۶۲٪ بیماران دید اصلاح نشده بیش از ۲/۰ داشتند و بهترین دید اصلاح شده بیماران در ۲۳٪ موارد بیش از ۲ خط کاهش یافته بود. Snellen

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که انجام عمل Photorefractive Keratectomy زیاد، از دقت و امنیت لازم برخوردار نبوده نسبت به انجام آن در نزدیک بینی کم و متوسط، قابلیت پیش‌بینی و ثبات کمتری دارد.

مقدمه

استفاده از لیزر اکسایمر ۱۹۳ نانومتر برای درمان نزدیک‌بینی روزیه‌روز در حال گسترش است (۱). مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، نتایج بسیار درخشنان این روش را برای درمان نزدیک‌بینی کم و متوسط آشکار ساخته است (۲)، ولی درمان نزدیک‌بینی زیاد (بالای ۶- دیوپتر) همواره با درجات بیشتری از بازگشت نزدیک‌بینی و تصحیح ناکافی همراه بوده است (۳). بنابراین تصحیح مقادیر بیش از ۶- دیوپتر خیلی محدود صورت می‌گیرد، بویژه آنکه در اینگونه موارد روش LASIK نتایج بهتر و عوارض کمتری را نشان داده است (۴). در این مطالعه، پرونده بیمارانی که قبل از معرفی روش LASIK، برای تصحیح نزدیک‌بینی زیاد، در کلینیک نور تهران، تحت عمل PRK قرار گرفته بودند، بررسی شده است.

استفاده از آزمون آماری Paired t و با بهره‌گیری از نرم‌افزار Epi Info مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

میانگین خطای معادل کروی بیماران قبل از عمل، $-9/49$ دیوبتر بود که یک ماه پس از عمل به $+0/64$ دیوبتر رسید (جدول ۱). مقایسه این دو مقدار، تفاوت آماری معنی‌داری را نشان می‌دهد ($P < 0/0001$).

همچنین تفاوت آماری معنی‌داری بین خطای معادل کروی قبل از عمل با $3/6$ و 12 ماه پس از عمل نشان داده شد (در تمام موارد، $P < 0/0001$).

میانگین خطای سیلندری بیماران قبل از عمل $-1/78$ دیوبتر و یکماه پس از عمل $-2/12$ دیوبتر بود که این اختلاف از لحاظ آماری معنی‌داری نیست ($P = 0/9$).

میانگین قدرت دید اصلاح نشده بیماران قبل از عمل، کمتر از $1/0$ بود که یکماه پس از عمل به $0/53$ رسید. همانگونه که از جدول ۲ یاد است، میانگین قدرت دید اصلاح نشده بیماران

از 43 چشم مورد مطالعه، 32 چشم (۷۴٪) بصورت یک مرحله‌ای و 11 چشم (۲۶٪) بصورت دو مرحله‌ای تحت عمل قرار گرفتند. در موارد یک مرحله‌ای، از کانون نوری (Optical zone) با قطر 6 میلی‌متر استفاده می‌شد و در موارد دو مرحله‌ای قطر کانون نوری در مرحله اول 5 میلی‌متر و در مرحله دوم $6/5$ یا $6/6$ میلی‌متر انتخاب می‌شد. پس از عمل بیمار با دستور داروئی قرص استامینوفن کدئین (در صورت نیاز) و قطره کلرامفینکل هر 6 ساعت مرخص می‌شد. توصیه می‌شد که 48 ساعت بعد جهت کنترل از نظر ترمیم اپتیلیوم و عوارض احتمالی آن مراجعه کنند. پس از ترمیم اپتیلیوم، قطره فلورومتولون $1/0$ ٪، بصورت هر 6 ساعت یک قطره، برای بیمار شروع و ماهیانه دوز آن کم می‌شد. حداکثر زمان درمان با فلورومتولون 10 ماه بود. معاینات پس از عمل در فواصل 1 ، 3 ، 6 و 12 ماه انجام می‌گرفت که طی آن آزمایشات قبل از عمل برای بیمار تکرار می‌شد. اصلاح مورد نظر برای کلیه بیماران، برابر خطای معادل کروی آنها بود.

اطلاعات لازم، پس از استخراج از پرونده بیماران، با

جدول ۱- شاخصهای توصیف خطاهای دید و قدرت شکست قرنیه PRK

فاصله زمانی از عمل	خطای معادل کروی (انحراف معیار \pm میانگین)	خطای کروی (انحراف معیار \pm میانگین)	قدرت شکست قرنیه (انحراف معیار \pm میانگین)	خطای سیلندری (انحراف معیار \pm میانگین)
قبل از عمل	$-9/49 \pm 0/27$	$-8/598 \pm 2/12$	$-1/780 \pm 1/60$	$44/100 \pm 1/60$
۱ماه بعد از عمل	$0/645 \pm 1/35$	$1/897 \pm 1/27$	$-2/129 \pm 1/53$	$36/100 \pm 2/39$
۳ماه بعد از عمل	$-0/106 \pm 2/04$	$0/643 \pm 1/95$	$-1/495 \pm 1/52$	$37/2238 \pm 3/82$
۶ماه بعد از عمل	$-0/926 \pm 1/93$	$-0/151 \pm 1/77$	$-1/539 \pm 1/21$	$37/668 \pm 2/81$
۱۲ماه بعد از عمل	$-1/616 \pm 2/01$	$-0/816 \pm 1/89$	$-1/994 \pm 1/42$	$38/1075 \pm 2/24$

جدول ۲- شاخصهای توصیق دید اصلاح نشده و بهترین دید اصلاح شده بر حسب فاصله زمانی از عمل PRK

فاصله زمانی از عمل	دید اصلاح شده (با عینک) (انحراف معیار \pm میانگین)	دید اصلاح نشده (انحراف معیار \pm میانگین)	دید اصلاح شده (با عینک) (انحراف معیار \pm میانگین)
قبل از عمل			
۰ ماه بعد از عمل	۰/۸۲۷ \pm ۰/۲۱۶	< ۰/۱	
۱ ماه بعد از عمل	۰/۷۱۸ \pm ۰/۲۵۳	۰/۵۳۰ \pm ۰/۲۸۳	
۲ ماه بعد از عمل	۰/۷۳۳ \pm ۰/۲۲۹	۰/۵۱۸ \pm ۰/۲۴۸	
۴ ماه بعد از عمل	۰/۷۵۶ \pm ۰/۲۵۲	۰/۵۵۸ \pm ۰/۲۸۴	
۱۲ ماه بعد از عمل	۰/۷۵۳ \pm ۰/۲۴۵	۰/۵۵۹ \pm ۰/۲۹۲	

در شکل ۱ میزان اصلاح بدست آمده با اصلاح مورد نظر مقایسه شده است.


میانگین بهترین دید اصلاح شده بیماران قبل از عمل ۰/۸۲ و ۱۲ ماه پس از عمل ۰/۷۵ بود که کاهشی در حدود ۰/۰۷ را نشان می‌دهد. در این زمان در ۵ مورد، کاهش بهترین دید اصلاح شده به میزان ۲ خط Snellen و در ۹ مورد کاهش بیش از ۲ خط دیده شد (جدول ۴). ۱۲ ماه پس از عمل، درصد بیمارانی که خطای معادل کروی آنها در محدوده ۱ \pm دیوپتر بود، ۲/۲۰٪ و محدوده ۲ \pm دیوپتر، ۵/۶۰٪ بود. ۱۲ ماه پس از عمل، در پنج مورد کدورت فرینه درجه ۲ و در دو مورد درجه ۳ مشاهده شد. در هیچ مورد کدورت درجه ۴ یا ۵ دیده نشد.

بحث

جهت ارزیابی عمل PRK برای تصحیح نزدیکی‌بینی زیاد (بیش از ۶ دیوپتر)، چند جنبه مهم آن، از جمله کارآیی (Predictability)، قابلیت پیش‌بینی (Efficacy) و امنیت (Safety) (همیلت دارد) (V).

نتایج بدست آمده در این مطالعه، این باور عمومی را تأیید می‌کند که عمل PRK می‌تواند بطور مؤثری خطای انکساری را کاهش دهد. در پژوهش حاضر نیز این موضوع با مقایسه خطای معادل کروی بیماران قبل از عمل، با مقادیر پس از عمل نشان داده شد.

پس از ۱۲ ماه به ۰/۵۵ رسید که نسبت به قبل از عمل، تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهد ($P < 0/0001$).



شکل ۱- مقایسه اصلاح بدست آمده با اصلاح مورد نظر، ۱۲ ماه پس از عمل PRK. نوار بالا: D/۰/۲۰ \pm شامل ۵/۶۰٪ مورد. نوار پائین: D/۱/۰ \pm شامل ۲/۲۰٪ مورد.

جدول ۳- میزان تغییر در بهترین دید اصلاح شده (BCV) بیماران در فواصل ۱، ۶ و ۱۲ ماه پس از عمل

میزان تغییر	۱ ماه پس از عمل (درصد تعداد)	۳ ماه پس از عمل (درصد تعداد)	۶ ماه پس از عمل (درصد تعداد)	۱۲ ماه پس از عمل (درصد تعداد)
افزایش ۲ خط	۲(٪۶/۴)	۲(٪۷/۴)	۱(٪۳/۷)	۲(٪۷/۷)
افزایش ۱ خط	۱(٪۳/۲)	۱(٪۳/۷)	۲(٪۷/۴)	۳(٪۱۰/۲)
بدون تغییر	۱۳(٪۴۱/۹)	۱۳(٪۴۸/۱)	۱۴(٪۵۱/۹)	۱۶(٪۴۱/۱)
کاهش ۱ خط	-	۲(٪۷/۴)	۱(٪۳/۷)	۲(٪۵/۱)
کاهش ۲ خط	۷(٪۲۲/۶)	۳(٪۱۱/۱)	۳(٪۱۱/۱)	۵(٪۱۲/۸)
کاهش بیش از ۲ خط	۸(٪۲۵/۸)	۶(٪۲۲/۲)	۶(٪۲۲/۲)	۹(٪۲۳/۱)
مجموع	۳۱(٪۱۰۰)	۲۷(٪۱۰۰)	۲۷(٪۱۰۰)	۳۹(٪۱۰۰)

می باشد.

باتوجه به پایین بودن درصد بیمارانی که ۱۲ ماه پس از

عمل، خطای معادل کروی آنها در محدوده $1 \pm$ دیوپتر قرار

داشت (۲/۳۰٪)، مشخص می شود که عمل PRK برای

تصحیح نزدیک بینی زیاد از قابلیت پیش بینی خوبی برخوردار

نیست.

یکی از جدی ترین عوارض عمل PRK، کاهش بهترین دید

اصلاح شده بیماران بدلایل مختلف از جمله

توپوگرافی غیر طبیعی، کدورت قرنیه و آستیگماتیسم نامنظم

منابع

1- Machat JJ. Excimer laser refractive surgery: Practice and principles. Slack Inc; 1996.

2- Thompson FB, Mc Donald PJ. Color atlas & Textbook of excimer laser surgery. Igaku - Shoin Medical Publishers Inc; 1993.

۳- مجید الف، میرعمادی الف. بررسی یکساله نتایج درمانی و عوارض عمل Photorefractive Keratectomy اکسایمر در بیماران با میوپی کم تا متوسط در کلینیک نور تهران.

4- Sher NA. 193-nm excimer photorefractive keratectomy in high myopia. Ophthalmology 1994; 101: 1575-82.

5- Kim JH. Myopic regression after photorefractive keratectomy. Opt Surg & Lasers 1996; 27: S435-S439.

6- Pallikaris IG, Siganos DS. Excimer laser in situ keratomileusis and photorefractive keratectomy for Correction of high Myopia. J Refract Corneal Surg 1994; 10: 498-510.

7- Waring G. Minimal essential standards for reporting studies of refractive surgical procedures. Emory Vision Correction Center; 1996.