

علل نارسایی پیشرفته کلیه در کودکان

دکتر سید طاهر اصفهانی، دپارتمان نفرولوژی، بیمارستان مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر عباس مدنی، دپارتمان نفرولوژی، بیمارستان مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مریم تشویق، دپارتمان نفرولوژی، بیمارستان مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر نعمت‌الله عطایی، دپارتمان نفرولوژی، بیمارستان مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر پریون محسنی، دپارتمان نفرولوژی، بیمارستان مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

Causes of End-Stage Renal Disease in Children

ABSTRACT

Between 1990-97 two hundred children referred to our department with end-stage renal disease (ESRD) for renal replacement therapy.

The ages of these children were 1-14 years (mean 8.14). There was no significant difference in incidence of ESRD between two sexes. We evaluated these children for the causes of ESRD. The most common causes were: Pylonephritis and congenital anomalies of urinary tract (35.5%), glomerular diseases (22.5%) and hereditary kidney diseases (13.5%).

Key Words: Children; End-Stage Renal Disease (ESRD); Replacement therapy; Causes

مقدمه

چکیده

نارسایی پیشرفته کلیه‌ها در کودکان شایع نیست، در آمریکا سالانه به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، بین ۱/۵-۳ کودک به مرحله نارسایی پیشرفته کلیه می‌رسند (۱). این رقم برای کشورهای اروپای غربی (۲) و برای برزیل در آمریکای جنوبی (۳) ۶/۵ می‌باشد. از کشورهای منطقه، در عربستان، در سال ۱۹۹۱ تخمین زده شد که به ازای هر یک میلیون جمعیت ۲۰ کودک مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیه موجود باشد (۴). در ایران آمار دقیقی از شیوع نارسایی پیشرفته کلیه کودکان نداریم. معهذا اگر حتی بدون در نظر گرفتن اختلاف شرایط بهداشتی درمانی آمریکا با ایران بخواهیم این آمار را در مورد ایران با جمعیت حدود ۶۰ میلیون نفر صادق بدانیم، سالانه حدود ۹۰-۱۸۰ کودک به بیماران فعلی «اضافه» می‌شوند که احتیاج به درمانهای خاص پیدا می‌کنند. با بهترین دیالیز، تنها بخشی از مشکلات این کودکان، یعنی اختلالات بیوشیمیک آنهم بطور ناقص اصلاح می‌شود، ولی بسیاری از مشکلات برای کودک و خانواده باقی می‌ماند. رشد جسمی و تکامل جنسی در کودک مبتلا به نارسایی کلیه نسبت به سن عقب می‌افتد (۵) و کودک قدرت

دویست کودک مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیه که بین سالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۶ به بخش دیالیز بیمارستان مرکز طبی کوکان تهران مراجعه کرده بودند، از نظر علل پیدایش نارسایی کلیه تحت بررسی قرار گرفتند. سن این کودکان ۱-۱۴ سال و میانگین آن ۸/۱۴ سال بود. تفاوت عمده‌ای از نظر شیوع نارسایی بین دو جنس مذکور و مؤنث نبود. پیلونفريتها و آنوماليهای انسدادی دستگاه ادراری در بیماران ما (۳۵/۵ درصد)، شایعترین علت نارسایی کلیه را تشکیل می‌دادند، سپس بیماریهای گلومرولی با ۲۲/۵ درصد و بیماریهای ارشی با ۱۳/۵ درصد قرار داشتند. با توجه به اینکه نارسایی حاصل از غالب موارد پیلونفريتها و آنوماليهای انسدادی، با تشخیص و درمان به موقع و صحیح قابل پیشگیری است و همینطور در بسیاری موارد، با راهنمایی والدین می‌توان از تولد کودک مبتلا به بیماریهای ارشی پیشگیری کرد، می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً نیمی از موارد نارسایی کلیه کودکان قابل پیشگیری می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: کودکان؛ نارسایی پیشرفته کلیه؛ پیوند کلیه؛ علت

روش و مواد

این بررسی روی کودکان مبتلا به ESRD که بین سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ به بخش کلیه و دیالیز بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. اصطلاح ESRD موقعی بکار برد شد که میزان فیلتراسیون گلومرولی به کمتر از ۱۰٪ طبیعی رسیده باشد(۱۰).

در مورد هر بیمار نکاتی نظیر سن، جنس، زمان شروع علائم کلیوی و نحوه پیشرفت بررسی شد. برای تشخیص علت ESRD از روش‌های مختلف استفاده شد نظیر سابقه شخصی، سابقه خانوادگی، علائم کلینیکی، علائم آزمایشگاهی و رادیولوژیک. در تعدادی از بیماران هم که قبل از رسیدن به مرحله ESRD مراجعه کرده بودند بیوپسی کلیه معیار تشخیص قرار گرفت. تمام نمونه‌ها با میکروسکوپ نوری و ایمونوفلورسانس مورد مطالعه قرار گرفت و در موارد لازم، نمونه‌ها جهت مطالعه با میکروسکوپ الکترونی به خارج از کشور فرستاده شد. متأسفانه ۲۷ کودک در مرحله نارسایی پیشرفت‌های کلیه‌ها به بیمارستان معرفی شده بودند و علائم بالینی و پاراکلینیک ESRD را داشتند ولی قبل اقدامات تشخیصی روی آنها انجام نگرفته بود و در سونوگرافی، کلیه‌های کوچک همراه افزایش اکوئیتیستیه داشتند و VCUG (Voiding Cystourethrography) اینها نرمال بود. چون در این مرحله انجام بیوپسی غالباً منجر به تشخیص قطعی نمی‌شود و خطر انجام بیوپسی بیشتر از سایر موارد است، لذا اینها جزو علل ناشناخته تقسیم‌بندی شدند. علل نارسایی پیشرفت‌های کلیه در کودکان بر حسب منابع موجود به ۸ گروه به شرح زیر تقسیم شد(۱۱) و هر بیمار بر حسب علت در یک گروه قرار داده شد:

- ۱- علل گلومرولی (غیرارثی)
- ۲- پیلونفریت و آنومالیهای مادرزادی دستگاه ادراری
- ۳- هیپوپلازی و دیسپلازی کلیه
- ۴- بیماریهای ارثی
- ۵- بیماریهای سیستمیک
- ۶- علل عروقی
- ۷- علل متفرقه
- ۸- علل ناشناخته

هر کدام از این گروه‌ها شامل تعدادی بیماری می‌شد که در بخش پافنه‌ها آمده است.

فعالیت و بازی در حد همسالان ندارد. رژیم غذایی محدود را باید تحمل کند و درمانهایی هم که انجام می‌شود، نظیر دیالیز گرچه برای کمک به آنهاست، اما انجام آنها هم با تحمل ناراحتیهای جسمی همراه است. مجموعه این عوامل و بستری شدنها مکرر در بیمارستان، که گاه با افت تحصیلی همراه است عوارض روحی و روانی برای کودک ایجاد می‌نماید.

هزینه انجام دیالیز بسیار بالاست. در حال حاضر بیمه‌ها برای هر جلسه دیالیز ۶۶۰۰ تومان پرداخت می‌کنند. در نتیجه برای بیماری که سه جلسه در هفته دیالیز می‌شود، هزینه سالانه دیالیز بیش از یک میلیون تومان می‌گردد و چون اکثر خانواده‌ها قادر به تأمین آن نیستند، قسمت عمده هزینه‌ها توسط دولت و بیمه‌ها پرداخت می‌شود و گرچه تعداد کلی بیماران دیالیزی زیاد نیست، اما هزینه سرانه این بیماران برای تهیه وسایل دیالیز و داروهای گران‌قیمتی نظیر اریتروپوئتین و هورمون رشد قابل توجه می‌باشد. در سال ۱۹۹۴ هزینه درمانی کل بیماران دیالیزی (تمام سین) در آمریکا ۱۱/۱ میلیارد دلار بوده است(۷).

امروزه بهترین درمان نارسایی پیشرفت‌های کلیه در بچه‌ها پیوند می‌باشد. گرچه در سالهای اخیر با پیشرفت‌های چشمگیر درمانی، درصد موفقیت پیوند کلیه افزایش یافته است، اما بهبودی ۱۰۰٪ نیست و در طی سالهای بعد از پیوند، هر ساله تعدادی از کلیه‌های پیوندی از کار می‌افتد. آمار سال ۱۹۹۳ آمریکای شمالی در مورد پیوند کلیه بچه‌ها نشان می‌دهد که بعد از ۵ سال ۷۵٪ از کلیه‌های گرفته شده از افراد زنده فامیل و ۶۲٪ کلیه‌های گرفته شده از جسد هنوز فعال بودند، بطوری که نیمه عمر کلیه‌های پیوند شده از اهداء کننده زنده، ۱۴ سال و از جسد، ۱۱ سال تخمین زده می‌شود(۹،۸).

با توجه به اینکه هیچیکی از اقدامات پزشکی که در مرحله نارسایی پیشرفت‌های کلیه (End-Stage Renal Disease ESRD) انجام می‌شود، کاملاً موفق نیستند، توجه و شناخت علل ESRD اهمیت پیدا می‌کند. در ممالک اروپایی و آمریکا شیوع و علل ESRD مشخص بوده و هرچند سال یکبار نتایج آخرین بررسیها منتشر می‌شود و بر مبنای آنها برنامه‌ریزی جهت پیشگیری و درمان صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه بیمارستان مرکز طبی کودکان با داشتن بخش همودیالیز، محل مراجعه کودکان مبتلا به ESRD می‌باشد، مطالعه زیر جهت شناخت علل ESRD کودکان در این مرکز صورت گرفت.

شیوع قرار گرفته‌اند. در این مطالعه بیماریهای عروقی منجر به ESRD نداشتیم. در ۱۳/۵ درصد موارد هم علل ESRD شناخته نشده است. نمودار ۲ توزیع فراوانی علل مختلف را نشان می‌دهد.

جدول ۱- توزیع فراوانی ESRD در هشت گروه اصلی

درصد	تعداد	گروه
۲۲/۵	۴۵	۱-بیماریهای گلومرولی
۲۵/۵	۷۱	۲-پیلونفریت و آنومالیها
۱/۵	۳	۳-دیسپلازی و هیپوپلازی
۱۳/۵	۲۷	۴-بیماریهای ارشی
۸/۵	۱۷	۵-بیماریهای سیستمیک
۰	۰	۶-بیماریهای عروقی
۵	۱۰	۷-علل متفرقه
۱۳/۵	۲۷	۸-علل نامشخص
۱۰۰	۲۰۰	جمع

در جدول ۲ علل گلومرولی ESRD آورده شده است. همانگونه که دیده می‌شود شایعترین علت گلومرولی ESRD در مطالعه ما سندروم نفروتیک با اسکلروز فروکال سگمنتال یا Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) می‌باشد که در بین علل گلومرولی، ۲۸/۹ درصد موارد را تشکیل می‌دهد و بعد از آن، گلومرولونفریتهای با سیر پیشرونده سریع Rapidly progressive glomerulonephritis (RPGN) می‌باشد. سایر گلومرولوپاتیهای شناخته شده عبارت بودند از گلومرولونفریت مامبرانو پرولیفراتیو (MPGN) با ۱۷/۸ درصد، سندروم نفروتیک با ضایعه ناچیز (MCL) با ۶/۷ درصد، پرولیفراسیون مزانثیال با ۶/۶ درصد، نفروپاتی IgA با ۴/۳ درصد و سندروم نفروتیک مادرزادی (CNS) Congenital Nephrotic (CNS) Syndrom با ۲/۲ درصد. مجموعه سایر گلومرولوپاتیها یا Unclassified GN با شیوع ۱۳/۳ درصد در آخر جدول آمده‌اند.


جدول ۲- توزیع فراوانی علل گلومرولی ESRD

ضایعه گلومرولی	تعداد	درصد
FSGS	۱۲	۲۸/۹
RPGN	۹	۲۱
MPGN	۸	۱۷/۸
MCL	۳	۶/۷
Mesengial Proliferation	۲	۶/۷
IgA Nephropathy	۲	۴/۴
CNS	۱	۲/۲
Unclassified GN	۶	۱۳/۳
جمع	۴۵	۱۰۰

یافته‌ها


تعداد ۲۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت. سن کودکان مراجعه کننده ۱-۱۴ سال با میانگین ۱۴/۸ سال بود (نمودار ۱). از ۲۰۰ پرونده مورد مطالعه، ۱۰۶ مورد دختر (۵۳٪) و ۹۴ مورد پسر (۴۷٪) بود که اختلاف معنی داری از نظر آماری ندارند و می‌توان نتیجه گرفت که بدون در نظر گرفتن علل زمینه‌ای، شیوع ESRD در کودکان مورد مطالعه در هر دو جنس یکسان می‌باشد.

نمودار ۱- توزیع فراوانی ESRD بر حسب سن



از نظر علل ESRD، تعداد و درصد هر یک در جدول ۱ آمده است، همانگونه که دیده می‌شود پیلونفریت و آنومالیهای دستگاه ادراری ۲۵/۵٪ از موارد ESRD را تشکیل می‌دادند و در حقیقت شایعترین علت ESRD در این مطالعه مربوط به این گروه بود. بعد از آن علل گلومرولی با ۲۲/۵٪، بیماریهای ارشی با ۱۳/۵٪، بیماریهای سیستمیک با ۸/۵٪، و دیسپلازی و هیپوپلازی با ۱/۵٪

نمودار ۲- توزیع فراوانی علل ESRD بر حسب ۸ گروه اصلی



۸ سال بود و اختلاف معنی‌داری هم از نظر شیوع ESRD بین جنس مؤنث و مذکور وجود نداشت.

در کشورهای مختلف بر حسب شرایط بهداشتی درمانی بخصوص مراقبتها قبیل و بعد از تولد، میزان شیوع و نوع بیماریهای ارشی شایع در هر منطقه، رواج ازدواج‌های فامیلی، شرایط اقتصادی، آب و هوایی و تغذیه، علل بیماریهای کلیوی و ESRD متفاوت می‌باشد، لذا در آمارهایی هم که از نقاط مختلف دنیا منتشر می‌گردد، شیوع علل ESRD یکسان نیست. معهدها می‌توان تا حدودی با مقایسه آمار مراکز مختلف دنیا به نتایجی دست یافته. در جدول شماره ۵ سه آمار معتبر را با آمار مرکز طبی کودکان مقایسه نمودیم. اولین ستون آمار ESRD در اروپا بین سالهای ۱۹۸۱-۵ می‌باشد که از ۲۳۷۲ کودک زیر ۱۵ سال در کشورهای اروپایی توسط انجمان دیالیز و پیوند کلیه اروپا (EDTA) در سال ۱۹۸۹ منتشر گردیده است(۵). ستون دوم نتایج بدست آمده روی ۷۳۵ بیمار زیر ۱۸ سال در آمریکای شمالی می‌باشد که توسط North American Pediatric Renal Transplantation Cooperative Study (NAPRTCS) در سال ۱۹۹۰ منتشر گردیده است(۶). بایستی یادآوری کرد که در آمارهای قبل از سال ۱۹۹۲ آمریکا که در مورد دیالیز و پیوند کلیه کودکان منتشر گردیده است سن بیماران تا ۱۸ سال بود ولی در آمار سالهای بعد سن بیماران تا ۲۰ سال ذکر گردیده است(۱۴،۱۳). چون بیماران ما زیر ۱۴ سال بودند و در سنتین مختلف، علل ESRD یکسان نیست آمار سال ۱۹۹۰ آمریکای شمالی ذکر شد که گرچه دقیقاً سن بیماران آنها با بیماران ما یکسان نیست و این امر می‌تواند تا حدی باعث اختلاف بین شیوع علل ESRD بین بیماران ما و آمریکای شمالی گردد، ولی این آمار از سایر آمارهای آمریکای شمالی به بیماران، تزدیکر است. ستون سوم آمار سوئن مربوط به کودکان ۶ ماهه تا ۱۶ ساله از سال ۱۹۷۸-۸۵ می‌باشد که در سال ۱۹۹۰ منتشر گردیده است(۱۵) و ستون چهارم جدول، آمار بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران می‌باشد. در مجموع سن بیماران اروپایی و سوئنی به بیماران ما تزدیکر است.

در آمار آمریکای شمالی و اروپا دو گروه اول، یعنی بیماریهای گلومرولی و پیلونفریتها و آنومالیهای مادرزادی با اختلاف کمی در صدر قرار دارند در حالیکه در آمار ما آنومالیها و عفونتها با یک اختلاف قابل توجه در صدر علل ESRD قرار گرفتند. در آماری هم که در سال ۱۹۹۰ از عربستان منتشر شد(۱۷) در بین یکصد کودک مبتلا به ESRD ۳۴٪ در اثر آنومالیهای مادرزادی و عفونتها و تنها ۱۴٪ در اثر گلومرولوپاتیها به نارسایی کلیه رسیده بودند.

شاید بتوان گفت که علت اینکه در آمریکا و اروپای غربی تعداد موارد آنومالیها و عفونتها دستگاه ادراری که منجر به ESRD می‌شوند کمتر است، تشخیص زودرس آنومالیها و درمان به موقع آنومالیها و عفونتهاست. خوشبختانه در ایران هم در سالهای اخیر سونوگرافی جنبین در اکثر شهرهای بزرگ انجام می‌شود و بسیاری از

گروه پیلونفریتها و آنومالیهای سیستم ادراری به دو گروه تقسیم شدند:

۱- گروه پیلونفریت در زمینه ریفلакс و زیکوپورتال دو طرفه اولیه

۲- آنومالیهای انسدادی مادرزادی به علی نظری: تنگی محل اتصال لگنچه به حالب، تنگی محل اتصال حلب به مثانه و دریچه پیشابرای خلفی

در جدول ۳ شیوع موارد این دو دسته دیده می‌شود که ریفلакс و زیکوپورتال اولیه دو طرفه، شایعترین عیب ارگانیک منجر به نارسایی پیشرفتی کلیه بوده است. از ۷۱ بیمار این گروه ۳۹ مورد در اثر ریفلакс دو طرفه و ۳۲ بیمار در اثر سایر علل، دچار نارسایی کلیه شده بودند. در مورد سایر علل ۲۰ بیمار انسداد در ابتدا یا انتهای حلب و ۱۲ مورد پرده پیشابرای خلفی داشتند.

جدول ۳- توزیع فراوانی پیلونفریتها و آنومالیها

نوع	تعداد	درصد
ریفلакс دو طرفه اولیه	۳۹	۵۴/۹
انسدادهای مادرزادی	۳۲	۴۵
جمع	۷۱	۱۰۰

در جدول ۴ توزیع فراوانی علل ارشی ESRD آمده است. شایعترین بیماری ارشی در بیماران ما، نفرونوفتاپایزیس و بعد سیستیموزیس و سندرم آپورت بوده است.

۱۷ بیمار در طی بیماریهای سیستمیک دچار نارسایی پیشرفتی شده بودند: لوپوس اریتماتوز سیستمیک ۹ مورد، سندرم همولیتیک اورمیک ۷ مورد و پورپورا هنخ شوئن لاین یک مورد در بین بیماران موجود بودند.

جدول ۴- توزیع فراوانی علل ارشی ESRD

درصد	تعداد	Hereditary D
۴۴/۴	۱۲	Nephronophthisis
۲۵/۹	۷	Cystinosis
۲۲/۲	۶	Alport's S
۷/۴	۲	Polycystic D
۱۰۰	۲۷	Total

از علل متفرقه که جمعاً ۱۰ مورد بودند ۵ بیمار بعلت مثانه نوروپاتیک، ۴ بیمار بعلت سنگهای متعدد دستگاه ادراری، و یک مورد تومور ویلمز دو طرفه دچار ESRD شده بودند.

بحث

بر اساس اطلاعات بدست آمده، میانگین سن بیماران ما حدود

جدول ۵- مقایسه علل نارسایی پیشرفته کلیه کودکان در آمار نقاط مختلف دنیا (درصد)

مرکز طبی کودکان	سوئد***	آمریکای شمالی**	اروپایی*	
۲۲/۵	۹/۶	۲۱/۳	۲۵/۸	۱- بیماریهای گلومرولی
۶/۵	۴/۱	۱۲	۶/۸	گلومرولواسکلروز فوکال سگماتال
۱۶	۵/۵	۹/۳	۱۹	سایر گلومرولونفریتها
۲۵/۵	۲۴/۹	۲۳	۲۴/۲	۲- پلیونفریت و آنومالیها
۱۸/۵	۱۷/۸	۱۶	۱۰/۸	انسدادها
۱۶	۵	۴/۱	۷/۸	ریفلاکس وزیکویورترال دو طرفه
۰	۲/۱	۲/۹	۵/۶	سایر علل
۱۳/۵	۲۷/۵	۱۵/۲	۱۵/۶	۳- بیماریهای ارشی
۱	۷/۵	۱/۸	۱/۶	بیماریهای پلی کیستیک کلیه
۶	۱۱	۲/۹	۶/۳	نفرونوفتاپیزیس ، MCD
۳	۰/۷	-	۱/۶	نفریت ارشی همراه کری عصبی
-	۳/۴	۳	۰/۶	سایر نفریتهای ارشی
۳/۵	۱/۴	۲/۶	۳/۲	سیستینوزیس
-	-	۱	۰/۹	اگزالوزیس اولیه
۰/۵	۲/۱	۳/۹	-	سندرم نفروتیک مادرزادی
۱/۵	۲۳/۱	۲۱/۷	۱۳/۵	۴- هیپوپلازی و دیسپلازی
۸/۵	۸/۳	۸/۶	۱۰/۲	۵- بیماریهای سیستمیک
۴/۵	۲/۱	-	۰/۸	لوبوس
۲	۲/۱	-	۲/۴	پورپوراهنخ شوئن لاین
۲	۲/۷	۳/۹	۴/۸	سندرم همولیتیک اورمیک
۰	۳/۵	۲/۲	۱/۶	۶- بیماریهای عروقی کلیه
۵	۲/۸	۴/۸	۳/۵	۷- علل متفرقه
۱۳/۵	۰/۷	۳/۳	۵/۷	۸- علل ناشناخته

* آمار انجمن دیالیز و پیوند کلیه اروپا سال (۱۹۸۴)

** آمار دیالیز و پیوند کلیه کودکان آمریکای شمالی (۱۹۸۹)

*** آمار سوئد ۱۹۸۱-۸۵ (۱۵)

۷/۰ درصد(۱۵) و در دوره ۹۴-۱۹۸۶ به صفر رسیده است(۱۸). اما در آمار مرکز طبی، ۱۳/۵ درصد قید گردیده است که از آمار آمریکا و اروپا بیشتر است ولی کمتر از آمار تونس می‌باشد که ۲۶ درصد گزارش گردیده است(۱۶). این نشان می‌دهد که تعداد قابل ملاحظه‌ای از بیماران ما تا قبل از رسیدن به مرحله ESRD تحت بررسی پزشکی قرار نمی‌گیرند و مسلمًاً در تعدادی از این کودکان علل قابل درمان وجود داشته که به آنها توجه نشده تا بیماری به مرحله نارسایی پیشرفته کلیه رسیده است. در عمل در مراجعین مشاهده شد که تعدادی از کودکان که در مرحله ESRD مراجعه کردند قبلاً علائمی نظیر عفونت ادراری، دردهای مبهم شکمی، شب ادراری، پرتوشی، پرادراری، رنگ‌پریدگی و کمی رشد، هماچوری یا پروتئینوری داشته‌اند ولی مورد بررسی کافی قرار نگرفته بودند.

در مجموع می‌توان گفت که بسیاری از ۳۵/۵ درصد موارد نارسایی کلیه که در اثر عفونتها و آنومالیها ایجاد می‌شوند و تعدادی از موارد ۱۳/۵ دصد بیماری‌های ارشی، با راهنمایی والدین از نظر بچه‌دار شدن قابل جلوگیری هستند و اگر در نظر بگیریم تعدادی از موارد ناشناخته ESRD جزو این دو گروه قرار می‌گیرند نتیجه‌گیری می‌شود که حدود نیمی از موارد ESRD کودکان قابل پیشگیری خواهد بود. استفاده از روش‌های زیر در پیشگیری از نارسایی کلیه کودکان پیشنهاد شده است(۱۹):

۱- قبل از حاملگی: مشاوره ژنتیکی و راهنمایی والدین کودک مبتلا به بیماری ارشی در مورد تولد فرزندان بعدی

۲- در زمان حاملگی: با سونوگرافی امکان تشخیص تعدادی از بیماری‌های جنین مثل انسدادها و کلیه پولی‌کیستیک وجود دارد. رواج استفاده از سونوگرافی در خانمهای باردار باعث افزایش تشخیص آنومالیهای جنین گردیده است. ذکر می‌شود که بر حسب نوع معیار سونوگرافیک شیوع آنومالیهای مادرزادی قابل تشخیص با سونوگرافی تا ۱٪ حاملگیها هم می‌رسد(۲۰، ۲۱، ۲۲). سایر

روشهای تشخیصی بیماری‌های کلیه جنین عبارتند از:

الف) آزمایش مایع آمنیوتیک از نظر مقدار آلفا‌فوتوپروتئین برای تشخیص سندروم نفروتیک مادرزادی، آزنزی کلیه و انسدادها.

ب) نمونه‌گیری از سلولهای ویلوزیت‌های جفت یا خون بند ناف جنین از نظر پیدا کردن اختلالات کروموزومی یا ژن معیوب برای

تشخیص سندروم آپورت و کلیه پلی‌کیستیک بالغین.

بجز سونوگرافی انجام سایر روشها آسان و صدرصد بی‌خطر نیستند، لذا انجام روش‌های تشخیصی تنها در موارد زیر اندیکاسیون

آنومالیها قبل از تولد تشخیص داده می‌شوند. معهداً این امر در مورد تمام خانمهای باردار انجام نمی‌شود. بعلاوه سایر روش‌های تشخیصی بیماری‌های کلیوی جنین هم که بعداً ذکر می‌شود هنوز در ایران رایج نیست. تظاهر بسیاری از آنومالیها و ریفلاکس وزیکوپورتال در کودکان بیشتر بصورت عفونتها ادراری است ولی در عمل مشاهده می‌شود که بسیاری از کودکان مبتلا به عفونتها ادراری بخصوص آنها که از شهرهای کوچک مراجعت می‌کنند تحت بررسی‌های رادیولوژیک قرار نمی‌گیرند و جستجوی علت عفونت در آنها صورت نمی‌گیرد و زمانی که به مراکز نفرولوژی مراجعه می‌کنند، تعدادی دچار آسیب کلیه گردیده‌اند. توجه بیشتر به این موارد از طرف جامعه پزشکی، همراه دادن آگاهیها به والدین می‌تواند از تعداد موارد نارسایی کلیه در اثر آنومالیها و عفونتها پکاهد. اثر این توجهات در آمارهای منتشره از سوئد در دو دوره زمانی مشهود است. در سالهای ۸۵-۱۹۷۸ در علل نارسایی کلیه کودکان را تشکیل می‌دادند(۱۵)، در ۹/۲۴ درصد علل نارسایی کلیه کودکان را تشکیل می‌دادند(۱۸). حالیکه در دوره زمانی ۹۴-۱۹۸۶ در آنومالیها و عفونتها تنها ۱۸/۵ درصد علل نارسایی پیشرفته کلیه کودکان را تشکیل می‌دادند(۱۸). در بین علل گلومرولی، در هر سه آمار شایعترین علت FSGS بوده است. تظاهر این بیماری معمولاً به شکل سندروم نفروتیک است ولی در اکثر موارد به درمان مقاوم بوده و منجر به نارسایی کلیه می‌شود.

شیوع بیماری‌های ارشی کلیه در مناطق مختلف دنیا بر حسب شیوع ژنهای معیوب متفاوت می‌باشد. در آمار EDTA، سوئد(۱۵) و مرکز طبی، نفرونوفتاپتیزیس شایعترین بیماری ارشی منجر به ESRD بوده است. در حالیکه در آمار آمریکای شمالی سندروم نفروتیک مادرزادی بیشتر مشاهده شده است.

در بین علل سیستمیک در آمار مرکز طبی بیشترین موارد مربوط به لوپوس SLE و در مرحله بعد HUS و پورپورا هنخ شوئن لاین بود در حالیکه در آمار EDTA و آمریکا، بیشترین مورد HUS می‌باشد. لازم به ذکر است که در بیماران مرکز طبی کودکان موارد ارشی HUS نادر بوده و بیشترین موارد HUS در شیرخواران و کودکان خردسال است که این موارد پیش آگهی بهتری دارند و کمتر به نارسایی کلیه منجر می‌شوند.

بالاخره دیده می‌شود که علل نامشخص در آمار EDTA که شامل کشورهای مختلف اروپایی است مجموعاً ۵/۷ درصد و آمریکای شمالی ۳/۳ درصد بوده است. در سوئد با شرایط بهداشت و بیمه‌های خاصی که دارد در سالهای ۸۵-۱۹۷۸ علل نامشخص

پیدا می کند(۲۳):

الف) سابقه خانوادگی بیماریهای دستگاه ادراری نظیر آنژی، دیسپلازی یا هیپوپلازی کلیه ها، انسدادهای مادرزادی، سندروم نفروتیک مادرزادی و سندروم پرونبلی

ب) وجود الیگوهیدرامینوس در طی حاملگی

ج) کوچک بودن اندازه جنین برای سن حاملگی

د) وجود آنومالیهای سایر سیستمهای عیوب کروموزومی در سایر افراد خانواده یا جنین

۳- بعد از تولد : توجه و بررسی دقیق در مواردی چون وجود توده شکمی، درد پهلو یا شکم، عقب افتادگی رشد، تب نامشخص، اختلال در نحوه ادرار کردن، پرنوشی، پرادراری، شب ادراری، عفونت ادراری، فشار خون بالا، پروتئینوری، هماچوری، ادم، اسیدوز با علت نامشخص، اسهال با علت نامشخص.

در بین موارد بالا توجه به علت عفونت ادراری Urinary Tract Infection (UTI) کودکان مهم می باشد. ظاهر بسیاری از آنومالیها و ریفلاکس در کودکان به شکل عفونت ادراری است به همین دلیل در کودک مبتلا به UTI باید به فکر پیدا کردن علت UTI بود. در تعدادی از کتب علمی توصیه گردیده است که تمامی کودکان مبتلا به UTI مورد بررسی رادیولوژیک قرار گیرند(۲۴). اما تعدادی از مراکز در تمام پسرهای مبتلا به UTI و دخترهای زیر ۵ سال بررسی رادیولوژیک را انجام می دهند ولی در دخترهای بالای ۵ سال چنانچه تنها علائم سیستیت داشته باشند، بررسی رادیولوژیک انجام نمی دهند و انجام بررسیهای رادیولوژیک در دخترهای بالای ۵ سال را تنها در صورت تکرار عفونت و یا وجود علائم پیلونفربیت توصیه می کنند(۲۵). حداقل بررسی رادیولوژیک در کودک مبتلا به UTI یک VCUG از نظر ریفلاکس و یک سونوگرافی از نظر بررسی مجاری فوقانی است، ولی در تعدادی از موارد برحسب نیاز از سایر روشها نظیر اوروگرافی، اسکن DMSA یا DTPA هم استفاده می شود (۲۶، ۲۵). با توجه به اینکه آسیب پذیری کلیه در طی عفونتهای ادراری سال اول عمر زیاد است انجام حداقل یک بار آزمایش کامل و کشت ادرار در سال اول عمر و در سالهای بعد، حداقل سالی یکبار انجام آزمایش کامل ادرار توصیه شده است(۱۹). آکادمی طب کودکان آمریکا توصیه کرده است که بعد از

سه سالگی حداقل سالی یکبار اندازه گیری فشار خون در بچه ها بعمل آید(۲۷).

با توجه به اینکه بسیاری از بیماریهای کلیوی علائم کلینیکی واضحی ندارند، لذا در تعدادی موارد همانگونه که در آمار مرکز طبی کودکان آمده است بیمار خیلی دیر و موقعی مراجعه می کند که بیماری به مرحله پیشرفته رسیده است. کم علامت یا بسیار علامت بودن بسیاری از بیماریهای کلیوی در مراحل اولیه باعث شده که در بعضی ممالک، با انجام آزمایش در کودکان و روشهای غربالگری در جستجوی این بیماریها برآیند تا از عوارض درازمدت آنها جلوگیری شود.

در ژاپن از سال ۱۹۷۳ برنامه غربالگری جهت پیدا کردن کودکان مبتلا به هماچوری و پروتئینوری با آزمایش ادرار به وسیله نوار تست ادرار در سنین دیستان و دیبرستان انجام شد(۲۸). این امر باعث شد که اپیدمیولوژی بسیاری بیماریهای کم علامت شناخته شود از جمله اینها نفروپاتی IgA و گلومرولونفربیت مامبرانوپرولیفراتیو بودند. در بین حدود یک میلیون کودک به ظاهر سالم که در کاناگاوا سالی یکبار بررسی شدند سرانجام مشخص شد که ۲ در ده هزار نفر مبتلا به یک بیماری کلیوی بی سرو صدا هستند. بعد از ۱۸ سال که این روش غربالگری کودکان، سالانه در ژاپن انجام گرفته است امروزه به فکر افتاده اند که روش غربالگری را توسعه دهند تا بیماریهای کلیوی دیگری را هم که علائم آنها هماچوری و پروتئینوری نیست تشخیص دهند، مثل انجام سونوگرافی برای تشخیص آنومالیها، اندازه گیری وزن مخصوص و استادومیکروگلوبولینهای ادرار برای تشخیص بیماریهای توبولر (۲۹، ۲۸). مسلماً با توسعه روش غربالگری، مشخص خواهد شد که تعداد کودکان مبتلا به بیماریهای کلیوی از ۲ در ده هزار هم بیشتر است. در ایران غالباً به یکبار آزمایش ادرار قبل از ثبت نام مدارس اکتفا می شود که جهت تشخیص انواع بیماریهای کلیوی کافی نیست. انجام بررسیهای نظیر آنچه که در ژاپن انجام شده مستلزم صرف بودجه و نیروی انسانی است معهداً با توجه به اینکه این بیماریهای کم علامت می توانند سالها ادامه یابند و مشکلاتی را برای بیمار و خانواده ایجاد کنند جستجوی این بیماریها در اجتماع ارزشمند خواهد بود.

منابع

- 2- Brunner FP, Broyer M, Brynger H, et al. Demography of Dialysis and Transplantation in Children in Europe. *Nephrol Dial Transplant*, 1988; 3:235-242.
- 3- Garcia C, Goldani J, Garcia V. Pediatric dialysis and renal transplantation in the state of Rio Grande do sul, Brazil. *Pediatr Nephrol* 1992; 6: 74-77.
- 4- Aldress A, Kurpad R, AL-Sabban EA, et al. Chronic renal failure in children in 36 Saudi Arabian hospitals. *Saudi Kidney Dis Transplant Bull*, 1991; 2: 134-138.
- 5- Rizzoni G, Broyer M, Brunner FP, et al. Combined report on regular hemodialysis and transplantation of children in Europe. 1983, Proc EDTA-ERA 1984; 23: 55-83.
- 6- Schaefer F, Mehlis O Endocrine, Metabolic and Growth disorders in chronic renal failure. In Holiday MA, Barrat TM, Avner ED (Editors): *Pediatric Nephrology*, 3rd Edition, Williams and Wilkins Company, Baltimore, 1994, pp: 1241-1286.
- 7- Saborio P, Hahn S, Hisano S, et al. Chronic Renal Failure, An Overview from a pediatric perspective. *Ped Nephrol*, 1998; 8: 134-148.
- 8- North American Pediatric Renal Transplant Cooperative study (NAPRTCS). 1993 Annual Report. Brooklin, New York, Suny-Health Science Center, 1994.
- 9- Ellis D, Gilboa N, Bellinger M, Shapiro R. Renal Transplantation in Infants and Children, in Shapiro R, Simmons RL, Starzl TE (Editors): *Renal Transplantation*, 1st Edition, Appleton and Lange Company, Stamford 1997, pp: 427-469.
- 10- Papadopoulou ZL: Chronic Renal Failure, in Barakat AY (Editor): *Renal Disease in children*, 1st Edition, Springer-Verlag Company, New York, 1990, pp 287-305.
- 11- Rigden SPA: Chronic Renal failure, in Postlethwaite RJ (Editor): *Clinical Pediatric Nephrology*, 2nd Edition, Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford, 1994 pp: 266-281.
- 12-Alexander SR, Arbus GS, Butt KMM, et al: the 1989 Report of the North American Pediatric Renal Transplant Cooperative study, *Pediatr Nephrol* 1990, 4: 542-553.
- 13- Warady BA, Hebert D, Sullivan KS et al: Renal Transplantation, Chronic Dialysis and Chronic renal insufficiency in children and Adolescents, The 1995 Annual Report of the Naprtcs, *Pediatr Nephrol*, 1997; 11: 49-64.
- 14- Fivush BA, Jabs K, Neu AM et al: Chronic renal insufficiency in CHildren and adolescents, The 1996 Annual Report of the Naprtcs, *Pediatr Nephrol*, 1998; 12: 328-337.
- 15- Esbjorner E, Aronson S, Berg V, et al. Children with chronic Renal Failure in sweden, 1978-1985. *Pediatr Nephrol*, 1990; 4:249-252.
- 16- Kamoun A, Lakhoud R. End-Stage renal Disease of the Tunisian Child, Epidemiology, Etiology and Outcome. *Pediatr Nephrol*, 1996; 10: 479-482.
- 17- Matto TK, AL-Mohalhals, AL-Sowailem AM, et al: Chronic renal failure in children in Saudi Arabia. *Ann Saudi Med* 1990; 10: 496-499.
- 18- Esbjorner E, Berg U, Hansson S. Epidemiology of Chronic Renal Failure in Children. *Pediatr Nephrol*, 1997; 11: 438-442.
- 19- Barkat AY: The Role of early diagnosis and intervention in the prevention of kidney disease, in Barkat AY (Editor) *Renal Disease in children*, 1st Edition, Springer Verlag, New York, 1990, pp: 395-405.
- 20- Johnson CE, Elder JS, Judge Ne, et al: The accuracy of antenatal ultrasonography in identifying renal abnormalities. *AM J Dis Child*, 1992; 146: 1181.
- 21- Carteville JE, Gray DL, Crane JP. Congenital hydronephrosis, Correlation of fetal Ultrasonographic findings with fetal outcome. *Am J Obstet Gynecol* 1991; 165: 384.
- 22- Elder JS. Antenatal hydronephrosis. *Ped Clin N Am* 1997; 44(5): 1299-1321.
- 23- Jeanty PH, Hansmann M. Prenatal Diagnosis of Renal and Urinary Tract Abnormalities, in Barkat Ay (Editor): *Renal Disease in children* 1st Edition, Springer-Verlag Company, New York, 1990, pp: 385-394.
- 24- Gonzalez R. Urinary Tract infections, in Behrman RE, Kliegman RM, Arvin AM (Editors): *Nelson Textbook of pediatrics*, 15th edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996, .pp: 1528-1534.
- 25- Jodal ULF, Hansson S: Urinary Tract infection in Holliday MA, Barrat TM, Avner ED (Editors): *Pediatric Nephrology*, 3rd Edition, Williams and Wilkins Company, Baltimore, 1994, pp: 950-962.
- 26- Rushton HG: Nonspecific infections in Kelalis PP, King LR, Belman AB (Editors): *Clinical Pediatric Urology*, 3rd Edition, W.B. Saunders Company Philadelphia, 1992, pp: 286-331.
- 27- Report of the second task force on Blood pressure control in children 1987. *Pediatrics*, 1987; (79): 1-25.
- 28- Murakami M, Yamamoto H, Ueda Y et al: Urinary screening of elementary and junior highschoold children over 13 year period in Tokyo. *Pediatr Nephrol* 1991; 5: 50-53.
- 29- Sheih CP, Lia MB, Tlung CS, et al: Renal abnormalities in school children. *Pediatrics*, 1989; 84: 1086-1090.