

بررسی آلوآنتی‌زنای C و HLA-A,B در جمعیتی از استان اصفهان

دکتر مینو ادیب، دانشیار گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی و مسؤول آزمایشگاه پیوند اعضاء، بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)، اصفهان
رسول ابولحسنی، کارشناس ارشد، آزمایشگاه پیوند اعضاء، بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)، اصفهان
ادنا آپکار شاهنام، کارشناس ارشد، آزمایشگاه پیوند اعضاء، بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)، اصفهان

Study of HLA-A, B, C Alloantigens in a Population of the Isfahan Province

ABSTRACT

A random panel of 500 healthy unrelated subjects from Isfahan province were HLA typed for A, B and C locus antigens.

The lymphocytes were separated from 5 ml of whole peripheral blood and HLA-A,B, C typing were performed on them, using the standard two stage microlymphocytotoxic NIH technique.

The Antigens HLA-A1, A2,A3,A9, HLA-B5,B35, HLA-CW4 had the higher frequency than other HLA antigens among the population studied. The distribution of HLA class I antigens in Isfahan is similar with their distribution in Tehran and Mashhad.

Key words: Allauntigene; HLA; Isfahan

چکیده

پلی مرفیک ترین سیستم های ژنتیکی شناخته شده است (۱). محصولات این ژنهای در سطح سلولهای بدن به نام آنتی‌زنای گروه یک و گروه دو HLA موسوم است و نقش بسیار مهمی در پیوند اعضاء دارد.

همچنین این آنتی‌زنای در تنظیم و تحريك پاسخهای ایمني بیز از اهمیت بسیاری برخوردار است، به همین دلیل این ژنهای و آنتی‌زنای خاص مربوطه می‌توانند عامل مقاومت نسبت به یک بیماری خاص باشند و یا بالعکس، شخص را مستعد ابتلا به بیماریها بنمایند. تاکنون ارتباط بسیاری از بیماریها با آنتی‌زنای سیستم HLA به اثبات رسیده است.

شیوع آنتی‌زنای HLA در نژادهای مختلف بشری متفاوت است و به همین دلیل ممکن است اختلاف هایی از نظر ارتباط ژنهای خاص HLA با بیماریها، در نژادهای مختلف مشاهده شود. بنابراین لازم است در هر منطقه جغرافیایی، شیوع آنتی‌زنای HLA بطور جداگانه بررسی گردد.

تنوع آنتی‌زنای گروه یک و دو HLA در نژادهای مختلف

مقدمه: تعداد ۵۰۰ نفر از مردم اصفهان که از سلامتی کامل برخوردار بودند، از لحاظ آنتی‌زنای گروه یک HLA شامل HLA-A,B,C مورد آزمایش قرار گرفتند.

روش: لنفوسيتها از ۵ میلی لیتر خون وریدی جدا شد و با استفاده از روش استاندارد دو مرحله‌ای میکرولنفوسيتو توکسیسیتی NIH، از نظر آنتی‌زنای HLA-A,B,C بررسی گردید.

نتایج: شیوع آنتی‌زنای HLA-A1,A2,A3,A9، HLA-CW4، HLA-B5,B35 در جمعیت مورد مطالعه بیش از سایر آنتی‌زنای گروه یک HLA بود.

بحث: شیوع آنتی‌زنای گروه یک HLA در اصفهان، مشابه با شیوع آن در تهران و مشهد است.

واژه‌های کلیدی: آلوآنتی‌زن؛ HLA؛ اصفهان

مقدمه

سیستم HLA که بیش از صد ها آلل مختلف در افراد بشر دارد، از

گردید. در هر مورد از دو کنترل مثبت و دو کنترل منفی نیز استفاده شد. پس از نیم ساعت انکوباسیون مقدار ۵ میکرولیتر کمپلمان خرگوش به هر خانه اضافه گردید و پس از یک ساعت، رنگ اثوزین به میزان دو میکرولیتر به هر خانه اضافه شد. جهت فیکس نمودن سلولها از فرمالین، به مقدار ۵ میکرولیتر در هر خانه استفاده شد و سپس نتایج با میکروسکوپ فاز-کنتراست و آینورت مشاهده گردید.

در طی این مراحل چنانچه لنفوسيت با آنتی‌بادی اختصاصی در خانه یا چاهک مربوطه ترکیب شود، کمپلمان را فعال نموده و نهایتاً سوراخی در سطح لنفوسيت ایجاد می‌شود که منجر به مرگ لنفوسيت و ورود اثوزین به درون آن و در نتیجه پررنگ شدن و متورم شدن لنفوسيت می‌گردد، مرگ سلولی با میکروسکوپ به راحتی قابل تشخیص است.

نتایج

جدول‌های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب درصد فراوانی هر یک از آنتی‌ژنهای A، HLA-B و HLA-C را شان می‌دهد. فرکانس ژنی آنتی‌ژنهای فوق نیز در جدول‌های مربوطه مشاهده می‌شود.

فرکانس ژنی از فرمول زیر محاسبه شده است (۴) :

$$\text{Gene frequency} = 1 - \sqrt{1 - \text{Antigen frequency}}$$

جدول ۱- چگونگی توزیع آنتی‌ژنهای HLA-A در اصفهان

| نام آنتی‌ژن | تعداد نمونه مثبت | شیوع آنتی‌ژن | فرکانس ژنی |
|-------------|------------------|--------------|------------|
| A1 | ۸۷ | ۰/۱۷۴ | ۰/۰۹۱۱۵ |
| A2 | ۱۴۲ | ۰/۲۸۶ | ۰/۱۵۵۰۱ |
| A3 | ۱۲۱ | ۰/۲۴۲ | ۰/۱۲۹۳۶ |
| A9 | ۰/۱۵۸ | ۰/۳۱۶ | ۰/۱۷۲۹۵ |
| A23 | ۱۲ | ۰/۰۲۴ | ۰/۰۱۴۰۷ |
| A24 | ۱۱۸ | ۰/۲۳۶ | ۰/۱۲۵۹۲ |
| A10 | ۹۰ | ۰/۱۸ | ۰/۰۹۴۴۶ |
| A28 | ۵۵ | ۰/۱۱ | ۰/۰۵۶۶۰ |
| A19 | ۸۲ | ۰/۱۶۴ | ۰/۰۸۵۶۶ |
| A29 | ۲۱ | ۰/۰۹۲ | ۰/۰۲۱۲۲ |
| A30 | ۱۲ | ۰/۰۲۴ | ۰/۰۱۲۰۷ |
| A31 | ۱۱ | ۰/۰۲۲ | ۰/۰۱۱۰۶ |
| A32 | ۲۱ | ۰/۰۴۲ | ۰/۰۲۱۲۲ |
| A33 | ۸ | ۰/۰۱۶ | ۰/۰۱۰۸۰۳ |

تعداد نمونه انتخاب شده، پانصد نفر

بررسی شده است و اختلافهای نژادی قابل توجهی به دست آمده است. برای مثال در مورد آنتی‌ژنهای گروه یک HLA، آنتی‌ژنهای A3, A1 و B8 در نژاد فرقه‌ای به وفور موجود است. همچنین آنتی‌ژنهای A23, A2, B17, A30 و B42 در سیاهپستان و آنتی‌ژنهای B59, B54 و B48 در نژاد مغولی بیشترین شیوع را دارد (۲). برخی از آنتی‌ژنهای نظیر A2 و B15 در کلیه نژادهای بشری با شیوع بالا مشاهده می‌شود (۳).

در این تحقیق آنتی‌ژنهای گروه یک HLA در پانصد نفر از مردم سالم اصفهان و اطراف آن مورد آزمایش قرار گرفت.

نتایج این تحقیق می‌تواند به عنوان جمعیت شاهد، در مورد تحقیقاتی که بر روی ارتباط آنتی‌ژنهای گروه یک HLA با بیماریها در اصفهان انجام می‌شود مورد استفاده قرار گیرد.

روش و مواد

از سال ۱۳۷۰ کلیه افراد سالمی که جهت تشخیص آنتی‌ژنهای HLA به آزمایشگاه پیوند اعضاء در بیمارستان حضرت علی‌اضغر (ع) مراجعه نمودند، افراد مورد مطالعه را تشکیل داده‌اند. این افراد اکثرآ جهت رد ابوت و یا بعنوان دهنده کلیه و مغز استخوان به آزمایشگاه پیوند مراجعه نمودند و کلیه آزمایشهای کلینیکی و پاراکلینیکی، سلامتی کامل آنها را تضمین نموده است.

در ضمن سابقه هیچگونه بیماری شخصی و یا سابقه بیماریهای ژنتیکی را در فامیل ذکر نمی‌کردند. هیچیک از افراد مورد مطالعه با یکدیگر نسبت فامیلی نداشته‌اند. کلیه این افراد ساکن مناطق مختلف اصفهان بودند و بدون توجه به سن، جنس و شغل برای تعیین آنتی‌ژنهای گروه یک HLA انتخاب شدند.

روش انجام آزمایش

در این تحقیق برای تشخیص آنتی‌ژنهای گروه یک HLA از روش میکروسیتوکسیستی NIH (۴) استفاده شد.

از هر بیمار مقدار ۵ میلی‌لیتر خون دفیرینه تهیه گردید و با استفاده از محلول فایکول هایپاک (۵)، لنفوسيت‌های آن جدا شد. لنفوسيت‌های به دست آمده پس از دو بار شستشو با محلول هانکس و تنظیم شمارش به مقدار یک میکرولیتر به هر خانه پلت HLA که دارای یک نوع آنتی‌سرم اختصاصی HLA بود، اضافه گردید. در این تحقیق از ۷۰ نوع مختلف آنتی‌سرمهای گروه یک HLA که از کارخانه‌های بیوتست، بهرینگ و یا پل فریز تهیه شده بود، استفاده

جدول ۲- چگونگی توزیع آنتی‌زنای HLA-C در اصفهان

| نام آنتی‌زن | تعداد نمونه مثبت | شیوع آنتی‌زن | فرکانس زنی |
|-------------|------------------|--------------|------------|
| CW1 | ۱۶ | ۰/۱۶ | ۰/۰۸۴۰ |
| CW2 | ۶ | ۰/۰۶ | ۰/۰۳۴۶ |
| CW3 | ۱۱ | ۰/۱۱ | ۰/۰۵۶۶ |
| CW4 | ۲۸ | ۰/۲۸ | ۰/۰۱۴۷ |
| CW5 | ۱۲ | %۱۲ | ۰/۰۶۲۹۸ |

تعداد نمونه انتخاب شده، صد نظر

این نتایج با بررسی هایی که در سایر نقاط ایران نظیر تهران (۷) و مشهد (۸)، انجام گرفته است مشابه و حاکی از شیوع بالای این آنتی‌زنها در ایرانیان می‌باشد. شیوع برخی از آنتی‌زنهای HLA در این مطالعه کمتر از چهار درصد بوده است، نظیر آنتی‌زنهای HLA-A23,A30, A33, B45,B37 آنتی‌زنها در مردم اصفهان است. با توجه به اینکه نظیر این نتایج در شهرهای دیگر ایران هم به دست آمده است، می‌توان گفت آنتی‌زنها نامبرده در ایرانیان رایج نیست (۸,۷).

شیوع سایر آنتی‌زنها گروه یک HLA در مقایسه با شیوع آن در سایر شهرهای ایران اختلاف قابل ملاحظه‌ای ندارد. از آنجایی که وجود برخی از آنتی‌زنهای HLA شخص را مستعد ابتلاء به برخی از بیماریها می‌نماید، نتایج این تحقیق می‌تواند به عنوان کنترل طبیعی برای تحقیقاتی که بر روی ارتباط آنتی‌زنهای HLA با بیماریها انجام می‌شود، مورد استفاده قرار گیرد.

منابع

- 1- Stites, D.P. Terr A.I. Basic and clinical immunology. Lange medical publication. 1994. p. 230-245.
- 2- Dausset, J. Colombani. J. Histocompatibility Testing, Munksgaard, Copenhagen. Joint Report. 1980; P. 621-667.
- 3- Dausset, J. The major histocompatibility complex in man, past, present, and future concepts, Science, 1981. 213, P. 1469-1474.
- 4- Ray JG. Niaid manual of tissue typing techniques. Bethesda. NIH publication. 1979. No. 80. 454; 39-41.
- 5- Boyum A. Isolation of mononuclear cells by one centrifugation and of granulocytes by combining centrifugation and

جدول ۲- چگونگی توزیع آنتی‌زنای HLA-B در اصفهان

| نام آنتی‌زن | تعداد نمونه مثبت | شیوع آنتی‌زن | فرکانس زنی |
|-------------|------------------|--------------|------------|
| B5 | ۱۹۵ | ۰/۰۳۹ | ۰/۰۲۱۸۹۷ |
| B7 | ۳۸ | ۰/۰۷۶ | ۰/۰۳۸۷۵ |
| B8 | ۲۲ | ۰/۰۶۶ | ۰/۰۳۳۵۶ |
| B12 | ۵۱ | ۰/۱۰۲ | ۰/۰۰۵۲۳۷ |
| B44 | ۴۴ | ۰/۰۸۸ | ۰/۰۰۴۵۰۱ |
| B45 | ۵ | ۰/۰۱۶ | ۰/۰۰۰۸۰۳ |
| B13 | ۲۸ | ۰/۰۷۶ | ۰/۰۰۳۸۷۵ |
| B16 | ۵۰ | ۰/۱ | ۰/۰۰۵۱۲۱ |
| B18 | ۲۸ | ۰/۰۵۶ | ۰/۰۰۲۸۴۱ |
| B21 | ۶۱ | ۰/۱۲۲ | ۰/۰۰۶۲۹۸ |
| B22 | ۲۸ | ۰/۰۷۶ | ۰/۰۰۳۸۷۵ |
| B35 | ۱۵۲ | ۰/۰۳۰۴ | ۰/۰۱۶۵۳۷ |
| B37 | ۷ | ۰/۰۱۴ | ۰/۰۰۰۷۰۱ |
| B47 | ۲۵ | ۰/۰۵ | ۰/۰۰۲۵۲۱ |

تعداد نمونه انتخاب شده، پانصد نظر

بحث

با توجه به نتایج جدول‌های ۲، ۳ و ۴، شیوع آنتی‌زنهای HLA-CW4 و HLA-B5,B35، HLA-A1,A2,A3,A9 سایر آنتی‌زنها گروه یک HLA در افراد مورد مطالعه بوده است.

sedimentation at 1 g. Scand J. Clin. Lab. Invest. 1968; 21 (suppl:7): 77-89.

- 6- Lalezari P. Speat TH. Studies on the genetics of leukocyte antigens. Blood. 1989; 478-58.
- 7- Nikbin, B. et al. Distribution of class I and II HLA antigens in Iran. 1986; proceeding of 3rd A. O.H.W.C.
- 8- Farid Hosseini R. et al. The distribution of class I HLA antigens in 1000 normal individuals in Khorasan province. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. 1989; 12: 43-44.