

# همی بالیسم و گزارش دو مورد آن

دکتر جمشید لطفی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

## Hemiballismus ABSTRACT

Hemiballismus is the most rarest type of unintentional movements. Two cases are reported in this article, discussing etiology, pathology and therapy (surgical and drugs).

**Key Words :** Hemiballismus; Etiology; Pathology; Therapy

## چکیده

سریع کره‌ای شکل طرف راست، بیشتر در قسمت دیستال همراه با اختلال تکلم مراجعت نمود. هوشیاری طبیعی بود، حرکات هنگام خواب وجود نداشت، معاینه نورولوژیک گذشته از مسائل فوق طبیعی بود. الکتروکاردیوگرافی اشکال حرکتی در بطن چپ در دیاستول (Diastolic LV Dysfunction) با  $75\%$  Ejection Fraction نشان داد.

در CT-Scan مغز بدون تریق، منطقه هیپوپادنس در هسته‌های قاعده‌ای طرف چپ نشان داد که در اسکن MRI محل ضایعه در هسته Subthalamic و نوع ضایعه ایسکمیک تشخیص داده شد (شکل ۲).

### تعریف و تظاهرات بالینی

همی بالیسم از نادرترین انواع دیسکانیزی است. لغت آن از لغت یونانی به معنای پرتتاب کردن گرفته شده است، چون حرکات بصورت پرتتاب دست و پا در یک طرف بطور سریع و ناگهانی و بی اختیار مشاهده می‌گردد. این ضایعه معمولاً در افراد میانسال و مسن گزارش شده است که اغلب دچار دیابت، ازدیاد فشار خون و یا پلی سیتمی بوده‌اند، ولی در افراد جوان‌تر و حتی اطفال نیز گزارش شده است. این حرکات بیشتر پرتوکسیمال هستند، در حالیکه حرکات کره، بیشتر قسمتهای دیستال را درگیر می‌سازند. اندام فوقانی بیشتر از اندام تحتانی و طرف چپ مغز بیشتر از راست درگیر می‌شود، حرکات غیرارادی گاهی با دیستونی و حرکات آنتوز شکل همراه هستند.

اگر صورت فرد درگیر شود، اختلالات بلع، تنفس و تکلم به بوجود می‌آید. حرکات فرق در خواب به کلی از بین می‌روند، خستگی شدید ناشی از این حرکات ممکن است خطر جانی دربرداشته باشد، گرچه در موارد دیگر ممکن است خودبخود و بطور نسبتاً ناگهانی این حرکات غیرارادی متوقف شوند.

همی بالیسم نادرترین نوع حرکات غیرارادی است. در این مطالعه دو مورد آن گزارش گردیده است و سپس دلایل مختلف ایجاد بیماری و پاتولوژی و درمان آن از نظر دارویی یا جراحی مورد بحث قرار گرفته است.

**واژه‌های کلیدی :** همی بالیسم؛ اتیولوژی؛ پاتولوژی؛ درمان

### معرفی موارد

بیمار اول - خانم م - الف، ۷۷ ساله، شماره پرونده: ۵۲۶۹۶۰، بیمارستان دکتر شریعتی، سابقه ۱۵ ساله دیابت و استفاده از سه قرص Glibenclamid روزانه و سابقه ۴ ساله از دیاباد فشار خون، که با Atenolol ۱۰۰ میلی گرم روزانه کنترل می‌شده است.



۱۵ روز قبل از بستری، بدبان استرس شدید روحی دچار حرکات متناوب و بی اختیار شدید در دست و پایی چپ گردیده است که تا هنگام بستری ادامه داشت. در معاینه حرکات بطور مشخص همی بالیستیک (Hemiballistic) و آتنوتیک (Athetotic) بود. بیمار دچار پلی اوری و پلی دیپسی بود، قند ناشتا ۵۰۰ میلی گرم درصد بود. با تجویز انسولین کربیستال ۲۵ واحد، قند به ۱۰۹ رسید و فشار خون  $\frac{140}{90}$  و ESR، WBC =  $۱۲۱۰۰، ۶۹$  بود. Hb =  $۱۰/۸$  و درجه حرارت  $۳۶/۹$  بود.

آزمایش تیروئید طبیعی بود، الکتروکاردیوگرافی ضایعات عروق قلبی (IHD) و رادیوگرافی ریه، بزرگ شدن قلب را نشان داد. در CT-Scan مغز، هموزاری در هسته‌های قاعده‌ای طرف راست بخصوص در پوتامن دیده شد (شکل ۱).

بیمار دوم - آقای ق - الف، ۶۵ ساله، شماره پرونده: ۵۵-۳۳-۲۸، بیمارستان دکتر شریعتی، سابقه از دیاباد فشار خون، هپرلیپیدمی و دیابت با ۵ ماه استفاده از Glibenclamid بیمار سیگار نمی‌کشید. بیمار با سابقه چند روزه حرکات غیرارادی و

شکل ۲- تصویری از نفر پنار دوم

شکل ۱- تصویر CT-Scan مغز، بیمار اول



از نظر پاتولوژی، اختلالات رابطه‌ای شیمیایی بخصوص GABA و انکفالین‌ها که باعث کاهش تحریکات مهار کننده به Globus Pallidus می‌شوند، مسؤول حرکات غیرارادی گزارش شده‌اند. در

این مطالعه، تالاموس را تنها منشاً حرکات غیرارادی ندانسته‌اند. Carpenter در ۱۹۵۸ (۸) با صدمه زدن به ناحیه Subthalamic، حرکات غیرارادی همی‌بالیسم را در طرف مقابل بدن در میمون گزارش کرد و اخیراً نیز تحریک این منطقه با فرکانس بالا (High Frequency Stimulation) همی‌بالیسم را در میمون ایجاد کرده است (۹).

ولی اطلاعاتی که از جراحی استروتاكیک بدست آمده است، نشان می‌دهد که ضایعاتی که باعث ایجاد همی‌بالیسم می‌گردد، می‌تواند در خود تالاموس یا حتی در پالیدوم و باکورنکس مغز باشد (۱۰).

## درمان

### ۱) درمان دارویی

به علت شدت حرکات، درمان دارویی حتی در مواردی که بسیار رو به بیهود است، لازم است. معمولاً از داروهای نورولپتیک (مانند کلرپرومازین) یا داروهای تهیی کننده دوپامین (مانند شرایتازین) استفاده می‌شود.

داروی دیگری که برای کنترل حرکات پیشنهاد شده است، عبارتست از Clozapine (۱۱)، در یک گزارش در دو مورد که بعد از یک ماه استفاده به هالوپریدول پاسخ نداده بودند، ۵۰ میلی‌گرم در روز کلرپرومازین کاملاً مؤثر بود. در مطالعه دیگر، این دارو در حالیکه بیمار به فنتیباریتال، هالوپریدول و پموزاید پاسخ نداده بود، حرکات را کنترل کرد (۱۲).

در برخی از موارد اختلال احساس عمیقی، لرزش و یا اختلال تعادل در همان طرف درگیر در معاینه دیده می‌شود.

## پاتولوژی و اتیولوژی

در اغلب اوقات ضایعاتی که در مغز باعث ایجاد حرکات غیرارادی بصورت همی‌کره یا همی‌بالیسم می‌شود، ضایعه عروقی در هسته Subthalamic (۲۱) یا حوالی آن است. این ضایعه در خیلی از موارد، ترومبوتیک و در رابطه با دیابت است و حتی ممکن است بعنوان اولین علامت در هیپرگلیسمی بروز کند (۳).

دلایل دیگر عبارتند از:

(۱) ضایعات عروقی دیگر: واسکولیت، پلی سیتمی، هیپرتانسیون

(۲) خونریزی

(۳) تومور مغز در این ناحیه

(۴) اغمای هیپراسموЛАR

(۵) دلایل نادر دیگر مانند اسکلروز متشر (MS)، A.V. Malformation، ضربه مغزی (۴)، آسیه مغز، هماتوم زیر دورمه و آنسفالیت

(۶) دارو مانند هروئین (۵) و فنی توئین و Dopamine Agonists

همی‌بالیسم اغلب مربوط به ترومبوز در شاخه‌ای از شریان Subthalamic Nucleus است که به هسته Thalamoperforant of Luys یا ارتباطات آن با Pallidum خون می‌رساند (۶).

در یک مطالعه (۷) دو مورد همی‌کره همراه با بروزی ۲۸ مورد مشابه در مقالات قبلی گزارش گردیده است. در این موارد مسئله اصلی، Striatal Infarction بوده است.

همی‌بالیسم به درمان طبی جواب نداده بود، با موفقیت استفاده کردند.

Jallo (۱۵) در یک مورد خاص، تalamotomy را برای کنترل حرکات غیرارادی یکطرفه در یک دختر ۱۳ ساله با موفقیت بکار بردا. این بیمار دچار همی‌بالیسم در طرف چپ بدن، بعد از عمل جراحی قلب برای یک ضایعه مادرزادی قلبی، گردیده بود.

## ۲) درمان جراحی

جراحی استروتاكیک در این بیماری مؤثر بوده است. در یک مطالعه توسط Krauss و همکاران، ۱۴ مور تحت عمل جراحی قوار گرفتند و در پیگیری بیش از ۱۱ سال، ۱۳ مورد بهتر شده بودند (۱۳).

Suarez و همکاران (۱۴) از Pallidotomy در مواردی که

## منابع

- 1- Carpenter MB, Athetosis & the Basal Ganglia, Arch. Neurol Psychiat, 1950, 63: 875-901.
- 2- Carpenter MB, Ballism associated with Partial Destruction of the Subthalamic Nucleus of Luys. Neurology, 1955, 5: 479-489.
- 3- Lietz TE, Huff JS, Hemiballismus as a presenting sign of hyperglycemia Am.J. Emerg Med, 1995, Nov. 13(6), 647-8.
- 4- Kant R., Zeiler S, Hemiballismus following closed head injury, Brain-Inj, 1996, Feb 10(2): 155-8.
- 5- Richter RW, Pearson J, Neurological complications of addiction to Heroin, Bull NY Acad Med, 49: 3, 1973.
- 6- Christensen E, Krabbe K.H., Case of hemiballismus with autopsy, Acta Psychiat. Neurol, 1945, 20:149-157.
- 7- Zagnoli F, Rouhart F, et al., Hemichorea + Striatal Infarction, Rev. Neurol-Paris, 1996, Oct 152(10): 615-22.
- 8- Carpenter MB, The Neuroanatomical Basis of Dyskinesia. In Fields MS (ed) Pathogenesis & Treatment of Parkinsonism, Springfield. Illionis, 1958, pp. 50-85.
- 9- Beurrier C, Bezard E et al., Subthalamic stimulation elicits hemiballismus in normal monkey, Neuroreport 1997, May 6: 8(7), 1625-9.
- 10- Cooper L.S. Bergmann et al., Anatomical verification of the lesion which abolishes parkinsonian tremor & rigidity 1963, Neurology, 13: 779-787.
- 11- Stojanovic M, Sternic N, Clozapine in hemiballismus Report of 2 cases, Clin. Neuropharmacol, 1997 Apr. 20(2) 171-4.
- 12- Bashir K, Manyam BV, Clozapine for hemiballismus Clin. Neuropharmacol, 1994 Oct: 17(5) 477-80.
- 13- Krauss JK, Mundinger F, Functional stereotactic surgery for hemiballismus, J. Neurology, 1996, 85: 278-86.
- 14- Suarez JI, Mefman LV., Pallidotomy for hemiballismus, Ann-Neurol., 1997, Nov.: 42(5), 807-11.
- 15- Jallo-Gil, Dogali-M, Ventral intermediate thalamotomy for hemiballismus, Sterotac-Funct-Neurosurg, 1995, 65(1-4) 23-5.