

بررسی انواع میکوباکتریومهای محیطی در رسوبات استخراهای پرورش ماهی شمال ایران و اهمیت آن در بهداشت عمومی

دکتر کیومرث قاضی سعید - گروه پاتوپیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مریم محمدی - گروه پاتوپیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

Study of Different Types of Mycobacteria in Sediments of Fish Breeding Pools of North of Iran ABSTRACT

In this study , 307 samples of the sediments of fish breeding pools of the different parts of North of Iran were tested for the survey of different environmental Mycobacteria.

After the process of cultivation , 107 cases of *Mycobacterium* were gained which after the performance of different biochemical tests. 112 cases of *Mycobacterium* were identified . From among the isolated Mycobacteria , the highest rank belonged to *M. fortuitum* with the frequency of 13.97% and the next *M.gordonae* 10.66% *M. xenopi* , *M. nonchromagenicum* 8.2% and the last *M.marinum* with the frequency of 5.74% . *M. marinum* was the case of Tuberculosis of fish and had important role in the creation of granuloma . Next to that , *M.fortuitum* , *M.kansasii* and *M.gordonae* had less importance.

The existence of such Mycobacteria in the fish breeding pools were on one hand the cause of pollution of fish and on the other hand the fishman and other people who are somehow connected to the fish and the pools sediments are subject to disease in case of existence of injury in their hands or feet.

مقدمه

طی یکصد سال اخیر و مدت کوتاهی پس از کشف باسیل توسط کخ دریافتند که گونه‌های دیگری از میکوباکتریومها بجز عوامل مولد سل وجود دارند. با آنکه بطور تصادفی یکی از این نوع میکوباکتریومها در محیط‌های کشت آزمایشگاهی ایزوله می‌شد ولی این اتفاق را غالباً متوط به یک کلونیزاسیون گذرا یا آلوگی محیط کشت می‌دانستند . در سال ۱۹۵۳ تیمپ و رانیون بطور سیستمیک کلکسیون بزرگی از میکوباکتریومهای غیر از باسیلهای کلاسیک سل جمع آوری کردند که از نمونه‌های کلینیکی بدست آمده بود(۶). این دسته از میکوباکتریومها از جهات متعددی با م.توبرکولوزیس متفاوتند. از جمله این میکوباکتریومها، میکوباکتریوم مارینوم را می‌توان نام برد. در سال ۱۹۵۰ انوردون و لینل گزارشی درباره گرانولوم استخراشنا منتشر کردند و م.بال نئی را نامگذاری کردند که بعدها مشخص شد که این ارگانیسم همان پاتوژن ماهی‌ها یعنی م.مارینوم بوده است (۱۰،۴،۶).

خلاصه

به منظور بررسی میکوباکتریومهای محیطی در استخراهای پرورش ماهی قسمتهای مختلف شمال ایران ۳۰۷ نمونه از رسوبات این استخراها مورد آزمایش قرار گرفت و پس از انجام مراحل کشت ۱۰۷ مورد میکوباکتریوم بدست آمد و بواسیله تستهای مختلف بیوشیمیابی ۱۱۲ مورد میکوباکتریوم شناسایی گردید. از میان میکوباکتریومهای جدا شده بالاترین رتبه مربوط به م.فورتوینوم با فراوانی ۱۳/۹٪ در ص. رم.گوردونه با ۱۰/۶۶٪ ، م.زنوبی ، م.نان فراوانی کروموزنیکم با فراوانی ۸/۲٪ و بالاخره م.مارینوم با فراوانی ۵/۷۴٪ درصد بوده است.
م.مارینوم عامل توبرکولوزیس ماهی بوده و در ایجاد گرانولوما اهمیت دارد و بعد از آن مافورتوینوم ، ماکانزاسی ، م.گوردونه ، م.هموفیلوم ، از جمله میکوباکتریومهایی هستند که در ایجاد عفونتهای پوستی دخالت دارند.

بهرخوازی، احتمال و جود این میکویاکریزوفهانی در محیط پراز استخراجی بورش ماهی و تغیر انتقال این باکتریها راه خراسن‌بای توچه به وفور این میکویاکریزوفهانی در این مناطق و پنهان‌خواص در نسام گونه‌های ماهی به عفرنیت یا مصاریشی و فورنیتوم حساسند (۸).

اخیراً مشخص شده که میکویاکریزوفهانی در ایجاد گاز اولوما بسیاری از ماهیان می‌باشد. این بیماری در میان جمیعت های ماهیان آبهای شیرین، شورخواره با دریاچه یا استخرهای بورش ماهی می‌باشد. همچنین با میکویاکریزوفهانی زیادی برای ابتلاء به عفونت توسعه این دسته از داشته باشند شناسی زیادی دارند، صیادانی که به صید ماهی در این استخراجها می‌باشند و نیز خانمهای خانه‌داری که ماهی های بورش پانه در این استخراجها را پاک کرده و آماده طبخ می‌نمایند چنانچه دچار زخم پاخراس پوستی باشند در معرض ابتلاء، به بیماری تاشی از این میکویاکریزوفهانی قرار می‌گیرند. بنابراین حضول روشنی که بوسیله آن ببوران از ابتلاء به چنین عفونتها لع جلوگیری کرد ضرورت دارد.

مواد و روش کار
۱- نمونه بردازی: نمونه بردازی از مناطق واستخراجی مختلف انجام شد و در هر منطقه‌ای که مورد بررسی قرار گرفت با توجه به بزرگی استخراجها، از هر استخراج بعد مر جدایانه چندین نمونه گرفته شد. نمونه‌ها از کناره‌های استخراجها، واگل و لای در سوابات قاشقک نلزی (اسپاتول) گل قسمت سطوح را کنار زد و از عمق ۳-۴ سانتی متری مقداری گل بودشت کرده و در شیشه‌های در پیچ دار ریخته، هر شیشه شماره گذاری شد و مشخصات استخراجها و مناطقی که نمونه بردازی انجام گرفت بیت کردیم و تمامی نمونه‌ها را تازمان عملیات گشت در بیچال نگهداری کردیم.

۲- گشت: نمونه‌ها را بعد از انجام مراحل آلوگری زدایی در دور مانند لوبوس ولکاریس قابل تشخیص است. ۳-۵ هفته بعد از الوده شدن فنايعانی به قطر ۰-۱۵ سانتی متر ایجاد می‌شود که این ضایعات تحت عنوانی متوضعی توصیف شده‌اند، مثلاً یک ندول کردیم.

لامها بطریق زبان نلسون رنگ آمیزی داشتند. شیشه‌های حادی بورسی کردیم (چون زمان رسید باکتری از نظر تعیین نوع میکویاکریزوفهانی را از اینها شناسی داشت).
بسیاری از بیماران ممکن است ضایعات ندول رودی دسته رنگی مانند (۴۰-۵۰٪).

در بعضی از بیماران شیشه‌های ضایعات چندی و بازوها در ابتدای مسیر مجرای لثاواری دیله شود، در نزد بغل و همچنین قورم خند لثاواری معمولاً دیله نمی‌شود. در بیمارانی که اینها تغیيف شده دارند عفونت یا مماریترم زخم عیشی ایجاد می‌کنند (۹).

- آزمایش اجتام‌نیزرات
- آزمایش کاتالاز
- آزمایش هیدروکسی توئین ۸
- آزمایش توبلد اوزار
- گشت روی محیط کلورنکی
- آزمایش تورانس نمک غطای
- واکنش در برای نور و همچنین رشد در حرارتی مختلط بور.

با توجه به اینکه میکویاکریزوفهانی محیطی در مناطق که دارای آب و هوای معتدل و مرطوب می‌باشد و فور بیشتری دارند، در استانهای گیلان و مازندران که از چشین شرایط اقلیمی خاص

میکویاکریزوفیز ماهی یک بیماری مزمن با تحفظ حاد در بسیاری از ماهیان می‌باشد. این بیماری در میان جمیعت های ماهیان آبهای شیرین، شورخواره با دریاچه یا استخرهای بورش ماهی می‌باشد. همچنین با این اهمیت زیادی بورده وبعد از آن، کارازاسی، م. فور توئینوم، م. او. لسرنس و... از اهمیت کمتری بخصوص دارند (۷-۸).

این میکویاکریزوفهانی عفونتهای جلدی یا حساسیت زیاد را برویه نزد آکواریوم داران و کارکنان بورش ماهی ایجاد می‌کنند (۹-۱۰). عفونت با مادریستم در انسان یک بیماری غیر شایع می‌باشد. بیماری بعنوان گازانولوماکی استخراج شنا و گازنولومایی ماهیان تانکها شناخته شده است (۱۰). اکثر مواد شیمیاییاری، درین افاده‌شناگر در استخراجها اتفاق می‌افتد. البته درین افرادی که بامخاذن ماهی سروکار دارند و خراشیده در دسته‌بیشان ایجاد می‌شود باکتری از راه خراشیده شده و پایجاد الکدی می‌کند. جراحتات ایجاد شده بصورت مفترد یا چند تابی بورده و مانند جوانه های شبیه زکل بر روی آرجه‌ها، زانو های پاها یا دستها ظاهر می‌شوند (۹-۱۰، ۱۱). موادی نیز در دسته‌ها و اگستن ماهیگیران همچنین در پل پیشی و چاهه دیده شده است. عفونت ایجاد شده لوكالره بورده وجود محدود و خوش‌خیم است و بذرگتر گرفتاری لثاواری را بوجود آورده است و به اسانی از تغیر کلولوزیس پیش‌ونده و عفونتهای جدی مانند لوبوس ولکاریس قابل تشخیص است. ۱-۲/۵ سانتی متر ایجاد می‌شود که این ضایعات تحت عنوانی متوضعی توصیف شده‌اند، مثلاً یک ندول

ویازوها در ابتدای مجرای لثاواری دیله شود، در نزد بغل و همچنین قورم خند لثاواری معمولاً دیله نمی‌شود. در بیمارانی که اینها تغیيف شده دارند عفونت یا مماریترم زخم عیشی ایجاد می‌کنند (۹).

هدف

با توجه به اینکه میکویاکریزوفهانی محیطی در مناطق که دارای

جدول ۱: توزیع فراوانی نمونه های انتخابی و درصد موارد مثبت آنها بر حسب مناطق
نمونه برداری در سال ۱۳۷۱

محل نمونه برداری	تعداد نمونه های برداشت شده	تعداد موارد مثبت میکروب اکتروبوم	درصد موارد مثبت میکروب اکتروبوم
ساری سمسکنده	۱۶	۱۱*	۶۸/۷۵
رشت سد سنگر	۴	۲*	۵۰
مرداب انزلی	۸	۳	۳۷/۵
رشت (کارگاه شهید انصاری)	۱۰	۶	۶۰
سلمان شهر (روستای دانیال)	۱۸	۹	۵۰
رشت (شعر صنعتی)	۱۲	۵	۴۱/۶۶
نشتارود (روستای بندین)	۳۴	۱۰	۲۹/۴
چالوس کیل کلا	۲۵	۸	۳۲
چالوس نجار کلا	۱۶	۳*	۱۸/۷۵
نور (روستای سنگین ده)	۲۲	۶	۲۷/۲۷
نور علمده (تاتکوه علیا)	۸	۱	۲۱/۵
نور (روستای عبدالآباد)	۲۶	۶*	۲۳/۰۷
بابل (درزی کلا)	۱۶	۴*	۲۵
بابل (روستای کمانگر)	۱۵	۴	۲۶/۶
نوشهر (روستای اندرور)	۲۰	۳*	۱۵
نوشهر (روستای اندرور)	۱۰	۶	۶۰
بابلسر (گالش کلا)	۱۳	۷*	۵۳/۸۴
بابلسر (گالش کلا)	۱۷	۷*	۴۱/۱۷
رامسر (دریا پشه)	۱۷	۶*	۳۵/۲۹
جمع	۳۰۷	۱۰۷	۳۴/۸

* - بیش از یک نوع مایکروب اکتروبوم از هر محیط کشت جدا شده است.

نتیجه

از تعداد ۳۰۷ نمونه رسوب استخراهای پرورش ماهی که مورد آزمایش قرار گرفتند، ۱۰۷ نمونه مثبت بدست آمد و ۱۲۲ نمونه میکروب‌اکتریوم جدا و تشخیص داده شد. ۱۵ نمونه اختلاف بین ایندو عدد (۱۰۷ و ۱۲۲) به علت این است که در بعضی از نمونه‌های کشت داده شده بیش از یکنوع میکروب‌اکتریوم رشد کرده بود (جدول ۱).

همانطور که در جدول ۲ مشخص شده بیشترین فراوانی و فراوانی نسبی مربوط به میکروب‌اکتریوم فورتویتوم (۷/۳/۹۶٪) می‌باشد که جزء میکروب‌اکتریومهای دارای قدرت بیماری‌زاپی محسوب می‌گردد. میکروب‌اکتریوم گوردونه با ۱۰/۶۶٪، زنپی، اسکروفولاسثوم به ترتیب با ۸/۲ و ۷/۳۷٪، م. کلونهای با ۵/۷۴٪ و م. مارینوم با ۵/۴۷٪ بدست آمدند.

جدول ۲- توزیع فراوانی و فراوانی نسبی موارد مثبت میکروب‌اکتریوم‌های بدست آمده از استخراهای پرورش ماهی در شمال ایران (۱۳۷۱).

نام باکتری	تعداد	درصد
م. فورتویتوم	۱۷	۱۳/۹۳
م. گردونه	۱۳	۱۰/۶۶
م. زنپی	۱۰	۸/۲
م. تانکروموزنیک	۱۰	۸/۲
م. اسکروفولاسثوم	۹	۷/۳۷
م. فلاوسنس	۸	۶/۵۵
م. اسمگماتیس	۷	۵/۷۴
م. کلونهای	۷	۵/۷۴
م. مارینوم	۷	۵/۷۴
م. اویوم کمپلکس	۵	۴/۰۹
م. ترا	۵	۴/۰۹
م. کاتزاسی	۴	۲/۲۷
م. ترموریزیستیل	۳	۲/۴۵
م. گاستری	۲	۱/۶۳
م. فلٹی	۲	۱/۶۳
م. وکی	۲	۱/۶۳
م. اگری	۱	۰/۸۰
م. هموفیلم	۱	۰/۸۱
م. ناشناخته	۹	۷/۲۸
جمع	۱۲۲	۱۰۰

بحث

نتایج بدست آمده در این مطالعه از نظر بررسی انواع میکروب‌اکتریومهای مسئول در ایجاد گرانولوم استخراشنا و عفونتهای پوستی و رابطه آنها با بیماری انسانهای در تماس، قابل بحث

می‌باشد. م. مارینوم، م. فورتویتوم، م. کلونهای، و م. هموفیلم از جمله میکروب‌اکتریومهایی هستند که در ایجاد عفونتهای پوستی دخالت دارند. در بررسی ما از مخازن پرورش ماهی مناطق ساری، سلمان شهر، یابل، میکروب‌اکتریوم مارینوم با فراوانی نسبی ۵/۷۴٪ بدست آمد، م. فورتویتوم بعد از م. مارینوم عامل ایجاد عفونتهای پوستی بوده است، م. فورتویتوم با فراوانی ۱۲/۹۳٪ بدست آمد. در مقایسه‌ای که بین نتایج بدست آمده از کشت خاک منطقه آذربایجان شرقی (۱۳) و گیلان (۱۱) و مازندران (۱۲) انجام گرفت از نظر فراوانی نسبی میکروب‌اکتریومها در این مناطق گیلان در مرتبه اول، مازندران در مرتبه دوم و آذربایجان در مرتبه سوم قرار دارد و فراوانی نسبی میکروب‌اکتریومهای محیطی در استخراهای پرورش ماهی ۳۴/۸٪ بوده که پایین تراز آمار بدست آمده در گیلان است. علت این اختلاف می‌تواند مربوط به اختلاف فصول نمونه برداری و موقعیت جغرافیایی و فاکتورهای دیگر باشد. چون اختلاف جغرافیایی در میزان پراکندگی میکروب‌اکتریومهای محیطی موثر می‌باشد و آمار بدست آمده در قسمت‌های مختلف نیز تایید کننده این نکته است. مثلاً مآمارینوم درگل استخراهای پرورش ماهی، خاک گیلان و خاک مازندران با فراوانی نسبی به ترتیب ۵/۷۴٪، ۳/۳۵٪ و ۳/۳۵٪ بدست آمد در حالیکه در آذربایجان این میکروب‌اکتریوم بدست نیامد. محیط‌های آبی و مرطوب برای رشد این دسته از میکروب‌اکتریومها لازم و ضروری می‌باشد.

فراوانی میکروب‌اکتریومهای محیطی در استخراهای پرورش ماهی از نظر بهداشت عمومی حائز اهمیت می‌باشد. چون خاک و آب یکدیگر ارتباط مستقیم دارند، لذا میکروارگانیسم‌هایی که در خاک هستند احتمالاً در آب نیز وجود خواهند داشت و آلوهه بودن خاک به میکروب‌اکتریومها موجب آلوهگی آب نیز خواهد شد. بخصوص در استخراهای پرورش ماهی گرم آبی که کفت و دیواره‌های استخراگل است، آلوهگی آب استخراها ممکن است باعث آلوهه شدن ماهی‌هایی که در این استخراها پرورش می‌باشند شود بخصوص ماهی‌هایی که مانند کپور که بیشتر در گل ولای و لجن زندگی می‌کند. آلوهه شدن ماهی بدن نحو موجب می‌شود که کسانی که با ماهی‌ها رسوایات و یا آب استخراها سروکار دارند آلوهه شوند و اغلب صیادان که با دست ماهی رامی‌گیرند و یا خانم‌های خانه‌داری که ماهی‌های آلوهه را تعیز می‌کنند آلوهه می‌شوند (۱۰ و ۱۱).

لذا بررسی وجود زخم در دست یا پای صیادان و کسانی که بتحویل با استخراهای پرورش ماهی سروکار دارند لازم است و بهتر است برای همه این افراد تست پوستی، یوسیله معرفه‌ای تست پوستی که از هریک از این میکروب‌اکتریومها تهیه شده انجام شود و در صورت وجود زخم، بیوپسی و آزمایشات لازم انجام شود و نسبت به درمان آنها اقدام شود تا از انتشار عفونت بدين نحو جلوگیری گردد.

منابع

- 1- Amerio-R; Carmenini, S.; Demori,F; et al: Atypical Mycobacteriosis caused by Mycobacterium G-Ital -Dermatol Venerol-1990,Apr;125(4):177-9
- 2- Baron.Ellen Jo,Finegold Sydney M,(Bauby & Scotts') Diagnostic Microbiology 1990,P:610-638
- 3- Boyd, Robert F.Ph.D. Hoerl. Brayn G, Ph.D.(1990) Basic Medical Microbiology P.540-543.
- 4- Collins, C oh and Others. Mycobacterium marinum in men. J.Hyg Camb(1985).
- 5- Davis, Bryon R. M.D. : Joga Biumbach, Mit , et al. Skin Lesions caused by Mycobacterium haemophilum. Annals of internal medicine vol.97 No. : 5 November 1982.
- 6- Eugene Sanders, W. Jr. Edward A Horowitz. Infection disease and their etiologic agents other Mycobacterium species. Mandel. chapter 231(1990) P:1914-1924.
- 7- Feldman, Roger, A. M.D. and Earl Hershfield, M.D. Mycobacterial Skin infection by and unidentified species. Annals of Internal Medicine vol. 80, No. 14P :445-452 ,1977.
- 8- Gengout,p.m.d.,f.Portaels,M.D... et al skin Granulomas due to Mycobacterium gordonae. Enternational Journal of Dermatology April 1987 , Vol.26,No. 3 181-184.
- 9- Joves, M.W.and I.A. wahl:d . 1988. Mycobacterium marinum infections of the hand and wrist Results of conservative treatment in twenty four cases J.Bone Joint Surg. 70:631-632.
- 10- Wayne, Lauvency, and Srneki. Hilda. Agents of Newly recognized of Infrequently encountered Mycobacterial Diseases. Clinical Microbiology Reviews. Jan.1992. P.1-25. Vol.5 No.:1.