

نگاهی به خونریزیهای زیر دور مری حاد و نتایج درمانی آن در سالهای اخیر

دکتر ناصر سدیفی*

علت خونریزی زیر دور مری معمولاً "ضریب جمجمه" است که در نتیجه پاره شدن عروق سطحی بین (کورنیکس) مغز و دور مری یاله شدن مغز و پارگی ورید یا شرائین سطح مغز می‌باشد. خونریزیهای داخل نسج مغزی گاهی به سطح مغز راهی‌می‌باشد و تشکیل هماتوم سودورال میدهد.

پارگی عروقی که به سینوس سازنیال می‌رسی کی از علل خونریزی‌های سریع و پیشرونده می‌باشد این نوع خونریزی‌هیچ وقت جدار ندارد و کپسوله نمی‌شود و تقریباً همیشه مشکل لخته می‌باشد. مکانیسم تشکیل خونریزی سودورال مزمن با نوع حاد بکلی متفاوت است در اینجا بعلت یک ضربه‌اولیه که ممکن است خیلی خفیف باشدیک تا دو ورید کوچک پاره شده و خونریزی در بین دور موآراکنوئید ایجاد می‌گردد این خون بعد از انعقاد چند روزی طول می‌کشد تا تبدیل به مایع می‌گردد و لیگیفیه می‌شود و بعلت بالا بردن فشار اسمرزی جذب مایع نخاع می‌کند و مجدداً باعث پارگی عروق مجاور می‌گردد و خونریزی ثانویه ایجاد مینماید تا اینکه به مین ترتیب حجم هماتوم افزایش می‌ابد و در صورتیکه بیمار تحت عمل قرار نگیرد منجر به فوت می‌شود (۵) و

W. Blackwood

در اینجا همیشه اطراف هماتوم پرده‌ای وجود دارد که Gardner تصور می‌کند این پرده بعد از هماتوم تشکیل می‌گردد و هماتوم را در بر می‌گیرد ولی Merley و Goodell و عقیده دارند هماتوم در بین دو لایه دور مر تشکیل می‌گردد و سیسیزگ می‌شود (۱) ضربه ایجاد کننده هماتوم ممکن است باعث شکستگی استخوان جمجمه گردد و ممکن است اصلاً همراه

ترجم خون در زیر دور مر عارضه شایعی است که در ضربه‌های مغزی پیدا می‌شود و به اشکال حاد، تحت حاد و مزمن تقسیم بندی می‌شود.

خونریزیهای زیر دور مری که از اولین ساعت بعد از ضربه ۲۴ ساعت بعد علائم عصبی ایجاد نماید و معمولاً بعلت شدت ضربه می‌باشد تحت عنوان هماتوم‌های سودورال حاد نام‌گذاری می‌شود ولی اگر علائم خفیف نر باشد و خونریزی قابل تحمل باشد و بین ۲ تا ۱۰ روز علائم عصبی ایجاد نماید، خونریزی سودورال تحت حاد نامیده می‌شود و بالاخره اگر چند هفت‌مو یا بیشتر طول بکشد تحت عنوان هماتوم سودورال مزمن می‌شناسیم (۲)

E. S. Gurdjian

هماتوم سودورال مزمن در قرن هفدهم برای اولین بار تشخیص داده شد و به اسمی پاکی منزیت مزمن و یا پاکی منزیت همو- رازیک توسط Virchow نامیده شد.

مرگ و میر این نوع خونریزی در نوع حاد بمحض آمارهای مختلفی که از منابع مختلف گزارش گردیده است بین ۵۰ تا ۸۰٪ است (۱) در نوع تحت حاد ۲۵٪ و در نوع مزمن ۵٪ مرگ و میر وجود دارد.

خونریزی حاد معمولاً یک طرفه است ولی در ۲۵٪ موارد دوطرفه دیده می‌شود.

خونریزی سودورال در هر قسمی از کاسه‌جمجمه ممکن است دیده شود ولی محل شایع آن در بارتنیال، تامپورال و فرونتیال می‌باشد. در گرداں خلفی نیز بندرت این خونریزی پیدا می‌شود.

*بخش جراحی اعصاب دانشکده پزشکی رازی - دانشگاه تهران

۱- رادیوگرافی جمجمه برای پیدا کردن خط شکستگی و یا شکستگی های فرو رفته و سیله ساده ایست که خیلی سریع می توان انجام داد.

در خیلی از افراد بخصوص در سنین بالا گذه بی نعال کلینیکی شده است و در رادیوگرافی ساده مشخص و در خط وسط قرار دارد در صورت وجود خونریزی در یک قسمت از مغز این غده از جای خود منحرف می شود و بطرف مقابله متوجه می گردد و با این ترتیب می توان وجود یک توده فشار دهنده را در یک طرف مغز با رادیوگرافی ساده تشخیص داد و اقدامات بعدی را سریعتر انجام داد. (۴)

T. M. Taveras

Angiography

۲- آنژیوگرافی مغزی آنژیوگرافی تنها وسیله دقیق و مطمئن برای تشخیص خون - ریزیهای زیر دور مری است با این طریق می توان وسعت و محل و نوع خونریزی داخل جمجمه را مشخص کرد آنژیوگرافی از راه شریان کاروتید سمتی که مشکوک به خونریزی است انجام می گردد ولی از آنجا که ۲۰٪ خونریزیها دو طرفه است صلاح است همیشه دو طرف آنژیوگرافی شود (۱) (۵)

I. R. you man

در آنژیوگرافی هماتوم سودورال یک فضای خالی بین سطح مغزو استخوان جمجمه مشاهده می گردد که در حالت روبرو مشخص است گاهی تجمع هماتوم در ناحیه تامیورال بیشتر می گردد و با هماتوم خارج دور مری اشتباه می گردد ولی اگر شریان منتهه میانی در آنژیوگرام پر گردد تشخیص خیلی ساده خواهد بود زیرا در هماتوم خارج دور مری این شریان نیز از سطح داخلی جمجمه فاصله می گردد در صورتیکه در هماتوم زیر دور مری در محل طبیعی خود قرار دارد . (۶)

I. M. Taveras

تشخیص بین هماتوم زیر دور مری حاد و مزمون نیز خیلی ساده است در شکل مزمن یک منطقه بدون رگ که تقرآن بطرف داخل می باشد تشکیل می گردد که محل طبیعی آن در پارتیال است در صورتیکه در نوع حاد این تغیر عکس حالت قبلی است و منطبق به سطح مغز است تنها یک تا دو سانتیمتر گاهی بیشتر از استخوان جمجمه فاصله می گردد .

از موارد عدم استعمال آنژیوگرافی بالا بودن سن بیمار از ۶۰ تا ۷۰ بیشتر است که باید با احتیاط زیاد انجام گیرد ولی بهر حال لازم است آنژیوگرافی دو طرف انجام گیرد زیرا چه بساماردي که هماتوم زیر دور مری در یک طرف و هماین

شکستگی نباشد و حتی گاهی محل ضربه و محل هماین یکجا نباشد، ممکن است در یک بیمار یک طرف جمجمه خونریزی سود ورال حاد باشد و در طرف دیگر خونریزی اگسترادورال . (۵)

W. Blackwood

علاوه کلینیکی خونریزی های سودورال حاد تشخیص هماین یکجا دور مری حاد در بسیاری از اوقات مشکل است زیرا این بیماران معمولاً دچار ضربه شدید مغزی می باشند این خونریزی بیشتر در ضربه های شدید مثل تصادف اتوبیل و سقوط از بلندی دیده می شود و اکثر اضایعات ساقه مغز ولاسراسیون و کنتوزیون مغزی با آن همراه است و در اینصورت تشخیص خونریزی خیلی مشکل خواهد بود و در اینجا مرگ و میر بیماران خیلی زیاد است و در نتیجه مقابل مقایسه با خونریزی های اگسترادورال نمی باشد زیرا اضایعه در این جا منحصر به یک نوع خونریزی است و نتایج درمانی آن نسبتاً خوب و مرگ و میر آنها نیز کمتر است البته باید در نظر داشت که مرگ و میر این نوع خونریزی هم در بعضی از آمارها از ۲۰ تا ۶۰٪ ذکر گردیده است.

اگر خونریزی زیر دور مری حاد منحصر بفرد باشد و تنها صدمه مغزی بیمار باشد در اینصورت عمل جراحی نتیجه بهتری خواهد داشت اگرچه مرگ و میر باز بیشتر از ۵۰٪ است ولی وقتیکه اضایعات دیگر مثل آنچه که در بالا اشاره شد به مردان این خونریزی گردد آنوقت جان بیمار در معرض خطرات زیادتری خواهد بود .

یکی از علائمی که مرا باید بفکر این نوع خونریزی بیاندازد بدتر شدن حال بیمار بعد از ضربه ، ادامه بیهوشی، بیداشدن علاوه عصبی مثل پارزی یا پارالیزی اندامها و حملات جاکسونی و یا تشنجهای زنر الیزه، باز شدن مردمک یک چشم و یا هر دو چشم از بین رفتن حرکات چشمی خونریزی ته چشم و گاهی ادم پاپی می باشد .

علاوه مزاء سفالیک سختی عضلات و تنفس خراب از تظاهرات مراحل آخر این خونریزی است . (۳)

E. S. Gurdjian

وسایل تشخیص :

بعد از گرفتن شرح حال بیمار و معاینات کامل عصبی و تحت نظر قرار دادن بیمار و کنترل آثار حیاتی و علائم عصبی و سایل تشخیص ذیل راهنمایی ذی قیمتی هستند که لازم است در موقع خود انجام گیرد .

حقیقت امرایستکه درخونریزیهای حاد زیر دور مری چون ضایعات دیگر مغزی نیز وجود دارد بخصوص ادمهای شدید مغزی ولاسراسیون و خونریزیهای داخل مغزی نتیجه درمان و عمل رضایت‌بخش نبوده است . (۶) Fell, Moiel

آخرین طریقه درمانی که در این چند سال اخیر در مراکز جراحی اعصاب انجام میگیرد و نتایج بهتری نسبت به گذشته داشته عبارتست از کرانیوتومی وسیع و تخلیه هماتوم و بازگذاردن دور مروحتی گاهی اوقات بجای خود نگذاردن استخوان قسمتی از جمجمه که در موقع عمل برداشته میشود و سپس استفاده از کورتیکوتروابی شدید و دیورتیکهای که روی ورم مغز اثر خوبی دارد مثل مانیتول و اوره .

با این ترتیب چون حجم داخل جمجمه برای ادم مغز محدود نیست و از طرفی تمام نقاط خونریزی دهنده با کرانیو ترمی وسیع کنترل گردیده است خواه ناخواه مرگ و میر کمتر خواهد شد . (۶) Fell, Moiel

آمار دلیل مربوط به ضربه‌های مغزی است که از دو سال و نیم قبل در بخش جراحی اعصاب بیمارستان سینا گرد آوری گردیده است و با آمار دیگران مقایسه گردیده است . در این مدت تعداد ۵۲۷ بیمار ضربه مغزی در بخش بستری شدن دو ۹۸۰ بیمار نیز در بخش اورژانس مدت ۲۴ ساعت و گاهی ۴۸ ساعت تحت نظر قرار گرفته است که احتیاج به مراقبتها اولیه و درمانهای سریائی داشتند و بدون اینکه به بخش منتقل گردند مرخص میگردیدند ولی بیمارانی که احتیاج به درمان و مراقبت بیشتر از ۴۸ ساعت داشتند پایا آنهایی که احتیاج به آنژیوگرافی و عمل جراحی پیدا میکردند بلا فاصله به بخش منتقل می‌یافتدند جمع این عدد ۵۲۷ بیمار بود که گزارش آمار ماروی همین بیماران تهیه شده است . از میان این ۵۲۷ بیمار ۳۵ مورد مبتلا به هماتوم سودواری حاد بودند که همه آنها تحت عمل جراحی قرار گرفته اند این ۳۵ مورد خونریزی زیر دور مری ۷/۵٪ بیماران بستری در بخش و ۱/۹٪ کل بیماران ضربه مغزی مراجعت شده به بخش اورژانس و بخش جراحی اعصاب بیمارستان سینا را تشکیل میدادند . حداقل سن این بیماران ۳ سال و حداقل ۷۵ سال بود . از تمام این بیماران رادیوگرافی جمجمه قبل از بستری شدن در بخش انجام گرفته بود ۴۵٪ دچار شکستگی در همان‌طرف یا طرف مقابل بودند .

خارج دور مری و یا داخل مغزی در طرف دیگر وجود دارد و بهترین وسیله تشخیص آنژیوگرافی است تا بتوان به نفع بیمار اقدامات فوری انجام داد .

بعضی معتقد بانجام ترپاناسیون در سه یا چهار نقطه از جمجمه در موارد حاد و فوری می‌باشد ولی این امر در هماتوم های زیر دور مری مزمن که تلف کردن وقت برای انجام آنژیوگرافی بخصوص موافقیکه وسائل کار در دسترس نباشد بیشتر صادق است تا در خونریزیهای زیر دور مری خاد .

۳ - گاما آنسفالوگرافی یا اسکینگ مغزی Gammacephalography بطور معمول در موارد حاد و تحت حاد این آزمایش کمتر انجام میگیرد زیرا فرصت انجام این آزمایش کم است ولی در موارد خونریزی زیر دور مری مزمن میتوان از این وسیله استفاده کرد بخصوص موافقیکه آنژیوگرافی متضمن خطراتی باشد . در این آزمایش جذب ماده رادیو ایزوتوپ در قسمتی که هماتوم وجود دارد بیشتر از حد طبیعی است و بخوبی مشخص میگردد .

۴ - اکو آنسفالوگرافی Echoencephalography در اینجا از امواج ماوراء صوت استفاده میگردد که از یک طرف جمجمه وارد میگردد و به استخوان جمجمه در طرف مقابل برخورد میکند و در برگشت این امواج بالا امواج اولیه موجی ایجاد میگردد که در حال طبیعی در خط وسط قرار دارد در صورتیکه در بیماری بعداز ضربه مغزی این موج از خط وسط منحرف شود ، باید بفکر خونریزی مغزی بود و سپس از وسائل دیگر تشخیص کمک گرفت .

۵ - پنو مو آنسفالوگرافی و وانتریکولوگرافی Pneumo encephalography and ventroculo graphy کمتر برای تشخیص خونریزیهای مغزی مورد استفاده قرار میگیرد .

درمان

درمان خونریزیهای زیر دور مری منحصر اجرایی است مگر زمانی که مقدار آن خیلی کم باشد و علائم عصبی وجود نداشته باشد و حال بیمار مرتب رو به بهبودی رود .

در خونریزیهای حاد زیر دور مری متدهای مختلف جراحی انجام میگرفت و بعلت اینکه مرگ و میر این بیماران زیاد بود هر چند وقت یکبار پیشنهاد تازه‌ای ارائه میگردید .

تراکتوستومی در اکثر بیماران که اختلال تنفسی داشتند بلافاصله بعد از عمل و یا در موقع لزوم انجام میگرفت مرگ و میر بیماران ما بعد از عمل در حدود ۵۳٪ بود که از چند ساعت بعد از عمل تا چند روز بعد دیده میشد.

حد اکثر روزهای زندگی بعد از عمل بیمارانیکه منجر به فوت میشدند ۲۷ روز بوده است . این مورد در یک بیمار ۷۵ ساله بود که مرگ او در اثر ضایعات ریوی و عفونت های مختلف بوده است و اگر مرگ این بیمار را جزو مرثایت خونریزی به حساب نیاوریم مرثایت بیماران مابه ۵۰٪ تقلیل پیدا میکند . در آمار ما هرچه سن بیماران باعین تر بود نتیجه عمل بهتر بود بطوریکه دو مورد کودک ۳ ساله با بهبودی کامل مرخص شدند .

یک بیمار ۷۵ ساله نیز بعداز عمل کاملاً "خوب شد و با پای خود بیمارستان را ترک گفت .

در مورد افراد مسن این نظریه وجود دارد که بعلت آتروفی مغز احتمال پیدا شدن ادم غزی و فشار داخل جمجمه کمتر است ولذا نتیجه عمل در این افراد بهتر است بشرطی که ضایعات ریوی و عفونتهای ادراری اشکالاتی از نظر درمانی ایجاد ننماید چنانچه بیمار ۷۵ ساله دیگر مابه مین علل بعداز ۲۷ روز درگذشت . داروی انتخابی مابرای کورتیکوتراپی دکساتازدن (دکارون یا ارادکسون) بود و هر چهار ساعت بین ۴ تا ۸ میلی استفاده میگردید ، در بعضی از موارد حتی دوبار بر این مقدار مصرف میگردید .

از دیورتیکها بیشتر از مانتبیول ۲۵٪ در حدود ۵۰۰ سانتیمتر مکعب یک تا دو بار در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول استفاده میگردید تغذیه کافی از راه لوله معده نیز انجام میگرفت .

تمام این ۳۵ مورد بجز یکی دو مورد که فرصت و زمان کافی وجود نداشت تحت آنتیوگرافی کاروتید قراز گرفتند و تشخیص خونریزی زیر دور مری داده شده بود همه این بیماران تحت عمل قرار گرفتند و از شیوه کرانیوتومی وسیع و کورنیکوتراپی شدید و دیورتیک کافی استفاده کردند .

تکنیک عمل در تمام بیماران ما باین ترتیب بوده است که بعد از انجام آنتیوگرافی و تشخیص قطعی و یا احتمالی هماتوم سودورال با بیهوشی عمومی و بی درنگ تحت عمل قرار میگرفتند بیماریه بهلوخوابانده میشد و انسیزیون قوسی شکل از ناحیه زیگوماتا استخوان پشت سری داده میشد و سعی میگردید که هر چه ممکن است انسیزیون وسیعتر داده شود و با اره برقی Stryker و یا وسائل معمولی استخوان برداشته میشد و بعد از اطمینان خاطر بر وجود هماتوم زیر دور مری ، دور مراز ناحیه تامپرال پائین باز میگردید و بطرف سینوس سازیتال برگردانده میشد در این موقع سعی میگردید تمام نقاط خونریزی دهنده هموستاز گردد و شستشوی کامل با سروم فیزیولوژیک ۳۷ درجه انجام گیرد تا هیچ لخته خویی باقی نماند پس بدون اینکه دور مری دوخته شود و یا گاهی با اضافه کردن پر یوست و یا فاسیالا تابسطح دور مربعد دلخواه سوتور میگردید و در صورتیکه مغز فشار فوق العاده داشت بدون گذاردن استخوان جمجمه بجای خود پوست روی دور مرد دوخته میشد و سعی میگردید که تمام این اقدامات در حداقل فالصله مانی انجام گیرد تا مدت بیهوشی بیمار کم باشد . در تمام مدت عمل از سروم مانتبیول ۲۰٪ برای جلوگیری از ادام مغزا استفاده میگردید .

از ۸٪ خونریزی زیر دور مری حاد ما بالمشدگی مغز و ادم و خونریزی داخل مغزی همراه بود بطور یکه الزاما دور مری باز گذارده شدو یا از غلاف عضله برای دوختن آن استفاده میگردید .

اجتماع ضایعات دیگر مغزی و نفاط دیگر بدن با خونریزی زیر دور مری

هاتومهای دیگر مغزی	شکستگی‌های استخوانهای دیگر	استخوانهای دیگر	لاسراسیون مغز	شکستگی استخوان جمجمه	خونریزی زیر دور مری	
۵	۶	۲۴	۱۲	۳۰	تعداد	
%۱۶/۶	%۲۰	%۸۰	%۴۰	%۱۰۰	درصد	

تابلوی جنس در ضربه‌های مغزی و خونریزی زیر دور مری

درصد خونریزی	خونریزی زیر دور مری حاد	بیمارانیکه احتیاج به بستری عذر داشتند	بیمارانیکه فقط ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت تحت نظر بودند	تمام ضربه‌های مغزی	
%۱۰۰	۳۰	۵۳۷	۹۸۰	۱۵۱۷	تعداد
%۷۰	۲۱	۴۰۳	۶۰۲	۱۰۰۵	مرد
%۳۰	۹	۱۳۴	۳۷۸	۵۱۲	زن

خونریزی زیر دور مری در سنین مختلف و درصد بهبودی و مرگ و میر

جمع	۲۵ سال	۲۶-۳۰ سال	۳۱-۴۰ سال	۴۱-۵۰ سال	۵۱-۶۰ سال	۶۱-۷۰ سال	۷۱-۸۰ سال	۸۱-۹۰ سال	
۳۰	۵	۸	۷	۴	۲	۲	۴	۴	تعداد
۱۴	۲	۳	۲	۱	۱	۱	۳	۳	بهبودی
۱۶	۲	۵	۴	۳	۱	۱	۱	۱	مرگ و میر
%۴۷	%۶۰	%۳۸	%۴۳	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۷۵	%۷۵	درصد بهبودی
%۵۳	%۴۰	%۶۲	%۵۷	%۷۵	%۵۰	%۲۵	%۲۵	%۲۵	درصد مرگ و میر

References

- 1- J.R. Youmans; Neurological Surgery, A Comprehensive Reference Guide to the Diagnosis and Management of Neurosurgery Problems, 1973, vol 2, p. 960.
- 2- G. Zuidema, W. Ballinger, R. Rutherford; The Management of Trauma 1973, P. 156-160.
- 3- E.S. Gurdjian, L.M. Thomas; Operative Neurosurgery, 3rd. Edition, 1970, p.230-250.
- 4- J.M. Taveras, E.H. Wood; Diagnostic Neuroradiology, 1970, p. 1780.
- 5- W. Blackwood, T.C. Dodds, J.C. Sommerville; Atlas of Neuropathology, 1970,p.132, 4.
- 6- David A. Fell, S. Fitzgerald, R.H. Moiel, P. Caram; Acute Subdural Hematomas, Review of 144 cases. J. of Neurosurgery 1975, vol. 42, p. 37.