

## بررسی سرطان ریه و ارتباط آن با دود چوب

دکتر نظام الدین مصطفا

بصورت چیق سروکار داشتند. زن خانهدار اعتیاد بخصوص نداشت و سوزن که در دهات ننانوایی می‌کردند روزانه ۱۰-۴۰ ساعت از دود چوب استنشاق می‌کردند که شرح حالتان بعداً توضیح داده خواهد شد.

انتشار جغرافیایی: ۱۹ بیمار ۶۰/۳ درصد ساکن تهران و ۱۱ بیمار بترتیب ۱ بیمار کاشان، ۱ بیمار از اراک، ۱ بیمار از رضاییه، ۱ بیمار از کرمانشاه، ۲ بیمار از خوزستان، ۱ بیمار از شهر کرد، ۱ بیمار از کرمان، ۲ بیمار از مشهد، و یک بیمار از رشت بوده‌اند.

فرم پاتولوژیک ضایعه: ۲۰ تن از مردان مبتلا به سرطان

Squamous Cell Carcinoma ۶۶/۶٪ بودند. ۹ بیمار ع مرد و سه زن (زن نانوایی) مبتلا به کارسینوم فرم آناپلاستیک یا اندیفراپیسیه بودند (و یک زن ۳/۳٪ فرم آدنوکارسینوم بود).

بررسی نتایج: در بررسی نتایج حداقل توزیع سنی در ۲۴-۵۵ سال، تاثیر اعتیاد به سیگار، تأثیر شهرنشیینی، ارتباط احتمالی مشاغلی مثل رانندگی و پاسان راهنمائی بچشم می‌خورد. اما نکته‌ای که جلب توجه بیشتری می‌نماید وجود سه زن نانوایی در بین مبتلایان است که بطور متوسط مدت ۱۰ سال روزانه بین ۱۰-۴ ساعت از دود چوب بعلت شغلشان استنشاق می‌کردند. بهمین جهت سه بیمار اخیر

بین سالهای ۱۳۴۹ و ۱۳۵۳ تعداد ۳۵ بیمار مبتلا به سرطان ریه مورد بررسی‌های اشیولوژیک قرار گرفتند و نتایج کلی زیر در مرحله اول بدست آمد:

گروه سنی: در میان ۳۵ بیمار جوانترین دختر ۲۰ ساله و مسن‌ترین مرد ۷۸ ساله بوده‌اند و همانطوریکه از جدول شماره ۱ بر می‌آید حداقل شیوع در گروه سنی ۷۴-۵۵ ساله بوده است.

جنس: در میان ۳۵ بیمار مبتلا به سرطان ریه ۴ بیمار زن (۱۲/۳٪) و ۲۶ بیمار (۸۶/۶٪) مرد بوده‌اند.

شغل: در بررسی شغل بیماران نتایج زیر بدست آمد:

پاسان	یکنفر
پاسان راهنمائی	یکنفر
راننده	۴ نفر
کارگر صنعتی	۸ نفر
زارع	۸ نفر
زن نانوا	۳ نفر
کارمند	۴ نفر
زن خانهدار	یکنفر
اعتياد: از ۲۶ مرد مبتلا ۲۰ نفر معتاد بسیگار بودند و بطور متوسط بین ۴۰-۲۰ سال روزانه بین ۵۰-۱۰ سیگار می‌کشیده‌اند. شش مرد دیگر نیز بنوعی با سیگار یا با توتون	

مورد بررسی بیشتری قرار گرفته‌اند.

### شرح حال بیماران:

در نمای میکروسکوپی طبق گزارش شماره ۹۷۲۳۹ بخش هیستوپاتولوژی انسستیتو تاج پهلوی، بافت نئوپلازیک بدخیم با ماهیت ابی‌تلیالی مشاهده شد، سلولهای تومورال دارای هسته‌های درشت نامنظم بایک یا دو نکلهول می‌باشند. سیتوپلاسم سلولها اکثراً اوزینوفیل و دارای حدود مشخص است. سلولهای تومورال بصورت صفحات بزرگ و کوچک در بافت همبندی پر رشته‌ای قرار گرفته‌اند، بطور کلی نمای میکروسکوپیک با کارسینوم آنالپلاستیک یا اندیفرانسیه ریه مطابقت می‌کند (شکل ۳).

بیمار دوم: خانم ش-ص ۳۳ ساله متولد و ساکن حومه کاشان در سابقه شخصی و خانوادگی نکته مهمی ندارد. بیمار مدت ۱۵ سال روزانه ۱۵-۸ ساعت در کار تنور بشغل نانوایی استغفال داشته است بگفته بیمار ماده سوختنی تنور چوب است. علت مراجعه بیمار سرفه‌های خشک و تنگی نفس است. بیمار از هموپتری و تب و لرز ۸ ماهه شکایت داشته است. ۳۱ بیمار با تشخیص بیماری مزمن ریه در بخش بستری گردید. در معاینه کاشکس مشاهده شد، گانگلیونی به بزرگی یک بادام در فوق ترقوه راست کشف گردید و در ریه رالهای رنفلان و سیوپلان شنیده شد. در رادیوگرافی ریه نیز تومور وسیع با حدود نامشخص در تمام ریه راست مشاهده گردید. در آزمایشات بیمار قند و اوره خون طبیعی هستندست مانتو + + است سدیماننتاسیون ۱۲۰ میلیمتر در ساعت اول است. فرمول شمارش ۵۰۰۰ گلبول سفید با فرمول لکوسیتر طبیعی و هموگلوبین طبیعی، با فرمول لکوسیتر طبیعی، در ریزبینی خلط سلول تومورال و باسیل کخ مشاهده نشد، در برونوکسکوپی نکته مهمی نداشت. بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت: قفسه صدری در طرف راست باز شد، تومور وسیع بصورت دو توده بزرگ در لوب تحتانی و میانی مشاهده شد، برای بیمار عمل جراحی پنومکتونی راست صورت گرفت. بیمار مدت ۱۱ روز بعداز عمل در بخش بستری بود و با وضع عمومی خوب مرخص گردید. قبول سرطان ریه در بیمار ۲۵ ساله بطور اولیه می‌باشد با اتوپسی و اطمینان از عدم ابتلا سایر اعضاء بسرطان و پیدا کردن محل شروع سرطان در ریه صورت گیرد ولی بیمار هنوز در قید حیات است و اعضاء دیگر بیمار نیز "فعلاً" سلامت هستند. بنابراین به ذکر و ارائه تصویر و نمای ماکروسکوپی و میکروسکوپی مقاطع از ریه مبتلا اکتفا می‌گردد.

در نمای ماکروسکوپی تومور (شکل ۲) در برش طولی دو توده بزرگ در لوب تحتانی و در لوب میانی با مناطق وسیع نکروز و کانونهای خونریزی مشاهده می‌شود. برتولپلاسم سلولها کم و هسته درشت و علائم آنارشی می‌باشند.

بیمار اول: خانم ط ۲۵ ساله متولد و ساکن اطراف اراک در سابقه شخصی و خانوادگی نکته مهمی ندارد. بیمار مدت ۵ سال روزانه ۸-۷ ساعت کارتنور به پختن نان اشتغال داشته است بگفته بیمار ماده سوختنی در تنور چوب است. علت مراجعه بسیار سرفه‌های خشک و تب متناوب است که مدت ششماهه ادامه داشته است. بیمار از کاهش وزن و بی-اشتهاهی شکایت دارد. رادیوگرافی ریه بعمل آمد است و بیمار با تشخیص ضایعه کیستیک ریه بستری شد. در معاینه بیمار کندانساسیون در ریه راست ملاحظه گردید. در رادیوگرافی مجدد قفسه صدری (شکل ۱) در ریه راست در قسمت تحتانی دو تصویر تیره‌با حدود نسبتاً مشخص نشانه ضایعات کیستیک یا تومورال خوش خیم مشاهده می‌شود. در آزمایشات بیمار تست کارونی منفی - آزمایش و این برگ منفی مقدار قند اوره خون طبیعی است سدیماننتاسیون خون ۶ میلیمتر ساعت اول - تست مانتو طبیعی است. فرمول شمارش ۵۰۰۰ گلبول سفید و مقدار هموگلوبین طبیعی، با فرمول لکوسیتر طبیعی، در ریزبینی خلط سلول تومورال و باسیل کخ مشاهده نشد، در برونوکسکوپی نکته مهمی نداشت. بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت: قفسه صدری در لوب تحتانی و میانی مشاهده شد، بصورت دو توده بزرگ در لوب تحتانی و میانی مشاهده شد، برای بیمار عمل جراحی پنومکتونی راست صورت گرفت. بیمار مدت ۱۱ روز بعداز عمل در بخش بستری بود و با وضع عمومی خوب مرخص گردید. قبول سرطان ریه در بیمار ۲۵ ساله بطور اولیه می‌باشد با اتوپسی و اطمینان از عدم ابتلا سایر اعضاء بسرطان و پیدا کردن محل شروع سرطان در ریه صورت گیرد ولی بیمار هنوز در قید حیات است و اعضاء دیگر بیمار نیز "فعلاً" سلامت هستند. بنابراین به ذکر و ارائه تصویر و نمای ماکروسکوپی و میکروسکوپی مقاطع از ریه مبتلا اکتفا می‌گردد.

در نمای ماکروسکوپی تومور (شکل ۲) در برش طولی دو توده بزرگ در لوب تحتانی و در لوب میانی با مناطق وسیع نکروز و کانونهای خونریزی مشاهده می‌شود.

و پسیب به درجات خفیفتری وجود دارد Doll و Hills در مطالعه و پرسش از ۴۰۰۰ طبیب در انگلستان، سیگار را فاکتور اتیولوزیک بحساب آوردند.

United States Surgeon General در سال ۱۹۶۴ فاکتورها در ایجاد کارسینوم ریه موثرتر است. با بالارفتن مدت اعتیاد و عده سیگار اهمیت این عامل بیشتر می‌شود. احتمال ابتلای به سرطان ریه برای فردی که به سیگار اعتیاد دارد در حدود ۲۵ بار بیش از فرد عادی است. در زنان که سرطان ریه کمتر از مردان واژ ۷/۱۰/۱۵ تا ۱۰/۶ درصد هزار تجاوز نمی‌کند باز همان رابطه‌ای که در مردان اشاره شد وجود دارد. عوامل کارسینوزن در سیگار عوامل شیمیایی هستند که مهمترین آن بنز و پیرن است و از ساخته سیگار بدست آمده است و در موش و خوکجه‌هندی سرطان پوست بوجود می‌آورد. ولی تا کنون این ماده در ریه حیوان مولد کانسر نبوده است. عوامل و فاکتورهای همراه مانند آلودگی هوا، کاغذ سیگار، انواع مختلف توتون و بیماریهای تحریک کننده ریه مانند برونشیت مزمن، آمفیزیم و غیره نیز باید در نظر گرفته شوند. آلودگی هوا: آلودگی هوای ناشی از صنایع و دود

اتومبیل یک فاکتور مهم در ایجاد کارسینوم ریه می‌باشد. هوا در اغلب شهرها شامل بعضی از مواد کارسینوزنی است که مشابه آن از دود سیگار نیز استخراج شده است. سرطان ریه در معتادان به سیگاریکه در شهرهای پر دود زندگی می‌کنند، شایعتر از معتادینی است که در مناطق روستائی بسیار می‌برند. مواد رادیوآکتیو: در معادن اورانیوم چکسلواکی نصف

تعداد معدنجیان از سرطان ریه درگذشتند. در معادن کالت ساکسونی نیز  $\frac{3}{4}$  مرگ و میر بعلت کارسینوم ریه گزارش داده شده است. فاکتورهای مهم در اینمورد گازهای رادیوآکتیو

Ore Radon هستند.

مشتقات ذغال سنگ و نفت: دودهای حاصله از سوختن

ذغال سنگ، قطران، قیر، گازوغیل وغیره که در آلودگی هوای شهر نیز موثرند، سهم بسزایی در ایجاد سرطان ریه دارند. انفلاماسیون مزمن ریه: بیماریهای التهابی مزمن ریه که تمایل به فیروز دارند عامل مستعد کننده‌ای برای ابتلا

کامل دارند. بطور کلی نمای میکروسکوپی منظره کارسینوم آنالاستیک ریه را نشان می‌دهد (شکل ۴) بیمار تحمل عمل جراحی را نداشت و مرخص گردید، و سه ماه بعد فوت کرد.


بیمار سوم: خانم ک - س ۴۰ ساله اهل و ساکن شهر کرد در سابقه شخصی و خانوادگی نکته مهمی ندارد. بیمار مدت ۱۲ سال روزانه ۵-۴ ساعت در کنار تنوریکه با چوب مشتعل نان بخته است. علت مراجعه بیمار سرفهای خشک و تنگی نفس و سابقه سردرد و هموپتیزی است. بیمار با تشخیص پلورزی طرف راست بستری گردید در معاینه بیمار وضع عمومی بدی دارد و علائم پلورزی در ریه راست مشهود است. در رادیوگرافی از ریه (شکل ۵) علائم پلورزی بعلت تومور ریه در طرف راست مشاهده می‌گردد.

در آزمایشات، در خلط بیمار تعداد زیادی لکوسیت و اسپرمونیلیا دیده شد، باسیل کنخ وجود نداشت فرمول شمارش ۵۴۰۰ لکوسیت با فرمول طبیعی، هموگلوبین ۹/۹ گرم درصد، قند اوره خون طبیعی، سدیمیاتاسیون ۸۵ میلیمتر در ساعت اول - در برنکوسکوپی نکته مهمی دیده نشد. از قاعده ریه راست ۲ بار پونکسیون شد و مایع خارج شده برای مطالعه سیتوپاتولوژی به استیتو تاج پهلوی فرستاده شد، بار اول گزارش شماره ۳۹۸۲۹ بخش سیتوپاتولوژی استیتو تاج پهلوی شامل است بر دیدن مقدار متوسط لکوسیت و سلولهای نئوپلاستیک با هسته‌های پر کرماتین و سیتوپلاسم واکوئله و بار دوم گزارش شماره ۴۵۰۲۳ مشتمل بر دیدن سلولهای کوچک اندیفرانسیه نئوپلاستیک و بطور کلی تشخیص کارسینوم ای آنالاستیک یا اندیفرانسیه از نوع سلولهای کوچک داده شده است. تحمل عمل جراحی برای بیمار مشکل بود و مرخص گردید و دو ماه بعد نیز فوت گردید.


عوامل شناخته شده ایجاد کننده سرطان ریه:  
عوامل زیر تا حال در مورد پیدایش سرطان ریه موثر شناخته شده‌اند:

سیگار: واستگی بین تیپهای اصلی سرطان ریه (کار-


سینوم اپیدرمoid و اندیفرانسیه) و اعتیاد به سیگار بخوبی شناخته و ثابت شده است. این واستگی در مورد سیگار بزرگ




شکل ۱ - تصویر رادیولوژی قفسه صدری بیمار اول



شکل ۲ - نمای ماکروسکوپی تومور ریه بیمار اول



شکل ۳—نمای میکروسکوپی تومور ریه بیمار اول



شکل ۴—نمای میکروسکوپی گانگلیون فوق ترقوه بیماره دوم



شکل ۵- رادیوگرافی قفسه صدری بیمار سوم

کمر در تنور خم می‌شود شروع به پختن نان می‌کند. نانواها معمولاً "روزها بمنازل می‌روند و گاهی تا ۱۵ ساعت به پختن نان مشغول‌اند.

به کارسینوم ریه محسوب می‌شوند. این بیماریها عبارتندار: توپرکولوز، پنومونیت مزمن، برونشکتازی، پنومونی لیبویید، آبسه مزمن ریه انفارکتوس، آنتراکوز و غیره.

#### ترکیبات شیمیائی چوب: محصولات تجزیه شیمیائی چوب

##### ubarendar:

اسیداستیک، استون، سلوفان، استات سلولز، کارکول Furfural، Dyestuffs Charcoal Molasses، Lacquer، Turpentine، Tar، Rosin، Rayon وانیلین و Yeast که در حرارت‌های مختلف تولید می‌شوند همه این مواد در اثر سوختن و ترکیب با اکسیژن بطور کامل ایجاد  $\text{CO}_2$  و ناقص تولید  $\text{CO}$  و بعضی مواد ناشناخته‌کربن دار می‌کنند.

هیچیکا ز مواد فوق تا کنون کارسینوزن شناخته‌نشده‌اند و از اثر دود ناشی از سوختن چوب نیز در مورد سرطان تا کنون گزارشی داده نشده است اما می‌دانیم که کاغذ از محصولات چوب است و گروهی عقیده دارند که عامل موئثر

#### بررسی تنورهای نانوایی خانگی در دهات ایران:

پس از برخورد بسه بیمار فوق نگارنده از دهات اطراف ارک، بخش آشتیان شهر رosta مانند تفرش و دهات اطراف کاشان و قم بازدید بعمل آوردم و بدقت مواد سوختنی تنورها بخصوص بخصوص در مورد بیمار اول و دوم را بررسی کردم. با توجه بهوضع روستاهای مورد بازدید و خانگی بودن پخت نان در این نقاط تصور می‌شود سالها وقت برای تبدیل این تنورها به تنورهای نفتی وغیره لازم است. تنورها بصورت گودالی استوانه‌ای شکل بعمق ۱/۵ تا ۱/۵ متر و بقطر ۷۰-۸۰ سانتیمتر در وسط اطاق یا آشپزخانه قراردارند. ماده سوختنی تنورها چوب است که اغلب چوب درختان هلو، گرد، آبالو و بادام است. درجه حرارت تنور تا حدود ۲۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد. معمولاً از چندین ساعت قبل از پختن نان تنور با شعله روشن می‌شود و پس از فروکشیدن شعله نانواهی گاهی تا

مدت ۱۰ سال روزی ۱۰ - ۴ ساعت از دود ناشی از سوختن چوب استنشاق می‌کرده‌اند و نیز هر سه بفرم اندیفرانسیه یا یا آنالاستیک سرطان ریه مبتلا شده‌اند، می‌توان استنشاق دود چوب را علت احتمالی سرطان ایشان بیان داشت که تحقیقات تحقیقات و بررسیهای بیشتر در نظری یا اثبات این نظریه خواهند کوشید.

در ایجاد سرطان ریه در کاغذ سیگار است که شایان توجه می‌باشد.

#### نتیجه نهائی:

با توجه باینکه هر سه بیمار زن نانوا در سنین پائین سرطان ریه (۲۰ - ۲۳ - ۴۰) هستند، هر سه بطور متوسط

#### REFERENCE

- Report of Advisory committee of surgeon General: smoking and health, United States Government printing office, Washington D.C. 1964.
- Doll R, and Hill, A.B. Brit. M.J2: 1971, 1956.
- Doll. R. Brit. S. Indust. Med. 16: 181-1959.
- Compton, H. L. and Kittle, C. F. Am. Surgeon 29: 26, 1963.
- Watson W. L. and Berg, J. W. Cancer 15: 759, 1972.
- Watson W. L.: Cancer 18: 133, 1965.
- Budinget, J. M.: Cancer 11: 106, 1958.
- Davis-Christopher, Text Book of Surgery 1847-Sabiston 1972.