

مطالعه بالینی و درمان ندول منفرد تیروئید

دکتر بیزدگرد اکرامی

بالینی بدخیم دارند.

عوااملی که احتمال بدخیمی ندول تیروئید را افزایش می دهند عبارتند از
۱- تقریباً ۴۰-۵۰ درصد ندولهای منفرد کودکان
بدخیم هستند (۵)

۲- سابقه اشعه درمانی $\frac{3}{4}$ کودکان با کارسینوم پاپیلر
سابقه اشعه درمانی در ناحیه گردن و مدیاستان را دارند.
۳- منفرد بودن ندول - ۴- ۳۳ درصد از ندولهای منفرد
تیروئید سلطانی هستند - بالا بودن درصد بدخیمی در آمار
هائیکه از بخش‌های جراحی گزارش می‌شوند معلوم دقت فراوان
در انتخاب بیماران برای عمل جراحی و درمان طبی اولیه
می‌باشد.

۴- جنس - ندول منفرد نزد مرد جوان خطر بیشتری در
بر دارد.

۵- علاشم فیزیکی - ندول بسیار سخت - آدنوباتی گردن
فلج عصب راجعه.

۶- فعالیت ندول - ۱۰ درصد ندولهای سرکه با جراحی
برداشته می‌شوند بدخیم هستند.

وسائل وامکانات تشخیصی در ندول تیروئید
از نظر جذب پردازی اکتویندولها Scanning - ۱

در سالهای اخیر، علیرغم اکتشافات چشمگیر در فیزیو
لوزی غده تیروئید و ابداع روش‌های بسیار مدرن تشخیصی
در بیماری‌های این غده، ندول تیروئید و نحوه درمان آن
همچنان مسئله‌ای مورد بحث باقی مانده است.

در سال ۱۹۵۵ گزارش ۱۰۰۰ مورد اتوپسی از کلینیک Mayo
منتشر گردید. ارقام برآستی تعجب آور بودند زیرا در ۸۲۱ نفر آنها که قبل از مرگ هیچ‌گونه ضایعه‌ای در تیروئید داشتند
۱۰۰ مورد ندول منفرد و ۳۵۶ مورد ندول متعدد تیروئید
یافته شده بود (۹).

۴/۲٪ از تیروئیدهای ندول حاوی کارسینوم بودند که با
احتساب تیروئیدهای سالم نسبت بدخیمی به ۱/۶٪ میرسید.
در آمارهای اخیر نیز در ۵۵ درصد اتوپسی‌ها یک و یا چند
ندول تیروئید یافته‌اند که اغلب آنها بعلت قرار داشتن در
پشت و یا میان نسخ تیروئید در زمان حیات قابل لمس نبوده‌اند
۲- ۵ درصد این ندولها از نظر هیستولوژیک بدخیم بوده‌اند
با توجه به قلت بروز و مرگ و میر سالیانه از سلطان تیروئید
که بر ترتیب ۲۵ و ۶ نفر در سال برای هر یک میلیون نفر جمعیت
حساب شده (۱۰) باید قبول کرد که در واقع تعداد قلیلی
از این سلطانهای هیستولوژیک (سلطان پاتولوژیست) مشی -

احتمال بدخیمی آنرا کاهاش میدهد ولی کاملاً از بین نمیرد زیرا در سرطانها مخصوصاً "نوع مدولر کالسیفیکا سیون مشاهده می‌شود وجود کالسیفیکا سیون در ندول از نظر برونوستیک نیز حائز اهمیت می‌باشد زیرا بکمک درمان سوپرسیو با T4 از

بین رفتن چنین ندولی غیر متحمل بنظر میرسد.

۸- رادیوایمونوآسی کالسی توئنین سرم - در کارسینوم مدولر تیروئید اندازه گیری تیروکالسی توئنین مخصوصاً "بعد از انفو" زیون کلسم ارقام بالائی رانشان میدهد.

Melvin بکمک این تست موفق به شناختن ۱۱ بیمار در یک فامیل شد (۷) جالب اینکه همه آنها قبل از عمل فاقد تومور قابل لمس و یا Scan غیر طبیعی بودند، معهد تیروئید کوتومی توتال سرطان مدولر دوطرفه را در همه آنها نشان داد ۹- بیوبیوسی با سوزن طریف - در تشخیص بیماری Hashimoto و تیروئیدیت dequervain بخوبی قابل استفاده است، بر عکس در کارسینوم غالباً "بعثت هوموزن ببودن ضایعه و یا بعلت کوچکی کانون سرطانی نتایج رضایت‌بخشی بدست نمی‌دهد (۱-۶)، البته انتقاد آن گروه را که با احتمال پراکنده شدن سلولهای سرطانی در مسیر سوزن اشاره می‌کنند نباید از نظر دور داشت.

تشخیص افتراقی ندولهای منفرد

Colloid Adenomatous - Cystic Disease - 1

فرمید در نواحی گواتر آندمیک، مصرف مواد گواترزای گیاهی و غیره سبب کم شدن ترشح هرمون تیروئید و در نتیجه از دیاد ترشح TSH می‌شوند. چنانچه اثر تحریکی TSH بروی غده تیروئید بمدت طولانی ادامه می‌ابد گواتر ندولر بصورت یک و یا چند ندولی تظاهر می‌کند، بعلت بروز خودکاری و یا تغییرات دیزرتیودر ندولها، درمان سوپر سیو با T3 و یا T4 بعد از ۴۰ سالگی اثر چندانی در از بین بردن این ندولهای خواهد داشت. ندولهای این بیماری ممکن است پرکار - کم کار و یا فعالیتی در حد طبیعی داشته باشد. گواتر ندولر شایعترین علت ندول منفرد تیروئید را تشکیل میدهد (۲) این بیماری در زنها شایعتر بوده و بعد از ۴۰ سالگی در زنها سریعاً شیوع می‌یابد (۲).

بنابراین هرچه بیمار جوانتر باشد مخصوصاً نزد مرد ها خطر سرطانی بودن ندول منفرد بیشتر است.

۲- تیروئیدیت ها - بیماری Hashimoto

بیشتر در زنان میانسال بروز می‌کند در اطفال نیز شایع است

به انواع Hot, Warm, Cold, Cool تقسیم می‌شوند، یک ندول برای دیده شدن در Scan باید اقلایک سانتیمتر قطر داشته باشد، قطر ندول و همچنین ضخامت نسوج اطراف آن در Scan اثر می‌گذارد و باید در نظر گرفته شوند.

۲- TSH Scan - ۱۰ واحد TSH به مدت ۳ روز تزریق شده و سپس Scan گرفته می‌شود، بکمک این تست می‌توان از بازگشت فعالیت در نسج تیروئید پاراندولر آگاهی یافت عدم ظهور نسج پاراندولر بعلل زیر نسبت داده می‌شود آنری - برداشته شدن نسج (با جراحی و یا رادیوآکتیو) - تیروئیدیت و نادراتومور بدخیم.

۳- Suppression Scan - ۰/۳ - ۰/۲ میلیگرم ال تیروکسین روزانه به مدت یکماه تجویز و سپس Scan گرفته می‌شود بکمک این تست می‌توان آدنوم خودکار را از هیبر تروفی جبرانی بازشناخت.

۴- 75SE - Selenomethionine ضایعات سرطانی که در Scan تیروئید باید رادیو اکتیو بصورت ندولهای سرد (Cold) هستند سلنیوم رادیو اکتیور ابخوسی جذب می‌کنند و بصورت نسبتاً گرم Hot ظاهر می‌شوند (۱۱)، در آدنوم های فولیکولر پرسلوول و تیروئیدیت نیز مشابه کیفیت فوق مشاهده می‌شود،

احتمال بدخیمی در ندولهای تیروئید که تست فوق در آنها مثبت است به ۵۰٪ میرسد،

در گزارش های منتشر شده رابطه بین نوع هیستولوژیک سرطان و همچنین سرعت رشد تومور با قابلیت جذب سلنیوم رادیو اکتیو روش نشده است.

۵- جستجوی آنتی بادی ها - اندازه گیری آنتی بادی نسبت به تیروگلوبولین و آنتی ژن میکروزوم تیروئید در تشخیص بیماری هاشی موتو کمال اهمیت را دارد.

در ۸۰-۸۵ درصد موارد LATS در خون بیماران مبتلا به Graves قابل جستجو است.

۶- اولتراسونو گرافی یا اکوگرافی - بدینوسیله می‌توان ندول سیستیک را از ندول توپر Solid بازشناخت ندولهای سیستیک تقریباً همیشه خوش خیم هستند، ندول های نوپلازیک غالباً Solid می‌باشند.

۷- رادیوگرافی گردن - وجود کالسیفیکا سیون در ندول

در حجم ندول پیدا نشود و یا بالعکس رشد ندول ادامه یافته باشد عمل جراحی راجایز می‌شمارند، در مقابل جراحان معمولاً از ابتدا اکسپلوراسیون گردن را پیشنهاد و استدلال می‌کنند که درمان سوپرسیو غالباً روی ندولهای خوش‌خیم موثرنیست و بالعکس ممکن است موجب کوچک شدن یک ندول سرطانی بشود.

چنانچه تصمیم به عمل جراحی گرفته شده باشد، تشریح و نمایان ساختن هر ندول تیروئید و سیس لمس دقیق آنها به یکی از دو حالت زیر می‌انجامد.

۱- متعدد بودن ندول - در ۶۰ درصد موارد بیش از یک ندول لمس می‌شود (۱۲) - عمل جراحی باقطع و برداشتم شدن نسوج مبتلاخاتمه می‌باید ولی کپسول خلفی تیروئید حفظ می‌شود و بدین طریق خطر هیپوپاراتیروئیدیسم و صدمه دیدن اعصاب راجعه منتفی می‌شود، در موارد مشکوک از تشخیص فوری پاتوزیست کمک گرفته می‌شود.
بعد از تیروئیدکتومی در گواتر مولتی ندولر، در آنها که بیشتر از ۱۵-۱۰ سال عمر کنند عودی در حدود ۱۵-۱۰٪ ملاحظه می‌شود، بنابراین درمان سوپرسیو با T_4 و با تیروئید نا آخر عمر ادامه داده می‌شود.

۲- منفرد بودن ندول - در صورت عدم وجود لنفاد توپاتی پری تیروئید و یا ظاهر همانزیومی ندول، که احتمال بدین خیمی ندول را افزایش میدهدن، لوبکتومی اکستراکپسولر در طرف ضایعه انجام می‌گیرد، سپس با توجه به تشخیص فوری پاتولوژیست عمل به همین جا خاتمه می‌باید و یا بالعکس و سعی وابعاد تازه‌ای می‌یابد، گروهی عقیده دارند که تنها برداشتن ندول همراه با نسج تیروئید سالم اطراف آن به ضخامت یک سانتی‌متر کافی است و چنین استدلال می‌کنند که این ندولها اقل از ۸۰ درصد موارد خوش‌خیم هستند و چنانچه پاتولوژیست در تشخیص فوری ضایعه را بدین خیم گزارش دهد می‌توان عمل را بشکل رادیکال با نجام رسانید.

پاتولوژیست و مسئله ندول سرطانی - در مرور ندول تیروئید پسی فوری علاوه بر تشخیص سرطانی بودن ضایعه، نوع آنرا باید تعیین کنند چه نوع تومور راهنمای جراح در انتخاب نوع عمل خواهد شد.

انتخاب عمل در ندول سرطانی

عظم یک و یا هر دولب تیروئید را سبب می‌شود، گاهی نیز بشکل ندول منفرد ظاهر می‌کند.

بیماری de Quervain نیز گاهی بشکل ندول منفرد ظاهر می‌شود ولی غالباً یک یا هر دولب را بزرگ می‌کند، حد اکثر شیوع آن در حدود ۵۰ سالگی است. در اطفال خیلی بندرت دیده می‌شود.

بكمک علامت کلینیکی و با استفاده از تست‌های یاد شده می‌توان تیروئیدیت‌ها را تشخیص داد.

۳- آدنوم

۴- کارسینوم

در بیمارستان Peter Bent Brigham از ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۵ جمعاً ۲۱۵ بیمار با تشخیص ندول منفرد تیروئید تحت عمل جراحی قرار گرفتند (۲). این بیماران بعد از یک دوره ۳-۴ ماهه درمان سوپرسیو با عصاره تیروئید برای عمل انتخاب شده بودند، شیوع نسبی بیماری‌های تیروئید در بیماران فوق بقرار زیر گزارش گردید (۲)

Colloid - Adenomatous - Cystic Disease - ۱ ۴۲ درصد

۲- آدنوم

۳- کارسینوم

۴- تیروئیدیت

درمان ندول منفرد الف - ندول گرم (HOT) - خطر بدین خیمی یک ندول گرم واقعاً ناچیز است، از نظر بالینی بیمار ممکن است هیبرتیروئید و یا یوتیروئید باشد، ندول گرم پس از سال‌ها فعالیت ممکن است دچار نکروز شده و در نتیجه هیپوتیروئیدی بیمار را سبب شود. چنانچه بیمار هیبرتیروئیدیا شد درمان ضرورت دارد. بكمک TSH-Scan می‌توان یک آدنوم توکسیک (TDG) را از یک گواتر توکسیک (TDG) آسیمتریک باز شناخت در شخص جوان بالوبکتومی تیروئید ندول توکسیک برداشته می‌شود. نزد شخص مسن تجویز بد رادیواکتیو مرجع است.

ب - ندول سرد (Cold) - چون بكمک و سایل تشخیصی موجود غالباً تشخیص ندول بدین خیم می‌سر نیست لذا در مورد نحوه درمان اتفاق نظر وجود ندارد، متخصصین غدد معمولاً یکدوره درمان سوپرسیو با T_4 و یا تیروئید را بمدت ۴-۶ ماه تجویز می‌کنند پس از انقضای مدت فوق چنانچه تغییری

۳- کارسینوم مدولر- غالباً بشكل گواتر مولتی ندولر و گاهی نیز بصورت ندول منفرد ظاهر می‌کند. عمولاً تومور جندکانوئی و دو طرفه است لذا تیروئید کتوئی توtal در همان جلسه و یا جلسه بعد بسته به گزارش فوری و یا تاخیری پاتو- لوزیست انجام داده می‌شود.

در ۹۰-۸۵ درصد موارد سابقه فامیلی وجود دارد، نوع فامیلی آن که بصورت صفت مندلی غالب انتقال می‌یابد غالباً بشكل سدروم Sipple's تظاهر می‌کند (سرطان ندولرتیروئید - فئوکروموسیتوم آدنال که غالباً دو طرفه است هیپر- پلازی و یا آدنوم پاراتیروئید). گاهی این تومور با NEUROMATA مخصوصاً در صورت ولبها و زبان ظاهر می‌کند.

از تومور مدولرمودای نظری ACTH پروستاکلاندین ها سروتونین - کالسی تونین و هیستامیناز ترشح می‌شود و همین سبب سدروم های پارانئوپلاستیک با این تومور زیاد دیده می‌شوند.

در نوع نامیلیال تومور مدولر تقریباً ۵۰ درصد بیماران ابتلای غدد لنفاوی گردی دارند. در این صورت دیسکسیون رادیکال گردن (غالباً Modified) در طرفی که غده لنفاوی مبتلا دارد ضروری است.

بعد از عمل، در صورت باقی ماندن قسمتی از تومور و یا بروز متاستاز هیستامیناز پلاسما زود تراز کالسی تونین ازدیاد می‌یابد.

۴- سرطان اندیفرانسیه - چون حتی باتیروئیدکتور توtal عود موضعی تومور حتمی است لذاتنها قطع و برداشت ایستم تیروئید برای جلوگیری از بسته شدن راه هوایی کافی بنظر میرسد.

۵- سرطان متاستاتیک- بصورت یک و یا چندندولی ظاهر می‌کند - شایعترین کانون اولیه سرطانی کلیه و سپس پرتریب دستگاه گوارش - ریتین و پستان هستند. درمان موضعی تومور تیروئید در اینجا غیر لازم بنظر میرسد.

۱- سرطان پاپیلر- علیرغم وجود کانونهای میکروسکوپیک در لب مقابله ۸۵٪ از موارد، تنها لوپکتومی در همان طرف ضایعه و سپس درمان سوپرسیو تا آخر عمر کافی بنظر میرسد و عمولاً عودی در لب مقابله بدنبال نخواهد داشت. معاذلک غالباً "لب مقابله نیز مورد عمل جراحی که از لوپکتومی سوب توtal نالوپکتومی توtal تغییر می‌کند قرار می‌گیرد و سپس درمان سوپرسیو تا آخر عمر ادامه می‌یابد. در صورت ملاحظه غدد لنفاوی مبتلا در طرف ضایعه دیسکسیون رادیکال گردن انجام می‌گیرد، گروهی نیز ترجیح میدهند که در این عمل ورید ژوکولر داخلی و عضله استرنوماستوئید را حفظ کنند.

چنانچه سرطان فولیکولر بهمراه سرطان پاپیلر وجود داشته باشد عمل جراحی عیناً بنحوی که در نوع پاپیلر است انجام می‌گیرد. در صورت مشاهده کانونهای سرطانی اندیفرانسیه، تیروئید کتوئی توtal عمل انتخابی خواهد بود.

عمولاً تیروئید Aberrant را در طرفین گردن متاستاز سرطان پاپیلر در غدد لنفاوی می‌شناسند، معاذلک این نظر در همه موارد صادر نیست چه گاهی نسج Aberrant طرفی گردن از نظر هیستولوژیک کاملاً طبیعی است و می‌توان آنرا نتیجه سکستراسیون قسمتی از تیروئید دانست. حتی در ۵ اتوپسی نسج کاملاً طبیعی تیروئیدرا در غدد لنفاوی گردن مشاهده کرده‌اند بدون آنکه بتوانند کانون سرطانی اولیه‌ای هراندازه کوچک و ریز در تیروئید بیابند (۸).

در دو یاسه دهه گذشته سرطان پاپیلر مخصوصاً نزد زنان جوان شیوع یافته است. در عوض برونوستیک آن طی همین مدت فوق العاده نسبت به گذشته بهتر شده است (۳).

۲- سرطان فولیکولر- عمولاً لب مقابله ابتلای ندارد و بنابراین لوپکتومی توtal لب مبتلا کافی بنظر میرسد این تومور عموماً از راه خون به ریه و استخوان متاستاز میدهد. چون ابتلا غدد لنفاوی گردن وجود ندارد دیسکسیون آنها غیر- ضروری بنظر میرسد.

References

- 1- Bech Hansen I, Kseldorf K: New england. Jour. Medi 291: 851 , Oct. 1974
- 2- Brooks IR: The Amer. Lour. Surg. 125: 477- 481, 1973

- 3- Crile G Jr. Surg. Gynec - Obstet. 132, 460, 1971
- 4- Hayles AB. Lohnson ML. Beahrs OH. Amer. J. Sur. 106. 735. 1965
- 5- Kirkland RT. Kirkland LL. Rosenberg HS. PEDIATRICS 51: 85 - 90. 1973
- 6- Mckenzie. J.M. Salisbury Murphy. S. Advances in - Medicine 215- 231, 1971
- 7- Melvin. K. E. W. Miller. H.H. New Eng - J- Med . 285: 1115- 1120. 1971
- 8- Meyer. I. S. Steinberg. L.S. Cancer 24: 302 - 311- 1969
- 9- Mortensen . J. D. Woolner, L.B. J.Clin. Endocrinol. 15: 1270. 1955
- 10- SKOKAL, J.E..New England J. Med . 249. 393. 1953
- 11- Thomas. C. Pepper F.D Ann. Surg. 170. 396. 1969.
- 12- Wright HK. Burrom GF. SURG. CLIN. N. AMER 54: 277- 288, 1974