

مجله دانشکده پزشکی تهران
شماره نهم - خرداد ماه ۵۴ - صفحه ۲۱۷

اهمیت عنصر سلنیم در تنفسیه انسان

دکترعلی اکبر خدا دوست - ذکرحسن عسکری شیرازی - دکتر رضا معزی

اگر سلنیم کافی ببدن انسان نرسد و یا عمدتاً "بحيوانات آزمایشگاهی غذاهایی که از نظر محتوای سلنیم فقر بر باشند بدھیم دچار کمبود این عنصر خواهند شد . اثرات کمبود سلنیم را در چندین آزمایشگاه در مورد حیوانات اهلی مطالعه نموده‌اند (۲) و کمبود سلنیم را در بیش از سی جنس مختلف از پرندگان خارجی در پارک ملی جانور شناسی در امریکا مورد مطالعه قرارداده‌اند (۳) در قسمت اعظم این موارد کمبود سلنیم با کمبود ویتامین E نیز توازن بوده است و کوشش بمنظور تولید کمبود خالص سلنیم در حیواناتی که بقدار کافی ویتامین E بآشنا داده شد تا قبل از کارهای Mccoy, Weswig بر روی موشهای سفید (۴) و همچنین آزمایش‌های Scott, Thompson آمیز نبوده است . پژوهش‌های بعدی نشان دادند که موشهای سفیدی که با غذاهایی که از نظر سلنیم کمبود داشتند ولی ویتامین E با آنها اضافه شده بود تنفسیه می‌شدند دچار ریزش مو، آب مروارید (CATARACT) و عروق خونی معیوب

خلاصه

تا حدود پانزده سال قبل عنصر سلنیم برای انسان و سایر پستانداران عنصری سمی شلقی می‌شد . در سال ۱۹۵۷ Faltz, Schwarz که مقدار ناجیز سلنیم در موشهای سفیدی که دچار کمبود ویتامین بودند قادر است از نکروز کبد جلوگیری نماید . مطالعات دیگری نشان دادند که در اطفال مبتلا به بیماری- Kwashior kor که در قاره آفریقا دیده می‌شود و نتیجه عدم تنفسیه کافی است مقدار سلنیم در خون کامل خیلی کمتر از حد طبیعی موجود در افراد عادی است . از این‌رو با اهمیت سلنیم در تنفسیه انسان و سایر پستانداران بی‌بردن . این مقاله درباره اهمیت عنصر مذبور در تنفسیه انسان و مختصراً از فیزیولوژی آن بحث مینماید . کمبود سلنیم - سلنیم بوسیله تنفسیه روزانه ببدن انسان میرسد . بعضی از غذاها مانند غذاهای دریائی (ماهی و امثال آن) و اصولاً غذاهایی که از نظر پرتوئین غنی می‌باشند دارای سلنیم نسبتاً زیادی می‌باشند . بالعکس میوه‌جات از نظر محتوای سلنیم فقر می‌باشند .

کم میشود . مثلا بورک و همکارانش (۱۱) یافته‌اند که غلظت سلنیم در هر سانتیمتر مکعب خون موشهای سفید جوانی که برای مدت چهار هفته با غذاهای فاقد سلنیم تغذیه شده‌اند از $۳/۰$ میکروگرم به $۵/۵$ میکروگرم تقلیل می‌یابد . اگر بعداً به همین حیوانات غذاهایی که سلنیم کافی دارند بدھیم مقدار سلنیم خون آنها بحال عادی بر می‌گردد . در همین آزمایش مقدار اولیه سلنیم کبداز ۷۵ میکروگرم به مقدار $۷/۰$ میکروگرم در هر گرم میرسد هورت (HURT) و همکارانش (۱۲) نیز گزارش مشابهی داده‌اند می‌تñی بر اینکه اگر به موشهای سفید غذاهای با سلنیم غیر کافی برای مدت ۶ هفته بدھیم مقدار سلنیم در خون وکید آنها به ترتیب از $۵/۳۳$ به $۰/۶$ قسمت در میلیون و از $۹/۰$ به $۰/۸$ میکروگرم قسمت در میلیون میرسد در مطالعه بورک مقدارویتامین E موجود در غذا یا مقدار پروتئین خورده شده تاثیری بر مقدار سلنیم موجود در خون نداشتند . بنابراین بنظر میرسد که مقدار کم سلنیم در خون کودکان مبتلا به کواشیورکور در درجه اول در نتیجه ورود کم سلنیم بین آنها می‌باشد . الاوی (ALLAWEY) و همکارانش خاطرنشان کردند که بنظر میرسد غلظت $۲/۰$ قسمت در میلیون سلنیم در کبد نزدیک به مقدار حد اقل بحرانی در مورد برخه‌ها می‌باشد . زیرا بیماری عضله سفید (WHITE MUSCLE) در حیواناتی مشاهده شده است که سلنیم کبد آنها کمتر از مقدار فوق می‌باشد . غلظت متوسط سلنیم در خون کامل افراد طبیعی انسان در مورد آمریکائیها کاناداییها و انگلیسیها به ترتیب $۶/۰$ و $۲۰/۰$ و $۳۲/۰$ میکروگرم در هر ۱۰۰ سانتیمتر مکعب است . مقدار سلنیم خون ختنی تا حدود ۱۱ میکروگرم در هر صد سانتیمتر مکعب در کودکان مبتلا به کواشیورکور گزارش شده است (۱۵) از طرف دیگر مقادیر زیاد تا حدود $۸۱/۰$ میکروگرم در صد سانتیمتر مکعب در کودکان و نزوئلائی در مناطقی که مقدار طبیعی سلنیم در خاک آنها زیاد است اندازه گیری شده است (۱۴) . درباره محتوای سلنیم اعضاء مختلفه انسان تنها اطلاعات پراکنده‌ای در دست است . عموماً مقدار سلنیم کلیه از اعضاء دیگر بیشتر است بعداً به ترتیب کبد ، طحال ، لوزالمعده و بیضه‌ها قرار دارند . دیکسون و توملینسون (DICKSON, TOMLINSON) وجود مقدار زیاد سلنیم در غده تیروئید را گزارش داده‌اند (۱۵) . تجزیه

گردیدند (۶۰) همچنین اسپر ما توزوژیدهای آنها از نظر شکل غیر عادی بودند . در مورد جوجه مرغها کمبود سلنیم باعث استحاله و غیروزنگده لوزالمعده گردید . از لحاظ تغذیه انسان گزارش مقدماتی درباره اثرات سود بخش سلنیم در میمونهای سنجانی (SQUIRREL MONKEYS) بالغ کدباغ‌هاهای که مقدار سلنیم آنها پائین بود تغذیه می‌شوند بسیار جالب است (۸) هر چند بعضی‌ها معتقدند قبل از اینکه مطالعات مذبور تأیید شده و توسعه یابند نتایج حاصله از آنها را بایستی با قید احتیاط تلقی کرد زیرا سایر محققین قادر نبوده‌اند در هیچ نوع حیوان بالغی که تا قبل از بلوغ با غذاهای که محتوای سلنیم آنها کافی بوده است تغذیه می‌شوند کمبود سلنیم ایجاد کنند و بعضی از علائم ذکر شده یاد آور کمبود ویتامین E می‌باشد .

دلیل مستقیم درباره نقش سلنیم در تغذیه انسان وجود ندارد . ولی تعدادی از مشاهدات در افرادی که شدیداً دچار سوء تغذیه شده‌اند کمبود سلنیم را در غذاهای آنها نشان داده‌اند مثلاً شوارتز (۲) متذکر شده است که بعضی از کودکان مبتلا به کواشیورکور که پس از فاصله ۰ مدن به مرحله اولیه بیماری اندکی افزایش وزن پیدا کرده‌اند ، در صورت دادن سلنیم بوزن آنها بمقدار قابل ملاحظه‌ای افزوده می‌شود . هاپکینزو مجاج (HOPKINS, MAJAJ) بطريق مشابهی اطفال مبتلا به کواشیورکور را مطالعه کرده و نشان داده‌اند که سلنیم بطور قابل ملاحظه‌ای شمارش رتیکولوسیت آنها را بهبودی می‌بخشد .

بورک و همکارانش (۱۵) یافته‌اند که مقدار سلنیم خون کامل کودکانیکه بیماری کواشیورکور آنها درمان نشده است نصف مقداری است که در خون بالغین وجود دارد و از مقداری که در خون اطفال درمان شده وجود دارد پائین تر است . این مولفین همچنین گزارش داده‌اند که جذب سلنیم رادیواکتیو بوسیله گلبولهای قرمز کودکان مبتلا به بیماری کواشیورکور در خارج از بدن زیاد بوده است و این خود دلیل آزمایشی مبتنی بر تأیید کاهش ذخیره سلنیم در این بیماری است . وجود سلنیم در بافتها - چندین محقق نشان داده‌اند هنگامیکه حیوانات آزمایشی با غذاهای که کمبود سلنیم دارند تغذیه شوند مقدار سلنیم در بافت‌های آنها بطور قابل ملاحظه‌ای

از نظر پروتئین دچار سوء تغذیه هستند (کودکان مبتلا به کواشیورکور) . باوجود فرار بودن بسیاری از ترکیبات سلنیم ، پخت و پز معمولی باعث از دست رفتن مقدار قابل ملاحظه ای عنصر نخواهد شد هرچند ، جوشاندن بعضی از سبزیجات که طبیعتاً از نظر سلنیم غنی هستند (مانند مارچوبه و قارچ) ممکن است منجر به از دست دادن مقدار قابل ملاحظه ای از عنصر مزبور گردد . با وجودیکه آسیاب کردن دانه های موجود در آنها میگردد ، رفتن بسیاری از الیگوالمانهای موجود در آنها میگردد ، خوشبختانه در مورد سلنیم تنها مقدار بسیار کمی از این عنصر درنتیجه آسیاب کردن از دست میروند . بعنوان مثال آرد گندم فقط بقدار ۱۴ درصد کمتر از دانه های گندم سلنیم دارد است و ذرت نیز در موقع آرد شدن تنها ۱۷ درصد از عنصر مزبور را از دست میدهد .

تجزیه چندین غذای منجمد معمولی نشان داده است که بعضی از آنها از نظر محتوای سلنیم در حدی قرار دارند که کمتر از آن کمبود تلقی میگردد (بجدول ۲ مراجعه شود) کلوچه های گوشتی منجمد (Pies) عموماً نسبت به سایر غذاهای منجمد سلنیم زیادتری دارا میباشد .

چون کودکان در حال رشد قسمتی از اجتماع انسانی هستند که محتملاً بیشتر در خطر کمبود سلنیم قرار دارند . محتوای سلنیم چندین نوع غذای کودک نیز تعیین شده است (۱۶) همانطوریکه انتظار میروند محصولات مختلفه گوشتی کودکان مقادیر کافی سلنیم دارند در صورتیکه محصولات میوه ای و سبزیجات محتوی مقدار بسیار کمی از این عنصرند . رویه هر فته محتوای متوسط سلنیم غذاهای فشرده کودکان فقط ۵/۰ میکرو گرم در هر گرم است یعنی غلظتی که پائین تراز حد لازم برای تغذیه خوب سلنیم میباشد .

نقش فیزیولوژیکی سلنیم

نقش فیزیولوژیکی سلنیم برای چندین سال محققین رشته الیگوالمانهای اکیچ کرده بود . پژوهش در چندین آزمایشگاه مختلف نشان داده است که ویتامین E و سلنیم متقابلاً ذخیره و مکمل یکدیگرند . فرضیه شایع درباره طریق تاثیر ویتامین E

۴ نمونه اتوپسی از کبد غلط سلنیم را در این عضو در حدود ۴/۵٪ میکرو گرم در هر گرم نشان داده است و حدود تغییرات آن از ۰/۲۳ تا ۰/۸۴٪ میکرو گرم در گرم بوده است . هیچگونه ارتباطی بین مقدار سلنیم موجود در کبد و جنس ، سن ، یا نژاد انسان مشاهده نشده است . کبد افراد مبتلا به سیروز دارای مقدار کمتری سلنیم بوده است . چون هیچیکاز نمونه های کبدی ۴۴ مورد فوق الذکر حاوی کمتر از ۰/۳۳٪ میکرو گرم سلنیم در هر گرم نبوده است ، چنانچه مقدار بحرانی ۰/۲۱٪ قسمت در میلیون در کبد گوسفندان را که کمتر از آن کمود تلقی میشود در مورد انسان نیز پذیریم نتیجه میگیریم که هیچیک از موارد فوق الذکر دچار کمبود نبوده اند .

سلنیم در بافت های بیک پروتئین متصل شده است که ماهیت دقیق آن هنوز معلوم نیست و بحث آن از حوصله این مقاله خارج است .

وجود سلنیم در غذاها – در سال ۱۹۳۵ در آمریکا در باره سلنیم مبادرت به تجزیه غذاهای مختلف نمودند که هدف از آن بطور عمده توصیف هرگونه خطر ممکنه ناشی از مصرف غذاهای سیمی حاصله از مناطقی که دارای سلنیم زیاد بودند برای انسان بود . در سال ۱۹۷۵ در کشور مزبور از غذاهای مختلفه را از نظر کمبود سلنیم مورد ارزیابی قراردادند (۱۶) اگر پذیریم که نتایج مطالعه برروی حیوانات در مورد احتیاجات غذایی در مورد انسان نیزبا ارزش است . نتیجه میگیریم که نیاز غذایی افراد بشری سلنیم محتملاً در حدود ۱/۰٪ تا ۰/۲٪ قسمت در میلیون میباشد (۱۷) . غذاهایی که از نظر پروتئین غنی میباشند مانند گوشت ، غذاهای دریائی ، از نظر سلنیم نیز غنی میباشند (بجدول شماره ۱ مراجعه شود) غلات ممکن است حاوی مقدار قابل ملاحظه ای سلنیم باشند ولی متابع قابل اعتمادی نیستند . زیرا محتوای سلنیم آنها بستگی به مقدار سلنیم خاکی دارد که در آن کشت شده اند . الا اخیراً عواملی را که ممکن است جذب سلنیم بوسیله گیاهان را تحت تأثیر قرار دهد خلاصه کرده است (۱۸) سبزیجات و میوه جات باستثنای مارچوبه ، سیر و فارچه های عموماً از نظر سلنیم منابع قیری میباشند این حقیقت که غذاهای سرشار از پروتئین دارای مقدار کافی سلنیم میباشند ممکن است علت کمبود این عنصر در خون کودکانی باشد که

آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز است (۲۱) چون عمل این آنزیم خراب کردن پراکسیدهای لیپیدی است. این کشف یک اصل روش در مرور در ابظه تغذیه‌ای بین سلنیم و ویتامین E بست داد. همچنین این موضوع ثابت شده است که سلنیم از مشکلین دستگاه‌های آنزیمی دیگری در میکرو ارگانیسم است (۲۲).

و این امکان نیز وجود دارد که عنصر مزبور نقش‌های دیگری هم در متابولیسم پستانداران بهره داشته باشد.

حاکی از اینست که توکوفرول (Tocopherol) بعنوان یک ضد اکسیدان عمل مینماید، فرضیه مزبور این ظن را برانگیخته بود که سلنیم نیز در بدن به قسمی مانند یک ضد اکسیدان عمل میکند (۲۰).

هرچند، طریق دقیقی که بوسیله آن سلنیم این عمل را انجام میدهد تا سال ۱۹۷۲ معلوم نبود. در این سال روتروک (ROTRUCK) و همکارانش در دانشگاه ویسکونسین (WISCONSIN) امریکا نشان دادند که سلنیم جزء مکمل

جدول شماره ۱ محتوای متوسط سلنیم در گروه‌های غذائی برگزیده

گروه غذائی	مقدار سلنیم بر حسب میکروگرم در هر گرم
غذاهای دریائی	۰/۵۳
گوشت‌ها	۰/۲۲
محصولات غله‌ای	۰/۳۹
سبزیجات	%
میوه‌جات	<%

جدول شماره ۲ محتوای سلنیم غذاهای منجمد مختلف

نوع غذا	مقدار سلنیم بر حسب میکروگرم در هر گرم	مقدار درصد رطوبت
<u>کلوچه‌های گوشتی منجمد</u>		
گوشت کاو شماره ۱	۰/۰۷۴۰/۰۰۷	۶۵
" " " ۲	۰/۰۸۴۰/۰۰۳	۶۴/۶
بوقلمون شماره ۱	۰/۱۰۴۰/۰۰۳	۶۱/۹
بوقلمون شماره ۲	۰/۱۴۰۰/۰۰۰	۶۲/۶
جووجه شماره ۱	۰/۱۲۳۰/۰۰۶	۶۵/۱
جووجه شماره ۲	۰/۱۹۸۰/۰۰۳	۶۴

<u>غذاهای منجمد</u>		
گوشت کاو راسته ساطوری	۰/۰۳۲۰/۰۰۱	۷۴/۳
گوشت کاو	۰/۰۶۰۰/۰۰۱	۶۴/۷
میت‌لوف	۰/۰۶۴۰/۰۰۷	۶۴/۵
ران خوک	۰/۰۲۱۰/۰۰۶	۶۷/۳
بوقلمون	۰/۰۹۱۰/۰۰۱	۷۳/۹
غذاهای دریائی		
مخلوط	۰/۱۱۶۰/۰۰۵	۵۵/۱

‡ متوسط سه اندازه گیری * متوسط دو اندازه گیری

دادن سلنیم با بیماری خاصی در نزد انسان بعمل آمده است، هیچیک از آنها تاکنون موقیت آمیز نبوده است. هر چند، نتایج حاصله در مورد حیوانات آزمایش نشان میدهد که آردسته از متخصصین علم تغذیه که مالیند در بهداشت و سلامتی انسان عملی را به سلنیم نسبت دهنده بایستی توجه بیشتر بطرف بیماریهای کبدی - لوزالمعده - عروق و دستگاه تولید مثل معطوف دارند. این مسئله که تغذیه مناسب سلنیم چگونه باید صورت گیرد، نیز در خور مطالعه و محتاج بررسی است. زیرا محققین در بحث بعضی از شرایط استرس Stress آثار سودبخش سلنیم را بمقداری بالاتر از مقادیری که معمولاً کافی تلقی می‌شود گزارش داده‌اند، مثلاً نیوبرن و کونر - (Newborn, Conner) یافته‌اند (۲۶) که یک قسمت سلنیم در یک میلیون نسبت به ۱/۰ قسمت در میلیون در مقابل مقدار یادگیری افلاتوكسین AFLATOXIN حفاظت بیشتری میدهد. احتیاج بسلنیم نیز بعلت اینکه انسان در معرض آلوده کنندگان مختلفه محیط از قبیل جیوه، کادمیوم و یا ارسنیک قرار می‌گیرد بطور قابل تصوری افزایش می‌باید. زیرا اجسام مزبوریا سلنیم را بصورت یک شکل غیرفعال در می‌آورند و یا اینکه به دفع آن سرعت می‌بخشند. روشن کردن تمام مسائل در باره نقش سلنیم در تغذیه انسان برای متخصصین علوم تغذیه مستلزم پژوهش‌های زیادی است که در آینده باید انجام گیرد.

اهمیت احتمالی سلنیم در سلامتی انسان

علاوه بر بیماریهای مختلف که در اثر کمبود سلنیم در حیوانات پدیدمی‌آید پژوهشگران رشته تغذیه ابر آن داشته‌است که قسمتی از اوقات خود را صرف مطالعه درباره اهمیت احتمالی سلنیم در سلامتی انسان نمایند. در گیری سلنیم در بیماری عضله سفیدگاو و گوسفند اشاره ایست بر اینکه عنصر مزبور ممکن است در دیستروفی عضلات انسان مفید فایده‌ای باشد، ولی ظاهرا چنین درمانی یا روش کمی داشته و یا اینکه اصولاً بدون ارزش بوده است. با وجود این، شبهات‌های بین مرگ ناگهانی در خوکه‌ای جوان درنتیجه کمبود سلنیم و ویتامین E و سندروم مرگ ناگهانی کودکان SID مشاهده شده است (۲۲). تجزیه پلاسمای خون کامل کودکان طبیعی و مبتلایان به سندروم SID فرضیه مبتنی بر اینکه کمبود ویتامین E یا کمبود سلنیم در علت بروز سندروم مزبور نقش اولیه را بعهده داشته باشد تائید نکرده است (۲۴) بعضی از محققین سعی کرده‌اند بین مقدار سلنیم در خون انسان در بعضی از مناطق و وقوع ناحیه‌ای سرطان یک نوع همبستگی برقرار کنند (۲۵) ولی همانطوری که الاوی بیان می‌کند (۱۸) غیر محتمل است که نتایج حاصله از توزیع ناحیه‌ای سلنیم در اغذیه بتواند مبنای کاملاً راضایت‌بخش برای پژوهش‌های اپیدمیولوژیکی درباره ارتباط سلنیم با بیماری انسان فراهم کند. بنابراین علی‌رغم کوشش‌های متعددی که بمنظور ارتباط

REFERENCES:

- 1- Schwarz, K. and Faltz, C.M., J. Am. Chem. Soc. 79: 3292, 1957.
- 2- Development and Status of Experimental Work on Factor 3-selenium. Fed. Proc. 20: 666, – 1961.
- 3- Saver, R.M., and Zook, B.C., J. Zoo. Ann. Med. 3: 34, 1972.

- 4- McCoy, K.E.M. and Weswig, P.H., J. Nutr. 98: 383, 1969.
- 5- Thompson, J.N., and Scott, M.L., J. Nutr. 97: 335, 1969.
- 6- Sprinker, L.H., Harr, J.R. Newberne, P.M. Whanger, P.D., and Weswig, P.H. Nutr. Repts. Int., 4: 335, 1971.
- 7- Wu, S.H. Oldfield, J.E. Whanger, P.D., and Weswig, P.H. Biol Report, 8. 625, 1973.
- 8- Muth, O.H., Weswig, P.H. Whanger, P.D. and Oldfield, J.E., Am. J. Vet. Res. 32: 1603, 1971.
- 9- Hopkins, L.L., Jr. and Majaj, A.S.: Selenium in human nutrition. In Muth, O.H. Oldfield, - J.E. and Weswig, P.H. des.: Selenium in biomedicine West-port. Conn.: Avi. publishing Co., 1967.
- 10- Burk, R.F., Jr. Pearson, W.N., Wood, R.P., II and Viteri, F., Am. J. Clin. Nutr. 20: 723, – 1967.
- 11- Burk, R.F., Jr. Whitney, R. Frank, H. and Pearson, W.N., J. Nutr. 95: 420, 1963.
- 12- Hurt, H.D., Cary, E.F., and Visek, W.J., J. Nutr. 101: 761, 1971.
- 13- Allaway, W.H., Moore, D.P., oldfield, J.E., and Muth O.L., J. Nutr. 88, 411, 1966.
- 14- Jaffe, W.G. Ruphael, D.M., Mondragon, M.C. and Cuevas, M.A. Arch Latin. Amer. Nutr. 22: 595, 1972.
- 15- Dickson, R.C. and Tomlison, R.H., Clin. chem. Acta 16: 311, 1967.
- 16- Morris, V.C. and Lavander, O.A., J. Nutr. 100: 1383, 1970.
- 17- Oldfield, J.E., Allaway, W.H., Draper, H.H., Frost D.V., Jensen, L.S., Scott, M.L., and Wright P.L. Nat. Acad. Sci. 1971.
- 18- Allaway, W.H. Cornel Vet. 63: 151, 1973.
- 19- Higgs, D.J., Morris, V.C. and Levandr, O.A. J. Agric. Food chem. 20: 678, 1972.
- 20- Green, J. Ann. N.Y. Acad. Sci. 203: 29, 1972.
- 21- Rotruck, J.T., Hoekstra W.G., Pope A.L., Ganther H.E., Swanson, A., and Hafeman, D., Fed. Proc. 31: 691, 1972.
- 22- Stadtman, T.C., Science 183: 915, 1974.
- 23- Money, D.F.L. N.Z., Med. J. 71: 32, 1970.
- 24- Rhead, W.J., Cary E.E., Allaway, W.H., Saltzstern. S.L. and Schrauzer, G.N. Bioinorg. Chem., I: 289, 1972.
- 25- Shamberger, R.J., and Willis, C.E., CRC Crit. Rev. Clin. Lab. Sci. 211, 1971.
- 26- Newberne, P.M. and Conner, M.W. Abstracts – 8th Ann. Conf. Trace substances and Environmental Health, June 11-13, 1974, Univ. of Missouri, P. 60.