

بررسی فلور میکروبی روده‌های باریک

بوسیله توباز ژرۇنوم در ۷۰ مورد*

دکتر محمد علی راشد محصل**

نوع سوند برداشت مایع ژرۇنوم که از یک لوله «پلی وینیل» به قطر چهار سیلیمتر ساخته شده و بوسیله یک محفظه جیوه‌ای منگین شده است. این سوند در انتهای دارای سه یا چهار سوراخ طرفی است. نوع دیگر سوند بیوپسی مخاط ژرۇنوم است [۲]

ب - طرز بجا گذاشتن سوند: سوند را قبل از بوسیله محلول های آبی‌نیوم چهار ظرفیتی ضد عفنونی کرده و بوسیله آب خالص کاملاً شستشو میدهیم که اثرات علول ضد عفنونی بر روی آن بجای نماند. سوند را صبح ناشتا در معده‌مریض قرارداده و سپس مراحل مختلف پیشرفت آنرا از دوازده ه تا ژرۇنوم بوسیله صفحه تلویزیون کنترل میکنیم. در موارد لازم وضعیت مریض را تناسب با پیشرفت سوند عوض میکنیم تا سوند به محل مطلوب برسد.

ج - برداشت مایع: اکثر برداشت‌های ما در ناحیه زاویه Treitz و با سیفوناژ یا آسپیراسیون سلایم انجام شده است. در تمام موارد نخستین نمونه برداشتی را بدور ریخته‌ایم. بقدار مایع برداشت شده هیچگاه از ه سیلی لیتر تجاوز نمی‌نمود و در بعضی موارد حتی بعد از مدت‌ها انتظار نمونه‌ای بدست نیافرده است. در مواردی که سوند بیوپسی مخاط ژرۇنوم را استعمال کرده‌ایم برداشت مایع نیز بوسیله همان سوند که در طرفین آن سوراخهای مناسبی ایجاد نموده بودیم انجام شده است.

۲- روش بررسی میکربشناسی:

الف - آزمایش مستقیم: که بعد از رنگ آسیزی گرم انجام میشود و بوسیله آن اندازه ژرهاهی منفی یا مثبت، نسبت کوکسی‌ها و پاسیل‌ها و احتمالاً وجود قارچها بررسی میگردید.

Bergogne Bergogne پاریس با کمک ارزنده آفای دکتر Cefr Debray CH. در بیمارستان Bichat در بخش پرفسور انجام شده است.

مقدمه: از زبانی که توباز ژرۇنوم آزاد یا غیر آزاد در عالم پزشکی عمول گردید بررسی کمی و کیفی فلور میکروبی روده‌های باریک در عالم پزشکی شروع شد.

با وجود آنکه فلور میکروبی روده‌های بزرگ دیرگاهی است که از روی استخان مدفعی شخص شده است ولی تاکنون وضع میکروبی روده‌های باریک ناشناخته مانده است.

اکنون کارشناسان، ساختمان میکروبی روده‌های باریک را در حال سلامت و بیماری سورد آزمایش قرارداده‌اند. ما هم این پژوهش بزرگ علمی را تعقیب نموده بررسی میکروبی این قسمت از دستگاه عظیم گوارشی انسان را با طریقه توباز آزاد ژرۇنوم انجام داده در عین حال که مایع برداشت شده را سورد آزمایش باکتریو-لوزی قراردادیم، این بررسی را از روی قطعات برداشت شده بوسیله بیوپسی مخاط ژرۇنوم تکمیل نمودیم.

اولین بار این پژوهش توسط Andrew و همکارانش انجام گرفت ساهم برای دوین بار این پژوهش را انجام داده و نتیجه این دو کار را باهم مقایسه کردیم.

هدف از این آزمایش بررسی دو نکته است نخست اینکه بررسی فلور میکروبی روده‌های باریک بصورت آزمایش جاری در آزمایشگاه عمول گردد دوم اینکه حد طبیعی و غیر طبیعی غلظت میکروبی روده‌های باریک در بیهوده‌های مختلف بیمارستان تعیین شود.

مواد و روش آزمایش

۱- طریقه برداشت:

الف - سوندها: از دو نوع سوند استفاده شده است یک

* این بررسی در بخش پرفسور Debray. CH. در بیمارستان Bichat پاریس با کمک ارزنده آفای دکتر Cefr و خانم دکتر

انجام شده است.

** گروه داخلی دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران

غلظتهاي مختلف آنرا تهيه نموده و سپس در محیطهاي کشت، کشت داده بيشد. اين بررسی دره ۷ سورد برداشت مایع ژرۇنوم بوده که در روی . ۷ نتراجام شده است (يعني در روی ه فرق دو برداشت با فاصله ۱۱ ماه انجام گرفته است) از ۷۵ برداشت در ۱۲ سورد مایع بدست نیامده است. در ۹ سورد قطعه اي از مخاط ژرۇنوم نيز از نظر میکروبی بررسی گردید ۷ سورد فقط باكتريولوزي مخاط ژرۇنوم مطالعه شد و مایعی از روده هاي باریک بدست نیامد. در ۱۱ سورد بررسی ماقطع کيفي بوده و در ۲۰ سورد دیگر بررسی کمي و کيفي انجام داده ايم (جدول ۱).

نتیجه:

۱- مایع ژرۇنوم: روی ۲۰ برداشت مایع ژرۇنوم نتایج

زير را بدست آورده ايم:

		برداشت منفي	۱ سورد
	برداشت محتوي يك ژرم	۱۲	»
	برداشت محتوي دو ژرم	۱۹	»
	برداشت محتوي ۳ ژرم	۱۶	»
	برداشت محتوي بيشتر از ۳ ژرم	۶	»
	برداشت محتوي باكتري و پارازيت	۱۱	»

ژرۇهای يافته شده بشرح زير بوده است:

الف - باسيلهای گرام منفي :

E. Coli	نمونه ۲۴
Enterobacter Cloacae	۸
Kl. Pneumoniae	۷
Proteus Mirabilis	۴
Citrobacter	۳
Enterobacteries Lactose +	۱
Pyocyanique	۷

ب - باسيلهای گرام مثبت :

Bacillus	نمونه ۲
Enterocoques	۱۸
Staphy. blancs	۱۱
Staphy. Pathogene	۶
Streptocoques	۰

ج - كوكسيهای گرام مثبت :

Neisseriacea saprophyte	نمونه ۱
هـ موراکسلا	۱

د - كوكسيهای گرام منفي

Moraxella نمونه ۱

ب - کشت: که در روی محیطهای ژلوز خون دار، ژلوز لاكتوزدار و تورنسل دار، محیطهای اختصاصی سالمونلا - شیگلا (S. S)، محیط شاپن و محیط کشت بی هوازی (ژلوز Veillon) بعمل میآمد.

چون بررسی میکرها بی هوازی در تمام مواردی که در ابتدا انجام شد منفی بود بدینجهت بعد از چند آزمایش از آن صرف نظر شد.

ج - شمارش ژرۇها : شمارش ژرۇها بدین ترتیب انجام شد که محلولهائی از مایع برداشت شده به غلظتهاي ۱۰^{-۱} و ۱۰^{-۲} و ۱۰^{-۳} و ... تا ۱۰^{-۱۰} تهیه میگردید و از هریک از این غلظتها ۰۰۰ میلی لیتر در روی هریک از محیطهای سورد نظر کشت میشد و بعد از ۴ تا ۸ ساعت در اتوو تعداد پرکنه های موجود در روی هریک از جعبه های کشت شمرده میشد و بدین ترتیب تعداد پرکنه ها برای ۰۰۰ میلی لیتر و با ضرب کردن در ۲۰ برای یک میلی لیتر در غلظتهاي مختلف بدست میآمد.

د - بررسی فلور میکروبی در روی قطعات مخاط ژرۇنوم: در مواردی که قطعه اي از مخاط برای بررسی میکروبی در دست بود آنرا در سرم فیزیولوژی له کرده و سپس با همان ترتیب قبلی

جدول ۱

نام	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	مجموع
شاهد	۱	۸	۷	۱	—								
ژرۇنیت	۳	۱۹	۱۰	۴	۵								
امپرو	۲	۷	۴	۱	۲								
معده عمل شده	۷	۱۴	۱۰	۴	—								
پانکراتیت	۲	۶	۲	۱	۲								
اسهال	۱	۳	۲	—	۱								
بیماری Whipple	۱	۱	۱	—	—								
دیابت	—	۲	۲	—	—								
آنی مکالوبلاستیک	—	۱	۱	۱	—								
آگاما گلوبولینی	—	۱	۱	—	—								
تنگی روده	—	۱	۱	—	—								
مختلف	۱	۶	۰	—	۱								
	۱۹	۷۰	۴۷	۱۱	۱۲								

ب - باسیلهای گرام مشبت
Bacillus ۲ سورد

ج - کوکسیهای گرام مشبت

Enterocoques ۲ سورد

Staphylo. blancs ۶ سورد

د - کوکسیهای گرام منفی:

Neisseriacea Saprophyte ۲ سورد

ه - سوراکسلا یک سورد

و - باسیلهای شناخته نشده یک سورد

شمارش ژریها بین . و ۱۰۰ بوده و آنرا نتایج بین ۰ و ۴٪ قرار داشته است.

مقایسه ژریهای یافته شده در توبیاژ با باکتریولوژی قطعه بیوپسی روده باریک فقط در دو سورد ژریهای یافته شده در دو آزمایش یکسان بوده‌اند و در ۰٪ سورد دیگر نتایج کاملاً متفاوتند. در ۷ سورد فقط نتیجه آزمایش باکتریولوژی روی قطعه بیوپسی مخاط را در دست داریم و توبیاژ با عدم موقوفیت رویرو بوده است.

بحث:

سالهای ستمادی وضع سیکری برودهای باریک ناشناخته بود اما اکنون به ثبوت رسیده است که روده باریک چنانکه قبل تصور می‌شد خالی از میکروب نیست [۱-۱۳-۱۲-۱۶-۱۴-۱۷-۱۸-۱۹] برای نشان دادن این سطل راه‌های مختلفی را برگزیده‌اند از آنچمه:

۱ - کپسول خودکار غیر متصل [۲۳]

۲ - کپسول متصل [۱۸] Shiner

۳ - برداشت مایع در جریان اعمال جراحی شکم

۴ - برداشت مایع از راه مقعد مصنوعی بهنگاسی که روده باریک بخارج راه دارد.

۵ - توبیاژ غیر آزاد ژریونوم [۱۲-۱۳-۱۴-۲۲]

۶ - وبالآخره توبیاژ آزاد ژریونوم که ماهم همین راه را انتخاب کرده‌ایم.

بهرگدام از این روش‌ها انتقاداتی وارد است مثلاً کپسول خودکار غیر متصل را باید در مدفوع جستجو کرد و در این کار مسلسل است که ترکیب میکروبی موجود در کپسول بهنگام عبور از روده‌ها تغیر خواهد نمود. کپسول متصل، کار کردن با آن شکل است و توبیاژ ژریونوم غیر آزاد بزرگترین عیبی که دارد این است که بهنگام تزریق سرم فیزیولوژی یا هوای فشرده برای باز کردن سوراخهای بسته شده ترکیب فیزیولوژی بعیط روده عوض می‌شود.

جدول ۲

نام ژری	شماره	تعداد	میزان	میزان	میزان	میزان	مجموع
شاهد	-	۱	۱	۲	۲	-	
اسپرو	۰	۱	۷	۴	-	-	
معده عمل شده	۰	۱	۷	۴	-	-	
ژریونیتها	-	۲	۵	۴	-	-	
پانکراتیتها	-	-	-	۱	۱	-	
اسهالها	۱	۱	۱	-	۱	-	
بیماری Whipple	۱	-	۱	-	-	-	
آنمی مگالوبلاستیک	-	-	-	-	۱	-	
هیپو کاما گلبولینی	-	-	۱	-	۱	-	
دیابت	۳	۱	-	۱	۱	۱	
متخلف	۱	۱	-	۲	۲	-	
تنگی روده	-	-	۱	-	-	-	
مجموع	۱۱	۶	۱۶	۱۹	۱۲	۱	

شمارش ژریها بین . و ۱۱٪ واکثر جوابها بین ۳ و ۷٪ زرم در میلی لیتر است. در شرایط موجود ایکان بررسی فلور لاکتیک وجود نداشت. در مسواردی که باکتری و پارازیت همراه یکدیگر بوده‌اند، پارازیت‌هایی را که یافته‌ایم از نوع سخن‌ها، کاندیدا آلبیکانس و لامبیا بوده‌اند.

۳ - باکتریولوژی قطعات بیوپسی روده‌های باریک: در مجموع ۱۹ سورد قطعات بیوپسی روده‌های باریک را از نظر باکتریولوژی ایستاخان کرده‌ایم و نتایج حاصله بشرح زیر بوده است:

قطعه خالی از میکروب	۳ سورد
قطعه بحتی یک زرم	۹
قطعه بحتی دو زرم	۶
قطعه بحتی سه زرم	۱
نام ژریهای یافته شده بشرح زیر بوده است:	
الف - باسیلهای گرام منفی:	
E. Coli	۶ سورد
Kl. pneumoniae	۳ سورد
Enterobacter cloacae	۶ سورد

گرفته‌اند [۴-۱۳-۱۶-۱۴-۲۲-۶-۴] و بطور کلی تمیز محققین اکنون قبول دارند که وجود بی‌هواییها در روده باریک فوقانی برضی است اما در مورد اشریشیا کلی اختلاف نظر است برخی آنرا برضی گرفته‌اند [۴-۱۶-۱] و برخی دیگر که نتایج ماهم باکار آنها تطبیق می‌کنند آنرا غیر برضی دانسته‌اند [۱۱-۶]. غلظت طبیعی ژرمها در روده‌های باریک برای ما تا 4 cm ژرم در میلی لیتر است.

بعد از این مقدمه اینکه به بررسی حالات برضی وضع میکری بروید های باریک می‌پردازیم:

۱- بیمارانی که بعلی قسمی از معده آنها برداشته شده است: در این بیماران مقدار ژرمهای در میلی لیتر بطور کلی بالاتر از حد طبیعی است. ما 4 cm مورد از این بیماران داشته‌ایم و نتایج کار ما بشرح زیر است:

تعداد ژرم 1.0^4	در میلی لیتر	۲ مورد
تعداد ژرم 1.0^0	در میلی لیتر	۳ مورد
تعداد ژرم 1.0^6	در میلی لیتر	۲ مورد
تعداد ژرم 1.0^7	در میلی لیتر	۴ مورد
همراه بودن ژرمهای میکری بالاسبلیا	با سخرمهای	۲ مورد
همراه بودن ژرمهای میکری بالاسبلیا	با سخرمهای	۲ مورد

بدین ترتیب مشاهده می‌شود که از دیگر ژرمهای میکری در کسانی که معده آنها تحت عمل جراحی قرار گرفته واضح است. این از دیگر میکری بدو علت بوجود می‌آید: نخست از بین رفتن اسیدیته بعدی و دوم وجود قوس کور [۹].

در مواردی که عمل شدگان معده اسهال بدون استانتوره دارند میزان ژرمهای موجود بین 1.0^4 و 1.0^7 در میلی لیتر است در صورتی که در اسهال‌های همراه با استانتوره این میزان بین 1.0^6 و 1.0^8 نوسان می‌کند.

علت استانتوره در نزد عمل شدگان معده دو چیز است: یکی اثر سستیم میکریها در روی سطح و دیگر اثر آنها در روی املاح صفرایی. خلاصه وجود سندروم بدجه‌نی همراه با اسهال در نزد کسانی که معده‌شان عمل شده ایجاد درمان حتمی با آنتسی بیوتیک‌هارا نینماید. اگر چنانچه حتی عمل شدگان معده سندروم بدجه‌نی و اسهال هم نداشته باشند باز هم هرچند مدت معالجه کوتاهی با آنتی‌بیوتیک‌های ساده روده‌ای بی‌فاایده نخواهد بود.

۲- ژرمهای غیر اختصاصی: 9 cm مورد از این بیماران تحت بررسی قرار داده‌ایم اما فقط در یک مورد میزان ژرمها بیشتر از 1.0^0 بوده است بدین ترتیب میتوان فکر کرد که در

گرچه عده‌ای از فیزیولوژیست‌ها معتقدند که حتی خود توبیاژ ساده ممکن است فیزیولوژی محیط روده‌ای را تغییر دهد اما آنچه مهم است این است که تغییرات کمتر از هنگامی خواهد بود که سرم فیزیولوژی یا هوا متراسکم تزریق کنیم.

توبیاژ آزاد را عده‌ای چنین انتقاد کرده‌اند که در جریان عبور لوله از قسمت‌های سخت‌الطبیعی ممکن است به ژرمهای نواحی دیگر لوله گوارش آلوه گردد و ماین کار را با بدوز ریختن نمونه‌اول جبران کرده‌ایم. از طرف دیگر Gorbach و همسکارانش با برداشت ترشحات ژرمنوم سگ از دو راه توبیاژ و برداشت مستقیم پس از باز کردن شکم حیوان نشان داده‌اند که نتایج حاصله در دو سورد یکسان بوده است [۱۶] و بدین ترتیب ارزش روش انتخابی سا ثابت می‌گردد.

موضوع دیگر بحث درباره خودمایع برداشت شده است. آزمایش شیمیائی و آنژیمی این مایعات نشان میدهد که نمیتوان آنها را ترشحات اختصاصی ژرمنوم نامید بلکه بخلوطی از ترشحات ژرمنوم، دوئونوم، دستگاه صفرایی و پانکراس هستند اما در هر حال محتوی میکری این مایعات بین وجود یک فلور شخص در روده‌های باریک است.

از 5 cm برداشت ما فقط یک مورد ترشح بدست آمده از نظر میکری منفی بوده است و بطور کلی تمام کارشناسانی که در این مورد کار کرده‌اند نتایجی مشابه بدست آورده‌اند.

ژرمهای که بدست آورده‌ایم به ترتیب عبارتند از:

E. Coli, Kl. Pne., Ent. Cloa., Staph. Blancs; Enterocoques, Strepto., Staph. Path., Pyocyanique در 8 cm مورد شاهد که داشته‌ایم نتایج زیر بدست آمده است:

E. Coli	۴ دفعه
Pyocyanique	« ۲
Enterocoques	« ۲
Citrobacter	« ۱
Staphylocoques	« ۱
Pseudomonas	« ۱
Bacillus	« ۱

در روی یکی از شواهد یک برداشت هم از ناحیه دوئونوم بوده که در آن + Enterobacterie lactoset و Enterocoques و Pyocyanique مشاهده گردید.

در مورد مشاهده این ژرمهای برای کوکسی‌های گرام‌بشت و بعضی باسیلهای گرام منفی مشاهده فوقانی و برای اکثر باسیلهای گرام منفی و کوکسی‌های گرام منفی مشاهده تختانی را در نظر

- ۸- کم خونی مگالوبلاستیک :**
یک مورد از این بیماران نیز وجود داشت ولی از نظر باکتریولوژی رودهای باریک اختلالی مشاهده نشد. اما بعضی گزارشها نشان میدهد که از دیاد میکرینها در رودهای باریک با اثر روی مجموعه ویتامین B_{12} + فاکتور انترننسک میتواند در کم خونی مگالوبلاستیک از عوامل ایجاد کننده محسوب شوند. بنظر سیرسد که ژرمهای مسئول در این حالات از نوع بی هوازیها و کلی- فرم‌ها باشند که در حالات طبیعی آنها را در رودهای باریک نمی‌بینیم.
- ۹- هیپو گاما گلبولینی:**
یک مورد از این ناخوشی را که ضمناً اسهال نیز داشته مورد بررسی قراردادهایم. میزان ژرمهای 1.0 در میلی لیتر بوده است.
- ۱۰- بیماری Whipple**
یک مورد از این ناخوشی نیز وجود داشت که از نظر باکتریولوژی طبیعی به میزان 1.0 در میلی لیتر بود.
در چه مواردی باید آنتی بیوتیک تجویز کرد؟
بنظر ما در تمام مواردی که میزان ژرم از 1.0 در میلی لیتر بیشتر باشد تجویز آنتی بیوتیکها بعد از تعیین حساسیت باکتری بوسیله آنتی بیوگرام لازم است.
- ارتباط بین باکتریولوژی مایع
و باکتریولوژی قطعات بیوپسی مخاط رودهای باریک
در سری مطالعه شده بجز در دو مورد هیچگونه ارتباطی
بین این دو وجود ندارد بعارت دیگر هیچکدام از این دو آزمایش
را نیتوان جانشین دیگری کرد بلکه هر کدام اختصاصات مخصوص
به خود دارند و اطلاعات جداگانه‌ای را بدست ما میدهند و برای
بررسی کامل باید این هر دو آزمایش را انجام داد.
- ۱۱- ژرمهای غیر اختصاصی از دیاد میکرینی رل بسیار کم اهمیتی را بازی می‌کند.**
- ۱۲- اسپرو :** در مجموع ۷ بیمار مبتلا به اسپرو را تحت آزمایش قراردادهایم و نتایج زیر را بدست آورده‌ایم:
- | | |
|---|---|
| قدان مایع | ۲ سورد |
| تعداد ژرم بیشتر از 1.0 در میلی لیتر | ۳ سورد |
| تعداد ژرم کمتر از 1.0 در میلی لیتر | ۱ سورد |
| بررسی کیفی | ۱ بدین ترتیب برخلاف آنچه تصور می‌شود از دیاد میکرین رودهای باریک در جریان بیماری اسپرو شایع است و این موضوع لزوم درمان با آنتی بیوتیکها را همراه با رژیم بدون گلوتن بائبات میرساند. |
- ۱۳- پانکراتیتیها :**
در میان ۶ مورد پانکراتیت فقط در یک مورد میزان ژرم از 1.0 در میلی لیتر بیشتر بوده است بنابراین میتوان اندیشید که عدم تعادل میکرین رل بسیار کم اهمیتی را در مورد پانکراتیتها بازی می‌کند.
- ۱۴- دیابت :**
بررسی ما شامل سه بیمار مبتلا به دیابت بوده است ولی برخلاف آنچه در کتب کلاسیک ذکر می‌شود عدم تعادل میکرین هیچگونه رلی را در این مورد بازی نمی‌کند.
- ۱۵- اسهال‌ها :**
در مورد اسهال‌ها بدون اتیولوژی میکرین تقریباً هیچ نوع از دیاد ژرم را مشاهده نکرده‌ایم. بررسی ما شامل سه مورد از این بیماران بوده است.
- ۱۶- تنگی روده :**
ما یک مورد تنگی روده با سندروم Konig شخص داشتیم میزان ژرم در این بیمار خیلی بالا یعنی 1.0 در میلی لیتر بوده است.

Reference

- 1 - Andrew G., Plaut M.D., Sherwood L., Gorbach M.D., Laila Nahas M.D; Louis Weinstein, Ph. D., M.D. Gastro entérology : 53, n° 6, P. 868, 1967 .
- 2 - Bertin D. Mémoire pour le certificat d'études spéciales des maladies de l'appareil digestif, Paris p . 19- 21, 1964
- 3 - Cattan R., Mainguet P., Ligny G. Acta gastro enrtérologica belgica T. 25 n° 4 p. 271-285. Avril 1962
- 4 - Dellipiant A.W. and Girdwood R.H. Cli sci.: 26, 359, 374, 1964
- 5 - Drasar B.S., Hill M.J. and Shiner R.H.: Lancet, 1, 1237, 1966
- 6 - Dellipiani A. Malabsorption: p. 193 - 220, 1969

- 7 - Frazier D., Cohen R., and Mayoral L. Am. Jour. Dig. Diseases: 10 n°. 10 p. 839-843, 1965
- 8 - Goldstein F., Cozzolino J.M.D. and Wirts W.M.D. Am. Jour. dig. Diseases: 8 n°. 11-1963
- 9 - Goldstein F., Wirts C.W. and Kramer S. Gastro entérology: 40-47, 1961
- 10 - Hirtzmann M. and Reuter G. Klin. Prax.: 35. 1408-1412, 1963
- 11 - Kalser M.H., Cohen R., Arteaga. I, Yavn E., Mayoral L., Hoffert W. R., and Frazier D. New Eng. Jour. Med.: 274-500. 1966
- 12 - Levrat M., Pasquier G., Truchot R., Moulinier B., Moulin A., Arch. Franç. Mal. App. Dig. 57 n°. 10, 838-840 octobre 1968.
- 13 - Levrat M., Pasquier G., Truchot R., Moulinier B., Moulin A. Arch. Franç. Mal. App. Dig (Novembre 1968) 57, n°. 11, 959, Novembre 1968
- 14 - Levrat M., Pasquier J., Truchot R., Moulinier B., Moulin A. Arch. Franç. Mal. App. Dig.: 58, n.7-8, 417-432 (Juillet - Aout 1969)
- 15 - Paulk E.A., J. and Farrar W.E., Jr. Am. Jour. Med.: 37, 473. 1964
- 16 - Sherwood L. Gorbach M.D., Andrew G., Plaut M.D., Lailas Nahas, M.D., Louis Weinstein Ph. D. M.D.: Gastro entérology : 53 n°. p. 856-1967
- 17 - Sherwood L., Gorbach M.D., Lailas Nahas M.D., Louis Weinstein Ph. D. M.D.: Gastro entérology : 53 n°. 6, P. 874 - 1967
- 18 - Shiner M., Waters T.E., and Gray J.D.A. Gastro entérology: 45, 625-632, 1963
- 19 - Tabaqchali S. and Booth C.C. Lancet 2 - 12, Gut. 7. 712 - 1966
- 20 - Tabaqchali S., Dkubadejo O.A., Neale G. and Booth C.C.: Proc. R. Soc. Med: 59-1244 - 1966
- 21 - Tabaqchali S., Booth C.C. Br. Med. Bull. : 23-p. 285-1967
- 22 - Vachon A., Barthe J., Sedallian J., Abry M., Brunet et Khouzan Jour. Med. Lyon : P. 1225-1968
- 23 - Van Der Reis V.: Ergebn inn. med. Kinderheilk : 27, 77-120, 1965
- 24 - Wirts C.W., Goldstein F. Ann. Inter. Med: 85 - 25 - 1963