

ارتباط میان شاخص‌های وضعیت آهن و ضخامت انتیما- مدیا شریان کاروتید به عنوان عامل پیشگویی زودرس آترواسکلروز

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۰۳/۱۶

چکیده

زمینه و هدف: هموستاز غیر نرمال آهن از قبیل کمبود یا افزایش بیش از حد آن با پاتوژن بسیاری از بیماری‌های مزمن از قبیل دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی در ارتباط است. احتمال دارد که آهن با افزایش استرس اکسیداتیو در پیشرفت آترواسکلروز دخیل باشد. تغییر در ضخامت انتیما- مدیا شریان کاروتید (CIMT) نشان‌گری برای تصدیق پیشرفت آترواسکلروز می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین وضعیت آهن و مراحل ابتدایی آترواسکلروز با به کارگیری ضخامت انتیما مدیا شریان کاروتید است. روش بررسی: ۱۴۰ زن بزرگسال سالم در محدوده سنی ۱۸-۵۰ سال (پیش از یائسگی) بدون بیماری شناخته شده مزمن یا حاد، به صورت تصادفی از یکی از کلینیک‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شدند. خون‌گیری جهت ارزیابی پارامترهای وضعیت آهن انجام شد. ضخامت انتیما مدیا شریان کاروتید با روش غیر تهاجمی سونوگرافی اندازه‌گیری شد. افراد بر اساس ضخامت انتیما مدیا کاروتید در دو گروه سالم ($CIMT \leq 0.8\text{mm}$) و در معرض خطر ($CIMT > 0.8\text{mm}$) قرار گرفتند. آزمون Student's t-test برای مشاهده تفاوت میانگین متغیرهای بین دو گروه استفاده شد. **یافته‌ها:** میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۳۲/۷۶ \pm ۰/۱ سال بود. میانگین آهن سرم، فریتین سرم، هماتوکریت و متوسط حجم سلولی (MCV) در گروه در معرض خطر به طور معنی‌داری بالاتر و بر عکس ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC) پایین‌تر بود ($P < 0.05$). نتیجه‌گیری: نتایج نظر تعداد گلوبول‌های قرمز و هموگلوبین تفاوت معنی‌داری بین دو گروه یافت نشد ($P > 0.05$). حاصل از مطالعه ارتباط تسبیبی بین پارامترهای وضعیت آهن با ضخامت انتیما مدیا شریان کاروتید به عنوان عامل زودرس و قایع بیماری قلبی عروقی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد با توجه به تنافض‌های موجود در سایر مطالعات، نیاز به مطالعات بیشتر باشد.

کلمات کلیدی: ضخامت انتیما مدیا شریان کاروتید، آترواسکلروز، وضعیت آهن بدن.

مصطفیر حیدری بُنی،^۱ مهرانگیز ابراهیمی^{*}، مسعود حاجی مقصود^۲ محمد کاظم طرزمنی،^۳ جواد مهتدی‌نیا^۱

۱- گروه تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت تغذیه، تبریز، ایران.

۲- گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پزشکی، تبریز، ایران.

* نویسنده مسئول: تبریز، خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقیقات علوم تغذیه، ۰۴۱۱-۳۳۵۷۵۸۱؛
تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۵۷۵۸۱؛ email: m-ebrahimi92@hotmail.com

مقدمه

قبیل کمبود یا افزایش بیش از حد آن با پاتوژن بسیاری از بیماری‌های مزمن از قبیل دیابت در ارتباط است.^۱ شواهد نشان می‌دهد که افزایش بیش از حد آهن نه تنها خطر مقاومت به انسولین و دیابت را افزایش می‌دهد بلکه سبب بیماری‌های قلبی- عروقی Cardio Vascular Disease (CVD) نیز می‌شود. کمبود آهن به طور موقت سبب تحریک عمل انسولین می‌شود اما کمبود مزمن آن همراه با کم خونی، ممکن است پیشرفت CVD را افزایش دهد.^۲ در فرم‌های آزاد و غیر باند شده آهن به راحتی در واکنش‌های فنتون شرکت کرده و سبب تولید رادیکال‌های آزاد خطرناک اکسی و پراکسی می‌شود.^۳ با

آهن (Iron) از مواد معدنی ضروری است که برای بسیاری از مولکول‌های مختلف در جهت حفظ ساختمان طبیعی آن‌ها و نیز بقا، رشد و پرولیفراسیون سلول‌ها مورد نیاز است. اگرچه آهن عنصری ضروری برای بدن است اما در مقداری بیش از حد می‌تواند سمی باشد. آهن از طریق واکنش‌های فنتون (Fenton) به عنوان یک ماده معدنی در نقش حامل، می‌تواند گونه‌های متفاوتی از اکسیژن و نیتروژن فعل را ایجاد کند. بنابراین متابولیسم غیر نرمال آهن می‌تواند منجر به بیماری‌های مزمن متفاوتی شود. هموستاز غیر نرمال آهن از

هر گونه مشکلات قلبی عروقی، دیابت، بیماری کلیوی، کم کاری و پرکاری تیرویید و همچنین عدم مصرف دارو برای درمان دیابت، فشارخون و اختلال لیپیدی بود. معیارهای خروج از مطالعه شامل زنان باردار، شیرده و یائسه، استفاده از استروییدها، هورمون رشد، قرص‌های ضد بارداری و هر گونه داروی آنابولیکی، استفاده از الکل یا مواد مخدر، اختلالات کلیوی و استفاده از دارو جهت درمان دیابت، فشارخون و اختلالات لیپیدی بود.

اندازه‌گیری‌های بیوشیمیایی خون: از افراد پس از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتاپی خون‌گیری انجام شد. اندازه‌گیری گلbul قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و MCV پلاسمما با دستگاه شمارش گر سلولی موسوم به H₁H (شرکت تکنیکون، آمریکا) انجام شد. بعد از جداسازی سرم با سانتیفور، فریتین سرم توسط روش ELISA با استفاده از کیت فریتین (شرکت Radem، ایتالیا) اندازه‌گیری شد و آهن و TIBC سرم توسط دستگاه اتوآنالیزور شیمیایی بر مبنای رنگ سنجی با استفاده از کیت آهن اندازه‌گیری شد.

اندازه‌گیری IMT: اندازه‌گیری ضخامت IMT با روش غیر تهاجمی سونوگرافی، در مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع) شهر تبریز انجام شد. در این مطالعه از دستگاه Medison مدل V10 و ترانس‌دیوسر خطی (Linear) با فرکانس ۱۰ مگاهرتز استفاده شد. حساسیت دستگاه سونوگرافی در اندازه‌گیری تا حد ۰/۱ میلی‌متر بود. همه اندازه‌گیری‌ها توسط یک رادیولوژیست که اطلاعی از وضعیت بالینی بیماران نداشت صورت گرفت. بیماران ابتدا در وضعیت خوابیده به پشت قرار گرفته و سر آن‌ها ۴۵ درجه به سمت مقابل ناحیه در حال بررسی چرخانده شد. در مقاطع عرضی و طولی در حالت B-Mode با حرکت ترانس‌دیوسر اسکن انجام شد تا نواحی دارای بیشترین ضخامت در ناحیه بولب (۱ cm) پروگزیمال به محل دو شاخه شدن کاروتید مشترک) هر دو کاروتید شناسایی شوند. سپس سعی شد که در مقطع طولی تصویری با کیفیت بالا از ناحیه مورد نظر به دست آید و تصویر ثابت شده و برای به دست آوردن اندازه دقیق تر در تمام بیماران از Zoom استفاده شد و با قرار دادن نشان‌گر اندازه‌گیری به طور الکترونیکی توسط دستگاه انجام شد. IMT در دیواره دورتر و در سه نقطه در سمت راست و چپ اندازه‌گیری شد که در نهایت بیشترین ضخامت برای هر طرف ثبت شد. بر اساس مطالعات در صورتی که ضخامت انتیما- مدیا شریان کاروتید بیشتر از

این حال هنوز مطالعات یک ارتباط معقول بین وضعیت آهن و بروز CVD و مرگ و میر ناشی از آن را ثابت نکردند. اگرچه مطالعات اندکی نقش فریتین و آهن پلاسمما را در بروز خطر CVD حمایت می‌کنند اما این مسئله محتمل است که با افزایش فریتین، آهن آزاد افزایش یافته و این مسئله با افزایش استرس اکسیداتیو همراه است.^۵ اکسیداسیون، فاکتور مهم در تشکیل جراحات آترواسکلروز می‌باشد. آترواسکلروز یک بیماری پیش‌رونده آرام است که می‌تواند ساختار عروق بزرگ و کوچک را در قلب، مغز، اندام تحتانی و دیگر بافت‌ها تغییر دهد. اغلب تغییرات در مراحل ابتدایی بیماری آترواسکلروز، اختلال در اندوتیال و افزایش ضخامت انتیما- مدیا در تمامی بستر عروق دیده می‌شود. اندازه‌گیری غیر تهاجمی اولتراسوند ضخامت انتیما- مدیا کاروتید Carotid Artery Intima -Media Thickness (CIMT) به عنوان یک نشان‌گر کلی برای آترواسکلروز می‌باشد. CIMT روشهای پیش‌بینی خطر افوارکتوس میوکارد و سکته می‌باشد. همچنین تغییر در CIMT نشان‌گری برای تصدیق پیشرفت آترواسکلروز می‌باشد.^۶ علی‌رغم این که فرضیه آهن- قلب (Iron- heart hypothesis) رواج دارد اما توافق کاملی بین یافته‌های اپیدمیولوژیک وجود ندارد. پارهای از شواهد حاکی از عدم وجود رابطه مستقیم بین وضعیت آهن و خطر CVD می‌باشد و انجام مطالعات به صورت مقطعي با به کارگیری عوامل زودرس خطر و نیز مطالعات آینده‌نگر و تجربی برای نشان دادن این رابطه پیشنهاد شده است.^۷ مطالعات نشان می‌دهد که زنان در سنین قبل از یائسگی در مقایسه با مردان در سنین مشابه ۵۰٪ مرگ و میر ناشی از CVD را تجربه می‌کنند.^۸ مطالعه حاضر در زنان در سنین پیش از یائسگی با هدف تعیین ارتباط بین وضعیت آهن و مراحل ابتدایی آترواسکلروز با به کارگیری ضخامت انتیما- مدیا شریان کاروتید صورت گرفت.

روش بررسی

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعي می‌باشد. این مطالعه بر روی افراد مراجعه کننده به کلینیک شیخ‌الرئیس شهر تبریز، بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انجام شد. مطالعه مقطعي حاضر، بر روی ۱۴۰ زن بزرگ‌سال سالم در محدوده سنی ۱۸-۵۰ سال (پیش از یائسگی) پس از کسب رضایت آگاهانه انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل افراد سالم بدون بیماری شناخته شده مزمن یا حاد شامل

مشاهده نشد. چنان‌چه جدول ۴ نشان می‌دهد CIMT با آهن، فربینین، هماتوکریت و MCV همبستگی مثبت معنی‌دار و با TIBC همبستگی معکوس یا منفی معنی‌دار را نشان می‌دهد. به طور مثال با

جدول-۱: ویژگی‌های افراد مطالعه در هر دو گروه		
تعداد(درصد)	متغیر	
۹۵(۵۷/۹)	خانه‌دار	شغل
۴۵(۳۲/۱)	شاغل	
۴۰(۲۸/۶)	مجرد	وضعیت تأهل
۱۰۰(۷۱/۴)	متأهل	
۱۷(۱۲/۱)	بی‌ساد و کم ساد	سطح تحصیلات
۲۸(۲۰)	راهنمایی	
۵۴(۳۸/۶)	دیپلم و فرق دیپلم	
۴۱(۲۹/۳)	لیسانس و بالاتر	
۳۵(۲۵)	سابقه مرده‌زایی	

جدول-۲: میانگین (انحراف‌معیار) متغیرهای مورد بررسی در افراد مورد مطالعه

Mean±SD	متغیر
۸۱/۶۴±۳۶/۶	آهن سرم ($\mu\text{g}/\text{dl}$)
۴۸/۹۰±۲۹/۷	فربینین (ng/ml)
۳۶۹/۷۰±۶۳/۳	TIBC ($\mu\text{g}/\text{dl}$)
۴/۶۷±۰/۴	تعداد گلوبول قرمز ($M/\mu\text{L}$)
۱۳۰/۰۵±۱/۱	هموگلوبین (g/dl)
۳۹/۹۰±۳/۱	هماتوکریت (درصد)
۸۶/۳۵±۶/۶	متوسط حجم سلولی (MCV) (fl) (MCV)
۰/۸۶±۰/۱۲	میانگین CIMT (mm)

TIBC: Total iron Binding Capacity, MCV: Mean Cell Volume, CIMT: Carotid artery Intima-Media Thickness

۰/۸mm باشد غیر نرمال و تحت خطر تلقی می‌شود.^۷ بنابراین پس از اندازه‌گیری CIMT افراد به دو گروه تقسیم شدند، یک گروه افراد با CIMT کمتر و مساوی ۰/۸mm (گروه سالم) و یک گروه افراد با CIMT بالاتر از ۰/۸mm (گروه در معرض خطر). اطلاعات جمع‌آوری شده و پس از کدگذاری، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS با ویراست ۱۸ آنالیز شد. تجزیه و توزیع فراوانی) صورت گرفت. آزمون Student's t-test برای مشاهده تفاوت Mean±SD متغیرهای بین دو گروه استفاده شد. $P<0.05$ معنی‌دار تلقی شد.

یافته‌ها

در این مطالعه ۱۴۰ زن سالم با میانگین سنی $32/76\pm 8/1$ سال شرکت کردند. ویژگی‌های فردی افراد تحت مطالعه بررسی و تحلیل شد (جدول ۱). میانگین آهن سرم، فربینین سرم، TIBC و تعداد گلوبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و MCV پالسمای خون افراد محاسبه شد (جدول ۲). بر اساس نتایج به دست آمده از سونوگرافی ۸۹ نفر دارای ضخامت انتیما- مدیا کمتر و مساوی ۰/۸ میلی‌متر (گروه سالم) و ۵۱ نفر دارای ضخامت انتیما- مدیا بیشتر از ۰/۸ میلی‌متر (گروه در معرض خطر) بودند. مقایسه پارامترهای وضعیت آهن در بین دو گروه با CIMT طبیعی و بالا (در معرض خطر) حاکی از آن است میانگین آهن، فربینین، هماتوکریت و MCV در "گروه در معرض خطر" نسبت به "گروه سالم" به طور معنی‌داری بالاتر و بر عکس TIBC در گروه در معرض خطر پایین‌تر است. در حالی‌که از نظر تعداد گلوبول‌های قرمز و هموگلوبین تفاوت معنی‌داری بین دو گروه

جدول-۳: مقایسه میانگین (انحراف‌معیار) پارامترهای وضعیت آهن در بین دو گروه با CIMT طبیعی و بالا (در معرض خطر)

P*	(CIMT>۰/۸mm) در معرض خطر	(CIMT≤۰/۸mm) سالم	متغیر
۰/۰۰۲	۹۳/۹۰±۳۱/۳	۷۲/۶۱±۳۷/۷	آهن سرم ($\mu\text{g}/\text{dl}$)
<۰/۰۰۱	۶۰/۷۸±۲۲/۲	۴۲/۱۰±۳۰/۹	فربینین سرم (ng/ml)
<۰/۰۰۱	۳۴۰/۵۱±۴۲/۷	۳۸۶/۴۲±۶۷/۲	TIBC ($\mu\text{g}/\text{dl}$)
۰/۰۸۲	۴/۷۵±۰/۴	۴/۶۲±۰/۴	تعداد گلوبول قرمز ($M/\mu\text{L}$)
۰/۰۹۳	۱۲/۲۷±۰/۸	۱۲/۹۳±۱/۲	هموگلوبین (g/dl)
۰/۰۰۵	۴۰/۸۸±۲/۷	۳۹/۳۴±۳/۲	هماتوکریت (درصد)
۰/۰۰۸	۸۸/۳۰±۴/۷	۸۵/۲۳±۷/۳	متوسط حجم سلولی (MCV) (fl) (MCV)

TIBC: Total Iron Binding Capacity, MCV: Mean Cell Volume, CIMT: Carotid artery Intima-Media Thickness

* مقادیر $P<0.05$ معنی‌دار تلقی شد. Independent sample t-test

جدول-۴: همبستگی میان CIMT و پارامترهای مریبوط به وضعیت آهن در کل افراد و به تفکیک گروه‌ها

متغیر	در کل افراد	گروه سالم (CIMT \leq ۰/۸mm)	گروه در معرض خطر (CIMT $>$ ۰/۸mm)
آهن سرم (µg/dl)	۰/۲۵۱(۰/۰۰۳)*	-۰/۱۰۴(۰/۳۳۳)	۰/۳۹۳(۰/۰۰۴)
فریتین (ng/ml)	۰/۲۷۳(۰/۰۰۱)	-۰/۰۱۰۳(۰/۹۸۰)	۰/۰۱۲(۰/۹۳۴)
(µg/dl) TIBC	-۰/۲۵۸(۰/۰۰۲)	۰/۱۴۴(۰/۱۷۷)	۰/۱۲۵(۰/۳۸۳)
تعداد گلبول قرمز (M/µL)	۰/۱۲۴(۰/۱۴۶)	۰/۰۲۰(۰/۰۸۵۴)	-۰/۰۸۸(۰/۰۵۴۱)
هموگلوبین (g/dl)	۰/۱۱۳(۰/۱۸۲)	-۰/۰۵۲(۰/۶۲۹)	۰/۰۱۳(۰/۹۲۸)
هماتوکریت (درصد)	۰/۲۰۶(۰/۰۱۵)	۰/۰۲۱(۰/۰۸۴۴)	-۰/۰۸۵(۰/۰۵۵۳)
متوسط حجم سلولی (fl) (MCV)	۰/۲۳۳(۰/۰۰۶)	-۰/۰۱(۰/۰۹۲۷)	۰/۳۲۲(۰/۰۲۱)

* به صورت Correlation coefficient (p-value) گزارش شده است. مقدار $P<0/05$ معنی دار تلقی شد.

TIBC: Total Iron Binding Capacity, MCV: Mean Cell Volume, CIMT: Carotid artery Intima-Media Thickness

هیپرلیپیدمی، هیبرانسولینمی و پرفشاری خون انجام شد بین میزان آهن سرم، فریتین سرم، TIBC و هماتوکریت و MCV با ضخامت انتیما- مدیا شریان کاروتید ارتباط معنی داری دیده شد. مرور متون حاکی از مطالعاتی است که ارتباط وضعیت آهن را در شرایط بیماری بررسی نموده اند. در مطالعه ای بر روی بیماران ایسکمیک قلبی (IHD) توسط Sobia Imtiz میانگین غلظت فریتین سرم در بیماران نسبت به افراد سالم بالاتر بود و در توافق با یافته های مطالعه Sullivan به نظر می رسد پیشرفت IHD با ذخایر آهن در ارتباط باشد.^۱ در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد یافته ها متناقض است. برای مثال Marrison ارتباط بین سطح آهن سرم و ریسک انفارکتوس میوکارد کشنده حاد هم در زنان و هم مردان را نشان داد.^۸ در صورتی که Regnstrom هیچ ارتباط معنی داری را بین وضعیت آهن با انفارکتوس میوکارد یافت نکرد.^۹ علی رغم این که در بعضی مطالعات ارتباط بین ذخایر آهن بدن و آترواسکلروز زودرس تأیید می شود^{۱۰} اما دیگر مطالعات وجود این رابطه را مردود اعلام کردند.^{۱۱} Rauramaa^{۱۲} و Bozzini^{۱۳} در گزارش خود وجود هر گونه رابطه بین وضعیت آهن بدن و آترواسکلروز شریان کاروتید و خطر بیماری عروق کرونر را مردود اعلام کردند در صورتی که مطالعه Tuomainen تأکید کننده این رابطه است.^{۱۴} در مطالعه دکتر خصوصی^{۱۵} بین شدت آترواسکلروز و سطح فریتین در مردان مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد ارتباط معنی دار آماری وجود داشت ولی این ارتباط در زنان معنی دار نبود. Kiechl^{۱۶} در یک بررسی نشان داد که همبستگی شدیدی بین غلظت فریتین سرم و و خامت پاتولژیک دیواره شریان

بالا رفتن آهن سرم، CIMT افزایش معنی دار را نشان می دهد. در حالی که مشابه چنین تغییری با کاهش TIBC یافت شد. آنالیز ارتباط وضعیت آهن به تفکیک افراد سالم و در معرض خطر بیماری های قلبی عروقی حاکی از تنها ارتباط معنی دار مثبت بین MCV و آهن سرم با CIMT در گروه سالم گزارش شده است. در حالی که در گروه سالم چنین ارتباط هایی دیده نشد.

بحث

مطالعه حاضر به منظور مقایسه وضعیت آهن در افراد سالم و در معرض خطر بیماری قلبی عروقی با فاکتور زودرس و پیشگویی کننده CVD در زنان صورت گرفت. CIMT به عنوان یک نشانگر عمومی برای آترواسکلروز می باشد که با میزان و گستره بیماری عروق کرونر در بزرگ سالان و پیش بینی حوادث قلبی عروقی در آینده مرتبط است. مطالعات نشان داده اند که CIMT نشانگر حساسی برای مراحل ابتدایی شروع آترواسکلروز می باشد. اکثر مطالعات انجام شده برای بررسی ارتباط بین وضعیت آهن و بیماری قلبی عروقی بر روی افراد بیمار شامل افراد مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد^{۱۷} بیماری ایسکمیک قلبی^۱ و افراد مبتلا به تنگی های شدید عروقی^{۱۸} انجام شده است. از آنجایی که اختلال در اندوتیال عروق به عنوان اولین تظاهرات ساختاری و عملکردی آترواسکلروز می باشد بنابراین با بررسی ضخامت انتیما- مدیا عروق در افراد سالم می توان به اثر آهن بر شروع زودرس آترواسکلروز پی برد. در مطالعه حاضر که بر روی افراد سالم بدون تظاهرات بالینی و فاکتورهای خطر CVD از جمله

افتاد. ^{۲۴} LDL اکسید شده به عنوان رسپتور برای ماکروفازها عمل می کند و سبب تجمع لیپیدها شده و در نهایت سلول های کفی را ایجاد می کنند (ماکروفازها LDL اکسید شده را بلعیده و چربی را در میان سیتوپلاسم خود جمع می کنند که به آن ها یک ظاهر کفآلود می دهد لذا به آن ها سلول های کفی گویند) که این سبب ایجاد پلاک های اولیه در آترواسکلروز می شود.^{۲۵}

پاره ای از مطالعات حاکی از آن است که افزایش سطح آهن بدن باعث افزایش غلظت مالون دی آلدید پلاسمما (به عنوان نشان گر CVD پراکسیداسیون لیپیدها) می شود و بنابراین سبب افزایش خطر CVD می شود.^{۲۶} در مطالعه ای دیگر هیچ ارتباط معنی داری بین فاکتور های نشان دهنده وضعیت آهن (فریتین و آهن و TIBC سرم) با اکسیداسیون LDL دیده نشد.^{۲۷} در مطالعه حاضر بین تعداد گلبول های قرمز و میزان هموگلوبین با CIMT رابطه معنی داری مشاهده نشده ممکن است این یافته به این دلیل باشد که آهن زمانی که در ساختمان مولکول هایی مثل هموگلوبین و گلبول قرمز قرار می گیرد و به فرم آزاد در خون نیست قدرت کاتالیزوری آن در تولید رادیکال های آزاد و پرس اکسیداسیون لیپیدها کاهش یافته و بنابراین اثر آن در بروز آترواسکلروز کاهش می یابد. نتایج حاصل از مطالعه ارتباط نسبی بین پارامتر های وضعیت آهن با CIMT به عنوان عامل زودرس و قایع CVD را نشان می دهد. اما به نظر می رسد با توجه به تناقضات موجود در سایر مطالعات برای ارایه تصویر دقیق از مکانیسم اثرگذاری آهن بر CVD نیاز به مطالعات بیشتر در گروه های جمعیتی سالم و بیمار و یا دارای عوامل خطر قلبی عروقی باشد.

کاروتید وجود دارد. این محققین غلظت فریتین را یک عامل خطر ساز مستقل و قوی برای ایجاد سکته در زنان و مردان معرفی کردند. اما در بررسی Manfori در برزیل،^{۱۹} Bozzini در ایتالیا^{۲۰} و Sempos^{۲۱} هیچ ارتباط معنی داری بین افزایش فریتین با تنگی عروق کرونر و خطر بروز آترواسکلروز دیده نشد. اگرچه فاکتور های متفاوتی با پاتولوژی CVD در ارتباط است امروزه توجه زیادی به این مسئله است که رادیکال های آزاد و اکسیدان های غیر رادیکالی در عملکرد نامناسب قلبی عروقی دخیل هستند. به نظر می رسد مولکول های کلیدی در این پروسه یون آهن و مس باشند که تشکیل رادیکال های فعال هیدروکسی را کاتالیز می کنند. شلاتورهای یون آهن اثر مفیدی را روی پرسه های مرتبط با توسعه آترواسکلروز و تشکیل پلاک دارند. این یافته ها به طور غیر مستقیم شواهد ناشی از نقش ذخایر آهن بدن در پاتولوژی آترواسکلروز و تخریب و آسیب عروقی و عوارض ایسکمیک قلبی را حمایت می کند.^{۲۲} مکانیسم دقیق که آهن سبب تحریک آترواسکلروز می شود نامشخص است. اختلال در اندوتیال ممکن است به دلیل القای استرس اکسیدانتیو توسط آهن باشد. پیشنهاد می شود که نقش تسریع کنندگی آهن در پراکسیداسیون چربی های ممکن است فاکتور مهم در تشکیل پلاک های آترواسکلروتیک باشد. LDL در حالت عادی و نرمال از دیواره عروق بدون ایجاد جراحت و آسیبی به دیواره رگ عبور می کند. آهن سبب کاتالیز واکنش های تشکیل رادیکال های آزاد می شود این رادیکال ها سبب اکسیداسیون LDL می شوند. این اتفاق می تواند در سلول های اندوتیال سلول های ماهیچه صاف، لنفوسيت ها یا ماکروفازها اتفاق

References

1. Imtiaz S, Zamir Ahmad M, Naik S, Yasir M, Shah MA, Sami W. Comparison of iron stores in healthy individuals and patients with ischaemic heart disease. *Biomedica* 2009;25:188-90.
2. Alam-samimi M, Emadi MA, Azami M, Najafian J, Jamshidian M. Association between serum ferritin level and Obstructive Coronary Artery. *Kosar Med J* 1387;2:245-52. [Persian]
3. de Godoy MF, Takakura IT, Machado RD, Grassi LV, Nogueira PR. Serum ferritin and obstructive coronary artery disease: angiographic correlation. *Arg Bras Cardiol* 2007;88(4):430-3.
4. Tuncer M, Gunes Y, Gunturkun U, Gumrukcuoglu HA, Eryonucu B, Guler N, et al. Heart rate variability in patients with iron deficiency anemia. *Arg Bras Cardiol* 2009;92(5):368-71, 385-8, 400-3.
5. Lee KR, Sweeney G, Kim WY, Kim KK. Serum ferritin is linked with aortic stiffness in apparently healthy Korean women. *Crit Pathw Cardiol* 2010;9(3):160-3.
6. Güll K, Ustün I, Aydin Y, Berker D, Erol K, Unal M, et al. Carotid intima-media thickness and its relations with the complications in patients with type 1 diabetes mellitus. *Anadolu Kardiyol Derg* 2010;10(1):52-8.
7. Ahluwalia N, Genoux A, Ferrieres J, Perret B, Carayol M, Drouet L, et al. Iron status is associated with carotid atherosclerotic plaques in middle-aged adults. *J Nutr* 2010;140(4):812-6.
8. Morrison HI, Semenciw RM, Mao Y, Wigle DT. Serum iron and risk of fatal acute myocardial infarction. *Epidemiology* 1994;5(2):243-6.
9. Regnström J, Tornvall P, Kallner A, Nilsson J, Hamsten A. Stored iron levels and myocardial infarction at young age. *Atherosclerosis* 1994;106(1):123-5.
10. Kiechl S, Willeit J, Egger G, Poewe W, Oberholzer F. Body iron stores and the risk of carotid atherosclerosis: prospective results from the Bruneck study. *Circulation* 1997;96(10):3300-7.
11. Bozzini C, Girelli D, Tinazzi E, Olivieri O, Stranieri C, Bassi A, et al. Biochemical and genetic markers of iron status and the risk of

- coronary artery disease: an angiography-based study. *Clin Chem* 2002;48(4):622-8.
12. Khososi-niaki MR, Salehi-omran MT, Jalali F, Ashrafian H. Association between serum iron and acute myocardial infarction. *Gonabad Med J* 1384;11(1):48-52. [Persian]
 13. Johnson DW. Intravenous versus oral iron supplementation in peritoneal dialysis patients. *Perit Dial Int* 2007;27 Suppl 2:S255-60.
 14. Gaenzer H, Marschang P, Sturm W, Neumayr G, Vogel W, Patsch J, et al. Association between increased iron stores and impaired endothelial function in patients with hereditary hemochromatosis. *J Am Coll Cardiol* 2002;40(12):2189-94.
 15. Magnusson MK, Sigfusson N, Sigvaldason H, Johannesson GM, Magnusson S, Thorgeirsson G. Low iron-binding capacity as a risk factor for myocardial infarction. *Circulation* 1994;89(1):102-8.
 16. Liao Y, Cooper RS, McGee DL. Iron status and coronary heart disease: negative findings from the NHANES I epidemiologic follow-up study. *Am J Epidemiol* 1994;139(7):704-12.
 17. Rauramaa R, Väistönen S, Mercuri M, Rankinen T, Penttila I, Bond MG. Association of risk factors and body iron status to carotid atherosclerosis in middle-aged eastern Finnish men. *Eur Heart J* 1994;15(8):1020-7.
 18. Tuomainen TP, Punnonen K, Nyysönen K, Salonen JT. Association between body iron stores and the risk of acute myocardial infarction in men. *Circulation* 1998;97(15):1461-6.
 19. Manfroi WC, Zago AJ, Cruz R, Oliveira J, Kirschnick LS, Ordovás K, et al. Lack of a relationship between serum ferritin levels and coronary atherosclerosis evaluated by coronary arteriography. *Braz J Med Biol Res* 1999;32(3):303-7.
 20. Bozzini C, Girelli D, Tinazzi E, Olivieri O, Stranieri C, Bassi A, et al. Biochemical and genetic markers of iron status and the risk of coronary artery disease: An angiography-based study. *Clin Chem* 2002;48:622-8.
 21. Sempos CT, Looker AC, Gillum RE, McGee DL, Vuong CV, Johnson CL. Serum ferritin and death from all causes and cardiovascular disease: the NHANES II Mortality Study. National Health and Nutrition Examination Study. *Ann Epidemiol* 2000;10(7):441-8.
 22. Kruszewski M. The role of labile iron pool in cardiovascular diseases. *Acta Biochimica Polonica* 2004;51(2):471-80.
 23. Steinbrecher UP, Zhang HF, Lougheed M. Role of oxidatively modified LDL in atherosclerosis. *Free Radic Biol Med* 1990;9(2):155-68.
 24. Halliwell B, Chirico S. Lipid peroxidation: its mechanism, measurement, and significance. *Am J Clin Nutr* 1993;57(5 Suppl):715S-724S; discussion 724S-725S.
 25. Steinberg D, Parthasarathy S, Carew TE, Khoo JC, Witztum JL. Beyond cholesterol. Modifications of low-density lipoprotein that increase its atherogenicity. *N Engl J Med* 1989;320(14):915-24.
 26. Siassi F, Amirkhizi F, Minaie S, Djalali M. Association between iron status and lipid peroxidation in obese and non-obese women. *Iranian J Publ Health* 2008;37(4):103-8.
 27. Derstine JL, Murray-Kolb LE, Yu-Poth S, Hargrove RL, Kris-Etherton PM, Beard JL. Iron status in association with cardiovascular disease risk in 3 controlled feeding studies. *Am J Clin Nutr* 2003;77(1):56-62.

The association between iron status and carotid intima-media thickness for the prediction of early-stage atherosclerosis

Motahar Heidari Beni MS.c.¹
Mehrangiz Ebrahimi
Mamaghani Ph.D.^{1*}
Masood Hajimaghsood M.D.²
Mohammad Kazem Tarzamani
M.D.²
Javad Mohtadinia Ph.D.¹

1- Department of Nutrition, School of Health & Nutrition, Tabriz University of Medical sciences, Tabriz, Iran

2- Department of Radiology, School of Medical Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

Abstract

Received: February 05, 2011 Accepted: June 06, 2011

Background: Abnormal iron homeostasis such as iron deficiency or iron excess is associated with the pathogenesis of many chronic diseases including diabetes and cardiovascular disease (CVD). Iron may stimulate the progression of atherosclerosis by increasing the oxidative stress. Changes in carotid intima-media thickness (CIMT) have been validated as a vascular indicator of atherosclerosis progression. The purpose of this study was to apply CIMT to investigate the association between iron status and the initial stages of atherosclerosis.

Methods: 140 healthy premenopausal women aged 18 to 50 years who had no chronic or acute disease were selected randomly from one of the Tabriz university sub specialized clinics. Blood samples were taken to assay iron status parameters. CIMT was measured noninvasively by ultrasonography. Based on CIMT results, the subjects were classified as "healthy" (CIMT \leq 0.8 mm) or "at risk" (CIMT $>$ 0.8 mm). Student's t-test was used to determine the mean differences between the two groups.

Results: The mean \pm SD age of the participants was 32.76 ± 8.1 years. The mean iron, ferritin, hematocrit and mean corpuscular volume (MCV) were significantly higher and the total iron binding capacity (TIBC) was lower ($P<0.05$) among the "at risk" group. However, there was no significant differences in red blood cell count or hemoglobin levels between the two groups ($P>0.05$).

Conclusion: Results of this study showed a relative correlation between iron status parameters and CIMT as the initial indicator of CVD. Regarding the contradictions found in the literature, more research is needed to clarify the situation.

Keywords: Atherosclerosis, carotid, intimal thickness, iron, status.

* Corresponding author: Tabriz, Golgasht Ave, Atar Neyshabori Ave, Tabriz University of Medical Sciences, School of Health & Nutrition, Nutrition Research Center, Tabriz, Iran.
Tel: +98-411-3357581
email: m-ebrahimi92@hotmail.com