

مسائل پزشکی مسافرت‌های فضائی

دکتر بهرامی

مقدمه :

یکی از موانع بزرگ در مسافرت‌های فضائی وجود انسان فضانورد است که گرچه قبل آموخته است که چگونه در شرایط محیط‌های خصمانه مختلف زنده بماند ولی در فضا با شرایط و عوامل بی‌نظیری مواجه می‌گردد.

مثلاً فضانورد ضمن مسافرت خود تحت تأثیر بی‌وزنی و تشعشعات یعنی زانت- (Radiations Ionisantes) بشدتی ماسفوق آنچه که تاکنون شناخته شده قرار می‌گیرد گذشته از این فضانورد بایستی تغییرات مهم شتاب و سرعت، کشش‌های عاطفی شدید تأثیرات زندگی اجباری چند هفتاهی در یک محیط کوچک و محدود، تغییرات و اختلالات ریتم قلبی و شاید تأثیرات افزایش اکسیژن هوای جو همه‌را تحمل نمایند از آنجاییکه معلوم نبود که ارگانیسم انسان طاقت تحمل همه این تغییرات و فشارها را داشته باشد مسئولین سازمانهای مسافرت‌های فضائی از همان ابتدا خود را مجبور دیدند از دانش پزشکی استمداد کنند و باین ترتیب علم طب بعنوان یکی از عوامل اصلی انجام سفرهای کیهانی شناخته شد. امروزه دیگر مسلم شده که نقشی را که انسان قرار است در کاوش فضا بازی کند کاملاً به اطلاعات و اکتشافات پزشکی بستگی دارد. تحقیقات و مطالعاتی که در رشته پزشکی فضائی تاکنون انجام شده برای تمامی پزشکان دنیا دارای اهمیت زیاد می‌باشد و از دستگاهها و وسائل فنی که در ضمن این آزمایشات تاکنون تکمیل و تهیه گردیده میتوان استفاده‌های گوناگونی برای بهداشت عمومی نمود.

۱- این مقاله بر اساس مطالعات سومین سمپوزیوم بین‌المللی که در تاریخ ۲۲-۱۹ نوامبر

۱۹۶۸ در مرکز اسازمان بهداشت جهانی در زنون در باره «مسائل اصلی مربوط به عوامل محیطی که مسافران فضائی ضمن سفر خود با آنها بر خود پیدا می‌کنند» تنظیم گردیده است.

شرح داده است. طبق این گزارش دفع کلسیم در ادرار این افراد بتدریج ضمن ۵ هفته اول افزایش یافته و بعداً بهمان میزان ثابت میماند. بر اساس مطالعاتی که ضمن موقعیت‌های تجربی شبیه سفرهای فضائی در آزمایشگاه انجام شده معلوم گردیده که ازین بردن تأثیرات استرس‌های مسافرت‌های فضائی امکان پذیر میباشد منجمله معلوم شده که هیپر کالسی یوری (Hypercalciorie) در افرادی که دربستر درحال استراحت هستند در بلندترین ارتفاعات بمراتب کمتر است.

دکتر والاویسکی (Dr. J. Walawski) از لهستان ضمن تجربیاتی که راجع به تأثیرات حالت شناور ماندن در آب بر روی ارگانیسم بمدت ۲۴ ساعت انجام داده نتایج مشابهی بدست آورده است.

بر اساس این آزمایشها این محقق مشاهده کرده که در ابتدا حالت بی وزنی باعث بروز اختلالات قلبی و کاهش فشارخون بعلت کشش روانی میگردد اما واکنش عروقی افراد مورد آزمایش در مقابل هورمونها فرقی باواکنش عروقی افراد در شرایط عادی ندارد.

دکتر پ.و. واژیلیو (Dr.P.V. Vasilyev) از شوروی تذکرداده است که حالت بی وزنی وضعف و کم حرکتی (Hypodynamic) آستانه تحمل تغییرات ارتواستاتیک و وستیبولایر (Tolérance Orthostatique et vestibulaire) را کاهش داده بر حساسیت ارگانیسم به عفونتها افزوده، از میزان مقاومت بدن در مقابل تغییرات شتاب کاسته و واکنشهای ارگانیسم در مقابل داروهای مختلف را تغییر میدهد. بطوریکه میدانیم افرادی که مدت طولانی بستری بوده‌اند مستعد به ابتلاء پاره‌ای بیماری‌ها مخصوصاً پنومونی می‌باشند.

دکتر بوریس اگورو (Dr. Boris Egorov) از شوروی که خود ضمناً فضانورد است ویکی از سه مسافر ناو فضائی روسی موسوم به وسخود بود که در اکتبر ۱۹۶۴ با موقیت به دور زمین چرخیده است در گزارش خود تأثیرات فیزیولوژیکی حالت بی وزنی طولانی و پیدا کردن وسایل ممکن برای محافظت فضانوردان را در مقابل این عوارض عنوان کرده است.

ضمن تجربیاتی که بر روی بیماران بستری مبتلا به اختلالات دستگاه عصبی مرکزی و آتروفی عضلات اسکلت انجام شده معلوم گردیده است که از راه تحریکات

بیوالکتریکی عضلات میتوان حجم و شکل تشریحی و ارادی حرکتی سابق آنها را دوباره بازگردانید.

بعد از چنین درمانی عضله مورد مداوا خود بصورت یک منبع نیرومند امپولاسیون در می‌آید که بدستگاه عصبی منتقل میشود پس ظاهراً تحریک بیوالکتریک عضلات میتواند واکنشهای خودکارانه بدن را تخفیف دهد.

این موضوع بخصوص هنگام مرحله نخستین یک پرواز فضائی مهم می‌باشد و باین ترتیب میتوان از راه تحریک بیوالکتریک عضلات فضانوردان از آتروفی بعدی نسج عضلانی جلوگیری بعمل آورد.

محققین مخصوصاً بدنبال وسایلی بمنظور محافظت نسج استخوانی فضانوردان گردیده اند زیرا آنها از همان پروازهای نخستین بدور مدار زمین دچار دلالی فیکاسیون استخوانها می‌شوند. عده زیادی از کارشناسان براین عقیده هستند که کاهش مواد معدنی استخوانها ضمن پروازهای فضائی طولانی ممکن است فضانوردان را دچار مخاطرات شدیدی نموده و بروز عوارضی مانند شکستگیهای استخوانی و رسوب کلسیم در جهازات ونسوچ مختلف و اختلالات عمل قلب را در آنها باعث شود. برای تعیین عواملی که در اینجا نقش اصلی را بازی می‌نمایند متابولیسم کلسیم بكمک روش ایزوتوپ‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است.

مقدار غلظت کلسیم ایزوتوپ در قسمت اپی فیز استخوان فمور موش‌های نر که از ۳۰ روز باین طرف در حالت کم حرکتی نگاهداشته شده‌اند یک ساعت پس از تزریق کلسیم ۴۵ با آنها یک مرتبه به ۰.۶٪ میزان کلسیم ایزوتوپ در گروه شاهد سقوط می‌کند.

در تحقیق مشابه دیگری که بر روی استخوانها تحت استرس‌های فونکسیونل مختلف انجام شد معلوم گردیده است که در تماس اسکلت کاهش ماده استخوانی بطرز متحدد الشکلی پیدا می‌شود.

آزمایشها و تحقیقات دکتر اگورو و همکارانش شامل یک موضوع مهم دیگر نیز می‌باشد و آن مطالعه درباره راهها و وسائل افزایش مقاومت ارگانیسم در مقابل تغییرات شتاب ضمん مرحله نهائی یک مسافت فضائی می‌باشد مثلاً اگر افراد مورد مطالعه در آزمایشگاه تحت شرایطی نظری شرایط یک مسافت فضائی قرار گرفند و از مقدار کلی خون هر نفر از راه خون گرفتن بمیزان ۸ درصد وزن بدن کاسته شود مقاومت

است طرز راه رفتن آنها تغییر پیدا کرده بود و پاهای آنها بمانع گیر میکرد سرشان میلرزید و وقتی میخواستند غذا بخورند حرکات غلطی انجام میدادند. برای اینکه سگهای مورد آزمایش و سگهای گروه شاهد وضع عادی اولیه خودرا بازیابند ۴ روز زمان لازم بوده است.

پروفسور ا. هاش گوئر (Professeur O. H. Gauer) و همکاران او از برلن غربی از راه در زیر آب نگاهداشت چند مرد داوطلب کاملاً سالم تأثیرات وضع بی و ذنبی مسافرت‌های هوائی را روی ارگانیسم انسان در آزمایشگاه بطور تجربی تولید و مطالعه کرده باین نتیجه رسیده‌اند که واکنشهای ارگانیسم در برابر شرایط و موقعیت‌های منحصر به فرد فضای جنبه کاملاً شخصی داشته و بسته با فرد فرق میکند. مثلاً یکی از افراد مورد آزمایش واکنشهای کاملاً غیرعادی از خود نشان داده است این فرد داوطلب که برای آزمایشات فضائی خیلی از خود ذوق و شوق نشان میداد مانند کسی بود که حتماً می‌خواست فضانورد کیهانی بشود. در جریان تجربه غوطه‌ورشدن خیلی وزن خودرا از دست داد و با آنکه بمقدار کافی آب خورد احساس عطش خیلی شدیدی کرد اوموقع خواب بیدار میماند و بعد از ۴۸ ساعت تجربه وضع عمومی او خیلی مختل شد.

دکتر و. ال. جونس (Dr. W. L. Jones) از امریکا ضمن گزارشی از تحقیقات

سازمان ناسا (National Aeronautics and Space Administration) به سپریزیوم تذکرداده است که افزایش مقدار آلدوسترون خون برای زندگاندن موجود انسانی در موقعیت‌های استرس شدید و برای توائی و قدرت مقاومت ارگانیسم در مقابل سرمای زیاد فوق العاده مهم میباشد. این مطلب را محققین دانشگاه هوائی ای ای ای ضمن یک تجربه راه پیمایی توسط ۱۴ مرد کاملاً سالم تأیید کرده‌اند در این آزمایش ۱۴ داوطلب مسافت ۱۶۰ کیلومتر را در ناحیه مجاور قطب در ظرف ۱۰ روز پیاده طی کردند در اغلب آنها میزان دفع آلدوسترون در ادرار افزایش پیدا کرد ولی دو تن از افراد مورد آزمایش که میزان دفع آلدوسترون در ادرار آنها کم بود در روز هفتم تجربه به بدون هیچگونه علائم پیشناز دچار یک حالت سنکوب گردیدند.

دکتر جونز همچنین نتیجه آزمایشاتی را که از طرف محققین مرکز تحقیقاتی امس (Ames Research center) روی حیوانات انجام شده و مربوط به تأثیرات افزایش قوه جاذبه روی بدن آنها بوده است گزارش داده است. یکی از آزمایشهای مورد

بحث که بسیار طولانی بوده مربوط به وضع و واکنشهای موشهایی است که از زمان تولد تا چهار سالگی عادت داشته‌اند در محفظه‌هایی مانند دستگاه سانتریفوژ و تحت تاثیر شتابی معادل ۴ را برابر قوه‌جاذبه زمین زندگی نمایند تحت چنین شرایطی موش‌های بالغ مورد تجربه با وجود آنکه خیلی بیشتر با آنها غذا داده شد خیلی سبکتر و لاغرتر از موشهای عادی بودند.

بعقیده دکتر جونز حیواناتیکه بر عکس در شرایط کاهش قوه‌جاذبه و یا بی‌وزنی نگهداری شده‌اند اینها بر عکس وزنشان از حیوانات عادی بیشتر خواهد بود مگر آنکه آنها را تحت رژیم غذائی کاملاً کنترل شده قرار دهیم ضمناً چنین بنظر می‌رسد در موقعیتها و شرایطی که قوه‌جاذبه افزایش پیدا کرده امید زندگه‌ماندن موجودات بیشتر است مثلاً سن یکی از موشهایی که در دستگاه سانتریفوژ زندگی می‌کند به ۴۷ ماه رسیده در حالیکه سن طبیعی این نوع موش معمولاً ۳۳ ماه است.

دکتر ب. ژ. داویدو (Dr. B. J. Davidov) از شوروی تحقیقاتی را درباره واکنشهای ارگانیسم در مقابل استرس‌های شدید‌گزارش داده است طبق این گزارش وقتی چند استرس با هم روی ارگانیسم اعمال نفوذ می‌کند سه وضعیت ممکن است پیدا شود یکی تأثیر مخرب آنها ممکن است با هم جمع شود دیگری اینکه اثربخش‌گر را اختیار کنند و یا اینکه در اثر توأم شدن آنها به فضانورد کمک شود یک عامل مخصوص مسافت فضائی را تحمل کند. دکتر داویدو واکنشهای ارگانیسم را در مقابل استرس پس از تزریق مواد رادیو پروتکتور مختلف هم شرح داده است.

همینکه بتدریج بعد از محفظه‌های فضائی بزرگتری ساخته شدو یا اینکه چند دستگاه فضائی پهلوی یکدیگر و روی مدار حرکتی زمین آماده گردید آنکه امکان خواهد داشت که تأثیر قوه‌جاذبه را در آنها از راه چرخاندن سریع آنها مانند دستگاه سانتریفوژ مصنوعاً ایجاد نمود و با این ترتیب میتوان امید داشت که روزی بتوان از این راه مضرات و معایب حالت بی‌وزنی را برای مسافران فضائی ازین برد. با این حال زندگی در کپسولهای فضائی که میتوان آنها را به چرخش در آورده، طبق گزارش‌های دکتر آ. گرای بیل (Dr. A. Graybiel) از امریکا که درباره وضع زندگی افراد ساکن اطاقهای با دوران آهسته مطالعه نموده، خود مشکلات و مسائل دیگری را پیش می‌آورد.

Resumé

Les astronautes sont soumis, au cours de leur voyage dans l'espace à la pesantur, à des radiations ionisantes très supérieures à tout ce que l'on connaît, ils doivent subir des variations considérables d'accélération, des tensions affectives importantes, un séjour de plusieurs semaines consécutives dans l'espace restreint d'une cabine, des perturbations du rythme circulatoire, et peut être un accroissement de la teneur de l'atmosphère en oxygène.

Au cours des débats du 3ème symposium international sur les problèmes fondamentaux concernant les facteurs d'ambiance rencontrés par l'homme dans l'espace, (organisé par la Fédération internationale d'astronautique et par l'Académie internationale d'Astronautique avec la coopération de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Agence internationale de l'Energie atomique) les spécialistes de la médecine spatiale ont rapporté plusieurs études consacrées à ces problèmes.

Les travaux accomplis en médecine spatiale présentent un grand intérêt pour tous les médecins du monde et les appareils qui ont été mis au point peuvent rendre de grands services en santé publique.

Dans cet article, en vue d'économiser de la place, nous allons décrire seulement quelques travaux des spécialistes de médecine spatiale concernant les effets de la pesanteur, dangers d'irradiations, troubles du sommeil, de vigilance et privation sensorielle.

Nous conclurons cet article par une brève revue des contributions de la médecine de l'espace à la santé du monde.