

الکترو دیا گنوستیک در چشم پزشکی

امروزه الکترو کاردیو گرافی در تشخیص بیماریهای قلب و الکترو آنسفالو گرافی در تشخیص اختلالات مغز و پیش‌نشانی بهمی داردند، در حالیکه الکترو دیا گنوستیک در چشم پزشکی هنوز در مرحله ابتدائی ترقی قرار دارد ولی مسلمان توسعه داره آن زیاد بطول نخواهد نجامید. اکنون در بعضی از کشورهای پیشرفته استفاده از آن جزئی از فعالیت‌های بخش‌های چشم پزشکی را تشکیل میدهد. متأسفانه در حال حاضر تشکیلات پیچیده ماشین‌های الکترونیک آن دامنه استفاده از آنرا محدود کرده و اجازه نمیدهد که بطور همگانی و همه‌جا در دسترس چشم پزشکان قرار گیرد.

الکترو دیا گنوستیک در چشم پزشکی بدوصورت عمدی الکترو رتینو گرافی والکترو-اکولو گرافی انجام می‌گیرد که در این مقاله برای اختصار بر ترتیب به E.O.G و E.R.G نشان داده می‌شود.


الکترو میو گرافی یعنی سومین قسم الکترو دیا گنوستیک و استفاده صحیح از آن در چشم پزشکی هنوز در مرحله تجربی است.

اساس الکترو رتینو گرافی

در حال عادی بین قرنیه و رتین چشم زنده همواره یک پتانسیل الکتریکی معینی وجود دارد، هنگامیکه چشم تحت اثر امواج نورانی اضافی قرار گیرد، یک پتانسیل جدید بر پتانسیل فوق الذکر افزوده می‌شود که مطالعه این افزایش پتانسیل، الکترو دیا گنوستیک براساس ERG نامیده می‌شود. این تغییرات الکتریکی کاملاً شبیه تغییرات الکتریکی بین مغز و پوست در الکترو آنسفالو گرافی است.

برای ثبت منحنی ERG الکترو دفعاً دستگاه را که به یک Contact Lens متصل است روی قرنیه بیمارثابت می‌کنند، قطب بی تفاوت در روی پوست و نزدیک چشم قرار داده می‌شود، بیمار را مدتی در حدود بیست دقیقه برای عادت بتاریکی در اطاق تاریک نگاه میدارند سپس با نور جرقه‌های الکتریکی رتین را تحریک مینمایند و نتیجه فعل و انفعالات ناشی از این تحریکات سریع نورانی را ثبت و مطالعه می‌کنند. یک منحنی ERG (شکل ۱) عبارت از

حاصل جمع عکس العمل‌های طبقات مختلف نورونهای حساسه و دوقطبی رتین است. این منحنی دارای دو موج عمده وابتدائی بنام موج a منفی و موج b مثبت می‌باشد.



شکل ۱ - منحنی پائین در این شکل نمودار تابش جرقه نورانی و منحنی بالا نمودار ERG یک چشم سالم در لحظه تابش نور است. منحنی دارای دو موج اصلی a منفی و b مثبت است.


امواج c و d نیز وجود دارد که ظاهرآ فاقد اهمیت مشخصی است و تصور می‌شود که پتانسیل موجود منحنی ERG از طبقات سلولهای کیرنده و دوقطبی رتین منشاء می‌گیرد، بدین معنی که موج منفی a حاصل فعل و اتفاقات سلولهای کیرنده (مخروطی واستوانهای) و موج مثبت b حاصل واکنش‌های سلولهای دوقطبی است، درحالیکه الکترواکولوگرافی نماینده اعمال لایه پیکمانتر رتین است و دو مورد زیر این اختلاف منشاء EGG و EOG را روشن می‌کند: در شب کوزی غیر پیشرونده مادرزادی که ضایعه در سلولهای دوقطبی است برخلاف رتینیت پیکمانتر، چون لایه پیکمانتر رتین سالم است EOG طبیعی ولی در ERG موج b بکلی حذف می‌شود همچنین در بعضی از کیست‌های بزرگ رتین که در آن شیکیه از ناحیه طبیعه پیکمانتر آن جدا می‌شود EOG غیر طبیعی ولی ERG بمناسبت اینکه نورونهای کیرنده دو طبیعی دست‌نخورده می‌مانند طبیعی نشان داده می‌شود.

اساس الکترواکولوگرافی

EOG مربوط به تغییرات بطنی پتانسیل ایستاده چشم است، درحالیکه ERG نماینده تغییرات سریع پتانسیل نورونهای رتین است: این پتانسیل ایستاده را میتوان بواسیله منحنی حاصل از حركات چشم اندازه کیری و ثابت نمود. برای اینکار لازم است یکبار پتانسیل مزبور در تاریکی و بار دیگر در روشنایی اندازه کیری و مقایسه شود. طرز کار از این قرار خواهد بود: الکترودهای دستگاه را روی پوست در گوش‌های چشم بیمار ثابت می‌کنند. در رو بروی بیمار دو چراغ نئون با نور ضعیف. برای اینکه اختلالی در عادت بتاریکی ایجاد نکند - بطوطی ثابت شده‌اند که با چشم‌ها از ۳۵ درجه می‌سازند، اطاق را تاریک مینمایند و بیمار هر بار نگاه خود را از یک چراغ بچراغ دیگر می‌گرداند، این عمل در هر دقیقه چندین بار تکرار می‌شود. در اینحال منحنی نوسانات چشم ذردیقیه اول عادت بتاریکی و سپس در دقایق بعد ثبت می‌شود پس از ۱۲ دقیقه اطاق را روشن می‌کنند و مجدداً بترتیب فوق عمل مینمایند؛ اختلاف پتانسیل

حاصله بین دو قطب دستگاه مناسب با پتانسیل ایستاده چشم بوده در روی نوار ثبت و ضبط میشود، سپس منحی های حاصله از حرکات چشم در تاریکی و روشنائی مقایسه و مطالعه میشود.

(شکل ۲).



شکل ۲- منحنی تغییرات EOG در چشمها لام- منحنی بالامر بوط بچشم راست و بالین عر بوط به چشم چپ است اعداد نمودار دقایق و تاریقه ۱۲ تغییرات پتانسیل چشم در تاریکی و ازدیقه ۱۴ یعنی بعد از علامت X نمودار تغییرات پتانسیل در روشنائی است. بناور یکه ملاحظه میشود هر چه چشم بیشتر در همجاورت نور قرار گیرد (عادت بروشنائی) دامنه نوسانات منحنی ها بیشتر میشود.

در مطالعه منحنی های مزبور یک سقوط اولیه در دامنه نوسانات یا بعبارت دیگر در پتانسیل ایستاده چشم بعلت عادت بتاریکی ملاحظه میشود که متعاقب آن هنگامیکه چشم در مععرض نور قرار گیرد بر پتانسیل فوق الذکر بتدریج افزوده شده پس از چند دقیقه بحداکثر خود میرسد (عادت بروشنائی). مطالعه این کیفیت الکتروودیاگنوستیک براساس EOG است. بنظر میرسد که تغییرات پتانسیل حاصله در سلو لهای رتین در هنگام تغییر میزان روشنائی مربوط به متابلیسم اپیتلیوم پیگما نتر رتین باشد. بنابراین بیماریهایی که بتواند عمل لایه پیگما نتر و یا قسمت های انتهائی سلو لهای استوانه ای و یا ارتباط این دورا مختلط کند باعث تغییرات EOG نیز خواهد شد، لذا برای اینکه EOG طبیعی باشد باید طبقه اپیتلیوم پیگما نتر و سلو لهای استوانه ای سالم و در عین حال باهم در تماس بوده ضمناً جریان خون میرگهای کور و گید که عهده دار تغذیه این طبقات هستند طبیعی انجام گیرد.

موارد استعمال الکتروودیاگنوستیک

E. D. یک وسیله آزمایش ابژکتیو عمل رتین است. EOG و ERG در تشخیص ضایعات طبقات فوق الذکر رتین مکمل هم دیگر هستند، بدین معنی که بعضی از اختلالات شبکیه ممکن است. باعث تغییر منحنی یکی و برخی سبب تغییرات دیگری و یا هردو شوند.

باید یاد آور شد که اختلالات مربوط بقسمت های دیگر رتین مانند سلو لهای کانگلیو نر و عصب باصره تغییری در نتایج آزمایشات الکتروودیاگنوستیک نمیدهد، زیرا مثلاً در آتروفی کامل عصب باصره و یا در گلوكوم مطلق EOG و ERG هردو طبیعی میمانند. در حالیکه در مراحل اولیه رتینیت پیگما نتر این آزمایشات فقدان کامل فعالیت های الکترویکی رتین را نشان

میدهد . دستگاههای موجود هنوز قدرت لوکالایزه کردن ضایعات را ندارد یعنی پاسخ آن در ضایعات ماکولا همانند اختلالات رتین محیطی خواهد بود بعبارت دیگر آزمایشات الکترو-دیاگностیک در چشم پزشکی فقط بر احل اختلالات رتین بطور اعم حساسیت دارد و بهیچوجه نمیتواند نمودار ضایعات نقاط و مناطق معین رتین باشد .

علیرغم نقصان فواید ذکر الکترو-دیاگностیک در موارد قابل توجهی بنوان تنها وسیله تشخیص بچشم پزشکان کمک خواهد کرد که ذیلاً باختصار به بعضی از آنها اشاره خواهد شد :

۱- انصافل شبکیه

در دکلمان رتین EOG فوراً بطور قابل ملاحظه‌ای غیرطبیعی میشود . یعنی پس از تابش نور بر چشمی که در حال مادت بتاریکی است افزایش پتانسیل منفاهده و ثابت نمیشود . بعبارت دیگر دامنه نوسانات منحنی‌های آن در تاریکی و روشنائی یکسان خواهد بود . در حالیکه در ERG منحنی آن - برحسب میزان و وسعت دکلمان - از کوتاه شدن مختصراً موج a تا حذف کامل آن تغییر میکند . واضح است در صورتی موج a بکلی ازین میروند که نسج رتین مرده باشد . در اینحال هر نوع عمل جراحی خالی از فائد خواهد بود . در مواردی که دیدن نه چشم بعلت لکهای وسیع قرنیه و یا آب مرارید و یا خونریزی مقدور نبوده ضمناً احتمال دکلمان رتین نیز درمیان باشد الکترو-دیاگnostیک کمک بزرگی خواهد کرد .

۲- دژنرنسن‌های ارثی و مادرزادی رتین

الکترو-دیاگnostیک عامل مهمی در تشخیص افتراقی انواع مختلف و متنوع استحاله‌های رتین است . در رتینیت پیکمانتر ERG خیلی کوچک و در مراحل پیشرفته بصورت خط مستقیم در آمده غیرقابل ثبت نمیشود ، در حالیکه حتی قبل از اینکه ERG عالمی نشان دهد و آثار ته چشمی بیماری بروز کند ، EOG نسبت بمارضه حساس بوده تغییرات آنرا آشکار میکند .

۳- عوارض عروقی :

در بستگی ورید مرکزی رتین و یا یکی از شعب آن EOG در بسیاری از حالات کاهش نسبی دامنه نوسانات را در مقابل نور نشان میدهد در حالیکه در ERG دامنه نوسانات و اندازه منحنی‌ها تغییر قابل توجهی خواهد کرد . ارزش این آزمایشات در اینست که اگر EOG طبیعی و ERG تغییری در اندازه موج a نشان ندهد ، آینده بیماری خوب است و اختلال بینائی شدید نخواهد بود .

۴- میوپی‌ها

در بعضی از انواع دژنراتیو میوپی بعلت اینکه تغییرات اولیه دژنرنسن در طبقه اپتیلیوم پیکمانتر ظاهر نمیشود ، دامنه نوسانات EOG کوتاه خواهد بود ، بعد ازا که میوپی پیشرفت

بیشتری کرد و تغییرات تدچشمی آن ظاهر شد ERG نیز تغییر خواهد نمود. در اینجا آزمایشات مزبور برای تشخیص چیزی که میتواند کودکان و پیش‌آگهی آن سودمند خواهد بود.

۵- ضایعات کوروئید

در کوروئیدیتها، مخصوصاً آندسته که بطیقه پیگما نتر رتین نیز تجاوز میکنند، EOG تغییر میکنند، در صورتیکه ERG ثابت و طبیعی میماند. در مواردی از کوروئیدیتهای منتشر سیفیلیسی که شباخت زیادی به دژنرنسانس‌ها پیگما نتردارند EOG در هر دو تغییر یافته در صورتیکه ERG فقط در انواع دژنرنسانس‌ها متغیر و در کوروئیدیتها طبیعی خواهد بود.

۶- کمبود ویتامین A

نقصان ویتامین A ممکن است باعث تغییرات بینائی منجمله شب کوری شود. در اینحالت تغییر نوسانات EOG و منحنی EDG ملاحظه میشود که بمختص درمان وضع طبیعی بخود میگیرند البته این امر منوط با نت که عارضه تازه باشد، زیرا در موارد بسیار مزمن ضایعات رتین دائمی و پابرجا خواهند بود.

۷- رتینوپاتی‌های ناشی از مسمومیت‌های داروئی

داروهای معینی مانند chleoroquine که در درمان مalaria و بعضی از اقسام بیماریهای کلارژن بکاربرید ممکن است باعث تغییرات رتین و در صورت مداومت دراستعمال دارو منجر به رتینوپاتی‌های ثابت وغیرقابل جبران شود. آزمایشهای الکترودیاگنوستیک این تغییرات را در مراحل بسیار ابتدائی یعنی در مرحله قابل جبران آشکار میکنند و مخصوصاً EOG کاهش عکس العمل بنور را درحالی نشان میدهد که هیچ‌گونه علامت ته‌چشمی و یا شکایتی از طرف بیمار ابراز نشده است، در اینحالات میتوان بیماران را منظماً تحت این آزمایش قرارداد تا در صورت بروز خطر فوراً دارو قطع شود.

خلاصه

- آزمایشهای الکترودیاگنوستیک با آنکه در راه تکامل خود سیر میکنند در حالات زیر میتوانند برای چشم پزشکان دارای ارزش تشخیصی باشد:
- ۱- در مواردی که آزمایشات سوبژکتیو بعلت همکاری و یا بعلت قلت سن بیمار قابل اعتماد نباشد.
 - ۲- در مواردی که معاینه و مشاهده ته‌چشم بعلت عدم کدورت قسمت‌های قدام و یا میانی چشم مشکل و یا غیر ممکن باشد.

- ۳- در تشخیص پیش آگهی اختلالات عروقی چشم
- ۴- در تشخیص مراحل اولیه و پیش آگهی بیماریهای وراثتی و دژنراتیو رتین .
- ۵- برای پیش گیری عوارض و خطرات ناشی از مسمومیت با داروها
- ۶- برای کسب اطلاع از چگونگی عمل رتین در مواردی که با وسائل موجود ضایعات ته چشمی مشاهده نگردد .

Références

- 1- A.M.A Arch . Ophthal . 1957 (57)
- 2- Hugh Davson (فیزیولوژی چشم)
- 3- Arnold Sorsby (جلد اول کتاب چشم پزشکی)
- 4- Brstish Journal of Ophthalmology 1962 (46)
- 5- Post Graduate Medical Journal 1964 (40)
- 6- Lancet i , 1164,1962