

# آزمایش سیتولوژی داوده برای تشخیص سرطانهای لوزالمعده و مجاری صفر اوی

دکتر فتح الله فرزد (۱)      دکتر احمد ربانی (۲)      دکتر عبدالحسین کاوندی (۳)

سرطانهای دستگاه گوارش یکی از شایعترین انواع تومورهای بدخیم بدن بوده و میزان مرگ و میر ناشی از آنها هنوز قابل توجه است. درمان موقفیت آمیز سرطانهای دستگاه گوارش هم مانند تومورهای بدخیم سایر اعضاء با تشخیص زودرس بیماری در مرحله ابتدایی و قبل از انتشار موضعی یا عمومی آن امکان پذیر است. از اینجهت بکار بستن راههای جدیدی که بتواند به تشخیص زودرس این سرطانها کمک کند اهمیت زیادی دارد.

آزمایش سیتولوژی سلولهای آزاد شده در ترشحات حاضمهای یکی از راههای تشخیص دقیق و زودرس سرطانهای دستگاه گوارش است بویژه در سرطانهای لوزالمعده و مجاری صفر اوی که روشهای آزمایشی دیگر نمیتواند کمک زیادی به تشخیص بنماید، سیتولوژی وسیله ذیقیمتی برای تعیین و تشخیص زودرس این تومورهاست.

مطالعه سلولهای موجود در ترشحات دستگاه گوارش از اواخر قرن نوزدهم، ابتدا بوسیله روزنباخ (۱۸۸۲) شروع شده و بعداً محققین دیگری مانند روزنهايم (۱۸۹۱) کونهایم (۱۸۹۵) و راینباخ (۱۸۹۶) و همتر (۱۸۹۹) ترشحات معده را از قلل جستجوی سلولهای سرطانی مورد مطالعه قراردادند. بعدها مارینی (۱۹۰۹) شششودی معده را با روش مشابه آنچه که هم اکنون مرسوم است بکار برد ولی بعلت عدم رنگ آمیزی سلولها، این تشخیص مشکل بود. با پیدایش روشهای مختلف آزمایشگاهی از قبیل رادیولوژی و آندوسکوپی و آزمایشهای بیولوژی، سیتولوژی دستگاه گوارش برای مدت ۴۰ سال متروک ماند تا اینکه در دنباله کارهای پاپیکلائو و همکارانش درباره سیتولوژی دستگاه تناسلی زنانهاین روش مجددأ برای تشخیص سرطانهای معده بکار رفت.

پاپیکلائو و همکارانش اولین گزارش خود را درباره تشخیص سیتولوژیک معده و کولون در سال ۱۹۳۳ منتشر کردند.

۱- استاد و رئیس تشكیلات پزشکی ۲ بیمارستان پهلوی

۲- استاد آسیب‌شناسی دانشکده پزشکی

۳- رئیس بخش داخلی ۲ بیمارستان پهلوی

نتیجه آزمایش در جدول زیر خلاصه شده است :

تعداد بیماران	منفی	مشکوک	ثبت	منفی کاذب	ثبت کاذب
۵۸	۴۷	۳	۶	۲	-

جدول (۱)

اینک سه ابر واسیون قابل توجه از موارد ثبت ذکر میشود :

### شرح حال اول

ح-ث، ۶۵ ساله اهل سیز وار بعلت درد ناحیه عیوب کندر راست در تاریخ ۱۱/۱۱/۴ پسترد. این درد از سه ماه پیش شروع شده و بتدریج افزایش یافته بود و با تشخیص آپاندیست برای عمل به تهران آمد و بود.

هنگام مراجعته بیمار لاغر بود و از درد هیبوکندر راست، نفع شکم و بیبوست شاکی بود. بیمار دچار سوب ایکتر شده بود و در معاينه، کبد بقدره بند انگشت در زیر دندنه لمس میشد و نرم بود. در مدت بسترد بودن تبهای کوچک غیر منظمی داشت و روز بروز ردی بیمار زیادتر میشد تا اینکه دچار بیان و اضحتی گردید. مدفوع گاهی سیاهر نک میشد ولی هیچ وقت بیرون نگ نشد. نشانه های آزمایشگاهی: فستاتاز قلیائی ۲۶ واحد بود انسکی. بیلر و بین مستقیم ۹۰ میلیگرم و غیر مستقیم ۳۲ میلیگرم در لیتر. - تیمول ۱۰ واحد. سفالین کلسترول + + ، رادیو گرافی معده و دوازدهه طبیعی بود و رادیو گرافی کیسه صفراء با ماده حاجب ترشی را نشان نداد. پونکسیون بیوپسی کبد رتا نسیون پیگمانهای صفراء رو را نشان داد. در تست سکر تین حجم کلی مایع ۱۳۰ سانتیمتر مکعب (وزن بیمار ۴۶ کیلو گرم) در یک ساعت و مقدار بینکن بنات به ترتیب ۱۰۰ ۱۳۵ و ۱۰۱ میلی اکیوالانت در لیتر بود. در دولوله اول مایع شستشو کاملا خونی بود و در دولوله بعدی مقدار کمی خون موجود بود. در آزمایش سیتو لوژی دوازدهه مقدار نسبتاً زیادی سلولهای سرطانی مشاهده شد (شکل ۱). با توجه به طبیعی بودن تست سکر تین و وجود سلولهای سرطانی در مایع شستشو، تشخیص سرطان مجاری صفراء داده شد و بیمار برای عمل جراحی معرفی شد.

در جراحی، کیسه صفراء کاملا بزرگ و محتوی ۱۵۰ سانتیمتر مکعب مایع شکلاتی مایل به خاکستری بود. علاوه بر آن چند سنگک داخل آن دیده میشد. جدار کیسه صفراء افیلتره بود علاوه توده بزرگ توموری در اطراف مجرای کولدوك وجود داشت و گانگلیونهای لنفاوی مر بوته شکمی بزرگ شده بود.

**تشخیص پاتولوزی:** آدنوکارسینومای کیسه صfra با متاستاز گانگلیونهای لنفاوی گزارش شده است (شکل ۲).

### شرح حال دوم

ب - الف ۶۰ ساله در تاریخ ۴۰/۱/۸ بعلت زردی شدید ، درد طرف راست شکم ، سرگیجه و ضعف شدید مراجعت کرده است – درد شکم از ۷ ماه پیش شروع شده و از ۲ ماه پیش شدت پیدا کرده است . همچنین بیمار دچار بیرقان شده که ابتداء مختصر بوده ، و رفته رفته شدید گشته و با بیرونگی مدفوع توأم بوده است . بیمار کاهش شدید وزن پیدا کرده است ، در معاینه بالینی کبد بساندازه ۴ بند انگشت در ذیز دندنه هالمس شده ، نرم و دردناک بود . طحال قابل لمس نبود .

نخانهای آزمایشگاهی در آزمایش ادرار آلبومین تراس دیده شد – سدیما تاتاسیون ۶۰ میلیمتر در ساعت اول - فسفاتاز قلیائی ۸ واحد بودانسکی - بیلر و بین مستقیم ۱۹۰ و غیر مستقیم ۱۸ میلیگرم در لیتر - تیمول ۸ واحد - سفالین کلسسترول + - رادیو گرافی معده و دوازده مطبیعی پروتئین تام ۶/۷ گرم در ۱۰۰ سانتیمتر مکعب بود در الکتروفورز ۵/۴٪ : AI = ۵/۵ ،  $\alpha_1 = ۱/۱۴/۳$  ،  $\alpha_2 = ۱/۱۰/۷$  ،  $\beta = ۱/۱۱/۸$  و  $\gamma = ۱/۲۱/۸$  بود . آزمایش کازونی منفی بود . در تست سکر تین حجم کلی ما بیع ۲۰ سانتیمتر مکعب (وزن بیمار ۴۵ کیلو گرم) در یک ساعت و مقدار بیکر بنات به ترتیب در لوله اول ۳-لوله دوم ۳۲-لوله سوم ۵۰ میلی اکیوالانت در لیتر بود . در کلیه لوله ها مختصری صfra وجود داشت . آزمایش سیتو لوزی دوازده سلولهای تومورال را نشان داد (شکل ۳) . بیمار با تشخیص سرطان لوزالمعده تحت عمل جراحی قرار گرفت . در موقع عمل جراحی سلطان سر لوزالمعده با متاستاز صفاقی دیده شد .

### شرح حال سوم

ع- ق ۵۵ ساله اهل کلپایکان ، در تاریخ ۱۰/۱۶/۴۳ بعلت برقان ، درد ناحیه اپیگاستر و هیپوکندر راست و خارش جلدی مراجعت کرده است . درد از یکسال پیش شروع شده ولی از دوعاه پیش از تاریخ مراجعت شدت پیدا کرده و برقان و خارش جلدی هم بدان اضافه شده است . در معاینه بالینی بیماری بودبا برقان شدید ، ناحیه دوازدهه در لمس دردناک ، کبد بساندازه چهار بند انگشت در ذیز دندنه ها لمس شده و بدون درد بود . کیسه صfra بزرگ شده و قابل لمس بود سدیما تاتاسیون ۶۵ میلیمتر در ساعت اول - بیلر و بین مستقیم ۱۱۵ و بیلر و بین غیرمستقیم ۱۰ میلیگرم در لیتر - تیمول ۸ واحد - سفالین کلسسترول + - پروتئین تام ۷۶/۵ گرم (آلبو مین ۴۳۶ گرم - کلوبولین ۱۴ گرم) در ۱۰۰ سانتیمتر مکعب بود .

- 7- Klayman, M.I., and Co - Workers, Gastroenterology , 29:5, 1955.
- 8- Lemon, H.M., Am. Int. Med., 37: 595, 1952.
- 9- Lemon, H.M., and Byness, W.W., J.A.M.A., 141: 254, 1947.
- 10- Masini , G. , Clinica Medica Italiana, 2:65, 1910.
- 11 - Members of the Vincent Memorial Hospital Laboratory staff the cytological diagnosis of cancer. W.B. Saunder Company , 1950.
- 12- Panico, F.G., Papanicolaou, G.N., and Cooper, W.A.. J.A.M.A., 143: 1308' 1950.
- 13-Papanicolaou,  
G. N., and Cooper, W. A., J. Nat. Cancer Institute, 7: 357, 1947.
- 14- Raskin, H. F., Kersner, J. B., Palmer, W. L., Pleticka, S., and Yarema, W A.; A. M. A. Archives of surg., 76, 507 ,1956.
- 15- Raskin. H. F., Kirsner, J. B., and Palmer, W. L.; J. A. M. A., 169, 789, 1959.
- 16- Raskin. H. F., and all. Sixth annual meeting of the inter. Society cytologic council, 1959.
- 17-Raskin, H. F., Wenger; J., Sklar, M., Pleticka, S., and Yarema, W. A. Gastroenterology, 34: 996, 1958.
- 18-Reinboth. Deutsche. Arch Klin. Med., 581: 62: 1896.
- 19-Rosenbach. Deutsche, Med. Wschr., 33: 452, 1882.
- 20-Rosenthal, M., and Traut, H. F. Cancer, 4: 147, 1951
- 21- Rubin, C. E., Massey, B. W., Kirsner, J. B., Palmer, W. L., and Stonecypher, D .O., Gastroenterology, 25: 119, 1955.
- 22\_Rubin, C. E., and Benditt, E. P. Cancer, 8: 1137, 1955.
- 23\_ Seybolt, J. F., and Papanicolaou, G. N. Gastroenterology, 33: 369, 1957.
- 24- Koss, L. G. : Diagnostic cytology J. B., Lipincott Co. 1964.