

گزیلو کائین در جراحی قلب

در جراحی قلب و قفسه صدري رسم وعادت براین است که برای قطع رفلکس های بیمار ضمن عمل از داروهای گانگلیوپلزیک و یا زوکائین استفاده شود ولی چون داروهای گانگلیوپلزیک خواب بعداز عمل را طولانی کرده و فشارخون بیمار را چند درجه ای پائین می آورد که مورد علاقه جراحان و متخصصین بیهوشی نمی باشد لذا برای قطع رفلکس های پریکاردوقاب مدتیها بعضی از آنستزیست ها از تزریق محلول نوکائین استفاده می نمودند و یا اینکه خود جراحان ضمن عمل قلب گازهای آغشته به محلول نوکائین راروی قلب گذارده و یا اینکه در داخل پریکارد چندسانی کوب محاول نوکائین میریزند تا از تاکی آرتیمی های ضمن عمل جلو گیری شود از طرفی همه میدانیم که تزریق آتروپین بعنوان پرمدیکاسیون بیماروفال کسدیل برای شل شدن عضلات واتر داروی بیهوشی که معمولا در بیمارستانهای دانشگاهی پزشکی بکار برده می شود هرسه ایجاد تاکیکاردی شدیدی در بیماران مینمایند که ضمن عمل قلب به تاکی آرتیمی تبدیل می گردد، این تاکی آرتیمی گاهی باعث فیبریلاسیون شده و تقریباً تا آخر عمل باقی میماند.

اخیراً در چند مورد بیمارانیکه تحت عمل جراحی قلب (قلب باز - قلب بسته) قرار گرفته اند از محلول گزیلو کائین برای ازین بردن رفلکس های قلبی استفاده شد که نه تنها کمک به بیهوشی بیمار شد بلکه رفلکس ها بکلی قطع گردید و در تمام مدت عمل نبض بیمار آرام بود و تعداد قرعات نبض که معمولاً قبل از شروع بیهوشی بین ۱۱۰-۱۲۰ در دقیقه بوده به ۸۰-۱۰۰ در دقیقه رسید.

گزیلو کائین در جراحی قلب

محلول گزیلو کائینی که برای اعمال جراحی قلب بکار برده شده عبارتست از مقدار ۰ .۰۵ میلی گرم در ۰ .۵ سانتی کوب سرم قندی که با شروع بیهوشی با هستگی درورید بیماران تزریق شده است.

چون مدت اعمال جراحی قلب بسته عموماً کوتاه می باشد لذا تاموقع دوختن جدار که

احتیاج به پروفوزیون این محلول داریم . بیش از ۱۵۰ - ۲۰۰ میلی گرم گزیلوکائین تزریق نمیشود و در اعمال جراحی قلب باز که مدت آنها نسبتاً طولانی است ما کزیم ۴۰۰ میلی گرم گزیلوکائین تزریق میگردد در صورتیکه مقدار سعمولی پروفوزیون گزیلوکائین بین ۱۰ - ۱۵ میلی گرم در هر دقیقه و مجموعاً میتوان تا ۸۵ سیلی گرم گزیلوکائین در سه ساعت تزریق نمود زیرا این دارو در پلاسمما متabolیزه ، بسرعت در کبد تجزیه و از کلیه ها و فوی میگردد اثر آن روی قلب مانند نروکائین و کینیدین است و این مقدار دارو هیچگونه اثر بدی روی بیمار نداشته بلکه در تمام مدت عمل جراحی نیش بیماران آرام و سرت (۱۰-۸۰ در دقیقه) و رفلکس ها بکلی قطع شده بودند . تغییرات مهمی در فشار خون بیماران حاصل نمیشود و چون گزیلوکائین آنالژیک خوبی است لذا پروفوزیون این دارو ضمن اعمال جراحی بزرگ کمک بسیار مؤثری در بیهوش بیماران مینماید .

اینکه بشرح مختصری در باره بیمارانی که در بیمارستانهای شاهپور علیرضا پهلوی و پهلوی باین متد بیهوش شده اند بیپردازم .

۱- آقای احمد ر. ۱۹ ساله بیتلاب به Septal Defect. مقدار تزریق ۰۰۴ میلی گرم در مدت ۵ ساعت . این بیمار باطریقه قلب باز تجت عمل جراحی قرار گرفت .

۲- یدالله ن. ۴۱ ساله تریلوژی فالوب (قلب باز) . ۳۰۰ میلی گرم گزیلوکائین در مدت ۱۴ ساعت

۳- سیدحسن . ۵. ۴۲ ساله تنگی میترال قلب بسته ۱۸۰ میلی متر

۴- رضا ل. ۳۲ رضا ل. ۳۶ معصوبه خ.

۵- فاطمه بج. ۲۲ توران ص. ۲۵ فاطمه ب. ۲۰ قنبرعلی ف. ۳۰ فاطمه س. ۲۰

۶- فاطمه بج. ۲۷ کانال آتریل « ۱۰۰

هیداتیک ریه راست

۷- فاطمه ص. ۲۷ « کانال آتریل « ۱۰۰

۸- زهرا ح. ۳۲ « تنگی میترال قلب بسته ۱۰۰

۹- سیفعلی ف. ۴۰ « ۱۸۰

بیماران بیمارستان شاھپور علیرضا پهلوی

۱۴- ولی الله. ش.	۳۴ ساله تنگی میترال قلب بسته ۲۰۰ میلی گرم در مدت ۲ ساعت	» $\frac{1}{2}$	» » ۱۰۰ » » » » ۱۴	۱۰- علیرضا
» $\frac{1}{4}$	» » ۲۰۰ » » » » ۲۶	۱۶- عباس. الف.		
» ۲	» » ۱۸۰ » » » » ۲۰	۱۷- کبری. ع.		
» ۲	» » ۲۰۰ » » » » ۴۰	۱۸- اختر. ف.		
» $\frac{1}{3}$	» » ۱۸۰ » » » » ۱۸	۱۹- عباس. خ.		

REFERENCES :

- ۱- Drugs in Anesthetic Practice (Wood -Smith) 1962
- ۲- A practice of Anaesthesia (W.D. Wylic) 1962.