

هوارهی از پنهو هو قوز گیستیک رو ۵۵

پنموموتوز کیستیک روده بیماری نادری است که از نظر بالینی امروزه شناخته شده ولی در اتیولوژی و پاتولوژی آن بین آسیب شناسان اختلاف عقیده وجود دارد. این بیماری در کتب مختلف باسامی Emphyseme buleuse intestinale و Gas cysts of the intestine Enteric Pneumatosis تاریخچه: اولین بار توسط Bang در ۱۸۷۶ شرح داده شده و در سال ۹۰۲ Koss ۱۳ مورد آنرا از کتب جمع‌آوری و گزارش داده‌اند. این بیماری در سنین مختلف دیده می‌شود ولی بمنظور میرسد که شیوع آن بین ۵ تا ۵۰ سال باشد در سوی جنس نیز اختلاف عقیده وجود دارد بعقیده دانشمندان انگلیسی و امریکائی این بیماری در زنان شایع‌تر است عده‌ای از دانشمندان نیز معتقدند که تعداد مردان مبتلا بیشتر است درینج موردی که در بخش‌های جراحی بیمارستان پهلوی دیده شده اکثریت با مردان و دو مردی که در بیمارستان رازی دیده هردو زن بودند.

تشخیص بیماری: عبارتست از مشاهده مقدار زیادی کیست‌ها و حباب‌های گازی در طبقه زیر صفاقی جهاز هاضمه. باید دانست این بیماری نه تنها در جهاز هاشمه (از بری تاراست روده) دیده می‌شود بلکه ممکن است در سایر احشاء مثل مثانه، واژن نیز دیده شود ولی محل عادی و شایع آن روده باریک است.

مشخص بیماری کیست‌ها و حباب‌های هوائی متعددی است به اندازه‌های مختلف ریز و درشت که ندرتاً ممکن است اندازه آنها از خشم کبوترینز گتر باشد. این حبابها در قسمت آزاد روده واقع بوده غالباً بدون پایه‌اند ولی ندرتاً ممکن است بواسطه پایه کم ویشن بلندی در فضای آزاد شکم آویزان باشند جدار کیست‌ها نازک و نیمه شفاف بوده (Translucent) و از نسج ظریف هم‌بند (Connective) که بواسطه سلولهای Endothelial مفروش شده تشکیل گردیده است. گاهی اوقات ممکن است جدار بواسطه نفوذ (Infiltration) سلولهای لتفویت و

* استاد و رئیس بخش جراحی شماره ۲ بیمارستان رازی

** رئیس درمانگاه جراحی بیمارستان رازی

۴۰۰- فرمول خون: سیگماتنه $\text{۲} \frac{۱}{۷}$ اثوزینوفیل ۴ بزرگ ۲ لنفوسيت ۸ مقدار هموگلوبین $\text{۵} \frac{۱}{۷}$ ٪ انتقاده دقیقه و ۳ ثانیه - سیلان ۳ دقیقه قند خون یک گرم - آزمایش ادرار عناصر غیرطبیعی ندارد. چند روز از معده بیمار شستشوی عمل آمد سپس تحت عمل جراحی قرار گرفت پس از باز کردن جدار ملاحظه شد معده بعلت قرحة قدیمی جدار خلفی اثنی عشر متسع شده است در ضمن تغییش و بررسی امعاء و احشاء وجود حبابهای هوائی بفاصله سی سانتیمتر از شروع ژرونم جلب توجه نمود تعداد این حبابها نسبتاً زیاد و اندازه آنها از عدها تا کمی کوچکتر از تخم گنجشک تغییر میکرد غالباً در کنار آزاد روده قرار داشته و فاقد پدیکول بودند و چندین قوس روده کوچک را پوشانده بودند. در نتیجه فشار بالگشتان حبابها خالی میشدند. درساير قسمتها بروده بزرگ و دستگاه تناسلی عارضه ای ملاحظه نگردید چون بعلت چسبندگی معده قابل برداشتن نبود گاستروانتروستوپی بعمل آمد ضمناً چند قتوگرافی رنگی و سیاه و سفید برداشته شد. متأسفانه عکس های رنگی خراب و عکس سیاه و سفید هم زیاد گویا نیست.

References

- I- Surgical pathology Illingworth and Dick 1960, 1949
- II- Boyd Pathology 1960
- III- J. H. Shoesmith and W. P. Crone, J. Surg. 1959