

با هم نهایان شدن آندام چینین^۱

و آمار پنجماله بیمارستان زنان

نمایش مختلط عبارتست از پائین آمدن یک یا چند آندام چینین مثل با و دست همراه با نمایش اصلی مثل سر یا سین بداخل لگن مادر.

آمار زیر درجه شیوع این نوع نمایش را نشان میدهد:

۱) مک کرنیک ۱۹۴۷ (Mc. Cornick ۲۵۰)

۲) گرین هیل ۱۹۰۰ (Green Hill ۳۶۰)

۳) ژیبرد ۱۹۰۱ (Gilberd ۸۰۰)

۴) گوپلرد - ایسمن ۱۹۰۲ (Goplerud - Eastman ۶۵۲)

۵) کونین لیون ۱۹۰۷ (Quin livon ۳۶۰)

۶) گوپلرد ۱۹۶۱ (Goplerud ۷۴۴)

آمار اخیر که توسط آقای گوپلرد در سرویس آقای ایستمن مطالعه و منتشر شده است در بین ۴۲۴۱ مورد زایمان طبیعی که بچه زنده متولد شده است ۵۰ مورد آنها دست یا پا همراه با مر پائین آمده یعنی از نظر شیوع $\frac{1}{44}$ دیده شده است جلوافتادن اندامهای تحتانی یعنی پاها با نمایش سر خیلی نادر است.

در آماری که قبل از کشیده فقط ۶ مورد مشاهده گردیده است یعنی از نظر شیوع یک مورد در ۶۶۸۰ زایمان دیده شده است. مضافاً یعنی که در ۶ مورد نمایش سرین فقط ۴ مورد دست همراه نمایش سرین وارد شده است نمایش های مختلط اغلب با سقوط بندناول همراه است. در هر حال چه سقوط بندناول موجود باشد چه نباشد تصمیم گرفتن برای بیمارستگی بزنده ماندن چینین دارد از نظر شیوع همراه بودن بندناول با نمایش های مختلط ۵ مورد در ۶ مورد می باشد و یا بطور کلی در ۱۱ موارد دیده میشود.

* دستیار بیمارستان زنان.

در بیمارستان زنان تهران بین ۴۱۲۰ و ۴۵۰ مورد زایمان طبیعی و شیر طبیعی در مدت ۵ سال ۳۰ مورد نمایش مختلط دیده شده است که ۲۰ مورد بچه زنده بوده است و فقط یک مورد نمایش پا و سر و بقیه نمایش دست و سر بوده است بنابراین به نسبت $\frac{1}{40}$ این نمایش دیده شده است مقایسه آمار بیمارستان زنان تهران با چند بیمارستان دیگر.

نام بیمارستان	تعداد زایمان	تعداد نمایش مختلط	نسبت شیوه نمایش
بیمارستان جانزهاپکینز(۱)	۴۲۴۱۰	۵۰	$\frac{1}{۷۴۴}$
» تزان یوک(۲)	۸۰۸۷۶	۶۰	$\frac{1}{۱۲۲۱}$
«شیتارژان سواسادان(۳)	۶۶۸۲۱	۹۱	$\frac{1}{۷۲۴}$
» زنان تهران	۱۴۱۲۰	۳۰	$\frac{1}{۴۷۰}$

روشهای درمانی نمایش مختلط در بیمارستان زنان تهران:

طرز درمان	بند ناف	هراباسقوط با سر	هراباسقوط با + سر	عضو همراه با نمایش اصلی	مدت حاملگی	زمینه زایمان	زمینه زایمان جنین	زمینه زایمان رسان	زمینه زایمان رسیده	تمام دست	پا + سر	پا + سر + دست
زایمان خود	۱۰	۱	۹	۳	۷	۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰
یخود												
زایمان بوسیله فورسپس	۴	۴	۰	۲	۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳
زایمان بوسیله چرخش داخلی	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سزارین	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱
جمع	۳۰	۱۱	۱۹	۱۰	۱۰	۲۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰

علت - علل مساعد کننده‌ای که زمینه را برای ایجاد نمایش مختلط آماده می‌نمایند نمایش‌هایی هستند که نمیتوانند کاملاً تنگه فوقانی را پر نمایند.

- ۱- چند زائی بعات شل بودن عضلات جدار شکم و بالا بودن سر.
- ۲- تنگی لگن.
- ۳- بزرگی بچه.
- ۴- جفت سر راهی.

۵- بچه های کوچک (نارس - زایمان های دوقلو) .

۶- هیدر آمینوس .

از بین عالی ذکر شده بالا بچه های نارس بیش از سایر عوامل دیده پیشوند .
از نظر مرگ و میر . ۶٪ از بچه های مرده در نتیجه پائین افتادن بند ناف همراه با نمایش اصلی بوده است .

درمان : در اغلب موارد لزومی ندارد برای اصلاح نمایش مختلط کوشش نمود .
و آنچه آقای گولبرد نشان میدهد تقریباً در نصف موارد احتیاج به هیچ گونه درمانی نیست
و زایمان بطور طبیعی انجام میگیرد فقط در آمار این شخص یک مورد بچه از بین رفته است
در مواردی که تمام بازو وساعده در امتداد سر قرار گرفته بالازدن و جا گذاردن دست لازم
است . با این روش باید دید که آیا بالازدن دست باعث میشود که نمایش اصلی پائین آمده
و تنگه فوقانی را پر کند و از برگشت دست جلو گیری نماید یا نه ؟ .

بعضی اوقات این موضوع بآسانی تحقق پیدا نمیکند در این موقع همزمان با بالا زدن
دست بطرف بالا باید سررا با فشار آوردن به ته رحم بپائین راند .
در مورد نمایش مختلط همراه با سقوط بند ناف و چفت سرراهی باید بیمار را تحت نظر
قرار داد و از هر گونه دست کاری خودداری کرد و اغایاب برای چنین بیمارانی اقدام بسازیم
بهترین روش درمانی است .

از چرخاندن یا کشش چنین نیز گاهی استفاده می شود ، ولی در موارد خیلی محدود
چون این اقدامات عموماً هم برای بچه و هم برای مادر خطرناک است . کشیدن در نمایش
سرین مناسب است در صورتی که اتساع دهانه زهدان کامل باشد و تنگی لگن در
کار نباشد .

اقدام به مزارین در مورد چفت سرراهی - سقوط بند ناف و تنگی لگن قبل از اینکه اتساع
کامل نباشد مناسب است . بکار بردن فورسپس یا کشیدن سرین بعد از کامل شدن اتساع
گلوی زهدان مناسب نمیباشد .