

ايزو توپ نفرو گرافی^۱

در آزمایش‌های کلینیکی متدهای مختلف موجود است که عمل وقدرت هردو کلیه را باهم اندازه می‌گیرند و بدینوسیله میتوان به ضایعاتی که تغییراتی در فونکسیون کلیه میدهدند بی‌برد. متأسفانه تمام این آزمایشات که بسادگی انجام می‌گیرند و برای بیمار چندان ناراحت کننده نمیباشند نمیتوانند درباره کار هریک از کلیه‌ها جدا جدا تضاد نمایند ولی از نظر بالینی لازم است که درباره هریک از کلیه‌ها علیهده اطلاعات صحیح بدست آورده شود زیرا بررسی‌های جدیدپژشکی ثابت کرده است که دربیماری از بیماریهای کلیوی و غیرکلیوی کم و بیش اختلافی از نظر فونکسیون بین دو کلیه موجود است. طریق‌های که با آن میتوان بدون اشکال این اختلاف بین دو کلیه‌ای را نشان داد آزمایش بامداد رادیوآکتیو است و متده که در این باره در چند سال اخیر جای خود را در بین آزمایشهای کلینیکی محکم نموده است ایزوتوپ نفرو گرافی یارادیوپوروفگرافی (RRG) نامیده میشود.

برتری RRG برمتدهای دیگر اینست که:

- ۱ - بوسیله دو کولیماتور میتوان کار دو کلیه را جدا جدا از خارج تعیین کرد.
 - ۲ - با مقدار بسیار ناچیز مواد رادیوآکتیو حاصل که حتی مقدار آن خیلی کمتر از میلی گرم است میتوان آزمایش را انجام داد و این موضوع مخصوصاً در موقع نارسائی کلیوی خیلی بالارش است.
 - ۳ - بادنکتورهای قوی میتوان با دوزی که کمتر از یکصدم دوز اورو گرافی بوسیله اشعه X است آزمایش نمود و این برای کودکان بسیار مهم است.
 - ۴ - برای آزمایش برعکس اورو گرافی هیچگونه آمادگی قبلی لازم نیست.
 - ۵ - آزمایش را میتوان بعد از مدت بسیار کوتاهی حتی چندین مرتبه روزانه تکرار کرد.
- در منحنی RRG (۱ و ۲) معمولاً سه فاز تشخیص داده میشود. (شکل ۱)

۲- در بیماریهای فشار خونی و اثبات ارتباط آن با کلیه یافقدان عوامل کلیوی در فشار خونها .

۳- امتحان مربوط به موانع در مسیر مجرای اورتر. مشادرسنگهای اورتیا انفیلتراسیون های توموری به اطراف اورترها .

۴- تعیین مقدار فونکسیون جدا جدای هر کلیه در بیماریهای طولانی کلیوی .

۵- کنترل نتایج درمان های داروئی و یا درمان با اشعه های مختلفه (اشعه X- اشعه γ و غیره) .

۶- آزمایش روتین در تمام تومورهای شکمی و تناسلی .

۷- آزمایشهای اولیه بیماریهای کلیوی در کودکان .

از موادی که تابحال برای RRG سورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از دیود راست^۱ رادیواکتیو، پرآبرودیل^۲ اوروکون^۳، هپیاک^۴ اوروگرافین^۵ و اخیراً هیپوران^۶ رادیواکتیو است ولی هیپوران از هرجهتی بر سایر مواد ذکر شده برتری داشته و سه فاز نامیده شده را بهتر مشخص می سازد (۷).

امروزه RRG نه تنها یک آزمایش لازم و ضروری برای کلینیک بشمار می رود بلکه از نظر بررسی خیلی با ارزش است مامیتوانیم (۸) مشاهدین میلے تأثیرات مواد دی اورتیک مختلف را بر روی کلیه ها از این راه آزمایش نموده و از تغییراتی که اینها در ترشح ماده حاجب رادیواکتیو می توانند بد هند به درجه سسمومیت کلیوی این مواد پی ببریم. آزمایشهای که ما در روی تأثیر مواد حاجب دویدی و سه بی دی نموده ایم (۹) نشان داده اند که مواد حاجب دویدی مثل پرآبرودیل ویدورون بامتدار گرمی که در یک اوروگرافی ساده تزریق می شوند باعث کاهش شدید ترشح ماده رادیواکتیو در RRG شده در صورتیکه مواد سه بی دی مثل اوروگرافین یا اوپاکورون چنین تغییری را در ترشح ماده رادیواکتیو حاجب باعث نمی شوند و این نظریات سابق را تأیید می کنند که مواد حاجب دارای دواتم ید (۱۰) از نظر

۱- Diodrast

۲- Per abrodil

۳- Urokon


۴- Hypaque

۵- Urografine


۶- Hyppuran

سنجش خیلی مضر تر از مواد سهیدی هستند و در موقع استفاده از آنها باید دقت خیلی بیشتری بکار برد.


در حقیقت آزمایش‌های چند ساله اخیر نشان داده‌اند که RRG نه تنها در کلینیک‌های داخلی، اورولوژی، جراحی، زنان، رادیوتراپی و کودکان از متدهای لازم و ضروری بشمار می‌رود بلکه میتواند در انستیتوهای فیزیولوژی، فارماکولوژی بنام یک تست دقیق مورد استفاده قرار گیرد.



(شکل ۱) سه فاز طبیعی در RRG



(شکل ۲) آزمایش ایزوتوب نفوگرافی در حال نشسته



(شکل ۳) ایزوتوپ نفرو گرافی در یک بیمار مبتلا به عارضه ناگهانی غیر کلیوی (انفارکت قلب)
منحنی I = بلا فاصله بعد از انفارکت
منحنی II = بعد از معالجه.

مأخذ (Literatur)

- 1- Kimbel, K. H. and W. Bourner; Arch. expch. Path. Pharmak. 226 (1955), 226
- 2- Taphin, G. V; O. M, Meredith; H. Kade; C.G. Winter; J. Labor Clin. Med. 48 (1956), 886
- 3- Farschidpur, D. : G. Schoknecht : Roentgenpraxis jalng. XVI (1963) Hept 2.
- 4- Pfeffer, K. H; W. Frommhold u. D. Farschidpur: 69. Kongrez fin innere Medizin in Wiesbaden (Germany) 1963

- 5- Scheer, K. E. ; K. Zum Winkel : 5. Internat. Symposion Bad. Gastein (1962).
- 6- Pfeffer, K. H. : W. Frommhold : G. Gries: D. Farschidpur : Med. Welt 1964 S. 44
- 7- Farschidpur, D., G. Schoknecht : Röfo 99, 5 (1963) 697
- 8- Farschidpur, D, H, Braband, K, H. Pfeffer: 44 DeutscL Kongrez für Medz. Radiol, Strahlen biologie u. Nuklearmedizin (1963)
- 9- Farschidpur,: D.: Der urolage 3. Jalng. Heft (1964) 13
- 10- Eggleton, G.; and y. A. Habib: J. Physiol, (Land) 110, 458 (1950)