

تراکتوتومی در بیماریهای مخ و ریه

سابق براین تراکتوتومی فقط در مواردی انجام میشد که علت ناراحتی تنفس در بالای تراشه وجود داشت مثلاً در لارنژیت‌های زیر گلویت، ادم حنجره و اپایلم‌های پیشرفته حنجره، دمل و ضربه‌های حنجره، سرطانهای پیشرفته حلق و حنجره، فلج عضلات تنفسی حنجره و بالاخره هروقت انسدادی بهر علت در بالای تراشه بوجود می‌آید که تنفس را شکل مینمود لازم بود برای جلوگیری از خفگی بیمار عمل تراکتوتومی انجام شود.

امروزه علاوه بر موارد فوق‌الذکر در مواردیکه برنشها پراز ترشح میشوند ویراثر فلج‌های مرکزی یا محیطی تنفس رفلکس سرفه نمیتواند ترشحات ریه را خارج نماید و سبب تولید کم شدن اکسیژن خون میگردد لازم است عمل تراکتوتومی انجام شود تا بوسیله آسپیراتور ترشحات ریه را خارج نموده و بمقدار کافی اکسیژن داخل ریه نمایند. برای پی بردن بنتایج درمانی تراکتوتومی در موارد اخیرالذکر موضوع را از جنبه فیزیولوژیکی تجزیه و تحلیل مینمائیم. چهار عامل در حفظ برنش دخالت تام دارند این چهار عامل عبارتند از:


- ۱- رفلکسهای بلعی.
- ۲- حرکات دودی برنشها.
- ۳- حرکات مژکهای برنشها.
- ۴- رفلکس سرفه.

این عوامل هر یک بنحوی مانع ورود جسم خارجی و ترشحات بزاقی در حنجره و برنش میشوند. ناسازگاری و از بین رفتن این عوامل بویژه رفلکس سرفه باعث باقیماندن ترشحات در ریه و بالتبلیجه نارسائی تنفس میشود. از نظر بیولوژیکی نارسائی تنفس ریوی موجب کمی اکسیژن خون و زیاد شدن CO_2 میگردد.

کمی اکسیژن و زیاد شدن CO_2 تولید ضعف مراکز تنفسی نموده و نتیجتاً سبب توقف ترشحات در برنش میگردد بطوریکه هروقت میزان فشار CO_2 در خون از ۷۰ میلیمتر حیوه تجاوز کند باید عمل تراکتوتومی انجام شود.

از نظر مکانیکی وجود ترشحات زیاد در برنش فشار داخل قفسه صدری و فشار وریدی را زیاد مینماید. زیاد شدن فشار وریدی عامل مساعدی در پیدایش ورم ریه و ورم مخ

میباشد و خود ورم مخ تولید ضعف مراکز تنفسی مینماید. بنابراین باعث باقیماندن ترشحات در ریه میگردد بطوریکه علت ومعلول درپیدایش یکدیگر تأثیر مستقیم دارند که در زیرنمایانده شده است.



چنانچه ملاحظه میشود پرشدن ریه از ترشحات یا انسداد برنش موجب ضعف مراکز تنفسی وضعف مراکز تنفسی بنوبه خود موجب توقف ترشحات در ریه میگردد و بهترین طریق برای ازین بردن این سیکل نامساعد عمل تراکئوتومی میباشد زیرا تراکئوتومی دارای مزایای زیراست.

- ۱- مانع ورود ترشحات بزاقی وحالتی در ریه میگردد .
 - ۲- از راه تراشه براحتی میتوان ترشحات ریه را خارج نمود .
 - ۳- باعث کم شدن مقداری از فضای تنفسی غیرقابل استفاده میشود .
 - ۴- در مواردیکه ضعف مراکز تنفسی در کار باشد باسانی میتوان اکسیژن لازم را به بیمار رسانید واز زیاد شدن CO_2 جلوگیری نمود .
- بنابراین در اسراضی که باعث توقف ترشحات در ریه و یا ضعف مرکز تنفس میشوند لازم است تراکئوتومی انجام شود این بیماریها بطور خلاصه عبارتند از:
- ۱- پولومیلیت قداسی حاد که در شکل اسپینال تولید فلج عضلات تنفسی و در شکل بولبر تولید فلج مراکز تنفسی وبالنتیجه ازین رفتن رفلکس سرفه-رفلکس بلع و پرشدن برنش از ترشح و زیاد شدن CO_2 میگردد .
 - ۲- در بیماری گیلن باره توأم با فلج تنفسی .
 - ۳- در بیماری کزاز- تزریق کورارد در بیماری کزاز متداول است چنانچه بیمار تراکئوتومی شود وتنفس تحت کنترل قرار گیرد عمل کوراریزاسیون بهتر انجام میشود .
 - ۴- بیماری هاری و بوتولسم .
 - ۵- در مسمومیت های حاد که بیمار در حال اغماء افتاده است و برنشها را از ترشح مینماید .
 - ۶- در ضربه های مغزی که منجر باغماء میشود بعلت پرشدن برنش از ترشح و زیاد شدن خون اتساع عروق مغزی و ورم مخ تولید میشود .
 - ۷- در بعضی از اعمال جراحی مغز برای پیشگیری از تجمع ترشحات در ریه .
 - ۸- گاهی اوقات در بیماری اسکروزان پلاک وراسولیسمان مخ .

۹- در جراحی های قفسه صدري (قلب و ریه) برای جلوگیری از پنوموپاتیهای بعد از عمل که باعث کمی اکسیژن خون و زیادی CO₂ میگردد .
بطور خلاصه علاوه بر موارد کلاسیک هر زمان در برنشها ترشحات زیادی متوقف شود که باعث کمبود اکسیژن و زیاد شدن CO₂ خون گردد برای جلوگیری از خفگی بیمار لازم است تراکتوتومی انجام شود .

مأخذ و مدارك :

Physiologie Medical Fabre et Relengier ۱۴۶۱

Manuel pratique d' oto-rhynologie Jean piquet ۱۴۶۳

Oto-Rhino-laryngologie Georges portmann ۱۹۶۰

Maladies de l'oreil intern et oto- rhino-laryngologie Aubry et pialoux ۱۹۵۰